

GABRIELIS
FALLOPPII
MVTINENSIS,

Physici Præclarissimi ac Chirurgi celeberrimi

OPERV M.

QVÆ IN GTMNASIO PATAVINO, DVM

REM MEDICAM ET CHIRVRGICAM MIRABILI

cum laude & splendore profiteretur, publice

docuit,

TOMVS SECVNDVS.

OPERA ET STUDIO

IOHAN. PETRI MAPHÆI D. Chirurgiæ

Tarvisini,

*Ad auctoris eiusdem gloriam, voluminis integritatem, Studioforum usum atq; vniuersi
entiarum orbis Medicorum utilitatem quam maximam nunc primum in lucem edunt, cum suis marginalibus
copiosissime ampliatas, ac gemino INDEX, quorum prior, qui præfationem immediate subsequitur,
omnes ordine tractatus & singula eorum capita, alter vero in fine operis res
quasvis notatas dignas summa diligentia collectas
continet.*



FRANCOFVRTI

Apud hæredes Andreæ Wecheli,

Claud. Marnium & Ioan. Aubrium.

M. DC.

Cum gratia & Priuilegio S. Cæsareæ Maiestatis ad sexennium.

FALLOPPI GABRIELIS MANTINENSIS

SVMMA PRIVILEGII

CESAREAE Maiestatis privilegio cantum est ANDREAE WECHELII hereditibus, CLAUDIO
 MARNIO, & IOHANNI AVIRIO, ne quis hunc GABRIELIS FALLOPPII Titulum secundum
 intra sacri Romani Imperii & omnium Regnorum ac provinciarum imperialem fines, eodem vel alio chara-
 ctere excutere, aut ubicunque recudendum dare, aut alibi impressum importare, vtiuere vel distrahere palam vel
 occulte ausus. Idem privilegium eis concessum de aliis etiam auctoribus in Philoſophica, Medica, & Iuridica facul-
 te, aliisq; disciplinis liberalibus, ad sex cuiusq; editionis annos. Quod sacra Maiestatis interdictum si quis negle-
 xerit, non modo libris expressis, verum etiam insuper decem marchis auri puri, Imperiali fisco, fraudis conditis & di-
 ctis Wechelii hereditibus, ex agno solvendum, multabitur, ut latius in Caesareo diplomate, declaratum est. Dato Vienna
 25. mensis Maii, anno Domini 1582.

RVDOLPHVS.

V. Iohan. Bapt. Weber.

Ad mandatum S. Caesar. Majest. proprium,

P. OBERNBURGER.



ERANCOVATI
 Augustus Andreas Wechelii

Maximilianus & Iohannes Avirio
 1582



CANDIDO LECTORI

TYPOGRAPHI S.



QUOD PRIMUM Gabrielis Falloppii totum hunc secundum impres-
surum equidem, Candide lector, serio nobiscum meditati con-
silio sumus, qua re tibi potissimum gratificaremur, iunctim
ne totum utrumque edendo & hunc cum primo in unum no-
uumque titulum congerendo, an vero seorsim & discrete suum
utrique priuatum titulum cum indice peculiari adsignando. Diu
itaque nunc hac nunc illac istius deliberationis lance nutante, tandem eo sen-
tentia defleximus, ut seorsim diuisimque impressum curaremus utrumque, & sic,
ut alias, ita nunc quoque pro more nostro, & in literas literatosque amore plus em-
porum commodis votisque, quam nostro priuato emolumento velificaremur.
Cum enim primus huius auctoris operum tomus iam dudum a nobis editus es-
set, cuius exemplaria in manibus, & bibliothecis quam plurimorum versari se-
remus: hisce, ne prioris impensis iacturam facere cogerentur, isthoc consilio
omnino parcendum nobiscum reputaremus. Quae res utique nec istis aut incom-
modabit quicquam aut displicebit, quorum plutei prioris tomi exemplum vel
adhuc desiderant. Nostrum ergo hoc studium, candide lector, ut comprimis
etiam auctoris laborem, eo, quo fas est, animo accipe, & similia in aliis tibi pro-
futuris de nobis pollicere.

Cæterum de auctore (breuiter dicamus) horum operum, viro extra omnem
aleam illustri, laude dignissimo, quid hic finiamus nisi publicis Mularum &
phœbi lachrymis præmaturam eius mortem iure merito deplendam esse? Vitæ
periodum nimis quam breuem habuit, & ætatem suam vix ad annum 39.
prouexit. At interim (proh indolem) quam magnis & meritis & monumen-
tis orbem terrarum isthoc curriculo impleuit? Ex pulpito docens auditorum
innumerum numerum cum stupore & admiratione quotidie detinuit, quotidie
ægrorum visitationibus desudans, illorum magnam copiam quodam quasi
miraculo orco eripuit. Publicis theatris mita solertia, applausu solenni Ana-
tomicam tum manu exercendo, tum voce iuxta illustrando, nunquam pedem
abfuit. Et non mireris, Lector, unde nam subcisiuas saltem aliquas huiusmodi ad-
peranda simul tot monumenta suffurari ipse potuerit? Qui si saltem exiguis
aliquot mensibus viuus adhuc perstitisset, præter cætera aurea opera, de colo-
re vniuersi corporis malo, de omni eius infectione seu suffusione, ut lentigine,
vitiligine, liuoribus, nigredine adeoque omnibus cutaneis maculis & scædamen-
tis promissum accuratum tractatum nulla mora nostris votis communicasset.
Sed quod res est, ingratitude nostræ fata virum hunc inuiderunt. Vixit annos
39. Patavii obiit, Anno 1562. 7. Id. Octobr. cuius monumentum ibidem in
templo D. Antonii maioris prope ostium visitari visere est.

Tantum de nostro consilio & operis auctore Quæ, lector, proba, & vale.

INDEX ET ELENCHVS LIBRORVM AC CAPITVM QVÆ IN HOC SECVNDQ TOMO GABRIELIS FALLOPPII CONTINENTVR.

TRACTATVS I.

DE MEDICAMENTIS SIMPLICIBVS.

| | |
|---|---|
| D E huius facultatis subiecto. CAP. I. fol. 1 | Quaratione ac methodo vniuscuiusque medicamenti facultates possint dignosci. c. XI 14 |
| De definitione dictæ facultatis. c. II 2 | De quibusdam difficultatibus circa sensum gustus, & quomodo Galenus & Aristoteles de hoc inter se reconciliari possint. c. XII 15 |
| De diuisione Medicina. c. III 3 | De odoratu & odoribus. c. XIII 16 |
| De quibusdam dubitationibus circa superius dicta & earum resolutione. c. IV 4 | De methodo applicandorum medicamentorum. c. XIV. 17 |
| De inscriptionibus circa hanc facultatem variis, & qua sit tenenda. c. V 6 | De Scirrhis à quacūq; vel causa vel materia factis. c. XV. 18 |
| De intentione ac ordine tractationis. c. VI 7 | De vi ac facultate soluentium. c. XVI. 19 |
| De quibusdam aliis differentiis simplicium, quæ ad ipsorum cognitionem essentialem multum faciunt. c. VII 9 | De corpore tractando secundum varias indicationes, & eius qualitates actiuas. cap. XVII. 21 |
| De reliquis simplicium differentiis pro perfecta ipsorum cognitione substantia & essentia. cap. VIII 10 | De qualitatibus passivis. c. XVIII 22 |
| De iis, quæ veluti actum materiam informant. IX. 12 | De quibusdam dubitationibus circa sapes dictos, item de methodo inueniendi secundas, tertias & quartas qualitates. cap. XIX. 23. |
| De differentiis à forma sumptis, & quid sit forma. c. X 13 | |

Finis tractatus primi.

TRACTATVS II.

De materia Medicinali in Librum Primum Dioscoridis. fol. 25

| | |
|---|------------------------------------|
| D E praxionibus circa Dioscoridem. CAP. I. fol. 25 | De spica nardi indica. c. X. 38 |
| De expositione seu explicatione proamii libri primi Dioscoridis. c. II 26 | De spica celtica. c. XI. 39 |
| De necessitate cognitionis medicamentorum. c. III 27 | De nardo montana. c. XII 40 |
| De expositione literæ Dioscoridis, ut & de præceptis circa collectionem plantarum, collectionis tempus & circa loca. c. IV 29 | De asaro. c. XIII 41 |
| De ætate plantarum & earum commutatione, ut & de plantis odoratis. c. V. 30 | De Phu. c. XIV 42 |
| De iride & quo ad nomen, & de eiusdem viribus ac proprietatibus. c. VI 31 | De malabathro. c. XV 43 |
| De acoro. c. VII 33 | De Cassia. c. XVI 45 |
| De meo vel meu. c. VIII 34 | De cinnamomo. c. XVII 46 |
| De Cypero. c. VIII 35 | De amomo. c. XVIII 48 |
| De Cardamomo. c. IX 36 | De Balsamo. c. XIX 49 |
| | De balsamo artificiali. c. XVII 52 |
| | De asphaltato. c. XX 53 |
| | De Santalis. c. XXI 55 |
| | De musco arborum. c. XXII 56 |
| | De moscho. c. XXIII 57 |
| | De ambra. c. XXIV 58 |
| | De Zibetto. c. XXV 59 |

Finis tractatus Secundi.

TRACTATVS III.

De Luxationibus.

| | |
|---|--|
| D E partibus, quæ ossibus colligantur, & de luxationis natura & causis. CAP. I. 60 | & laqueorum. c. III. 64 |
| De speciebus luxationum, deque earundem signis & prognosticis variis. c. II 62 | De conseruatione restantionis facta per fascias & alia instrumenta. c. IV 67 |
| De curatione simplicis luxationis & ante & post restitutionem, & quot sint species restantionis | De fasciis, quo ad earum conseruationem & stabilitatem in loco. c. V 71 |
| | De inflammatione prohibenda & articulo in suo loco 70 |

lucā conseruando per victus rationem & enacu-
ationem. c. VI. 72
De tractatione loci affecti per manulem operati-
onem & lotionem, & de signis ulcerum sub fasciis
latentium. c. VII. 74
De luxatione cum inflammatione vel ante vel post
restitutionem. c. VIII. 77
De luxatione cū esse erupente extra cutim. c. IX. 78
De luxatione cum detractione ossis, quia ulcerata
vel vulnerata sit caro, & partium circumposi-
tarum tractatione. c. X. 79

Finis tractatus tertii.

TRACTATVS IV.

De fracturis.

De fractura natura, speciebus, causis, signis & cu-
rationis. CAP. I. 88
De callo osseo & eius natura, & quibus scopis absol-
uatur curatio. c. II. 91

Finis tractatus quarti.

TRACTATVS V.

De partibus similibus.

De difficultate tractationis, hominis substantia &
corporis compositione. CAP. I. 96
De natura, definitione & usu partium similiarum
cum solutione difficultatum. c. II. 97
De numero partium similiarum ex Aristotele, Ga-
leno, Auicenna, Cardano, Fernelio, Fuchsio &
alijs probantibus compositionem non esse de na-
tura instrumenti. c. III. 99
De ossibus quo ad eorum naturam, materiam, nu-
trimentum, causam, formam, usum, definitio-
nem atq. passionem. c. IV. 103
De pinguedine, eius passionibus, materia, causa effi-
cientie, natura, usu, definitione & speciebus. cap.
VI. 109
De carne, utpote de eius nominibus speciebus, defi-
nitione, generatione in vulneribus, de causa eius
efficiente, temperie, facultatibus, qualitatibus,
usu, differentiis atque passionibus. c. VII. 112
De nervis, eius natura, materia, ortu, specie, faculta-
tibus, usu & passionibus. c. VIII. 117
De ligamentis, utpote de eius nominibus, definitio-
ne, materia, generationis & materia nutritio-
nis, forma, causa efficiente, temperatura, facul-
tate, usu, passionibus & dubitationum solutione
c. IX. 120
De chorda, videlicet de eius nominibus, definitio-
ne, materia, differentiis, nutrimento, ortu, tem-
perie, usu, sensu, passionibus & opinionibus au-
torum. c. X. 122
De membrana nominibus, natura, definitione, ma-
teria, causa efficiente, temperie, usu & passione.

Finis tractatus quinti.

TRACTATVS VI.

De vulneribus in genere seu vniuersali.

De nobilitate & dignitate artis vulnerarie, & qui

De curatione luxationis articuli cum prominentia
ossis. c. XI. 82
De callositate superueniente luxatis articulis &
impediente motum, & quomodo ea sit tollenda
c. XII. 84
De articulo ex sua sede cadente post restitutionem.
c. XIII. 85
De elongatione articuli & eius curatione. c. XIII
86
De distorsione puerorum in utero vel post edu-
ctionem facta per nutrices. c. XV. 87

De ferulis, tabellis, vinculis & dissolutione fractu-
rarum. c. III. 92
De ulcere superueniente fractura, & de ossis detec-
tione & ablatione. c. IV. 93

capit. XI. 126
De vena, & primum de eius nominibus substantia,
natura, definitione, constructione, causa efficiente
& principia earum generationis cum rationibus
Aristotelis & Peripateticorum. c. XII. 128
De rationibus Medicorum contra Aristotelem de
principio venarum, & responsionibus ad ratio-
nes Aristotelis, & ad auctoritates, & de conclu-
sione. c. XIII. 131
De arteriis quo ad earum nomina, naturā, defini-
tionem, substantiam, materiam, causam efficien-
tem & usum. c. XIV. 135
De pulsū & qua circa eum notatu digna sunt. c. XV
137
De responsionibus ad rationes in oppositum per E-
rasistratum & Trusianum traditas. c. XVI
142
De vnguib. c. XVII. 145
Quomodo ad argumenta in oppositum allata sit re-
spondendum item quæ sit vnguinum natura, de-
finitio, causa efficiens, materia, nutrimentum,
temperies, usus & passiones. c. XVII. 147
De pilorum nomine, definitione, materia, genera-
tione, causis efficientibus, generibus, temperie,
usu, passionibus, colorum & crispitudinis causis,
& eorum casu. c. XIX. 153
De humore crystallino & de tunica cornea. cap. XX
154
De cute quo ad eius nomina, causas, materiam,
temperaturam, usum & passiones eiusdem. cap.
XXI. ibid.

autores in tali materia sint legendi. CAP. I. 157

De fontibus differentiarum & speciebus ipsius solutionis continui. c. II 159
De vera definitione vulneris & differentiis à propriis fontibus. ex Falloppio semetita & causis. c. III 161
De prognostico instituendo in vulneribus. unde habeatur, quæ sint letalia vulnera, quæ non. c. IV 162
De curatione vulnerum secundum varias intentiones & scopos. c. V 163
De iis, quæ naturam impediunt, ne vulnus sanet per certam partem. ex ipso Falloppio distinctis. c. VI 166
De vulnerum excrementis, de quorum nominibus, signis, speciebus, natura, materia, causis & ortu. c. VII 167
Quo modo & arte tela & alia in vulnere contenta extrahenda sint. c. VIII 169
De extractione manuali telorum & infixorum in vulneribus & de instrumentis ad eam rem maxime aptis. c. IX 171
De quibusdam præceptis circa coniunctionem vulnerum per suturam, & conseruationem eius per deligationem cum diuersis fasciarum speciebus, & per laqueos & per puluicos. c. X 173
De laqueis & telis pro glutine item de diuersis glutinibus, ceratis glutinosi, & modo applicandorum telorum psaltherino. c. XI 175
De suture, de fibulis, acubus, filo, pennis, formicarum capitibus, & omnibus iis, quæ ad suturam pertinent. c. XII 176
De conseruatione temperiei partis affectæ, siccitatisque ipsius: quod duplex sit temperamentum &

quando conueniant siccantis diuersorum graduum, & qualia debeant esse sarcinica. c. XIII 178
De resuscitatione & explosione illorum, qui in vulneribus videntur aqua benedicta, incantationibus, benedictionibus, oleis atque linteis benedictis & albo cum mastice. c. XIV 179
De medicamentis conglutinantibus ad vulnus apponendum & de diuersa eorum compositione & recta applicatione. c. XV 180
De regimine circa sex res naturales & de phlebotomia & euacuatione per pharmacum. c. XVI 182
De agglutinandis atque carne implendis vulneribus & de signis vulneris cocti, de quorum excrementis. c. XVII 184
De medicamentis sarcoticis cuiuscunque gradus cum simplicibus, tum compositis. c. XVIII 186
De medicamentis impediendis ne caro nimis crescat, ut etiam de iam adnatam & superfluum auferentibus. c. XIX 187
De modo inducendi cicatricis super vulnus. c. XX 188
De curatione symptomatum, quæ superuenire solent vulneribus & de eorum præcautione. cap. XXI 189
De cruditate vulnerum. c. XXII 190
De dolore vulnerum, de inflammatione, erysipellate, intemperie quatuor, ædemate atque nimio sanguinis fluxu. c. XXIII 191

Finis tractatus sexti.

TRACTATUS VII.

De vulneribus particularibus, a capite ad infra versus.

De oculorum vulneribus, & eorum diuisione, agglutinatione, sutura & tractatione post conseruationem. CAP. I 196
De secundo genere vulnerum oculis contingentium. c. II 197
De tertio genere vulnerum oculorum difficilium ac perniciosorum. c. III 199
De dolore vulnerum oculorum. c. IV 202
De tollendis cicatricibus, quæ post sanationem relinquantur. c. V 203
De vulneribus nasi & narium refrigeratarum, & de carni confusione: item de foris narium & glutine pro applicandis ipsis formis. c. VI 204
De vulneribus aurium. c. VII 206
De vulneribus colli. c. VIII 207
De vulneribus gula & aspera arteria. c. IX 207
De vulneribus ac incisionibus venarum & articularum colli, & de diuersis modis sistendi sanguinis earum. c. X 208
De vulneribus spinalis medullæ. c. XI 212
De vulnerum thoracis cognitione, & possumum de signis vulnerum penetrantium. c. XII 213
De curatione vulnerum thoracis quoruncunque, & præcipue de euacuatione sanguinis collecti & grumosi contenti in thorace. c. XIII 215

De confolidatione vulneris, quos modis efieri possit, & per quæ & qualia sint talia medicamenta cum simplicia tum composita. c. XIV 216
De curatione vulneris illius, in quo ex sanis collectione successit empyema. c. XV 218
De vulneribus abdominis, de eorum differentiis, de signis quoruncunque, partium contentarum vulnerarum & de præfagio in eis faciendis. c. XVI 219
De curatione vulnerum abdominis. c. XVII 220
De confusione vulnerum abdominis & curatione ac amputatione omenti excurrentis & refrigerati. c. XVIII 221
De curatione intestinorum cum egressorum ex abdomine, tum etiam vulneratorum. c. XIX 222
De vulneribus ventriculi curandis. c. XX 223
De vulneribus epatis. c. XXI 226
De vulneribus renum. c. XXII 227
De vulneribus vesicæ. c. XXIII 227
De vulneribus nervorum & præcipue de eorum qualitate, diuisione, signis, præfagio & sensu. c. XXIV 228
De punctura nervorum. c. XXV 228
De nervis sectis siue casim vulneratis. c. XXVI 231
De confuso nervo cum cute, tum sine cute. c. XXVII 232

De vul-

De videribus scelopetorum velâ glau de plumbea factis. c. XXVIII

233

Finis tractatus septimi.

TRACTATUS VIII.

De vlcetibus particularibus.

| | |
|--|--|
| <p>De Finea speciebus, natura, causis, signis, præfatio & curatione. CAP. I fol. 236</p> <p>De affectibus aurium, videlicet de distillatione, de ulcere, de purulenta, putredine, vermicibus, carne supercrescente & ossis corruptione. c. II 237</p> <p>De vlcetibus oculorum, cum in vniuersali, tum de omnibus eorum speciebus, de infixis in oculis & de fluxione. c. III 239</p> <p>De cura fluxionis facientis vlcus in oculo. capit. IV 241</p> <p>De reliquis vlcum oculorum speciebus. c. V 242</p> <p>De fistula lachrymali. c. VI 243</p> | <p>De vlcetibus narium. c. VII 245</p> <p>De vlcetibus palati, erosione gingivarum & affectibus quibusdam dentium. c. VIII 246</p> <p>De vlcetibus papillarum vel mammillarum capit. c. IX 247</p> <p>De vlcetibus sedis, sed potissimum de fistula aut, cum oculis, tum manifesta, cum reclusa, tum obliqua, quo ad eius naturam, causas, signa & præfagium. c. X 248</p> <p>De curatione fistularum ani. c. XI 249</p> <p>De rhagadibus. c. XII 252</p> <p>De vlcetibus pedum. c. XIII 253</p> |
|--|--|

Finis tractatus octau.

Tractatuncula siue potius lectio de Tumore bilioso, quam benignus lector ad doctrinam tomii primi de tumoribus præter naturam caput 28. quod de erysipelate est, præferre potest fol. 553

TRACTATUS IX.

De Scirrho & reliquis tumoribus omnibus tum vniuersalibus tum particularibus, qui libro in tomum relato defunt.

| | |
|---|--|
| <p>De scirrho. CAP. L fol. 256</p> <p>De purgatione totius & tractatione loci affecti in scirrho. c. II 259</p> <p>De cancro quo ad varia eius nomina, definitionem, differentias, signa, causas & prægnosticum. cap. III 261</p> <p>De curatione cancri. c. IV 263</p> <p>De tractatione cancri quo ad locum affectum per medicamenta, & etiam per manualementum operationem. c. V 264</p> <p>De elephantiasi siue lepra, quo ad eius nomina, differentias, & causas atque signa. c. VI 268</p> <p>De signis lepræ cum incipienti, tam confirmata. c. VII 270</p> <p>De curatione lepræ & primum de præfatio. c. VIII 271</p> <p>De curatione lepræ per loci affecti tractationem. c. IX 274</p> <p>De glandulis istis, qua nodi dicuntur seu naphtha vel abscessus cum folliculo. c. X 276</p> <p>De curatione abscessuum cum folliculo in speciali, & primum de meliceride. c. XI 277</p> <p>De atheromate. c. XII 280</p> <p>De steatomate. c. XIII 282</p> <p>De tumore illo, qui aneurisma vocatur & inter tumores materiam collectam habentes refertur. c. XIV 283</p> <p>De signis aneurismatum. c. XV 284</p> <p>De curatione aneurismatis. c. XVI 285</p> <p>De bronchoceli seu aneurismate in gutture. c. XVII 286</p> <p>De tumoribus glandularum, qui struma seu serophula dicuntur. c. XVIII 288</p> <p>De curatione exquisita strumarum quo ad virtutem & humoris euacuationem. capit.</p> | <p style="text-align: center;">XIX</p> <p>De curatione strumarum per tractationem loci affecti. c. XX 291</p> <p>De ganglio siue nodo, natha vel nappa vulgo dicta cap. XXI 293</p> <p>De tumoribus narium. c. XXII 296</p> <p>De curatione polypi per medicamenta localia siue loci tractationem. c. XXIII 297</p> <p>De hydrocephalo & eius curatione exquisita. cap. XXIV 298</p> <p>De cassi siue inutilis inuenibus occurrentibus in facie. c. XXV 300</p> <p>De ranula siue batracho. c. XXVI 302</p> <p>De gingivarum parulidibus. c. XXVII 303</p> <p>De epulida seu gingivarum tumore. c. XXVIII 305</p> <p>De panaritii vnguium ac digitorum affectibus. c. XXIX 305</p> <p>De Hernia quacunque primum tamen de vmbilicali. c. XXX 306</p> <p>De Hernia inguinali & potissimum de Hernia seroti, quo eodem modo curantur. c. XXXI 308</p> <p>De cõseruatione intestinorum repositorum in suum locum per medicamenta & ligaturas. c. XXXII 310</p> <p>De curatione hernie intestinalis in serobo existentis per manualementum operationem iuxta aliorum præcepta & potissimum ex inuentu proprio. c. XXXIII 312</p> <p>De Hernia agnosa. c. XXXIV 314</p> <p>De Hernia ventosa, carnosâ, cancerosa, varicosa atq. etiam de tephacea. c. XXXV 315</p> <p>De inflammatione testium. c. XXXVI 316</p> <p>De affectibus glandis pudendi ad tumores pertinentibus. c. XXXVII 317</p> <p>De caruncula super crescentem in canali urinario</p> |
|---|--|

I N D E X.

| | | | |
|--|-------|---|-----|
| <i>molestissima. c. XXXVIII</i> | 319 | De affectibus partes extremas occupantibus, & primum de pernionibus. c. XLI | 322 |
| <i>De ani affectibus illis, qui ad tumores pertinent & manu indigent. c. XXXIX</i> | 320 | De callis seu clavis. c. XLII | 323 |
| <i>De hemorrhoidibus. c. XL</i> | ibid. | De poris seu verrucis. c. XLIII | 324 |

Finis tractatus noni.

T R A C T A T V S X.

De decoratione.

| | | | |
|---|-------|--|-------|
| Praefatio seu CAP. I | 325 | De quibusdam partibus natura tenuibus inrasandis atq. magnificandis. c. IX | 338 |
| Definitio decorationis ad quam artem pertineat c. II | 327 | De praputis breuitate corrigenda. c. X | 340 |
| De Turpitudine & primum de obesitate & quid nominis eius. c. III | ibid. | De nasi generatione, labiorum atq. aurium. c. XI | 341 |
| De causis obesitatis. c. IV | 330 | De mammillarum amplificatione. c. XII | 342 |
| De indicationibus. c. V | ibid. | De papillis. c. XIII | 343 |
| De gracilitate. c. VI | 332 | De partibus crassis extenuandis. c. XIV | ibid. |
| De maciei curatione. c. VII | 334 | De mammillarum extenuatione. c. XV | 343 |
| De diminutione vel paruitate alicuius membri restitueranda. c. VIII | 336 | De testium extenuatione. c. XVI | 344 |

Finis tractatus vltimi.

GABRIE.



10 GABRIELIS FALLOPPII MV-
TINENSIS. MEDICI AC PHILOSO-
PHI PRÆCLARISSIMI. DE MEDICAMENTIS
simplicibus II. TOMI Tractatus I.

CAP. I. De huius facultatis subiecto.

20 **Q**UANTA sit utilitas, quantaque nobilitas & præstantia huius
facultatis simplicium, iam patet ex superiori nostro sermone.
Nunc autem cum ob utilitatem, nobilitatem ac eius præstan-
tiam vt Medicinam optime acquiramus, eam adipisci non
solum conueniens, sed etiam necessarium fore coniciam: vt
id fieri possit, necesse est medicam artem ipsam prius diui-
dere, cum ipsa simplicium facultas ad Medicinam attineat,
& inter medicas partes connumerari debeat. In qua re, si-
cut in aliis pertractandis vos obsecro, ac maxime rogatos vel-
lim: vt totis viribus sitis auerſi, neque auctor aut interpreti,
& cuiquam ita addicti, vt has meas explicationes non appro-
betis: nam omnia, quæ sum dicturus, non nisi ratione pro-
bare intendam: neque expecteris me reprobaturum clarissimorum virorum sententias,
qui tanquam duces in hac facultate existunt, cum mihi id ingrati tudini ac arrogantiæ esset
asseribendum: His enim gratias potius referre debemus, cum facultatis huius vel inuen-
tores vel auctores fuerint. Diuidenda igitur est ars medica, vt videamus, sub quam par-
te contineatur hæc facultas indagandorum simplicium, verum primo quomodo de his
simplicibus agendum sit, dicamus.

30 Simplicia sunt subiectum in hac facultate. Quia autem à definitione omnis facul-
tas exordiri debet, prius definitionem ponere debemus. Sed ante omnia quoad nomen,
vt euitetur confusio, quid itaque sit quoad nomen dicamus. Simplex igitur quoad no-
men illud est, quod purum, syncerum ac impermixtum est. Tale autem, quod purum
40 syncerumque est, duplex esse potest, aut enim potest esse incorporeum aut corporeum. Ve-
rum alius nomen petere oportet, quoniam perfecta cognitio haberi non potest nisi à lon-
ginq̃is principiis exordiamur: duplex itaque est simplex, si incorporeum, aut scilicet
quod potest per se à corpore separatim existere, aut non: quod potest à corpore separari,
simplex est autē vere, aut non vere: quod vere simplex est, est purus actus, vt Deus Opt.
Max. Quod vero incorporeum est, per se existere potest, ac non tamen simplex est vere ac
absolūte, vt sunt reliquæ intelligentiæ, de his Auerſi. Meth. tract. 2. quæ sicut à Deo re-
cedunt, aliæ magis, aliæ minus sunt simplices. Quod autem hæc non sint vere simplices,
patet, quoniam suam essentiam à Deo participant: nam intellectus noster possibilis, qui est
50 veluti quoddam potentia, totum compositum esse dicitur, quoniam cum potentia exi-
sit, & minus particeps est diuinæ essentia quam alia. Sunt autem alia simplicia in corpore,
quæ non possunt separata à corpore per se existere, & duplicia sunt: alia enim sunt corpo-
rum principia, licet ipsa non sint corpora: alia quæ non sunt corporum principia.
Quæ autem sunt principia, adhuc sunt duplicia, alterum veluti fundamentum & quod
nulli inheret, perfectionem autem sumit à materia, quæ est quoddam simplex incorpore-
um, quæ non potest per se existere, cum sit fundamentum aliorum à forma: alterum vero
est, quod alio iunittur reddens ipsi esse, & hæc est forma.

Simplex vero, quæ non sunt principia corporum, sunt omnia accidentia in genere:
si vero plura accidentia simul complectamur, erit veluti compositum, talia sunt simplicia

Ordinis ra-
tio.

Subiectum
huius facul-
tatis.

Simplex
quæ ad no-
men quid
sit.

Duplicia sim-
plicia.

Corporum
principia.

Simplicia
incorporea.

incorporea. Corporea vero duplicia sunt, nam aut tale à natura est, quia scilicet non est ex pluribus corporibus à natura constitutum, aut est simplex, quia ab arte non habet compositionem. Quod autem tale est à natura, illud triplex est secundum Auerrohem in libro destructionum disputatione tertia: aut enim ex materia & forma compositum est, & tale est elementum; aut constat ex materia tantum in actu, non autem ex forma: ut sunt corpora cœlestia: & sunt hæc duo corpora simplicia: Tercium est, quod eandem definitionem in toto, & hoc est homogeneous corpus, quod simplex videtur in sua natura. Hæc autem est bona distinctio quo ad speculationem. Sed nos alio modo distinguere solemus: vel scilicet quod corpus simplex, vel reuera tale est, vel non: si reuera tale est, aut ex materia & forma componitur, qualia sunt Elementa, vel est compositum cum materia in actu. Si vero sit secundum apparentiam tale, sunt corpora homogenea, & sub istis continentur lapides, metalla & huiusmodi quæ eandem rationem seruant, & denominationem in toto sicuti in parte. Si vero dicatur simplex, quia non sit tale ab arte, & tale corpus dicitur illud esse, quod est huic nostræ tractationi subiectum, quod adeo commune est, ut sub se continent omnia corpora naturalia, de quibus tractatur in hac nostra facultate, siue sint simplicia, siue mixta ex elementis, siue animata, siue inanimata, siue animalia omnia sensitiua, siue non. Et de his corporibus multi sunt, qui pertractant, & variis modis considerari possunt: Ideo videndum est, quomodo sint consideranda in hac nostra facultate, ut distincte procedamus. Hæc autem simplicia corpora à Philosopho naturali considerantur, quoniam considerat corpus ipsum naturale, mobile, generationi & corruptioni subiectum: Sed Philosophus de his non tractat ad usum aliquem humane vitæ, sed contemplationis gratia tantum. Agricola etiam, & qui hortorum notitiam habent, licet non vniuersaliter considerent, tamen multa, quæ sunt sub hoc subiecto, considerant, & circa sationem, culturam ac seminum collectionem versantur, pro ut hæc sint animalibus necessaria atque hominibus. Incantatores etiam his incumbunt, ut scilicet nocua menta hominibus affectant. Herbarii vero, qui nunc vulgo herbolarii dicuntur, plantarum cognitionem habent, quoniam figuram & nominum cognitionem considerant, & à montibus ipsas plantas colligunt ad loca habitata transferentes, ut vendantur & plantentur ad usum hominum, non tamen norunt ex his, nisi nomen & loca ubi nascuntur.

Seplasiarii vero & hi cognitionem habent, non tantum ut nomina sciant & figuras, sed ut possint ipsa conseruare, ut deseruiant præceptis Medicorum, & isti dicuntur maiorem simplicium cognitionem habere, quam herbolarii.

Mulierculæ etiam sunt quædã & verulæ, quæ quidem in Empyricis aliquam cognitionem habent, non tamen considerant naturam aut temperamentum ipsorum, sed sola experientia ductæ ipsi vtuntur.

Medici etiam dogmatici ac rationales singulorum simplicium cognitionem habere profitentur, non ut nomina tantum figuræque, sed ut naturam, facultates ac vires ipsorum cognoscant, ut varia possint ad sanitatem tuendam, & morbos expellendos remedia parare. Talis est cognitio, quæ à Medico debet haberi, & quæ etiam in hac nostra tractatione memorizè mandari oportet. Et omnia corpora naturalia considerantur à Medico: aliqua enim composita habemus à plantis, alia ab elementis, alia ab animalibus & similibus. Videndum est modo ac declarandum, quid sit medicamentum ipsum, & quomodo à Galeno definitum sit, & his declaratis ad diuisionem Medicinæ deueniemus, & videbimus, sub quam parte contineatur hæc tractatio.

De definitione dictæ facultatis.

CAP. II

VM conaremur subiectum huius facultatis inuenire, id nobis enenisse conspicio, quod fabris lignariis solet aliquando, qui dum aliquod perficere tentant, mundum primum ipsum reddunt, excrementa ac partes crassiores reicientes, ac deinde à partibus crassioribus expurgant: tertio vero à quibusdam corporibus minutis denudant, quarto in toto ita ipsum expoliant, ut perfectum reddant; ita nos fecimus in superiori capite, diuidentes, donec inuenimus subiectum huius facultatis naturalis, quod erat corpus ab arte denudatum, & ita discurrentes diximus, hoc à pluribus artificibus considerari. Medicus autem secundum vnamquæque speciem corpus hoc naturale considerat, non ut agricola, ut ea colligat, quæ ad usum animalium spectant, ut ipsis vescantur, non alia de causa, quæ paratur ab aliis: sed ut omnibus

hisc re & cognitis, quoad nomen, formam & figuram eius naturam contempletur, vt regularar, quibus curare morbos possimus: & hic est finis considerationis in hac facultate. Perfecta itaque definitio huius nostræ facultatis hæc erit. Naturale corpus simplex illud erit, quod nulla est arte passum seu compositum, vt ex eo rationalia remedia sumantur ad sanitatem tuendam ac recuperandam. In hac definitione supremum corpus est ipsum genus, per quod distinguitur ab omnibus aliis, quæ simplicia sunt in corporea, de quibus hic non loquimur. Subdimus (Naturale) quia hoc debet distingui a corpore mathematico & a corpore metaphorico, si datur, & etiam a cœlesti corpore, quod ex materia in actu compositum est, licet simplex sit, illud tamen non consideratur a medica
 10 facultate: per naturale enim intelligo corpus ex materia & forma generationi ac corruptioni suppositum. (Nulla arte compositum) vt tradet ratio, quare simplex sit ac impermixtum, quoniam de simplicibus agimus in hoc loco, ex quibus deinde composita parantur. (Vt ex eo remedia sumantur ad sanitatem tuendam & conseruandam.) Hæc est ratio formalis, quia multi considerant hoc corpus naturale nulla arte compositum, vt naturales ac mathematicas, non tamen vt ex eo eligant auxilia recipienda, quod ad Medicum tantum pertinet: Considerat enim hæc vt sunt corpora. Verum quia etiam Empirici talia simplicia hoc eodem modo considerant, quoniam etiam his videntur, vt distinguantur hæc inter se inuicem, addidimus (rationalia remedia) & ita habetis definitionem hanc perfectam essentia subiecti, & fateor me ipsam vnquam ab alio non audiuisse
 20 senecque didicisse, sed meo tantum labore eam aduenisse. Hoc est igitur subiectum facultatis huius.

Sed dubitabit aliquis, quia multa videntur esse in rerum natura genita, quæ non considerantur a Medico hoc modo, quoniam circa centrum terræ ac in profundo maris, quæ nos contingere non possumus, multaque in suprema regione aeris consistunt, ad quæ peruenire minus datum est alicui, quomodo ergo dicitur, omnia corpora naturalia nulla arte composita esse subiecta Medici, si hæc ad nos peruenire non possunt? Ad hanc
 30 difficultatem dupliciter respondere possumus, & vtraque responsio optima erit. Prima quod diximus, nullum esse corpus naturale, non quidem secundum indiuiduum, quoniam hoc est impossibile, sed secundum genus considerata, hoc enim potest sufficere. Aliter respondendum est, quia etsi non possim ego propter maximum interuallum ex his medicamenta sumere & parare, tamen talia sunt hæc corpora, vt ex his possent parari remedia, si in promptu essent ac præ manibus haberentur: quare nihil obstat, quod huiusmodi res non faciant ad vsum medicum. Et hæc sunt solutiones ad hanc difficultatem. Tale ergo erit subiectum, quod in hac parte Medicinæ considerabitur, videndum enim est Medicum, qui mederi vult, non cognoscere subiecta hæc, quæ sunt necessaria, & tunc oportet ad hoc vt adsit primo herbarius optimus (de quo antiqui tractant) qui aptus sit ac
 40 his ita doctus, vt Medicum ipsum docere possit, & est velut pater Medicorum dicendus, quare ipsos consulere sæpe debemus. Videamus modo diuisionem artis Medicæ, vt hanc facultatem in sub parte, qua collocari debet, reponere sciamus,

De diuisione Medicinæ.

CAP. III.

Cum iam definitum sit subiectum huius facultatis, videamus ad quam Medicinæ partem pertineat, quare Medicinam diuidamus.

Diuiditur autem ars Medica à quibusdam in quinque, ab alijs vero in tres partes tantum. Qui in quinque partes diuidunt, primam partem dicunt esse quæ circa naturam ac constitutionem humani corporis versatur: de hac autem parte in lib. de temperamentis & humoribus Galenus tractat, ac Hippocrates in lib. de nat. hum. Secunda
 50 pars Medicinæ est *συντακτική*, in qua symptomata ac causæ explicantur, de qua in lib. de symptomatum causis pertractat idem Galenus. Tertia est *εμπειρική*, in qua signa dispositionum corporis habentur. Et hæc fuit ab Hippocrate in lib. de præfagijs pertractata, & Galenus in lib. de crisijs eam tradidit. Quarta pars est *ϕαρμακική*, hoc est sanatiua siue conseruatiua, in qua docetur modus tuendæ sanitatis ac valetudinis. Quinta est *διαιτητική*, quæ tripliciter diuiditur: nam victus rationem docet, & dixta dicitur, versatur circa victum, ac res non naturales docet; vel est *χημική*, vel *συμπεριεργική*. Medicamenta autem sunt duplicia, vel scilicet simplicia aut composita. Et hæc est prima artis medicæ diuisio. Sine simplicium autem medicamentorum cognitione ad composita deuenire non possumus.

*Medicina
diuisa feci-
dum alios
in 3. partes.*

*Medicina
diuisa in
duas partes.*

*Diuisio ma-
gis approba-
ta.*

*Dubitatio
circa hanc
approbatam
diuisionem.*

*Alia dubi-
tatio.*

*Inscriptio
tractationis.*

*Nutrimen-
tū cuius rei
sit nutrimen-
tum.*

*Medicamen-
tū simplex.*

Alii vero diuidunt Medicinam in tres partes, dicunt enim Medicum nil aliud age-
re, nisi, cum cognouerit corpus, quam prædicere ex signis, ac affectiones partis corporis
cognoscere, & eas denique curare: ideo in prognosticā sanatiuam siue præseruatiuam,
accuratiuam diuidunt, & hanc postea curatiuam subdiuidunt in illas tres partes, in quas
deperit diuidebamus superius, nempe in dietam, chirurgiam & pharmaciam. Alii ve-
ro diuidunt Medicinam dupliciter, vt facit Auicenna, videlicet in theoricam & practi-
cam. Theoricam dicunt illam esse, quæ versatur circa cognitionem tantum naturæ: pra-
cticam vero, quæ circa modum curandi siue operandi versatur, quæ itidem consistit cir-
ca illa tria, nempe dietam, pharmaciam ac chirurgiam: pharmaciam postea in simplicia
ac composita subdiuidunt, quarum omnium hæc vltima, quæ in theoricam & practi-
cam diuisa est, mihi magis placet, & ratio est, quoniam genus per duas oppositas differen-
tias diuidi debet, quales sunt theorica & practica. Quare dixerim ego, satius esse ipsam
diuidere Medicinam in duas tantum partes & non plures.

Sed dicet quis statim, erras maxime, quoniam debemus improbare hanc diuisio-
nem: Si enim ita diuidatur, tota erit practica hæc ars, quoniam finis eius est morbos de-
pellere, ac sanitatem conseruare, quod nisi operatione fieri potest, quare tota factiua ac
practica erit, ergo non potest dici speculatiua ac theorica. Ad hoc autem ego respondeo,
quod nulli dubium est, quod considerata vniuersaliter, vt scilicet vna facultas est, quæ à
fine denominari debeat, tota factiua est, quoniam sic versatur circa opus. Sed si hanc fa-
cultatem in partes seiunctam consideremus, necessum est, vt altera eius pars theorica di-
catur, altera vero practica, ibi enim incipit Medicus, vbi Philosophus desinit: quare su-
prema pars Medicinæ connectitur philosophiæ naturali, quæ tota theorica & speculatiua
existit.

Sed quis alius dicet, denno verum esse, quod hæc pars speculans & theorica posset
dici, nisi vterius progrediretur Medicina, vt ipsa à fine denominatur, quia circa opus
versatur, ergo tota practica. Sed respondeo iterum, quod hoc esset iterum confundere
partes has iam distinctas: quoniam si partes distinctas consideremus, non est dubium, quod
ista pars theorica dicetur, alia vero practica. Confirmatur enim hoc etiam, quoniam si
queramus ab his, qui in quinque partes eam diuidunt, quænam sit pars theorica, dicent esse
illam, quæ de naturâ corporis tractat: si ergo hæc considerans naturam est speculatiua, id
debet diuidi in duas tantum partes, in theoricam scilicet & practicam.

Sed his omissis, quamcumque diuisionem accipiamus, semper videmus partem illam,
quæ de simplicibus agit, sub therapeutica poni: Medicamenta enim vel simplicia sunt, vel
composita: ideo sub ea tractatio hæc habetur, quæ pars maximi est momenti, quoniam
hæc supponit omnes alias partes medicinæ, ac eam etiam continet partem, quæ de compo-
sitis medicamentis tractat, sub therapeutica ergo continetur ad pharmaceuticam scilicet. Ex
hinc est, quod cum medicamenta sint instrumenta artis medicæ, hinc est, dico, quod pars
ista inscribitur de materia medica, siue de re medica. Est autem medicamentum huiusmodi
ex Gal. lib. 1. de simplic. med. facult. cap. 10. id, quod naturam nostram permutare potest,
& ita nutrimentum: ac nutrimentum dicitur rei nutritibilis nutrimentum: medicamentum
vero rei medicabilis medicamentum. Nutrimentum autem in substantiam vertitur mu-
tata ipsius substantia ac in similem reddita, ac medicamentum non mutatur ab humano
corpore, sed ipsum potius mutat ac corrumpit aliquando; hoc autem duplex est, vel sim-
plex, vel compositum: simplex est, quod à natura tale est; compositum vero est illud, quod
permixtum est cum alio,

In quo tractantur ac resoluntur quædam dubitationes circa superius dicta.

CAP. IV.

*Dubitatio,
an debeat
simplicia
naturalia.
Natura du-
plex, et ac-
cipitur.*

Dicebamus medicamentum non mutari ab humano corpore, sed potius ipsum cor-
rumperere, quandoque etiam duplex esse, simplex scilicet & compositum; & quod sim-
plex illud est, quod à natura tale existit; & compositum illud, quod est cum alio permixtum.
Sed hic quispiam dubitare posset, quoniam in libro de simplicium medicamentorum fa-
culatibus capitulo decimo tertio Gal. dicit, quod quæ secundum naturam sunt, licet sim-
plicia medicamenta videantur, composita sunt, quomodo itaque dicit, quod simplex medica-
mentum est sua natura sincerum? Ad hoc respondens dico, quod Natura in duplici significatione
accipitur: primo enim modo natura significat substantiam ac essentiam, quomodo accipit
Galenus

Galenus in libro 3. de temperam. cap. 4. Et etiam in libro 1. de simpl. medicam. facul. capite 4. dum de aqua loquitur: alio modo accipitur natura non pro substantia corporis naturalis, sed pro facultate; & hoc modo libro 3. de simpl. medicament. facultat. capite 13. accipit, quoniam subdit dicens: *facultate tantum & viribus multiplicia sunt*, quamuis simplicia esse videantur: & hoc clarius dicit in sequenti capite loquens de brassica ac de lente, quæ multiplices facultates habent, licet simplicia sint quo ad naturam & substantiam. Quare secundo modo intelligentes dicemus, illud esse naturæ simplex, quod non multiplices habeat facultates ac vires.

Obiiciunt aliqui, vt in definitione dixetim, subiectum huius facultatis naturale esse corpus nulla arte passum, cum pompholyx, oleum, ærugo & alia infinita arte parantur, quoniam arte fiunt, & tamen etiam inter simplicia à Galeno connumerantur. Ego autem respondeo, quod aduertant hi, quod ego dixi, non ab arte passum, sed ab arte nulla compositum esse, aliud est hoc: oleum enim non est compositum attenece vinum & alia huiusmodi, vt mel quod extractum est ex fauis & arte factum, & ita passum ab arte, non autem ab arte compositum, & ita difficultas cessat aliqua ex parte.

Verum dicunt, sunt etiam alia vt cerussa & alia, quæ composita sunt, non autem simplicia, vt ego dixi. At ego vellem hos & alterum relegere ac considerare modum, formam ac rationem, quas non solum in arte medica tradunt, sed etiam in substantia: quoniam quæcunque talia sunt, vel talia dicuntur, dupliciter ita dicuntur, vel absolute vel secundum quid: hoc modo Galenus hoc pacto loquens de simplicibus, diatiron piperem inter simplicia connumerat, vt cum ex tribus generibus piperis constat: nam non simpliciter ac absolute compositum siue simplex vocat hoc, quoniam diatiron piperem vocatur simplex à Galeno, non quia simplex sit absolute, sed quia simplex est in respectu alterius magis compositi, ac in quo plura ingrediuntur, quoniam in arte medica habemus etiam oxymel simplex, & oxymel compositum, quamuis ambo composita sint: ac simplex illud dicitur, quoniam in eo pauciora ingrediuntur: Et compositum illud, quoniam plura accipit ingredientia: vnum itaque dicitur simplex in respectu alterius, quod ex pluribus confectum est, non autem, quod absolute & vere sit simplex. Præterea Galenus nonne musculum ac venam etiam partem corporis simplicem vocat, cum tamen vena & arteria ex pluribus composita sint, Et musculus etiam ex pluribus constat: tamen appellantur simplicia, sed non simpliciter, absolute ac proprie, sed respectu capitis, crurum & aliarum partium magis compositarum: Et hoc idem dicendum est de arteria, de membranis, de ossibus ac similibus. Quare Galenus in respectu ad alia magis composita illa simplicia nuncupat, quamuis aliquid ab arte composita etiam sint aliquo modo ac passa, ideo in nostra definitione diximus, quod subiectum facultatis huius est corpus naturale nulla arte compositum, non autem nulla arte factum aut passum, & ita primum dubium solutum est.

Aliud vero dubium: quod coniciunt dicentes, per temorem genus nos definiuisse hanc facultatem: hoc modo resoluo, dicens, hoc proximum esse genus his, quæ circa hanc facultatem versantur. Si enim hoc subiectum est adeo amplum, vt nihil inueniri possit, quod non sit subiectum huic arti, quoniam vnum dico, quid proximius reperiri potest quam corpus naturale, de quo diximus? si itaq; minus commune genus accepissimus, etiam potius species, non autem genus proximum.

Tertia difficultas obiiciebatur ab his, quod in definitione diximus, corpus naturale esse subiectum nulla arte compositum, vt ex illo rationabilia remedia sumi possent, ac dixi, additam esse hanc particulam, vt mulierculas ac empyricos excluderemus, qui sola obseruantia remediis vtuntur: Quare vt excluderentur hi, qui non dogmaticæ procedunt, addidi illud **RATIONABILIA**: tamen hi dicunt, quod claudam reddiderim Medicinam, eo quia solirationi innixam esse putarim, ac si experimentum exclusissem, cum tamen quæcunque ars non solum rationi, sed experimento etiam nitatur ex Galeno. At hi considerent verba in definitione mea posita, quoniam dixi, *vt ex eo sumantur remedia rationabilia*, non secludimus autem experimentum, quoniam nullibi ex his verbis hoc apparet: imo exprimitur manifeste, cum subdimus *ad sanitatem tuendam ac morbum expellendum*: Et si ita dicimus, nonne in hoc remedia explicantur cum operatione applicanda? quomodo ergo clauda erit hæc Medicina ex me?

Postremo torquet alios definitionis particula illa, *nulla arte compositum*. Nam si prius dixi *naturale*, & addidi postea *nulla arte compositum*, dicunt hi, me superfluum fuisse,

quasi dicere volens, quod etiam natura arte niti possit ac vtatur. Sed non est ita, nam dixi ego, quod artes non tantum materia subiecta distinguantur, sed per rationem etiam formalem: nam habemus nos subiectum huius nostre facultatis esse corpus naturale, quomodo autem possit apparere, quod sit subiectum proprium huius facultatis, non apparet certe, quoniam videtur esse etiam naturalis Philosophi subiectum, quoniam etiam Philosophus naturalis corpus naturale considerat. Quare vt distinguatur hoc subiectum à subiecto philosophiæ naturalis, non poterat id fieri, nisi adderemus, considerandum esse eo, quia ab arte nullam compositionem habeat: nisi enim hoc adderemus, idem esset subiectum, quod est Philosopho naturali: Fuit ideo necessum addere hanc particulam. Nolint itaq; hi dicere, me superfluum fuisse vel aliquo modo errasse, sed veram ac legitimam esse 10 definitionem à me positam, & facultatem hanc sub parte therapeutica contineri.

De Inscriptionibus circa hanc facultatem variis, & qua sit tenenda.

CAP. V.

Variæ sunt autorum descriptiones circa hanc facultatem, quæ tamen communes non sunt vniuersali subiecto: alii enim tantum de arboribus, alii vero solum de herbis eam inscripserunt, & propterea sunt diminutæ, & nostra verior ac perfectior inscriptio erit de simplicibus medicamentis, sciendumq; post cognitionem iam traditam de corpore simplici, quid sit medicamentum quo ad nomen, quæ cognitio, quid nominis iam præcedere debet cognitionem, quid rei. Per medicamentum enim illud omne intelligendum est, ex quo sumi potest remedium ad sanitatem tuendam ac morbos pellendos. Sed communius accipiendo hoc medicamentum, videtur etiã intelligi non salubria tantum medicamenta, sed ea etiam, quæ prorsus inimica sunt naturæ, quæ venena se dicuntur ac deleteria medicamenta: proprius vero accipiendo, ad medicamentum tantum salubre hoc nomen referri debet: quate duplicem significationem habet nomen hoc, vt Rhodius dicit. Quod quando volumus malum medicamentum significare, non debemus simpliciter appellare ipsum hoc nomine medicamenti, sed medicamento addere *malum*: vox enim hæc *medicamentum* in bonam partem accipitur, atq; deduci debet ab auxilio præstando. Quantum vero ad 30 rem pertinet, dictum fuit, quod medicamentum à Gallib. de simp. med. fac. c. i. illud est, quod naturam nostram alterare potest, ac nutrimentum illud esse, quod substantiam augere valet: & medicamentum esse, quia alterat substantiam. nutrimentum vero, quia alteratur à substantia, vt in ipsammet conuertatur. At si ita simpliciter intelligatur definitio, multas difficultates affert. quoniam aer, cibis, potus, & omnes res non naturales possunt corpus alterare, at tamen non sunt medicamenta. Motus enim & quies, cibis & potus, inanius & repletio, somnus & vigilia, animi accidentia, & Venus non sunt medicamenta: quoniam cum therapeutica pars Medicinæ in tres partes diuidatur, in dietam sc. quæ victu, in pharmaceuticam; quæ medicamentis vtitur, cibis & potus contradistinguuntur, quare cibis & potus cum contradistinguantur, non sunt medicamenta, & ideo sub parte phar- 40 maciæ non continentur, & tamen alterare possunt corpus. Præterea lintea calida vel frigida applicita corpori ac membris apposita ipsum alterare possunt, & tamē non sunt medicamenta. Quæ etiam pungunt, quæ lacerant, quæ incidunt & alia huiusmodi, alterant corpus nostrum, & tamen non sunt inter medicamenta reponenda. Corpora cælestia etiam alterant corpora, & tamen non sunt medicamenta. Ad hoc autem multipliciter multo respondent, distinguentes de alteratione dicendo, quod alteratio tripliciter accipitur, vel sc. per se, vel per accidens, vel per aliud, sumentes ex s. phys. circa princip. dicimus enim quandoq; musicam moueri, ambulare ac calefieri, non quia musica moueatur, ambulet ac calefiat, sed quia accidit ipsi currenti vel incalescenti esse musicum: aut per aliud dicimus, vt si quis sanetur circa digitum, dicitur sanus, cum tamen pars tantum fuerit ad sanitatem 50 reducta. Mouentur autem per se, vt quando dicimus infirmum sanari ac Medicum sanare, quoniam per se sanatur infirmus, & Medicus etiam per se medetur ac primo: est etiam Galeni sententia, quod mutationes quædam specificæ reperitur ac sunt, quæ deducunt ad aliam speciem: & non specificæ, quæ non deducunt. His autem positis dicunt sustineri posse sententiam Galeni, quoniam quando dicimus, illa relata superius non esse medicamenta, hæc medicamenta esse per accidens. Cum autem dicit illud medicamentum esse, quod alterat, loquitur de alteratione per se, non autem per aliud. Vt autem hoc declaratur, notandum est, quod corpora illa sunt, quæ mouentur, & mouent, ac nulli dubium est, quod somnus & vigilia non possunt per se moueri nec mouere, ideo nisi per acci-

*Inscriptio
operis.*

*Medicamentum
quid sit
quo ad nomen.*

*Quid medicamentum
quo ad rem.
Quid nutrimentum.*

*Alteratio
tripliciter
accipitur.*

accidens. Propterea clarum est, quod in numero eorum sunt, quæ moueri secundum accidens dicuntur, quare non sunt contraria sententiæ Galeni.

At quis dicit clarum est, quod hæc non alterant per se corpora nostra, quia non sunt corpora. Sed quis dicit de cibo & potu, ac aere & celestibus corporibus, quæ sunt corpora hoc verum est: sed quatenus alterare possunt corpus, medicamenta dicuntur, quatenus vero mutantur in substantiam, tunc alimenta, non autem medicamenta nominantur: quare etiam hæc sub ratione medicamenti continentur.

Aer vero utroque modo dicitur à Galen. in lib. de simpl. med. fac. cap. 1. 2. & 3. & lib. 2. de simpl. med. fac. cap. 2. ubi dicit alia actu talia esse, ut ignis, qui actu calidus est: quia statim actionem suam proferunt. Alia potestate talia sunt, ut aëre, quod corpus calefacit, non tamen statim sed futuro tempore. Stante ergo hac distinctione, aer & alia dicta possunt esse medicamenta. Et lib. 3. de temperam. cap. 4. distinguit circa ea, quæ potestate talia sunt, in nutrimenta, medicamenta, & regumenta, quare contradistinguit elementa ipsis, cum dicaribi elementa esse sub his, quæ actu talia sunt.

De corporibus autem celestibus, cum dicunt, alterant inferiora, dico quod non statim alterant, sed mediante alio corpore, ut lumine & motu: quare cum per se non possunt alterare corpora nostra, ideo medicamenta dici non debent.

His ita stantibus, distinguenda sunt primum medicamenta per genera, secundo per species & differentias. Medicamentorum ergo quatuor sunt genera subalterna: quædam enim sunt, quæ nihil passa à corporibus & applicata ipsis alterant, ut sunt, quæ non à tota substantia, sed quantitate venena dicuntur, ut cicuta, papauer, mandragora & hyosciamus semen, quæ eum contraria sunt corpori, nec antipsimum, sed in certa tantum quantitate, atque ita non à tota substantia sunt deleteria, sed secundum quantitatem.

Aliqua sunt à tota substantia venenosa, & talia sunt, quæ non in inferunt nocuummentum, nisi prius alterentur à corpore, ut dicerè possumus de auripigmento, de chrysocolle & colocythide: quæ nisi prius alterentur à corpore & corrumpantur, agere non possunt in corpore nostro, quamuis etiã in minima quantitate exhibita corrumpant corpora. Quædam alia sunt, quæ corpus alterant, sed non mala ac lædenti alteratione, quoniam scilicet non destruant, ut chamæmelon, absinthium & huiusmodi alia. Alia vero sunt, quæ partim medicamenta sunt, partim nutrimenta, ut lactuca, quæ alterare potest, quatenus medicamentum, potest etiam nutrire corpus: quare quædam à quantitate, quædam à tota substantia, quædam alterantia tantum sunt, quædam vero quæ simul alterant ac nutriunt.

De intentione ac ordine tractationis. CAP. VI.

Conqueruntur nonnulli, imo & admirantur, quod scilicet in his vniuersalibus diutius immoratus sim, cogor ergo duo verba dicere: quod simplicium medicamentorum cognitio duplex esse potest: vna imperfecta ac superficialis, quæ ex nominum cognitione ac figuræ extrinsecæ explicatione constat, & hæc parui est momenti: nomina enim, ut scitis, consulationem potius quam cognitionem parere possunt. Figura etiam atque colores, qui secundum varietatem temporum mutantur: Altera est cognitio essentialis, quæ (non contemnendo nominis ac figurarum explicationem) magis tamen interius penetrat, vires ac naturam rei considerans: & hæc duplex est: altera, quæ in cognitionem causarum, virium ac naturarum pertinet: altera est ultra hæc quæ modum, mensuram & tempus considerat. Cum ergo nos medici sumus, & in ordine ad medicam artem hic sequi velimus, non ita licet eo pede est transiendum, sed ita nos progredi oportet, ut naturas ac vires & actiones rei cognoscere possimus.

Cum ergo nostra intentio sit naturas & essentialis simplicium speculari, & antequam speculemur, quia occultæ sunt, inquirere, ideo modum inuenire debemus, quo possimus actionum cognitionem habere earum, quæ communes sunt ac frequentiores, ac etiam earum, quæ raro cum accidunt, mirabiles videntur, quæ occultæ causæ dicantur, de quibus etiam nos acturi sumus.

Verum quia hæc cognitionem adipisci conamur ad vsum artis medicæ, ideo oportet etiam modum inuenire, quo, qua ratione applicentur medico vsui, cognoscamus: ac præterea, quia modo simplicia, modo composita apponuntur, ideo rationem etiam qua componuntur trademus. Et quoniam in his sæpe adfunt reliquæ malæ qualitates, ut venefica dici debeant, ideo de his etiam inueniendis tractabimus, ac de pondere & mensura eorum aliqua proponemus, quibus omni bus habitis vniuscuiusque simplicis naturam cognoscere poterimus: quare vos etiam æquo animo feratis, ut quæ necessaria sunt, prius declaremus, quam ad particularem tractationem vniuscuiusque simplicis deueniamus.

*Simplicium
differentia
in quibus su-
mantur.*

Diximus ergo in precedenti capite, quod quatuor essent prima genera simplicium medicamentorum, & quod ad alias differentias accedendum est; ideo sciendum quod simplicium medicamentorum differentie tripliciter variari possunt: aut enim ab essentia rei, aut à vitibus, aut ab actionibus. ab essentia rei iterum sumuntur dupliciter, vel scilicet à materia proxima, vel à forma substantiali: à materia autem proxima dico, non autem à materia prima, quæ potius est origo conuenientie in vnaquaque re. Ideo à materia proxima, non à remotâ sumi debent differentie. A materia ergo proxima sumendæ sunt differentie medicamentorum, ac ab essentia & forma; aliz vero à facultatibus & viribus, aliz ab actionibus. Quæ à materia proxima sumuntur, duplices sunt: aliz enim sunt veluti potentie, aliz veluti actu materiam informantes, vt raritas, densitas, leuitas, grauitas, durities, mollities, plenitudo, vacuitas, visciditas, friabilitas, crassitudo & tenuitas; hæ enim materiam informant.

*Differentia
veluti per-
fecta in sim-
plicibus qua-
est quæ.*

Quæ vero sunt veluti potentie, sunt vt congelabile & non congelabile, liquabile & non liquabile, madefactibile & non, ruptile & non, frangibile & non, cedens tactui & non, formabile & non, dilatabile & non, teribile & non, elixibile & non, vaporabile & non, cremabile & non, suffibile & non, per singula autem istorum discurramus, nulla enim istorum actualem formam significant actum in materia informantem, sed apirudinem ac potentiam potius. Quædam enim cremabilia magis sunt, quædam minus; quæ varietas provenit ex varia mixtione humidi cum sicco, & frigidi cum calido.

*Supponen-
da circa for-
marum mul-
tiplicita-
tem.*

Harum vero omnium differentiarum primo naturas explicandas esse dicimus, deinde harum causarum inuestigabimus: primo quidem hoc vno supposito, quod scilicet variarum formarum multiplicitas ab actione calidi & frigidi circa humidum & siccum ortum habeat.

*Pororum
varietas.*

Secundum supponendum est, quod nullum horum continuum est propter varietatem, quæ est inter humidum & siccum, calidum & frigidum, quoniam non possunt ita variari, vt continuæ sint, sed plene sunt porositatibus, & hi pori multiplices sunt, alii enim angusti sunt, alii lati, alii duri, alii molles, alii in superficie, alii per profundum penetrantes, alii recti, ordinarii regularesque, alii curui, irregulares & inordinati, alii vero vacui, alii repleti, alii materia tenui, alii crassa. His ita habitis incipiamus deuenire ad declarationem istarum differentiarum. Quædam itaque spectat ad differentiam illam primam, quæ ad materiam proximam pertinet, quæ est congelabilitas vel concrecibilitas, per quod intelligimus, quando res aliqua mollis ac liquida ad tantam duritiem potest peruenire, vt quasi lapidea fiat, vt de aqua patet, quæ ita quandoque concreciscit, vt lapidea res videatur, hoc est esse concrecibile, congelabile & indurabile oppositum reperitur in re, quæ ex mollitie non potest ad hanc duritiem peruenire: cause autem huius triplices esse possunt: quædam enim sunt, quæ à calore ex siccitate valida congelantur, per consumptionemque siccantur, vt est sal & nitrum, quæ ex materia aquea generantur, cum tanta fuit actio caloris, & tanta siccitate fuit extenuata materia illa, vt ad illam duritiem deueniret. Sûnt ergo ista indurata à calore exiccante, quæ frigida & humida erant. Aliqua vero sunt à frigore concreta: à frigiditate enim exprimitur aerea portio, quæ congelari non potest, ideo quod relinquitur, indurabile fit, vt patet in aqua, ex qua spirituosum exprimitur à frigore, & ita condensabilis remanet.

*Causa con-
gelationis
& indura-
tionis.
Sal & ni-
trum quæ-
modo indur-
tantur.*

Alia vero ab vtraque causa indurantur, vt quæ non solum à vehementi calore exiccante, sed etiam à frigiditate exprimente concrecunt, tales sunt lateres, qui prius in fornace à calore exiccantur, deinde frigore etiam indurescunt: quæ à caliditate & siccitate indurantur, vt sal, à frigiditate & humiditate liquantur. Quæ à frigiditate tantum exprimente indurescunt, à calore liquecunt. Quæ vero ab vtraque causa indurata sunt, duplicia sunt. nam vel vehemensissimus fuit calor, qui consumpsit omnem humiditatem, vel non ita validus fuit: si valde exiccans fuit, ista nunquam liquari possunt, vt sunt lateres optime siccati. Si vero exiccata fuerit materia, non tamen consumpta fuit omnis humiditas, potest à calore liquefieri: & hoc de pice patet & in melle, quæ passa cum sint aliquid à calore, quoniam si mel igni apponatur, pars humiditatis consumitur, & si diutius detineatur, concreciscit, vt quomodo sunt suppositoria, & deuenit ad tantam duritiem, vt lapideum videatur: sed tamen à calore liqueciscit iterum, quoniam non fuit consumpta omnis humiditas ipsius.

De quibusdam aliis differentiis simplicium, quæ ad ipsorum cognitionem essentialem multum faciunt. CAP. VII.

Medicamentorum differentias cum explicarem in præcedenti capite, quæ cum triplices essent, aliæ ab essentia, aliæ à viribus, aliæ ab actionibus, illas, quæ ab essentia sunt, incœpimus pertractantes, quæ à materia proxima sunt, ac primum de potentiis locuti fuimus, quæ recensentur in lib. prædicamentorum ab Aristotele. Sunt ergo in hac materia aptitudines quædam, per quas corpus aptum est pati vel non pati, & primum erat, quod sua natura est gelabile, cuius triplices differentias diximus; quoniam vel à frigido humidum aerium exprimente fit, quod patet in vasis tempore hyemis, in quibus humor aliquis congelatur, quoniam facta congelatione in ore vasis ita ut non possit ingredi aer, nam cum hæc frigiditas comprimat exprimendo humidam ac æream substantiam, necesse est, ut corpus illud colligatur in se ac fiat minus, & ita, ne detur spaciū inter vas & corpus illud, necessum est ut vitrum vel vas rumpatur, ut possit aer ingredi.

De aliis postea, quæ à calore & ab utroque indurantur, dictum est supra: reliquum erat, ut declararemus ea, quæ non possunt indurari, ut olei, butyri ac maior pars pinguedinum, ac aer ipse & corpora alia ærea, quæ quamuis formam aliquam congelationis accipiant, tamen nunquam ita indurantur, ut dura vere dici possint, causa est, quoniam multam habent æream substantiam, quæ hoc congelari non permittit, quoniam ipsa congelationem non patitur.

Eo quid secunda differentia, quæ est veluti primæ opposita, liquabilis scilicet & non liquabilis, ideo sicut duplex causa indurationis principalis erat, ita duplex etiam erit liquabilitatis. Liquabilia ergo erunt hæc, quæ quamvis durationem aliquam acceperint, tamen liquari possunt, ut nitrum, sal, cera & glacies & huiusmodi, quæ à frigore concreta sunt, calore liquantur, quoniam licet concreta sint per expressionem frigiditatis, tamen remanet humiditas tanta, ac aliquid etiam æræ substantiæ, quæ superueniente calore liquantur: in sale autem & nitro patet, quæ ab humiditate eliquantur, & hinc est, quod quædam alia, quæ à vehemēti calore exsiccata sunt ac ex superueniente frigore expressa, est humiditas quæcunque. Ideo non possunt liquefieri, quoniam propter meatuum angustiam ac inordinationem non potest humiditas ingredi ad ea liquanda, ut lateres sunt.

Tertia differentia est eorum, quæ madescentibilia dicuntur & non. Id esse dicitur madescentibile, quod potest humiditatem extrinsecus accipere usque ad profundum suæ substantiæ, ut lana ac spongia, quoniam habent poros latos ac multos, & penetratio usque ad profundum. Licet enim hæc videantur sicca, tamen quia poros habent latos, multos & profundos, sunt madescentibilia & apta recipere humiditatem. Quæ vero multitudine, profunditate ac latitudine meatuum carent, madescentibilia non sunt, ut lapides & id genus alia.

Quarta differentia est ruptile & non ruptile. Ruptile est, quod in duas tantum partes diuidi potest. Causa huius ruptibilitatis est amplitudo pororum ac ordinatus ductus ipsorum cum exiccatione aliqua in re rumpente, ut patet in virga lignea exiccata: quæ in duas partes diuiditur propter meatuum exiccationem vel ordinationem: Hinc est, quod ligna vitidia non ita facile rumpuntur propter visciditatem humoris ac inordinationem meatuum.

Quinta differentia eorum, quæ frangibilia dicuntur, quod illud esse dicitur, quod inuito frangenti in plures partes diuiditur, ut evenit in rotula cerea valde exiccata, quæ nobis inuito in plures partes frangitur; hoc autem fit ex meatuum multitudine, exiccatione & latitudine ac inordinatione. Quod si res meatibus careat, vel ordinatos habeat, non poterit frangi; quoniam quæ meatibus carent, diuidi non possunt. Sed reuera nullum corpus reperitur, nisi corpus celeste, quod ratione continuitatis, ac quia careat meatibus, diuidi non potest; nam est indiuisibile.

Sexta differentia est flexile & non. Flexile illud est, quod ab impellente vel in cauo, vel in sinu potest ad circumferentiam deduci, absque quod frangatur, quoniam facta est optima permixtio humiditatis æræ cum sicco, sed flectitur tantum & in gyrum deduci potest. Verum quæ humiditate hac viscida repleta non sunt, dum flecti ipsa conantur, statim franguntur, non autem flectuntur.

Septima differentia est eorum, quæ tactui cedere possunt seu percussioni: quoniam quædam sunt, quæ à propellente violentè comprimī possunt, ut in plumbo & cera patet,

quoniam fouea remanet post vehementem propulsionem, & talia dicuntur cedentia tactui. Causa autem huius est multa humiditas crassa ac viscida à valido frigore indurata: nam non possunt nisi à vehementissimo calore liquari, vt in plumbo, quod patet etiam in ære, quæ tactui & percussioni cedunt, ac fouea in ipsis conseruatur ratione substantiæ aeris permixtæ huic humiditati crassæ. Quæ vero prorsus terrestria sunt ac exicca, ita vt penitus humiditate careant, compressioni non cedunt, vt patet de lapidibus, in quibus nulla adest vel paucissima portio humiditatis aeris: Hinc est etiam, quod non possunt à calore linuari.

Compressibilia. Octaua differentia est eorum, quæ compressibilia dicuntur ac non compressibilia. Comprimi autem illa dicuntur, quæ ex ampla magnitudine in angustata reduci possunt: id quæ facile, vt spongia, lana &c. quæ ad differentiam eorum, quæ tactui cedunt, post compressionem redeunt ad amplitudinem pristinam: cuius rei causa est multitudo, profunditas ac amplitudo meatuum: hinc est, quod cera & pumex non sunt compressibilia, quia licet multitudine meatuum sint prædita, ac amplos habeant meatus & profundos: tamen quia nulla in his remanet humiditas, ideo non possunt comprimi, at spongia, lana & huiusmodi habent humiditatem viscidam continuantem, ideo comprimuntur: ac cera, quia non habet amplitudinem meatuum, non comprimitur: Quare duo requiruntur ad hoc, vt comprimat aliquid, vt scilicet amplitudo meatuum adsit, ac etiam humiditas continuans ipsum corpus, vt in spongia, lana & huiusmodi.

De reliquis simplicium differentiis pro perfecta ipsorum cognitione substantiæ & essentia.

CAP. VIII.

Scissile. **Q**uod scissile est & non scissile, hoc loco succedit declarandum, cum alia octo declarauerimus. Scissile ergo est id, quod fere diuiditur ultra id, quod scindens intendit, vt patet in lignis exiccatis, quæ per longum diuiduntur. Cuius causa est extensio pororum ac series meatuum per longitudinem. Quando autem res non est prædita hac serie continuata meatuum, qui meatus debent etiam aliquam amplitudinem habere, neque esse repleti viscido humore, tunc, vt in lignis viridibus apparet, non facile scinduntur: quoniam ligna viridia cum non habeant illam seriem meatuum, per longitudinem ac visciditatem humorum, difficillime scinduntur. Non scissile ergo erit, quod meatus repletos habet humiditate viscida ac etiam crassa, vel meatus non habet per longum ordinatos.

Formabile. Decimo loco est formabile & non formabile. Formabile est id, quod in quemcunque situm ac figuram diduci potest, vt patet in cera. Illud autem erit: quod simul partes coniunctas ac continuatas seruat. Causa huius est humoris visciditas ac crassitudo permixta cum tetrea substantia: nam quæ mollia ac humida sunt, facile formantur: quæ vero sicca, minime. Causa ergo quod res formabilis sit, ea est, quia humiditate crassa & viscida prædita est, quæ tamen humiditas optime permixta est cum sicco terreo, suscipit autem figuras has partibus continuis manentibus.

Dilatabile. Succedit vndecima differentia, dilatabile scilicet & non. Dilatabile est id, quod in maius spatium secundum latitudinem diduci potest, à comprimente & coneuulente, vt æs, plumbum & cera etiam. Si enim comprimatur valide æs, extenditur in latitudinem, vt plumbum ipsum, huius causa est lentor ac humoris visciditas cum reliqua pororum multitudine. Et in hac dilatabilitate requiritur, vt partes simul maneant ac continuatæ: nam quæ carent hac crassa humiditate, non possunt dilari.

Terribile. Duodecima differentia est terribile & non. Terribile est illud, quod in terreum puluerem facile redigi potest compressum, talia autem sunt arida omnia ac valde exicca: vt pumex & alia huiusmodi exicca. Cuius causa est siccum terreum omni fere humiditate priuatum: nam patet, quod ea ratione herbarum, flores ac radices non possunt conterri, nisi exiccentur. Quædam vero sunt, quæ humiditatem adeo tenacem habent, vt à sole vel corpore calefacienti exiccati non possint, ac nisi comburantur, in puluerem redigi nequeunt, vt est lana, spongia & similia. Causa ergo huius conteribilitatis erit siccitas terrea: illa vero, quæ hoc carent, non terribilia dicuntur.

Eluxabile. Decimertia differentia est elixabile & non. Elixabile illud est, quod ex feruenti liquore per profundum penetrare potest ac coqui. Ex liquore dico aqueæ substantiæ vel alterius corporis aqueam formam habentis. Huius causa est meatuum amplitudo: con-

geries, multitudo, profunditas ac præsentia elixabilis & coctilis humoris: nisi enim intus hunc habeant, non possunt eoqui. Hinc est, quod quæ humoris sunt intus prædita, meatibus tamen careant, elixari non possunt, vel habeant ipsos valde angustos, vt in ossibus patet, quæ humiditatem habent, & tamen non coquantur, si imponantur ad coctionem, quod est ratione meatuum obstructionis. Hinc est, quod spongiæ elixari non possint, quoniam non habent humorem elixabilem, quamuis meatus ampliores habeant. Quare ad hoc, vt res elixabilis sit, requiritur vt habeat meatuum copiam, ac humorē elixabilem contingat. Non elixabile autem erit id, quod his meatibus ac humoribus caret.

Quartodecimo loco est vaporabile & non. Vaporabile illud est, quod in vapores seu halitus humidos à calore redigi potest; talia sunt aquea substantia prædita, & quæ magis humida sunt ac mollia, magis vaporosa sunt. Hinc est, quod corpora puerorum vaporosa sunt magis quam senum, quoniam molli substantia præditi sunt. Hinc est etiam, quod corpora senum non sunt vaporabilia, quoniam exsiccata sunt. Et hinc est, quod aqua, quæ tota humida est, tota etiam in vapores resoluitur, perseverante actione caloris. Non vaporabile ergo erit id, quod humiditate aquea, penitus destitutum est; Talia sunt fictilia ac lapides seu lapidea omnia ac reliqua siccissima.

Quintodecimo loco est cremabile & non. Cremabile est id, quod ab igne ita cinicipotest, vt in cinerē etiam veratur. Huius causa est conueniens meatuum amplitudo, multitudo & profunditas, ac præterea humiditas quædam & ita mixta cum siccio terreo, vt ab igne comburi possint, quoniam ignis non potest perdurare, nisi humiditas adsit qua alatur. Quare si humiditas hæc ita mixta sit cum terreo in corpore aliquo, hæc talia corpora cremabilia erunt. Non cremabilia vero sunt, quæ carent meatuum amplitudine, multitudine ac profunditate, ac non habent humiditatem illam mixtam cum terreo, talia sunt lapides, qui non possunt à calore vinci, quoniam non habent humiditatem illam: ac lapides, ex quibus calx fit, habent maximam amplitudinem meatuum, qui etiam per longum & per profunditatem corporis ducuntur, ac etiam tantum humiditatis habent, vt ignis formam recipere possint, ideo cremari possunt ac in cinerem veluti verti, vt in calce patet.

Decimosexto loco est inflammabile, quod est id, quod igni ad motum, halitum emittit: qui in flammam accenditur; talia sunt palea, stipula, ligna subtilia, ac valde siccata & huiusmodi. Ista enim statim igni ad mota flammam gignunt ac in ignem vertuntur. Huius autem causa est, quoniam cum siccio terreo mixta est optime multa humiditas aerea, quæ propter affinitatem quam habet cum igne, in causa est, vt statim res accendatur; quod patet in oleo & pinguedinibus, quæ consumuntur, ita tamen vt non remaneat cineritium corpus, vt contingit in cremabilibus, quæ multa substantia terrea prædita sunt. At inflammabilia paucum terre habent, ac multum aeris substantiæ. Hinc est, quod aliqua cremantur tantum & non inflammentur, vt corpora aerea: quædam vero inflammentur tantum & non cremantur, vt oleum & pinguedines; Quædam vero simul cremantur & inflammentur, sed prius inflammentur, postea cremantur, quia hanc utramque causam optime mixtam habent, vt pix, quæ cito flammam emittit, ac postremo cineres relinquantur, quia utraque substantia prædita est, ac inflammatur primum pars aerea: deinde pars terrea relinquitur quæ crematur. Alia sunt, quæ neque inflammari neque cremari possunt, quia neque meatuum amplitudinem habent, neque multitudinem ac profunditatem eorum, neque humiditatem ac substantiam aeream, vt sunt corpora maxime siccata, vt omni fere humiditate destituta sint, vt lapides, maxime densi, carentes omni prorsus meatuum amplitudine.

Decimoseptimo loco est suffumigabile & non. Suffumigabile est id, ex quo ex coctione caloris habitus tenuis eleuatur ac odorabilis. Cuius causa est optima permixtio ac attenuatio tenuis substantiæ cum humido aqueo & aereo, ac in halitus resoluitur, qui odorabiles sunt, & modo grati, modo ingrati, pro vt conueniunt aut contraria sunt naturæ hominis. Non sunt autem vaporabilia illa, quæ crassa sunt, vel multa humiditate abundant, vt vapor tenuis ex ipso exhalare non possit, nisi vi maxima caloris eleuentur. Habetis ergo differentias omnes simplicium corporum, quibus explicatis potestis considerare, quantum vtilitatem consequi possit ad cognitionem horum, qui hæc omnia notit; quoniam his cognitis, recte ac sine errore ipsis vt poteritis ad sanitatem tuendam & morbum etiam pel-

lendum.

Cum declarauerim superius ea omnia, quæ sunt veluti potentie corporum simplicium, nunc modo declaranda sunt illa, quæ veluti actû materiam sunt informantia, vt leuitas, grauitas, raritas, densitas, durities, mollities, lenitas, asperitas, plenitudo, vacuitas, friabilitas, visciditas, crassitudo denique ac tenuitas. Leue igitur illud esse dicimus, quod sine pondere existit: vel si pondere particeps est aliquo, illud leue admodum est, vt vix sensu percipiat, & illud est, quod sua natura sursum tendit, & difficile deorsum: tale autem est illud, in quo maior pars leuium elementorum reperitur, quam ipsorum grauium. Quæ ergo plus aeris & ignis habent, illa leuia dicuntur. Graue vero illud est, quod ponderosum est & facile deorsum tendit: quodq; ad ferendum molestum est. (Nam grauia dicuntur, quæ molestia sunt) & plus habet grauium elementorum quam leuium. Segregantur experimento grauia à leuib, quoniam leuia supernatant aquæ, grauia vero fundum aquæ petunt, nisi in eis detineantur. Aduertendum autem est, quod multa sunt sua natura terrestria, & grauia dicuntur, quæ tamen apparent leuia sensibus, vt pumex lapis, cuius fere tota substantia seu essentia terreæ est, & tamen leuo sensibus videtur, hoc autem est per accidens, propter scilicet raritatem suæ substantiæ: totum enim porosum est, & in ipsis porositatibus plurimum aeris continet, cum tamen sua natura grauis sit: Quoniam si in puluerem redigatur, grauis est, imo grauissimus puluis ipse, quia ex contritione partes aeræ expelluntur, & remanent tantum graues ac terrestres.

Rarum autem illud est, quod habet partes distantes adinuicem, & non coniunctas simul; vt dicimus lintheum rarum esse, quando filamenta, ex quibus contextum est, non se coniungunt. Densum vero illud esse, quando se coniungunt ac contingunt filamenta, quoniam densum est, quando partes contiguæ sunt ac inuicem se tangentes. Raritatis causæ in corporibus his simplicibus est maior quantitas elementorum illorum, quæ rara dicuntur. Sicuti densitatis illorum, quæ densa nuncupantur.

Durum illud est, quod difficile diuiditur in partes ac motui renitens. Et huius causa triplex est, vel scilicet quia ab aliquo calore res exiccata est, vt euenit in lateribus: vel à frigore cōdensata ac constipata: vel quia plenum est corpus ipsum: quoniam potest esse, quod res aliqua mollis sit neq; frigore congelata neq; calore exiccata, & tamen dura, quia corpus eius plenum est, vt in vesica patet tensa, ac pila illa magna, quales sunt iuuenes; huius autem causa est plenitudo ipsa. Moile autem illud est, quod tractabile, humidum ac fluidum est, & neq; frigore congelatum neq; calore exiccatum, neq; ratione plenitudinis tensum, ita vt comprimi possit.

Leue illud est, quod superficiem planam ac æqualem habet, ita vt vna pars alteri non supereminet; Huius causa est humiditas, aquea vel aerea, quando bene mixta sunt in corpore sicco. Quandoque itaque pars aliqua humida est, facile etiam eius partes æquantur, & leue dicitur. Asperum vero illud est, in quo partes non æqualem situm obtinent, sed superficies inæqualis est. Huius causa est maior pars corporis siccæ quàm humidæ; quoniam quando non bene miscentur, tunc fiunt partes inæquales, tunc est, quod partes terreæ asperæ sint, nisi remoueantur asperitates. Hinc est etiam quod corpora puerorum ac mulierum lenia sunt ratione humiditatis substantialis & excrementitiæ, quoniam temperamento humidiores sunt femina viris, ita & pueri humiditate etiam excrementitia ratione otii, ac quia non habent tantum caloris. Iuuenes vero exercitio dediti ac senes: qui diuturna caloris consumptione ac humidi radicalis ideo carnes asperiores habent, lenitatis itaque causa est humiditas; asperitatis autem siccitas.

Viscidum & friabile. Viscidum illud est, in quo partes tenaciter simul hærent, ita vt ab inuicem diuelli non possint, vt in pinguib, rebus patet, vel in putrescentibus ipsis, in quibus tenacitas adest ac visciditas. Huius causa est permixtio aeræ humiditatis cum aquea, quoniam quando hæ commiscentur, viscidam quandam acquirunt corpus temperaturam, quod patet in aqua, dum putrescere incipit, in qua ampullæ excitantur, quæ difficile disrumpi possunt. Patet etiam hoc, quando misceatur oleum cum aqua, vel aqua cum sapone, vt pueri faciunt, quod est ratione visciditatis acquisitæ ratione permixtionis substantiæ aeræ ac humiditatis cum aquea substantia. Eadem ratio est, quod in putrescentibus rebus visciditas excitatur, quoniam à calore extraneo excitantur vapores aeris, qui permiscuntur cum substantia aerea, nam fiunt ampullæ atque vesicæ illæ in talibus putrescentibus corporibus.

Friabile id est quod terreum & sicum est, ac caret prorsus humiditate aerea permixta cum aquea, vt terra ipsa vel lutum ipsum, licet in eo aquea humiditas misceatur: Quoniam

niam ex aquea humiditate non fit visciditas. Et hoc patet in argilla, quoniam licet species luti sit, tamen quia plurimo statu abundat, ideo visciditatem habet.

Vacuum est, quod in se non habet illud, quod aptum est habere: vt dolium dicitur *Vacuum*, vacuum, quia vinum non continet, quod aptum est continere, cum tamen vere vacuum non sit, quoniam aerem continet: non datur enim vacuum in natura.

Repletum est id, quod habet id, quod aptum est a natura habere, vel quod ab extrin- *Repletum* feco impositum est, vt si dolium repleatur lapidibus.

Crassum illud est ac esse dicitur, quod non facile per poros alterius corporis penetrat. *Crassum* Huius causa est visio ac tenacitas partium, quae partes ita mixtae sunt, vt vna alteram in transitu *Tenuis* impediat. Quae autem habent partes tenues ac ita diuisibiles, illa tenuia dicuntur, vt separare in gredi possint vna alteram, licet angusti sint meatus: Quia tamen res diuisibilis est in minimas partes, illa res tenuis est. Habetis ergo explicationem differentiarum a materia, quae sunt tanquam aditus ad alia.

De differentiis a forma sumptis & quid sit forma. CAP. XI.

Explicatis medicamentis a materia medicamentorum sumptis, explicandae veniunt illae, quae a forma sumptiuntur, quae forma substantia est ac temperatura ex mixtione *Forma quid* medicamentorum ad certos actus secundum ordinem dispositos. Cum ergo temperatura sit forma, quot erunt temperaturae, tot etiam erunt differentiae formarum ipsorum medicame-

torum. Aut enim aequalis est aut inaequalis. Nam quae aequalem temperaturam habent, *Differentia* a nostris temperata dicuntur: quae vero inaequalem, intemperata. Quae autem intemperatae *a forma, quae* sunt, aut compositae sunt aut simplices, atque ita nouem erunt formarum differentiae simplici- *et quae sunt* um medicamentorum, quae a temperatura sumuntur. Notandum tamen est, quod medicamenta dicuntur vel calida vel frigida in ordine ad corpus humanum, quatenus scilicet sunt

nutrimenta: nam quia sunt nutrimenta, referuntur ad corpus humanum ita medicamenta quatenus sunt vel calida vel frigida, referuntur ad corpus humanum. Potest, n. esse quod in suo genere medicamentum aliquod sit temperatum, & tamen ratione corporis non sit tale: quare dicendum est in respectu ad corpus humanum aut temperatum aut intemperatum. Aliud praeterea

notandum, quod qualitates istae in medicamentis simplicibus, aliter quam in corpore considerantur, quoniam facultates haec dupliciter in corpore reperiuntur, aut, n. actu reperiuntur, aut potestate, ita vt aut statim aut pro tempore agant, at in corporibus, actu sunt, sicuti dicimus, in elementis has qualitates esse actu, vt in medicamentis hoc non est, quoniam erit medicamentum

aliquod actu frigidum in suo genere, quod tamen relatum ad corpus erit calidissimum, siue, vt rectius dicam, potestate calidissimum: vt exempli gratia, piper, quod non apparet ad actum nec ad actum calidum, sed applicatum corpori, aut intus assumptum feruens esse videtur: nam medicamenta talia dicuntur potestate, non autem actu. His stantibus, vel temperata sunt medicamenta vel intemperata. Si temperata sunt, nullam actionem inferunt corpori humano, quoniam

neque frigefaciunt, neque calefaciunt, neque humectant, neque exsiccant: nam ex his corpus humanum temperatum seruetur, vnicuique autem est hoc & simplex medicamentum. Intemperatum vero est multiplex: nam vel simplex est vel compositum, & ita quatuor sunt differentiae, in quibus multi sunt gradus: quod autem magis, quod autem minus calefaciunt. Ideo reperiuntur quatuor gradus actionum in simplicibus, ab ipsis Medicis. Cum itaque medicamenta in primo gradu sunt calida, coctiones iuuant, & actiones perficiunt, atque non excitant calorem igneum: nam ipsum calorem innatum destruere non possunt, sed potius iuuare: & talia sunt

absinthium, chamamelum, amygdalae dulces, buglossum, eupatorium, quae possunt actiones augere & non destruere. Quae vero in secundo ordine calefaciunt, attenuant, rarefaciunt, penetrant etiam magis: quoniam participant veluti igneo calore, vt apium, anethum, masticho & nux mellea: haec enim ad secundum gradum deueniunt caliditatis & non ultra. Quae autem tertio gradu calida sunt, non tantum calefaciunt, attenuant ac incidunt, rarefaciunt

ac penetrant, sed corpus etiam colligunt, incalescunt, & nocumenta ipsis corporibus inferunt, vt est abrotanum, ammi, cumini, cinamomum & origanum, quae talia sunt, vt possint etiam corpus ad tabem deducere consumendo humidum radicale. Quae autem quarto gradu sunt calida, comburunt, mordificant calorem innatum, vt est allium, euphorbium, sinapi & huiusmodi quae ultra nec nocumenta dicta vesicae etiam attollunt in corpore.

Frigida etiam in quatuor gradibus sunt. Quae in primo sunt frigida, calorem innatum aliquantulum debilitant, seu actiones ipsius corporis imminuunt refrigerando, ita vt non perfecte acque tam cito proprium finem possint attingere, quoniam retardantur actiones naturales ab his: tale est hordeum, poma, pyra, rosa, attriplex & huiusmodi, quibus si frequentius vtamur, actiones possunt debilitari. Quae vero secundo ordine sunt frigida,

non tantū debilitare possunt actiones, sed calorem obtundūt ac crassesciunt, & etiā crudorū humorū eopia ex his generatur. Nā necesse est postea, vt & ipse calor obtundatur, & actiones impeditæ remaneant, talia autē sunt cucurbitæ, lactuca, acacia, plātago, phyllū &c. Quæ in tertio sunt frigida, nō tantū incrassant, sed alstringūt etiā intrinsicos meatus, ac succū naturalē exprimunt, distributiones alimenti prohibent ratione alitractionis, sensus stupefaciūt, ac in corpore plumbeū colorem inducunt, talia sunt camphora, hyoscyamus & alia. Frigida in quarto non solū refrigeraciūt, sed cōgelant humores corporis, ac calorem exstinguūt, & eāquam venena corpora interficiunt, talia sunt cicuta, papauer, opiu & huiusmodi. Quæ vero humectantia, sunt in quatuor etiā gradus ratione variorū temperamentorū distributā. Nam quæ in primo humectant, leniunt corpus ac lubricant, & talia sunt, buglossa, endiuia, malua, glycyrrhiza. Quæ in secundo, laxant humores, ac temperamentū naturale imbecillius reddūt, vt triplex, lactuca, portulaca & huiusmodi. Quæ in tertio sunt humida, languidū & torpēs corpus reddunt: nā nausæ, vomitus, lienterie, & fluores alui sequuntur, talia sunt cucumer, succus lactucæ, cucurbitarū, portulacæ, qui succi longe frigidiores sunt quā substantia ipsorū, quoniā corpus totū ipsorū diuersas partes habet, quā vnā altera temperatur. Quæ quarto sunt ordine humida, suffocant calorem, & venena sunt, vt hydragrygi, & est venenū. Exiccantia similiter in quatuor gradus disponūt. Et quæ sunt in primo, secundo & tertio gradu exiccantia, omnia exiccant, sed quæ in primo sunt exiccantia, potius corroborant actiones sensitiuas ac motiuas, quā destruunt. Quoniam actiones sensitiuæ & motiuæ in corporib. perficiunt ratione & beneficio neruorū, qui cū habeant siccū teporamentū, ideo à moderate siccis iuuantur ac firmiores redduntur, ab humidis v. obtunduntur, talia sunt chamæmelū, sceniculū, brassica, cæceus & huiusmodi, quæ humiditate resistunt labefacti. Quæ v. secundo ordine exiccant, manifeste ligant sensus nostros, ac adstringunt, vt cotonea mala, lentes, mastiche & huiusmodi. Quæ tertio ordine exiccant, non tantū ligant sensus, sed meatus angustiores reddūt, humorūque transitus impediunt, ac excretiones inhibēt, nimis exiccando, succos à corporib. exprimunt, vt aloë, acetū, sal, piper, cuminū &c. Ideo ab horū frequentatione cauendū est, quando excrementis plurib. repletū est corpus, quoniā cum ita repleta sunt corpora, possunt etiā humorem radicalem exprimere. Quæ quarto ordine sunt exiccantia, eadē faciunt, sed etiā ita constringunt, vt omnes meatus impediuntur, vt neq. spiritūū transitus per meatus fieri possit, talia sunt ruta syluestris, alliū, nasturtiū ac sinapi, quæ ad mortē deniq. deducere possūt illū, qui his frequētijs vt consueuerit.

Qua ratione ac methodo vniuersiusq. medicamenti facultates possint

diagnosci. CAP. XI.

Cum omnes differentias ab essentia medicamentorū acceptas habeatis, tam eas scilicet quæ à materia sumi possunt, quarum quædam erant veluti potentia, quædam vero veluti actus materiam informantes, quam eas quæ à forma desumebantur, sciendum est, quod non sufficiat ita discurrere ac contemplando rerū species cognoscere ad differentias distinguere, cum Medicus sit artifex sensatus, atq. speculationem suam ad operationes dirigat, atq. necessario circa singularia versetur, ideo methodum quandam habere oportet ac instrumentum aliquod, quo facultatem propriam vniuersiusq. medicamenti vtentes cognoscere possimus. Cum ergo, vt diximus, Medicus sit artifex sensitiuus, instrumenta ad naturas rerum inuestigandas à sensu sumit: sensus autē numero quinque sunt, & ex his quidam actu vt sūt instrumenta ad naturas rerū inuestigandas apti sunt, quidā vero inepti. Auditus enim fidem præbere non potest circa naturam & temperamētā medicamentorum, quoniam pro obiecto habet voces, quæ ad libitum hominum sunt, qui falsā & verā dicere possunt: quare ex hoc fides certa naturæ medicamentorum haberi non potest. Reliqui quatuor omnes possunt ex certa via exactā cognitionem tradere medicamentorum ac naturarum simplicium ipsorum, sed ex quibusdam magis certam, vt per tactum & gustum, ex quibusdam vero minus, vt per guttū & per olfactum. Verum quia etiam ex his quiddā coniectura id assequi possumus, ideo de his quatuor omnibus verba faciemus. Quomodo autē per sensum tactus haberi possit, dico hoc simpliciter fieri posse: Quædam enim sensui tactus statim & primo occurrit se manifestant; quædam vero temporis intervallō. Quæ statim occurrunt, sunt illa, quæ diximus esse tanquam actus informantes materiam, vt lenitas, asperitas, raritas, mollities ac huiusmodi. Possumus enim nos de his statim asserere iudiciū certum adhibita manu, & ex his quosdam affectus in corporibus inducere possint, indicare. Ac præterea formæ elementorum tactui statim patefunt, vt aerem humidum, terram siccam, ignem calidum & aquam frigidam esse: Quorum vero qualitates in potentia sunt & non actu, in his vires & qualitates in potentia tantum existunt, nec possunt actionem producere, nisi à calore de potentia ad actum deducant.

Medicus à quibus instrumentis sumat ad naturas rerum inuestigandas.

Auditus nō potest præbere fidem circa naturā medicamentorum.

Ex sensibus qui magis & qui minus apti ad inuestigandas res sunt naturæ.

ducantur: Ideo non statim ex his iudicium afferre possumus, qualia sint & quale eorum temperamenrum, sed tēporis spacio indigemus, quo possit de potētia ad actū deduci qualitas a calore innato. Vñ aliud notandū, quod scilicet cū facultates istorū medicamentorum multos habeant ordines & gradus, vt diximus in p̄cedenti capite, quod non statim neque ita facile affectus iudicare possumus eorū, quē p̄tino gradu hārū qualitātū sunt p̄dita, tātū ipso, eo quia debilis sit vis medicamēti, cū vnico gradu temperamētū corporis excedat, ita vt nō possit valde imprimi, sed longo tēporis spatio percipitur, vt si quis p̄tina vtatur refrigerare in primo gradu ac humedante, nō facile ac statim percipit ipsam frigiditatem ac humiditatem, cum minimo excessu excedat tēperamentum humidū: quare cum non percipiatur statim, nō ob id negandū est esse frigidū vel humidū, quoniam spatio tēporis hoc patefiet. Diligentes itaq; estote in hoc, de dignotione autē horū medic. quantū ad has qualitates attinet, quē sensu tactus cognosce possunt, in lib. de sim. med. fac. agit Gal. ac in li. de alimēt. quare ipsos legere potēstis. Sed alius sensus ex quo talē naturā percipere possumus, gustus est, de quo neq; a calido neq; ab aliis exquisitā rationē habetis, quare de hoc diffusius agem⁹. Gustus est sensus maxime annexus humanæ tēperaturæ & istorū omniū substantiæ. Quoniā sicut ex debita p̄portionione elementorū sunt, ita sensus saporis diuersus est. Cum ergo ex iisdē principiis oriatur saporis essentia, ex quib. oriūtur temperamēta omnium istorum sensum ac etiam humani corporis, quare ex hoc sensu facile diiudicare possumus: quare cūm temperatū tēp̄ales sint vel inæquales, ita saporum quidam mediū est, quidam exuperans, qui exuperant excedunt vel per caliditatem, vel per frigiditatem: Qui autem exuperant per frigiditatem, vel sunt cum dominio terreæ substantiæ vel humiditatis: qui autem cum dominio terreæ substantiæ exuperant, vel paruum calorem habent, vel priuata sunt prorsus calore. Si priuata sunt calore, sequitur sapor acerbus, in cuius substantia dominatur siccū terreū ac frigiditas ipsa, & ob id maxime adstringens est, & cū terreo sit, p̄dero sitate sua vsq; ad ventrē linguē penetrat. Si vero nō sit omni calore priuatus, sed sit aliqua permixtio caloris, vt terreatatem attenuare possit, austerus sit sapor, in quo terrea substantia magis tenuis est, ac accedit aliquantulū ad caliditatem. Si vero in mixto vna cū frigiditate exuperet humidū aquū cū aliquali calore, quia tamē paruus est, cū tamen potest agere magis in aqua substantia quā in terra: ideo in hoc sapore aliqualem coctionē humoris habemus; & hīc est sapor acidus, qui in frigida substantia est: sed cū permixta sit aliqua portio caloris, generatur sapor apertus ad penetrationē ac vsq; ad profundū linguę, & abstergens est ac adstringens, & in materia humidā fundatus ac aquea. Hi sunt tres sapores per frigidū exuperantes a medio temperamento ipsorum. In sequenti autē capite persiciemus materiam hanc, quæ difficilis est, quia Galenus & Aristoteles in hoc diuersi esse videntur, hos tamen non dissentire inter se ostendam.

De quibusdam difficultatibus circa sensum Gustus & quomodo Galenus & Aristoteles de hoc inter se reconciliari possunt. C A P. XII.

DE sapore cēptimus in p̄cedēte capite agere, verū quia aliqua p̄termisimus, a principio incipiemus hoc modō. Saporū quidā est mediū, æqualis ac tēperatus, quidā intēperatus, inæqualis ac extremus. Mediū est, qui nulla sensatione tristi, sed potius cū delectatione sensum afficit, & talis est sapor dulcis, qui delectabilis est his, qui naturaliter affecti sunt. At talis sapor hāc habet latitudinē: nam quidā vere, p̄prie ac simpliciter mediū & tēperatus esse dicitur, & est ille, in quo ex tēperata qualitate optima dulcedo generator, ac omnib. grata: talis. n. sapor, in quo est hæc optima dulcedo, æqualis ac p̄portionatus tēperamento æquali corpori dicitur & est. Quidam vero declinat ab hoc medio, & declinat aut caliditatem aut frigiditatem versus. Si versus frigiditatem, dupliciter: s. n. primo sit sapor paratū declinans, sit sapor aliquis ipsius dulcedinis p̄ticeps. Si vero multū declinat, sit insipidus, vt est aqua, quæ tamē dulcis dicitur. Si vero declinet ab isto medio exacte ac perfecte versus caliditatem, duo sapores generantur, prim⁹, in quo immensa dulcedo repitur, vt in saccharo duro, quæ nō est ita omnib. grata, vt p̄fecta illa dulcedo; quidā. n. sunt, qui hac dulcedine sacchari nō delectantur, vel declinat sapor iste mediū dulcis p̄ maiorē declinationē versus calidū, & tunc coniungitur dulcedo cum alio sapore, vt est mellis dulcedo, quæ cum acredine coniungitur ratione immensioris caloris; & ita habetis medium p̄fectissimum. Quæ autem p̄fecta fortasse inter has est dulcedo pinguedinum illarū. Declinatio vero a medio vltra dulcedinē mellis, nō reperitur ali⁹ sapor, qui mediū dici possit, quoniā in eo immensa caliditas percipitur, vel intemperati, inæquales & extremi sunt sapores. Intemperatus autem duplex esse potest, vel. n. per frigidū a medio recedit, vel per calidum: si per frigidū, dupliciter, vel cū dominante terreo cū frigido, vel humido aqueo vel cū siccō terreo. Si cū siccō terreo, vel siccū terreū est cū summa quadā frigiditate, siue cū omni

Notandum circa facultatem gradus, quod nō possit ita facile & p̄tino cognoscere affectum.

Gustus p̄p̄tans.

Dulcedo sacchari dura.

Mellis dulcedo.

ea frigidityte, cum qua coniungi potest: quoniā necesse est, omnes qualitates concurrere ad generationē saporis, sed dicimus non dominari caliditatē supra frigiditatē, siccitatemq; supra humiditatē: nam si est dominū frigiditatis supra caliditatē, fit sapor acerbus, in quo remanet stipticitas, quę ex terrea siccitate de pēdē. Ideo stipticat hic sapor ac ad profundū penetrat. Siccō ergo terreo cū frigiditate dominante fit sapor acerbus. Si vero vna cū dominio frigiditatis superet siccū terrēū, sed cū aliquali humore admixto, sapor austerus generatur, in quo portio caloris concurrat, qui stipticus est, cōstipat ac confringit, sed tantū deficit à stipticitate quantū superat in caliditate. Hic autē sapor dicitur à Græcis *oxyphylus*, & ille est qui est in fructib; proximis maturitati. Si vero frigiditatis dominū sit cū humore aqueo, acidus sapor generatur, quoniā in siccō terreo actio caloris debilis non potest ita facile imprimi, sed melius in humore aqueo, ac etiā partes tenuiores ipsius vniūtur, tantū relicto quodā vestigio vstionis, fit sapor acidus, cuius substantia nō habeat aliquid caloris, penetrat, in cidit ac abstergit; penetrat ppter tenuitatē substantię, incidit & abstergit ratione caloris vestigiū relicti. Hi itaq; sunt tres saporēs, acerb⁹, austerus ac acidus, duo primi in terreo siccō positi, tertius in aqueo humido: dicamus modo de saporib; per calidū excedentibus, ac à medio recedentib; nam hi siccū terreum admixtū habent, vel humidū aqueum: si terreū siccū, vel cū summa caliditate est, quę habet vim exiccandi ac cōsumendi totum humidū, vnde generatur sapor amarus, qui omnib; fere ingratus est, quoniā cum delectemur similib; ac tristemur dissimilib; cū in amaro sapore sit cōsumpta omnis humiditas, redditur corpus ingrātū, quia siccitas est inimica naturę. Vita, n. in humido cōsistit, ideo amarus sapor inimicus est, quia cōtrarius est naturę. cū in eo non sit humiditas aliqua ob caloris exuperantiā, ac etiam ob exuperantiā siccitatis terreę, imo non solū naturę humanę inimicus est, sed etiā animalib; omnib; vti nullū sit animal, q. hoc tantū amaro nutriatur. Dominante ergo siccō terreo vna cū caliditate intensa fit sapor amarus inimicus animalib; omnib;. Quę vero pure & sincere amara sunt, valde calida sunt: quoniā ptingunt ad tertium gradū caliditatis, sed raro inueniūtur. Si vero nō sit tanta caliditas cū siccō terreo cōiuncta, falsus sapor generatur, q. ob acuitatē actionis caloris penetrat vsq; ad p̄fundū, & quia relicto humidū ipsius mixtū est optime cū siccō terreo, delectat etiā ac deducit siccū vsq; ad p̄fundū sui tenuitate, ideo appetentiā humidū inducit. Et hi sunt duo saporēs geniti ex calido excedere et mixtionē terreī siccī, amarus s. & falsus. Si vero vna cū dominio caliditatis sit etiā exuperantiā humidū aq. vel super terreū siccū, cum facilius patiatur humidū aq. cū siccū terreū, acris sapor generatur, qui maxime penetrat sui tenuitate, exiccāt & adurit: Habetis ergo tres alios saporēs, amarū s. falsū & acrem; & ita omnes saporēs ac eorū differtias, & frigidōs & calidōs. Vnum autē aduertendū est, q. videret Arist. Gal. aduersari, quoniā contrarietate Aristot. ponit inter dulcē & amarū; Gal. vero inter acrē & acerbū, & dico in re ipsa nō esse discordiā inter Gal. & Arist. licet in voce discordes esse videātur. Nam cōtrarietas, quę est inter dulcē & amarū, non repugnat cōtrarietati, quę est inter acrē & acerbū, quoniā hi autores diuersa respexerunt. Arist. enim respexit delectationē ac voluptatē & tristitiā & dolorē ideo debet dulce contrariū esse amaro. Gal. vero, qui ad vsum omnes actiones in arte medica dirigit, cū actiones inter dulce & amarū non sint contrarię: quoniā dulcē sapore posuim⁹ inter medios ac tēperatos, ac amarū inter extremos: ac nō est magna oppositio inter mediū & extremū: quare nō sunt ex Gal. contraria. At si respiciam⁹ Gal. qui actiones horū saporū respexit, pcul dubio ipsum optime sentire iudicabim⁹, quoniā sapore acerbū inter saporēs exuperātes in summa frigiditate posuim⁹, acrē v. inter eos, qui in caliditate summa excedunt. Quare excedere in caliditate & excedere in frigiditate sunt valde cōtraria, ita ergo conciliare possum⁹ ac debemus autores istos adeo celebres.

De odoratu & odorib;. CAP. XIII.

VIdendū est nūc, qua ratione ex odore peruenire possimus in cognitionē simpliciu, cū de his quę ratione gustus atq; saporū egerimus. Odores n. sequuntur naturā mixti sicuti sapor. Quoniā sicut sapor cōsistit in humidō, permixto terreo siccō, sic odor cōsistit in siccō terreo euaporato p humidū: in terreo enim siccō fudatur odor, attenuato ac euaporato ab humido: & hec est essentia odoris, & vapor odoris est aqua tenuior & aere crassior. Nam quādo sentimus tertiu odore, linteū apponimus narib; ex quo linteō ramē non impeditur ingressio, ac attractio aeris, sed phibetur odor puenire ad nares. Quare vapor odoris est crassior ipso aere; ac incerta admodū est cognitio de essentia simpliciu ex odorib; quoniā imperfectissimus nobis traditur est à natura sensus olfactus, sicuti perfectus est gustus, quod patet ex rosa ipsa, quam si olfacimus, sentimus gratum odorem, & ex hoc iudicamus siccū terreum esse optime attenuatū ac euaporatū ab humido. At si ipsam rosam gustamus, saporēs diuersos sentimus, ex quo coniciamus, diuersa esse temperamenta in ipsa rosa, quoniam gustus sensus perfectissimus, olfactus vero imperfectissimus nobis à natura tra-

Saporis per calidum excedentem à medio.

Reconciliatio inter Galen. & Aristot.

Odor in quo consistat.

Ex odoribus incerta est cognitio essentia simplicium.

ditus est. Quare non possumus ex odoribus ipsis in cognitionem substantię simplicium peruenire, ac præterea propter diuersitatem substantię possumus peruenire in cognitionem ipsorum substantię ex odoribus, quoniam non æque partes omnes in quocumq; mixto exuperare possunt ac à calore attenuari: & ideo non ab omnibus partibus mixti deuenit & euaporat odor: quare non perfectam habemus substantię cognitionem ex odoribus, quoniam quædam sunt partes in mixtis tenuiores, quædam crassiores: à primis facile deuenit odor, à crassioribus vero non ita.

Ex odoribus cognitis substantia quare sit temperata.

Eorum etiam, quæ odorata sunt, scimus fere omnia tenuitatem partium habere & caliditatem: sed quo in gradu sit hæc caliditas seu tenuitas, ex odore non cognoscimus. Innotescunt enim nobis odores sub hac communi notione grati & ingrati. Alię vero differentię potissimum non sunt nobis cognitę, nisi velimus dicere, quod habeamus odores quoddam similitudine saporum sumptos, quoniam aliquos odores dulces appellamus ac suauis, & amaros & insuauis: quoniam odor ille inimicus sit, vel inimicus temperamento naturali hominis. Posslemus etiā dicere odorū tria esse genera, aliquos videl. veluti inchoamēta odorū ac veluti materia, vt si dicamus in odoris odor, qui proportionē respondet in spido saporis alios esse odorū fœtidiorū ac putridiorū tales vero odores sunt ichores odorū. Quare est in odoris odor ac putris odor, qui extemit sunt: in medio vero horū sunt odores grati temperamento humano: ac eorū nomenclaturę, species ac differentię sunt incognitę propter diuersitatem partium in mixtis existentū, ac propter sensum olfactus debile & imperfectū in homine. Quare ex odoribus non possumus perfectā simplicium cognitionem habere.

Odores substantia quare nota nobis sunt.

Ex visu autem forsitan longe minus, quam ex odoribus, tum quia cum quacunq; specie coloris omnia temperamenta possunt reperiri: quædam enim alba sunt, quę frigidissima sunt: quædam vero alba, quę calidissima, vt calx: quare ex colore non possumus temperamentū simplicium cognoscere. Præterea colores indicant dispositionē corporis, quę in superficie est, non autem illius, quę in profundo existit. Quare in superficie tantum dispositionē exteriore ex colore habere possumus, non autem profundiorē. Non tamen prorsus spernendi odores ac colores in re medica: plurimū enim in seruiū nobis ad dispositionem naturę mixti cognoscendā: quoniam suavis odor optimā concoctionem ac attenuationē sicut terrei cum humido indicat: putris vero odor magnam in re corruptionē esse denotat.

An calor probat cognitionem substantia.

Ex colore etiam seplasiati cognoscunt, an simplicia sint recte disposita. Colores etiam in egris dominium humorū indicant: si ruber, sanguinis, si albus, pituitę, si liuidus, melancholicę, si flauus, bilis cognitionē affert: quare ex coloribus & odoribus aliquam cognitionem licet imperfectam habere possumus. Reliquum esset, vt ad actiones & facultates simplicium certas accederemus: sed antequam ad hæc deueniam, est dubitatio, cum in præcedenti dixerimus, maximam esse similitudinem inter sapes & temperamenta simplicium, ob id dubitatum est, quoniam multa sunt odore & sapore delectabilia, quę non solum temperamentum proprium lædunt, sed etiam interficiunt, quod habetis ex Theophrasto lib. 9. de histor. plantar. qui dicit, multas esse radices odoratas, quę tamen interficiunt. Ipsum ergo videre potestis, vt ad rem nostram magis accedamus & citius.

De Methodo applicandorum medicamentorum. CAP. XIII.

Cum declarata sit hæcenus tota simplicium medicamentorū essentia, videndū est modus, quā via singula medicamenta singulis humani corporis partibus applicanda sint. Diximus autem in principio tractationis huius, eam quam Medicum decet rationale tractationem medicamentorum aggredi, quā possit sanitatem reseruare & morbos depellere. Diximus quin etiam multiplicia esse simplicia: sed simplex, quod medica materia dicitur, est corpus naturale nulla arte compositum, quod potest accommodari ratione ad sanitatem tuendam & morbos expellendos. Diximus postea, quę cognoscantur ex tota eorū essentia percepta, quę essentia est temperatūra ipsorū, quare necessum est deuenire ad separaturam dignoscendā, quā etiam tradidimus per qualitates, accidia & huiusmodi. Quoru aliquę ex parte materię, alię ex parte formę tenent. Dico igitur quod si medicamentu veniat in facultate ista ad morbos expellendos, quę facultas est therapeutice subiecta, videndū est, quomodo morbi expelli possint. Expelluntur autē triplici instrumēto, chirurgiā nēpe, dixi, ac pharmacia. De primis duobus sermonē omittimus, & tantū de applicatione medicamentorū agemus, & de ipsis simplicib. tantū tractabimus. Quare dico, cū iste sit finis noster, vt scilicet morbos expellamus, & expulsio sit in genere motus, qui motus sit per contraria: quare per contraria morbi expelli debent: quę contrarietas inter qualitates est, quarū aliquę naturā corporis, alię materię conditiones sequuntur. Quę materię conditiones sequuntur, sepiē esse differentias diximus, vt potest videri ex principiis huius tractationis nostrę, quare videndum est, quomodo applicanda sint medicamenta contraria.

Epilogus dissertationis.

Finis Medicinæ tractatus de simplicibus.

*Methodus
applicando-
rum medi-
camentorum.*

*Calidiorum
in secundo
gradu sibi
ad tertium
facilius.*

*Conueni-
entia in scir-
rho à mate-
ria pituito-
sa.*

Si ergo sit corpus immodice rarefactum, ita, ut actiones eius impediatur, si contraria contrariis curantur, eòdem sententia erunt applicanda. Sed qua via hæc inueniemus? Iam hoc declaratum fuit, cum dixerimus, quod ea dicantur esse rara, quæ poros habent plures in sui substantia ac amplios. Cum ergo corpus nostrum valde rarum fuerit, inuenienda sunt medicamenta, quæ coarctent illa, quæ nimium dilatata sunt, & quæ obstruant nimium aperta. Hæc autem quænam erunt? Ea enim quæ sapore acerbata sunt & austera optima erunt ad hanc obstruktionem & constructionem. Sed quæ ratione id efficiunt? Considerate naturam ac temperamenta ipsorum, quoniam quæ austera sunt & acerbata terrestria sunt ac frigida, ideo possunt comprimere, incrassare, constringere & obstruere. Si vero corpus non nimia raritate sed densitate nimia sit affectum, ita ut impediatur eius actiones, ut quādo obstructa sunt viscera interna vel ab humore implente meatus, vel à frigiditate comprimente. Quare medicamenta, quæ vim habent attenuandi & aperiendi, qualia sunt calida in secundo gradu & quæ usque ad tertium accedunt, quoniam possunt incidere, attenuare & aperire, optima erunt. Cognoscetur autem tale medicamentum ex sapore acris ac mordaci, quoniam calore igneo medicamenta hæc prædita sunt, ideo per quamcunque viam usque ad profundum penetrare possunt, dilatant, exobstruunt, aperiunt & attenuant talia medicamenta. Si vero corpus induratum sit nimium, reuocare in memoriam oportet ea, quæ dicta fuere de duritie; quæ medicamenta, quoniam à multis causis talia fieri diximus, ut à condensatione, frigiditate nimia, ut quando ex aqua fit glacies, & hæc proprie congelata dicuntur, quædam vero à calore indurante ac siccante; quædam etiam à frigiditate comprimente & exprimente humidum, ut in laceribus patet. Quædam vero dura dicuntur ob nimiam plenitudinem ac repletionem, ut patet in pila vento repleta ac tensa. Quare distinguenda sunt species hæc. Si ergo corpus induratum sit à frigore nimio, ut consuevit fieri, quando generatur scirrhus à materia pituitosa, tunc durities provenit à nimia frigiditate ob congelationem quandam; tunc igitur quæ congelata sunt, opposita sunt illis, quæ dissoluit, ut patet in glacie, quæ à calore solis dissolvitur. Quare dissoluentia conueniunt medicamenta, qualia sunt, quæ moderate calida sunt; quia si scirrhus sit à materia pituitosa ac crassa, si extreme calidis utemur, resoluemus ac exiccabimus: nam resolutis partibus tenuioribus, crasse indurabuntur magis per introductam à calore exiccationem. Aduertendum est igitur, ne fugientes indurationem à frigore ineidamus in indurationem à calido resolvente, quod peius erit. Quare moderate calidis utendum est, talia autem sunt, ut superius diximus. Ex sapore cognoscuntur moderate dulcia, quoniam dulcia omnia accedunt ad temperamentum. Inter species autem dulcedinis, quæ remissiores sunt, sunt illæ, quæ oleosæ sunt: quare omnia ac oleaginea in scirrho conueniunt à materia pituitosa, talia autem sunt olea ac pinguedines animalium moderate calidorum, quæ tamè recentia sint, quoniam si rancida sunt, ex putrefactione maiorem calorem habebunt ac mordacitatem. Quare pinguis recentia, nec sapore extraneo prædita conueniunt. Si vero à calore exiccante ac frigore exprimente humidum, induratum sit corpus, tunc id dupliciter fieri potest: vel nim hoc omnino sit, ut accidit in scirrho exquisitissimo, ex toto humido expresso: in hoc autem casu cura desperata erit, si consumptum sit totum humidum, quoniam tunc neque calida conueniunt, neque frigida etiam, quoniam ex his indurabitur magis scirrhus. Sed si expressa non sit tota humiditas, tunc nos poterimus aliquam spem habere curationis, licet difficilem, & tunc necesse erit adhibere quæ habent vim resistendi causæ adhuc lædenti, & quod iam factum est, corrigere. Causa autem cum sit calor insignis, ideo frigida conueniunt, quæ tamen exiccantia esse non debent, quoniam augeremus affectum introductum. Medicamenta igitur frigida sunt & humida, ut est succus solani, oleum violaceum, oleum rosaceum, licet habeat diuersitatem partium. Sed qua via inuestigari possunt? Ex saporibus hoc habebimus. Ea enim omnia quæ aquea sunt ac insipida, conueniunt. Quare talibus infrigidantibus ac humectantibus utendum est. Si vero ab utraque causa sit factus scirrhus, tunc etiam cura hæc desperata est.

De Scirrho à quacunque vel causa vel materia facti. CAP. XV.

Cum omnis intentio medici circa sanitatis recuperationem versetur, ideo quomodo applicanda sint singula medicamenta singulis corporis partibus iam diximus ac etiam exposuimus, quod cum multipliciter possit oriri durities, quoniam quandoque à frigiditate provenit, ut in congelatis apparet, ideo talia per oppositam qualitatem curanda esse diximus, & ideo calidis curabimus. Quando vero aliqua sunt indurata à calore resolventes cum frigidis procedendum esse. Si vero ab utroque, si perfecta sit facta humiditatis expressio, incur-

inevitabiles esse hos affectus explicauimus. Sed quoniam quandoq; ob nimiam repletionem fit durities, non autem ob caliditatem vel frigiditatem, vel ab vtraq; causa simul, sed quia aut humore aut flatu nimium repletum est, hæc etiam durities sua contraria qualitate tollitur, nempe euacuatione. Sed hæc multipliciter fieri (& hoc attendatis) & multis rationibus variari potest, quare oportet, vt cauti sitis, quando scilicet hoc modo, & quando illo vti debetis. Quandoq; enim discutientibus, quandoq; abstersione, interdum lubricatione, quandoque compressione, aliquando etiam attractione & solutione euacuamus. Sed quis dicet, vnde rot modi euacuationis hauriuntur? tot modis fit, quoniam, vt corpus repletum sit, necesse est, vt repleatur materia, quæ materia aut hæret in partibus repletis, aut non, aut tenuis est materia & flatuosa, aut crassior & corpulenta. Si tenuis sit & flatuosa, per halitum euacuatur, vt contingit in tympanitica affectione; tunc enim discutientibus vtendum est. Discutientia autem sunt, quæ flatus propellunt, vt sunt & faciunt illa, quæ in secundo sunt gradu calida, vt sunt pulegium, nasturtium, calamentum & huiusmodi, quæ penetrant sui tenuitate & acrimonia, ac discutunt & expellunt flatus. Si vero materia magis crassa sit ac corpulentior, vel hæret vel non, Si hæret, aut viscida est, & penetrat in profundum substantiæ, vel est in superficie. Si penetrat, abstergentibus validis vtendū est, quæ incidunt, attenuant & penetrant, vt amara ac salsa omnia. Absterfip enim nihil aliud est, quam expurgatio sordium tenaciter in hærentium. Talis autē expurgatio fit cum his, quæ penetrant, extergunt ac expellunt. Talia autē vt penetrant, oportet, vt tenuiorum sint partium: talia autem sunt, quæ sui caliditate incidunt, penetrant ac detergunt, vt sunt amara & salsa, in quibus est portio terrei elementī. Abstergunt etiam dulcia, exempli gratia, mel abstergit hac ratione, quia in eo satis insignis adest caliditas, cuius signū est mordacitas. Dulce enim est mel cum mordacitate; nam in oculo, si infundatur gutta mellis, maxima acrimonia percipitur ac sentitur. Cum autē in melle sint partes tenues, propterea penetrat ac sui calore incidit & attenuat: suo vero leniore lubricat, ac corpus ad euacuationem aptum reddit. Abstergit etiam saccharum, sed non est in eo tanta caloris vis ac exiccatio vel mordicatio vt in melle.

Resinæ etiam abstergunt: habent enim visciditatem ac lentorē ac partes renues, & vim exiccandi maiorem, quam in dulcibus reperitur, quoniam in his amaritudo quædam adest, quæ maiorem adustionem ostendit, nam magis abstergere possunt. Abstergere etiam potest pituita hordeacea, quoniam cum ea aqua est, quæ abluit ac excrementa educit. Abstergunt etiam acida, quæ quamuis frigida sint, tamen in eis adest aliqua caliditas: ac quia tenuium sunt partium, ad profundum penetrant, & propter vestigium mordicationis ac caloris euaporato reliquæ abstergunt. Abstergentibus itaq; medicamentis vtendum est, in materia pertinaciter hærente. Sunt & alia etiā, vt pulueres, ratione asperitatis, & eo magis, si ad tenuitatem partium redacta sint aspera; In ipsis enim adest asperitas, quæ secum inuolutas sordes educit, ac humorem imbibunt, ac sui tenuitate penetrant, ideo validissime absterguunt pulueres, & ob id in externis etiam partibus imponimus pulueres: Lomētum etiam seu fatina, vt fabarum, orobi & lupinorum sui tenuitate penetrant, quare chirurgi dum volunt valide abstergere, his vtuntur. Euacuatio itaq; per abstersionem his dictis fieri potest, & tunc potissimum fieri debet: quando ad profundum corporis penetrant & hærent. Si vero materia non ita ad profundum penetret, sed in superficie sint, abluentia tantum satisfaciunt: ideo abluitione egemus, quando in superficie hærentia continentur. Ablutio autem cum humidis, liquidis & aquosis rebus fit: talia autem medicamenta sunt illa, quæ in lipido sapore sunt prædita, sapor enim aquosus est sine aliqua qualitate. Si vero materia repleta non adhæreat partibus ipsis, neq; leniter neq; pertinaciter: sed tantum in cavitatē existat, tunc istæ cavitates vel distant à viis ductuum, vel non distant: Si non distant, lubricantibus tantum vtetur, vt pingua sunt ac mollia, vt est oleum maturum, pinguedines omnes, butyrum & huiusmodi, quæ æqualitatem quandam habent ac lentorē, ita vt per se ipsa, nisi hæreant, excrementa subducere possunt in clysterib; itaq; ad hunc scopum lubrum olea ac pinguedines imponi. Si vero materia sit impacta, addimus mel rosaceum & saccharū, & alia id genus, quæ valide abstergere possunt. Quod si non adsint partes viscidæ ac hærentes, sola lenitione egemus. Si vero longe à viis ductuum distent excrementa, necesse est attractione: talis autem attractio necesse est, quod fiat medicamentorum habente attrahendi ad se ipsum, vt soluentia sunt. In hoc itaque casu, quando humoribus multis repletum est corpus, qui à viis ductuum distent, soluentibus vtetur, quæ habent vim ad se trahendi, & ad vias communes excrementa trahendi. Quæ autem facultate medicamenta hæc trahant, aliqui enim à proprietate occulta hoc facere dicunt, quidam sui caliditate, idgo de hac re nos longo sermone tractabimus. Id

autem nunc attendendum est, quod quandoque ita vnita sunt ista, vt quæ abluunt, abstergunt & trahunt, vt patet in aqua mulsa, in qua propter aqueas partes abluentionem & à melic attenuarionem & absterfionem habetis. Quare cum coniungantur hæc simul quâdoque, & cum opus sit similibus scopis, attendere his etiam complicatis vti oportet. Sunt etiam alia, quæ compressione euacuant ac adstrictione. Sciendum est, quod hæc non per se sed per accidens euacuant. Quæ enim per se euacuant, sunt dicta. Hæc autem per se non possunt penetrare ac incidere, sed per accidens, quia comprimunt, euacuant, vt sunt citonia mala & huiusmodi, sed hæc nisi post cibum exhibenda sunt, ac nisi prius lenita alio ante cibum: à cibo vero deinde hæc adstringentia exhibere, quoniam reperient viam paratam à lenientibus, & comprimendo excrementa deinde expellent. Tot modis itaque fit euacuatio, vt audiuistis; de vi modo soluentium tractandum est,

Citonia mala quæ ratione euacuant.

De vi ac facultate soluentium. CAP. XVI

ANte comprimentium exhibitionem emollientia exhibenda esse diximus, quoniam aparant fluxionem. Quæ vero euacuante electiue à longinquis, dixerunt aliqui, quod à proprietate occulta id agant: aliqui autem dixere id agere per similitudinem, quæ est inter medicamentum attrahens & humorem attractum; alij vero, vt Auerrhoes, alio modo. Aliqui autem dicunt, quod sola caliditate soluant. Et hanc sententiam attribuunt Galeno dicentes, quod non à qualitate occulta, sed à manifesta fiat euacuatio: quoniam si fiat per caliditatem, manifesta est qualitas. Sed hæc non modo mihi non placeant, sed contrarias Galeno esse dico: Quoniam si fieret per caliditatem euacuatio vel attractio, quæ magis calida essent, magis etiam attraherent ac solueret: sed multa sunt calidissima, quæ nihil profusus attrahunt, vt piper, zingiber & huiusmodi, quæ calidiora sunt scammonio & colocythide, & tamen nihil profusus attrahunt.

Soluentia autem manifesta non soluentia attrahunt.

Præterea si caliditate fieret attractio, nulli dubium quod calidum attraheret, quodcunque sibi obuiam venit; sed hæc electiue euacuant determinatum humorem respicientia, non autem quodcunque proximus reperiunt: imo licet pituitosum excrementum proximus sit viis purgationis, tamen medicamentum apium purgare bilem, citius ac facilius ipsam bilē trahet distantem, quam pituitam proximam. Bene verum est, quod quando non adest amplius bilis attrahenda, trahuntur etiam alij humores, tamen prius trahetur ad se id, quod valde distans est: quod non fieret, si caliditatis ratione hoc proveniret; quare hæc attractio non fit per caliditatem; patet etiam hoc ex Galeni sententia: Galenus enim in libro 2. de natur. facult. cui sententiæ contradicunt isti, dicit attractionem non fieri per caliditatem. Sed dicunt isti, omnia quæ educunt, calida sunt, ergo caliditate agunt. Sed argumentum hoc fallax est, non enim valet. Quoniam si verum esset, opus esset etiam, quod omnia calida attraherent, nam non conuertitur: bene verum est, quod caliditas iuuat attractionem medicamenti soluentis aperiendo vias, ac attenuando humores, non tamen quod ea attractio fiat sola caliditate, sed sit virtute propria medicamenti, quæ vel est forma resultans ex mixtione, vel est quid à cælo proveniens, vel à corporibus cælestibus per influentiam quandam. Quare dicamus medicamenta soluentia hoc habere à propria virtute formæ.

Redarguitur dicentes soluentia trahere per caliditatem.

Argumentum contra Galenum quod omnia soluentia trahunt per caliditatem.

Præterea notandum est, quod omnia ista medicamenta, quæ benedicta dicuntur à Medicis, non ob id benedicta dicuntur, quia leniant, comprimant, vel aliud simile iuuat, sed etiam soluentia sunt. Quando enim dicitur, quod aloë bilem purgat, floresque cassiæ humores crassos ac adustos, manna tenues ac serosos, myrobalanorum alij pituitam, alij bilem, & tamen omnia benedicta dicuntur ac lenientia. Et hæc ex electione etiam trahunt, ergo non constrictione vel lenitione trahunt, quoniam deberent hoc modo exprimere quemcunque humorem peccantem: sed isti bilem, isti pituitam educunt, ergo à propria qualitate. Hoc etiam alia ratione patet, quoniam si exhibeatur flos cassiæ vel aloë in magna quantitate, longe magis flores euacuabunt in magna quantitate exhibita, quam scammonium in parua quantitate. Ideo signum est, quod non dicuntur benedicta, quia tantum lenientia sunt ac comprimentia: sed ita dicuntur, quia si moderate exhibeantur, moderate educunt, ac molesta non sunt. Et hoc etiam ex Galeno patet: quoniam sententia Galeni est, quod Aloë si moderate quantitate exhibita non pertranseat primas venas, mefmicas se: & ita non pertingat ad hepar: quia si quantitas immodica sit, non modo primas venas petit, sed etiam à venis educit maxime remotis, & non solum pituitam, sed alios etiam humores. Quod autem de cassia dixi, idem de alijs etiam intelligi debet.

Medicamenta benedicta cur dicantur.

De corpore tractando secundum varias indicationes & eius qualitates actiue.

CAP. XVII.

Si corpus euacuatum sit, repleti debet: at quoniam vel excrementis vacuum est, vel substantifico humore: Si excrementis est vacuum, hac de causa laesum esse non potest, nec lesionem pati, quoniam excrementorum euacuatio iuuat potius, ac corpus ab ipsa iuuatur, ideo prodest, vt excrementis vacuum sit. Si vero sit vacuum corpus alimento, hoc dupliciter esse potest, vel quia alimento tantum careat, licet ex sua naturali dispositione possit ipsum attrahere ac concoquere: vel eo caret, quia non potest attrahere, vel attractum concoquere. Si potest attrahere, hoc iterum fit dupliciter: vel enim potest attrahere, concoquere & retinere, vel si attrahit, non potest concoquere ac retinere. Si potest attrahere & retinere atque concoquere, tunc nulla alia re eget, nisi vt congruum alimentum exhibeatur, & hæc actio ad diætam pertinet. Si vero corpus attrahit, sed tamen retinere non potest, eo, quia propter raritatem partium alimentum euaporat, tunc occurrendum est, ac facere oportet, vt corpus retinere possit: hoc autem fiet astringentibus constringendo ac conspiciendo partes: possumus etiam obstruentibus seu inuisicantibus vni medicamentis, quæ scilicet sua natura viscosa, sui que viscositate poros obstruant & obturent, & ita obstruendo ac replendo resistemus huic euaporationi. Et quia hanc affectionem sequitur quandoque, & vt plurimum atrophia, in qua fit consumptio partium solidarum, ac humoris substantifici membrorum corporis, tunc, quoniam ita exsiccata sunt, vt suis partibus solidioribus careant, & non possint alimentum attrahere, tunc, inquam, valide attrahentibus occurrendum est, quæ sunt ea, ex quibus sinapismi & dropaces sunt, quorum vsus est, quando potissimum non potest ex nimia frigidityte ob resolutionem spirituum, membrum aliquod attrahere, ita vt vacuum alimento remaneat, in hoc casu dropacibus vtitur.

Dropaces autem medicamenta magis in vsu apud antiquos, quam apud nos, & duplices erant: alii enim ex pice fiebant, & paucissimo oleo mixto, & his calidis totum corpus vel membrum illiniebatur, ex quo calefactio, humectatio corporis, & attractio sanguinis fiebat, & de his loquitur Paulus libro septimo capite decimo septimo, quem potestis videre. Sinapismi vero erant medicamenta ex sinapi confecta. Caricas enim accipiebant, & infundebant in aqua calida, deinde exprimebant caricas, & addebant sinapi, & miscebant ipsum vel in minori, vel in maiore copia, prout opus erat, sicuti ipsi maiori vel minori, debiliori vel validiori egebant attractione, & his sinapismis à centro ad superficiem calorem attrahebant, & maximum ex his beneficium afferebant infirmis.

Quoniam autem de pleno & vacuo mentionem fecimus, dum tractabamus de duro & molli, reliquum est, vt videamus, quomodo mollia corpora curanda sint. Dum autem perfecimus sermonem de duro, & etiam de pleno & vacuo diximus, duplici de causa fieri corpora dura, vel scilicet quia à nimio frigore indurantur, vel quia à nimio calore exsiccantur. Ita de molli dicendum est, quod scilicet vel à nimio calore eliquetur, vt patet in cera & pinguedinibus. Si itaq; corpus ex hoc calore ad hanc molliem deuenit, tum refrigerantibus occurremus ac congelantibus. Si vero à nimia humiditate & frigidityte liquefacta fuerint corpora, vt accidit in sale, in tempore humido hyemis: nam sicuti tunc ipsum soli opponimus & igni, ita etiam in corpore mollietis ab hac causa, siccitate & calore indurantur.

Cum autem ex septem qualitatibus propositis, tria explicauimus, videlicet de duro & molli, de raro & denso, & de pleno & vacuo, sequitur quartum genus harum qualitatuum, quod est crassities & tenuitas. Crassities autem attenuantibus curatur ac incidentibus, quæ calidiora sunt vsque ad tertium gradum, nam rarefaciunt, penetrant, incidunt ac calc faciunt, & attenuant. Ista autem cognoscuntur sapore. Quæ enim acris sapore sunt prædita, talia existunt. Si vero e contra corpora nimia tenuitate affecta sunt, incrassantibus hoc faciemus, quæ sunt triplicia: nam aut constringentia sunt, quoniam congregant partes in vnum, condensant ac coniungunt & continuas faciunt ipsas partes, Secunda vero sunt viscidæ, & ratione huius visciditatis replent vacuitates & poros. Tertia vero sunt ea, quæ lentore prædita sunt, ita vt repleant, ac pettinaciter hæreant, & ita extremo crassum videtur corpus. Faciunt etiam vnum aliud, quod ligant partes ac connequunt simul suo lentore. Tertio modo crassiora reddimus corpora permiscenda, quæ

crassa substantia sunt prædita ac sicca permiscendo, vel ergo constringentibus & constantibus, vel inuisantibus & replentibus, vel terrestribus ac siccis utimur ad incrassanda corpora

*Asperitas
& lenitas.*

Sequitur secundum genus: quando sc. corpus nimis asperum est, & tunc occurrimus humidis: Asperitas enim siccitatem sequitur. Sed sunt duplicia humida: quædam enim sunt statim fluentia ac liquida, quædam vero viscidiora. Sed in hoc casu viscidioribus uti oportet, quoniam liquidiora statim decident à parte, & non agent, & ita diutius lentotem seruabunt ac humiditatem hæc viscida humiditate prædita. Si lenes autem nimium sit corpus, exiccantibus utendum est, ut sunt ea, quæ terrestres habent partes ac crassas. Sequitur visciditas & friabilitas, quæ ex sexta differentia earum qualitatum, quæ setenent ex parte materiæ. Cum igitur corpus erit nimia visciditate præditum, cum exiccantibus ac penetrantibus procedendum est, ac illis, quæ faciunt exhalare substantiam æream, quæ est illa, quæ permixta cum substantia aquea lentorem facit: quare vim penetrandi habentia conuenient, ac exiccantia, & etiam abstergentia, quæ qualia sint, superius diximus: Quæ autem possunt penetrare, abstergere, ac euaporare ac exicare, sunt ipsa amaro sapore prædita: detergunt enim & exobstruunt. Iam ergo habemus sex differentias declaratas, quæ setenent ex parte materiæ, & quomodo ipsis occurrere debeamus.

*Visciditas
& friabilitas.*

*Gravitas
& leuitas.*

Remanet septima differentia, quæ amplectebatur grauitatem & leuitatem. Ex grauitate autem corpus nostrum lædi non posse videtur statim maxime, quoniam si nimium graue sit, hoc ex humoribus replentibus, vel crassis, vel tenuibus fit: at quomodo occurrendum sit his, iam dictum est. Leuitate autem lædi corpora non possunt, quoniam talis leuitas non potest esse, nisi ex vacuitate, & tunc vel est excrementis vacuum, quod non nocet, ut dixi: vel deficit alimentum: cui defectui, quomodo obcurrendum sit, supra etiam diximus ac declarauimus satis superque, quare nihil aliud restat nobis tractandum circa qualitates actiuas: igitur in posterum de passiuis agemus.

De qualitatibus passiuis.

CAP. XVIII

*Sapores
quatuor
de fiant.*

Cum hæcenus egerimus de qualitatibus attinentibus ad qualitates actiuas, nempe caliditatem & frigiditatem, modo conuenit, ut de passiuis agamus: ubi unum sciendum est, quod licet ex gustu possit aliquod haberi qualitatum passiuarum indicium, non tamen possunt perfecte cognosci, nisi etiam habeatur cognitio qualitatum istarum, quæ setenent ex parte materiæ, ut est durities, mollities, friabilitas, visciditas & huiusmodi. Vt ergo rectam cognitionem istarum consequamur, sciendum est, quod sapores sunt ex permixtione sicci cum humido, & nisi fieret hæc mixtio, sapores neque fierent: nam dubium non est, quod saporibus mediantibus ad cognitionem harum qualitatum passiuarum deuenire possimus: quoniam quæ sapore prædita sunt, aliqua siccitate prædita esse dicemus. Quæ vero insipida existunt, humida esse dicuntur: sed quomodo cognosceret istarum gradus? Si siccum terrenum tundatur in materia crassa ac densa, tunc vel exuperat calor, vel frigiditas: si calor exuperet, sapor salis oritur, ac ita sapor hic salis, cum sit fundatus in materia sicca, terrea & crassa, non tantum calorem sed siccitatem significat, quoniam fundatur in materia sicca, terrea ac calore adusta: nam quanto maior est salsedo, tanto maiorem siccitatem esse dicemus. Si vero exuperet calor magis, amarus fiet sapor, & tunc calidiora erunt, & siccitas etiam maior. Hinc est, quod salsa & amara resistunt putredini, quoniam omnia sicca sunt. Putredo enim ex humiditate fit. Nam vestimenta seruamus cum foliis citri, absinthio & huiusmodi: carnes vero conseruamus sale. Si ergo materia, in qua sapor fundatur, sit crassa & terrea, oritur sapor salis & amarus, qui indicent caliditatem & siccitatem. Si vero siccitas sit in materia tenui, tunc orietur sapor acris, qui cum sit in materia tenui, non tantum caliditatem, sed siccitatem indicat: quoniam calor in materia tenui fundatus magis penetrat ac adurit. Si ergo calor dominetur in materia crassa, possumus ex sapore salso & amaro hoc habere: Si autem in materia tenui, ex sapore acris. Si vero frigiditas dominetur & siccitas in materia crassa, oritur sapor acerbus: quoniam in ista materia crassa pauca caliditas continetur, quæ statim exhalat, ideo est sapor acerbus, qui non solum frigiditatem, sed siccitatem etiam insignem denotat.

Si vero frigiditas in materia sit tenui, oritur sapor acidus, qui cum in materia tenui fundetur, ideo habet vim incidendi ac refrigerandi, siccandi etiam ac penetrandi & attenuandi, & etiam aperiendi. Si vero siccitas in materia mediocri sit, tunc vel calor dominatur frigido, & tunc oritur dulcis sapor, qui fit ex leui dominio caloris in materia permixta ex siccitate & humiditate. Et sicut in corporibus est leuis gradus dulcedinis, ita moderata

rata caliditate sunt prædita ac siccitate, sed levis est siccitas, ut prope ad temperatum accedat, & talia sunt omnia pinguis, & oleaginea, nisi alio sapore sint prædita, ut si rancida sint, quoniam tunc sapor ille rancidus à putredine oritur: putredo vero à calore extraneo, & ita adurit partes illas: quare calefaciunt hæc & exsiccant. Quamvis inter pinguis quædam sint, quæ sua natura exsiccant, ut est adeps hiretnus & leoninus, qui insigniter exsiccant ac calefaciunt. Si vero dulcia intensiora sint, quanto magis intensus est gradus dulcedinis, tanto magis intensus est gradus caloris, ut est mel, in quo acrimonia reperitur, ex qua patet valenter ipsum exsiccare & calefacere. Si vero frigiditas sit in materia mediocri, sapor austerus oritur; qui indicium dat frigiditatis, non tamen adeo insignis, ac acerbus, sed siccitatis etiam index est, quare moderate exsiccet ac refrigerat, ideo facile transeunt austeri in dulcedinem.

Quæ vero nullo sunt prædita sapore, humida sunt, ac aquea. Supponamus itaque saporem provenire ex permixtione humidæ aquæ cum siccò terreo, & uis fieret hæc mixtio, non adesset sapor.

De quibusdam dubitationibus circa sapes dictas, item de methodo inueniendi secundas, tertias & quartas qualitates.

CAP. XIX.

¶ Cum ante dixerimus ex siccitate fieri saporem, non autem ex humiditate: nam humiditas nullum præbet gustui saporem: oritur dubitatio de lactuca, quæ à prædominio humida est: Et tamen saporem habet, quomodo ergo dicemus ex siccitate fieri saporem? Ad hoc respondeo; quod non dixi à siccitate tantum fieri saporem, sed dico, non posse fieri saporem aliqueum absq; aliqua permixtione siccitatis. Diximus etiam, quod quando frigiditas dominatur in materia sicca tenui permixta cum humido aquæo, incidit, attenuatur & penetrat. Fitemur tunc aciditas ipsa. Sed quis diceret, si acida à prædominio frigida sunt, & frigidi sit condensare, cur itaq; non adstringunt acida, si à prædominio sunt frigida? Ad hoc etiam respondens dico, acida non adstringere, quoniam est à prædominio frigida sint, fundata sunt tamen in materia tenui, ita ut facile à calore euinci possit. Addamus quod acida non multum distant à calido, licet à frigiditate prædominentur: cuius rei signum est, quod facile in acidum saporem vertantur, quæ à caliditate putrescunt, quod est in causa, ut sui frigiditate non possint constipare poros corporis, & quoq; in lib. 3. de caus. sympt. rationem dat Galenus dicens, quod acida in stomacho putredinem generant.

Ex his autem colligitur acida & actia non differre substantia, sed qualitate tantum, quoniam actia intense calida sunt, acida vero frigida, licet non intense: sed cum utraq; in tenui sint substantia, ideo possunt attenuare, penetrare ac incidere, cuius rei signum est acetum, quod quia non solum acidum est, sed acredine habet, maxime penetrat, incidit & attenuat. Succus vero limonum tantæ aciditatis est, ut in tenuitate & penetratione superet acetum: tenuissimus enim est substantia, & validissime penetrat ac incidit: quare his vniuntur aliqui in frangendis lapidibus fructus calculis renium, licet vires succi limonum non exprimantur à Galeno vel aliis auctoribus. Non possunt enim omnia ab vno tantum viro probari ac cognosci.

Diximus præterea, quod cognitio hæc non tantum ex saporibus, sed ex modo substantiæ rei haberi possit penes scilicet etiam solum & tenue, molle & densum, & huiusmodi, sicut diximus superius: Ea enim, quæ sicca & acida substantia sunt, nulli dubium est, quod exsiccare possunt ac humidum absorbere.

Non tamen econtra verum est, quod scilicet omnia, quæ humida sunt, actu humedant, ut patet in vino potenti & aqua ardente, quæ actu humida sunt, maximam tamen vim obtinent exsiccandi, imò ad arrendi: hoc autem est, quoniam in corpore sunt tenues partes permixtæ aeris ac ignis, quarum maxima copia in vino potenti ac aqua ardente reperiuntur. Quando autem hæc corpora fluida tali partium commixtione prædita sunt, sensu percipi potest, quoniam actia sunt.

Si vero insipidum sit corpus fluidum, dicatis ipsum nullam habere partium siccantium. Si vero percipiaris ipsum acidum, dicatis frigiditas habere partes. Aristoteles autem in lib. problemat. & in 4. Meteor. vinum semper humidum esse asserit: at Galenus ait vinum non lymphatum exsiccare: non tamen pugnant inter se, quoniam Arist. formas rei considerans ac actu existentes, videns fluens esse vinum, tanquam naturalis, humidum illud esse dixit; Ga-

lenus uero ceu Medicus & medicamenta faciens, ex vino non tantum actum, sed potentiam ipsius consideratauit: nam dicit ipsum exiccare, quanquam secundum formam sit humidum & fluens. Quæ ergo actum humida sunt, non debent iudicari statim posse humectare: quæ uero sicca sunt, possunt dici siccare.

*Methodus
inueniendi
qualitates
secundas,
tertias &
quartas.*

Supereft, ut methodum habeamus inueniendi qualitates illas, quæ secundæ, tertie & quartæ dicuntur. Secundæ autem sunt, ut menses clere, & urinam prouocare, lacque gignere, vel humores crassos ac pus è pectore educere, & hæc hecica dicuntur. Aliæ uero dicuntur hepaticæ, capitales & huiusmodi ratione membrorum, quæ ipsæ respiciunt, & sunt hæc de genere tertiarum qualitatum: sed de his non est tractandum à nobis, quoniam nostrum non est, sed excellentissimorum practantium. Sufficit, ut agamus de secundis, quæ omnes aliqua ex parte sunt consideratæ, dum de causis materialibus tractaremus, quæ erant aperire, claudere, resoluerè, constipare & huiusmodi. Nam diximus has numerari inter qualitates formales, cum tamen videantur respicere materiam ipsam; quare notate, ne decipiàmini, reuocantes in memoriam, quod illæ septem qualitates, durities scilicet, mollities, & huiusmodi dicuntur materiales, eo quod disponunt subiectum, aliz uero formam insequuntur, ideo formales dicuntur, cum quia circa figuram, conformationem partium, ac situm & huiusmodi alia insequuntur, & circa ipsa versantur illæ primæ, ideo dicuntur materiales, quamuis omnes ab eodem principio formali oriantur. Cum autem uoluerimus aperientibus uti, ac aperientia ipsa inuenire vel attrahentia, procul dubio insequentes rei naturam, calida & sicca inuenire debemus, quoniam calidi est attrahere, præsertim si cum caliditate ad sint partes tenues: quoniam quæ crassarum sunt partium, inertia sunt ac tarda ad motum: Quare si tenuitatem habent partium, quæ calida & sicca sunt, facillime attrahunt: Igitur si uolumus eligere ea, quæ moderate trahant, eligamus ea, quæ in secundo gradu calida & sicca sunt, cum tenuitate partium. Si uehementius attrahentia uolumus, accipiamus, quæ in tertio sunt gradu: Et si adhuc validius, quæ in quarto cum tenuitate partium.

*Attrahit
per quos
gradus caliditatis sunt.*

*Repercutio
à quibus
fiat.*

Repercutio uero fit à contrariis: quoniam radone frigidiatis adstringunt, ratione uero crassarum partium, quas obtinent, obstruunt, ut sunt cerussa, plumbum, plantago & huiusmodi. Si etiam acerba sint, validius hoc facient: nam succus iolani, quia frigidissimus est, ualde astringit: quæ uero intente non sunt frigida, non ita astringunt. Ctacus uero & spicanardi, quæ leui acerbitate prædita sunt, quia potius calida sunt, non possunt ita adstringere: nam potius vim corroborandi & confortandi, quàm repellendi ac constringendi habent. Atque ita in aliis progredi poterimus semper à natura rei exordientes.

Inuenientes ergo qualis sit ex natura rei gradus primus qualitatum primarum, eodem modo poterimus has secundas inuenire.

Ad inueniendas uero tertias & quartas, exempli gratia, si uelimus urinam prouocare, necessaria sunt medicamenta diuretica. Sed prius aduertendum est à nobis, quod cum renes aquositatem sanguinis trahant, quando egemus prouocatione urinae, necesse est suppressionem ab aliquo prouenire impedimento urinae. Hoc autem impedimentum urinae vel per se esse potest, ut si clausus sit meatus urinae per lapidem obstruentem propter crassos humores, vel propter carnis inerescentiam, & tunc statim ablato hoc impedimento effluet urina. Sed hoc non erit prouocare urinam, sed remouere lapidem, abstergere humores crassos, ac carnem incidere: quare per accidens hæc erit prouocatio.

Sed quando uolumus ut prouocetur urina, notandum est, quod renes facti sunt ob expurgationem aquositate sanguinis: Quare hoc prouenire potest propter defectum in ipsa aquositate, & tunc, vel quia pauca est, vel permixta est cum sanguine, vel cum humoribus crassis: Si pauca sit aquositas sanguinis, medicamenta humida eligere debemus, ac tenuium partium, ut est uinum album lymphatum, aqua pluuialis, succus melonum, &c. Si enim humida crassarum partium eligatis, crassities illa impedit deductionem: quare humida cum tenuitate partium eligenda sunt.

Quod si iste defectus urinae sit eo, quia permixta sit urina cum crassis humoribus; tunc calida eligere debemus, cum tenuitate partium, ut superent aquositatem illam à crassis humoribus, & tunc feniculo, apio, petroselino, ac aliis cum simplicibus, cum seminibus calidis utendum est. Si uero defectus sit ratione membri attrahentis vel generantis, hæc cura ad practicos pertinet excellentissimos. Si autem hi defectus fient ratione obstructionum, ut lapidis ac uiarum obstruentium, de his diximus, quod per accidens fit hæc prouocatio. In sequenti tractatu aggrediemur primum librum Dioscoridis.

GABRIELIS FALLOPPII MV- TINENSIS. MEDICI AC PHILOSO- PHI PRÆCLARISSIMI. DE MATERIA MEDI- cinali in lib. I. Dioscoridis. Tomi II. Tract. II.

De Prænotionibus circa Dioscoridem.

C. A. P. I.

DIOSCORIDIS de medicinali materia liber primus interpretandus siue
à nobis exponendus proponitur. At antequam ad prolegomena acce-
dam, vnum vobis attendendum est, quod his multa veritatur inter in-
terpretes voluminis istius, in cuius titulo legentes Dioscoridis Pedacii
liber, his inter eos versatur, dico, super vocem istam *Pedacii*, & pari-
ter in hac voce *Dioscoridis*. Sed quoniam lites eiusmodi ad prædagogos
potius pertinet, quàm ad scientificos, ideo explodendos esse iudico, af-
ferens nihil referte, quomodo cuique vocetur. Bene verum est, quod inter illa, quæ primo
solent explicari, est, ut sciamus, quis sit iste auctor, de quo certam notitiam habere non pos-
sumus propter obitum historicorum: auctor enim est antiquissimus, cuius nominis fuisse
plures. Reperitur enim ex historicis quidam Dioscorides Poeta, cuius epigrammata leguntur
in epigrammatibus græcis. Reperio alium Dioscoridem Philosophum Cyprii monoculū,
qui fuit Discipulus Nicæi. Tertio reperio apud Galenum in eo libro, in quo interpretatur
nomina Hippocratis occulta. Ibi enim nominat Dioscoridem quendam herophileum,
quoniam erat de secta Herophili, qui maximè fuit autoritatis inter antiquos, & instaura-
uit anacromen, cuius quidem autoritas apud me circa res anatomicas est Evangelium.
Nam quando Galenus confutat Herophilum, censeo ego ipsum confutare Evangelium
medicorum. Nam Herophilus apud antiquos fuit idem cum Vesalio apud modernos. Et
hic Dioscorides appellabatur lenticularus, quoniam lentes habebat in facie: Quamvis
apud Suidam habeamus, quod noster Dioscorides dictus fuerit lenticularus: sed falsum
est, nam Galenus ponit maximam differentiam inter hunc lenticularum, & nostrum Ana-
zarbæum: quoniam hic noster erat Empyricus, ille vero lenticularus erat rationalis & he-
rophileus, & sic erant omnes tenentes opinionem Suidæ. Quarto in loco habemus alium
Dioscoridem, qui fuit interpretes Hippocratis, quem accusat Gal, ubique: & reuera iste non
fuit noster Diosc. quæ & cuius opus præ manibus habemus. Facit mentionem Gal. in 5. de
compos. med. per gen. circa finem eiusdem Diosc. quem credo ego esse eundem cum no-
stro, qui à Galeno Tharsensis & Anazarbæus proponitur, & ab eo maxime laudatur. Scio
autem hunc fuisse ex Asia Cilicia, & ex ciuitate dicta Anazarba, quæ condita fuit ab Ana-
zarba. Hæc ciuitas dicta est postea Cæsarea Augusta secundum Plinium: quamvis dicat
Ptolemæus Cæsaream Augustam conditam esse prope Anazarbam. Sed quicquid sit, aut
quisquis fuit Dioscorides, dico hunc nostrum Dioscoridem libros suos donasse ac di-
casse Arrio aut Arceo Philosopho. Dictus autem est forte Tharsensis, quia in eo Gymna-
sio profecerat, quod distabat per sexaginta millaria. Medicus fuit nobilissimus ac magne
autoritatis, imo tantæ, ut Cleopatra Egypti Regina ipsum pro familiari, ac maximo Me-
dico acceperit. Fuit etiam miles; nam sic faciunt præclara ingenia. An vero maior fuerit
ac præstantior miles quam Medicus, nescio profecto discernere. Sed credo ipsum fuisse
in exercitiis, ac ipsos exequutus, ut varia loca videret, & esset etiam Medicus in exercitio,
& circa corpora seu exercitiis exercuerit, ut testatur Galenus ubique locorum, dicens,
Medicos secuisse cadauera barbarorum. Empyricus fuit Dioscorides, ut testatur omnes,
& ex historia eius patet, præterea ut ex 6. lib. conuincitur, ibi enim clare patet eum fuisse
Empyricum. Scripsit varios libros. Nam Suidas dicit ipsum Dioscoridem scripsisse libros
viginque quatuor de vtilibus medicamentis. Apud Galenum autem habemus, ipsum scrip-
sisse libros de subtilioribus medicamentis, & alios, quos desideramus, & habemus tantum
libros quinq; de medicamentis: Sextum vero de venis: qui libri tantæ sunt autoritatis
apud Gal. ut ipse præferat Dioscoridē omnibus aliis, qui de hoc scripserunt. Habuit noster
Dioscorides varios amicos, inter quos fuit Licinius Bassus, quē ipse nominat in proœmio.
Præterea habuit amicum Arreum illum Philosophū Asclepiadeum. Solet autem quæri,
an hic liber legitimus sit Dioscoridis: nam dico ego, hunc & alios legitimos fuisse ipsius li-
bros, probans ex Galeno & Orisasio, qui in 11. 12. & 13. lib. dum loquitur de simplicib. ex
Diosc. omnia proponit, & in omnibus consentit cum eodem verbo tenus.

De prænoti-
onibus circa
Dioscoridē.

Quis sit au-
thor.
Plures Dio-
scorides.

Herophili
autoritas
apud anti-
quos.
Herophili
præstantia
circa anato-
miam.

Dioscoridis
patria.

Dioscorides
fuit miles &
guerr.

Dioscoridis
libri.

Dioscoridis
amici.

Scopus libri.

Scopus Dioscoridis in his libris est facultas omnium medicamentorum simplicium, quæ faciunt ad ægitudines omnes corporis humani: nec turbet vos, quod ipse multa superflua & noxia proposuerit: nam hic scopus utilis & communis, non est relinquendus. Et cum Medicina tria habeat instrumenta, Dicetam scilicet, chirurgiam & pharmaciam, ideo ut Medicus hanc tertiam acquireret, & in ipsius manu vigeret, hos libros composuit.

Ordo librorum Dioscoridis.

Dioscorides autem quamvis Empyricus fuit, non tamen sine ordine scripsit: & cum in tota hac materia, pars illa nobilior esset, quæ continebat aromata, vnguentaq; peregrina ac rara, ideo ab aromaticis incipit Dioscorides tanquam à nobilioribus: nam in lib. 1. de his agit, & de lachrymis odoratis: sed quoniā hæc à plantis oriuntur, ideo statim explicat historiam plantarum. Tertio per consecutionem de omnibus aliis arboribus verba facit. Restabat adhuc magna moles animalium, plantarum atq; fossilium. Sed cum animalia nobilissima sint, ideo de ipsis animalibus statim assumptæ tractatione, maxime cum in his consistat alendi vis. Ideo in secundo libro de animalibus agit omnibus. Cum autem de animalibus tractauit, subiungit alimentum animalium, præcipueq; hominis: & ideo primo agit de lacteis, secundo de omnibus oleribus, quamvis ea non vt alimenta, sed vt medicamenta describat: postea aliam totam materiam medicinalem, quæ quoniam spectat ad plantas, & fossilia, primo de plantis agit, sed confuse ac miscellaneæ, secundo de ipsis fossilibus. Quo vero ad plantas, primo explicat plantas naturales, secundo ea, quæ ex plantis arte colliguntur, vt sunt vina, succi, aceta &c. quæ potius artificialia sunt, quàm naturalia: ultimo vero de materia metallica tractat, atq; inanimi, vt clauderet suos libros. Seruat autem Dioscorides

Methodus Dioscoridi circa capitula Medicamentorum.

hanc methodum, quod primo proponit vniuersumq; medicamenti varia nomina, si quæ sunt; quamvis multa spuria sint in principio capitulum Dioscoridis circa illa nomina, quod indicatur nobis à Galeno, Oribasio & Arabibus, quæ voces tamen neglectæ sunt ab istis. Postea proponit historiam, habitum materiamq; medicamenti, sed hoc tantum in ignotis, at in notissimis tacet. Quarto proponit electionem medicamenti, ac modum præparandi ipsum. Quinto loquitur de Sophisticis; nam etiam eo tempore multa fiebant sophistica, vt etiam temporibus nostris. Vltimo in loco proponit medicamentorum facultates, modumq; vsum & quantitatem ac locum, cui applicari debeant medicamenta ipsa. Talis est eius ordo. Nam non est mirandum, si Galenus tantum Dioscoridi attribuat. Liber autem hic inter medicos est ascribendus, & distinguendus in duas partes: nam tota illa pars, in qua continentur plantæ descriptio, natura, &c. est legenda post quinque libros Galeni de simp. & alia pars capituli, est ponenda post 11. Galeni librum de simp. med. & huius divisionis author est Oribasius, qui hunc eundem ordinem seruat. Sed quis dubitare posset, quod hic liber sit legendus cū libris Philosophicis. Dico ego, quod liber iste est legendus etiam à Philosopho: nam Philosopho naturali etiam inferuire potest, quo ad historiam: sed quoniam cum his historiis adiuncta est præparatio, facultas medicamenti, &c.: quæ ad Medicum spectat, ideo inter medicos libros reponendum esse censeo cum Oribasio. Stylus autem ipsius Dioscoridis fuit in hoc opere, vt sit nominum conrempor & brevis.

*An liber istius Dioscoridi inter medicos sit reponendus.**Dubitatio.*

Diuiditur autem hic liber in proœmium & narrationem siue tractatum. In proœmio tria potissimum facit, vt dicam in sequenti.

De expositione seu explicatione Proœmii libri I. Dioscoridis.

CAP II.

Vis fuerit Dioscorides, cuius sed & ex qua patria, quo ordine scripserit, & quod libros hos distinguit in proœmium & tractationem, diximus. Nunc quo ad proœmium, dico Dioscoridem in ipso tria agere: primum est, qua de causa hæc scripserit: secundum est dedicatio operis & ratio dedicationis: vltimum caput continet in se præcepta multa ad medicamenta spectantia.

Cur Dioscorides de materia scripserit.

Quod ex positionem primæ partis dico, quod in ea primo pertractabat, cur post omnes scriptores de hac materia scribendū suscepisset, & omnes scriptores distinguit in antiquiores, & eos, q; ferme suis temporibus viguere, & rationem refert sui tractatus dicens, hoc facere, quoniā nonnulli absolutū nihil ediderunt, quia non egerunt de omnibus simplicibus. Nam Crateuas de iis tantum egit plantis, quæ cum radice euelluntur. Alia ratio est, quæ cum hitractant de medicamentis, nō egerunt de omnibus medicamentis convenientibus. Andreas enim egit tantū de incantationibus, alii de præparatione tantū, alii de iis tantum, quæ percunctando audierunt, scripta tradiderunt. Desideratur ergo liber, qui hæc omnia contineat atq; ab solute.

Bithinus Iolas. Heraclides Tarentinus.

Probat postea quod dictum est exemplo multorum, nam de materia medic. scripsit Bithinus Iolas, & Heraclides Tarent. sed de metallicis ac de maiori plantarū copia nō egerit. Notan-

Notandum est autem, quod Dioscorides per illam vocem *omnes* illos duos tantum supra nominatos intelligit, & nō omnes, qui scripserunt: quia Crateuas librum scripsit de metallicis teste Galeno. Fecit autem mentionem Dioscorides de his scriptoribus, de quibus etiam Galenus & alii meminere. Galenus enim meminit Heraclidis in lib. 6. de simp. med. fac. quem etiam habuit in magno honore, qui tamen ex Diogene fuit Empyricus. *Andreas Medicus* Andreas autem Medicus à Galeno reprobatur eo, quod incantationes admiscuerit medicamentis & prætigiis. Nam omnes Graeci, excepto Galeno, hæc medicamenta admiscerunt, & Latini nostri etiam. Crateuas herbarius vixit temporibus Hippocratis, & apud ipsum fuit magna autoritatis, ut habemus in epistolis Hippocratis, cuius testimonio utitur Dioscorides, & eum laudat Gal. in lib. 2. de nat. hum. cum autē nihil de his scriptoribus aliud sit dicere, veniamus ad reliqua. Recentiores ergo plures commemorat Dioscorides, eosque damnat, quoniam de vulgaris tantum medicamentis egerunt, omittentes nonnulla peregrinaque. Inter hos autem ego probo interpretationem Ruellii circa Iulium Bassum, non autē circa Petronium & Nigrum, quoniam credo distincta hæc esse nomina, non autem vnū, ut aliqui crediderunt. Petronii autē meminit Gal. lib. 5. de comp. med. per genera c. 11. Nigritiam in 6. simp. & in lib. de antidotis. De Nicerato etiam habemus mentionē apud Gal. in lib. de comp. med. per loca, ubi dicitur ipsum esse Asclepiadeum. Accusat autē hos Dioscorides, quia quasi cursive de omnibus egerunt, & causas quidem omnium reddunt, sed vanas, ac omnia in acervum commiscerunt, imo vnū quodque eorū, quod tractabant, ad tumorū differentias retulerunt: nam ipsi erant dogmatici sub ipso Asclepiade, quia dicebat Aromos esse principia corporū, & volebat ista corpuscula habere infinitas facies, & non quadrare, nam omnium corporum differentia erat propter varias harū atomorum conditiones & humores, & meatus, ex quibus penderat apud eas omnis rerū differentia. Cum igitur isti ex hac secta fuerint, omnem causam in tumorem referebant, & sic festlegendum ex codice antiquissimo optimo. Quod autem hoc sit verum, legatis Gal. lib. 1. de simp. med. fac. cap. 1. qui etiam hanc refert opinionē, de qua loquitur etiam in 3. Epidem. com. text. 4. & lib. 1. de different. morb. cap. 3. & 4. Præterea confirmat, quod isti male scripserint, quia multa falsa dixerunt, quod indicare eos ex altiorum relatione scripsisse, nō autem oculata fide. Præterea eidem medicamento contrarias actiones attribuunt, ac contrafugunt secundum ordinem literarū aliorum. Nam notandum est, quod illi Dioscoridis libri, qui scripti sunt per ordinem literarum, non sunt legitimi Dioscoridis. Sed posset aliquis dicere, ob id Galenum etiam, Oribasium ac Paulum esse reprehendendos, quia secundum ordinem literarum de his egerunt. At ego dico, non esse reprehendendos, quoniam si respiciamus ad commodum & faciliorem fortasse intelligentiam legendum, optima est series, si scribamus per ordinem literarum: sed si materiam respiciamus ipsam, alio modo sunt ista scribenda, quia genera ipsarū plantarum sunt simul per genera, & non per litteras docenda; quare vterque optime facit, si cum diligentia scripsit.

Dedicat postea Dioscorides libros suos Arreo, & promittit se melius acturum de medicamentis, quam alii qui antea scripsere: quoniam ipse multa vidit, imo & plurima, quæ non fuerant aliis visa, laudans ipsum Arreum ab amicis, & diligentia, &c. Vnde & vos ab ipso Dioscoride addiscere poteritis mo dum laudandi eum, cui vestros dedicabitis libros.

Omne autem quod boni inueniemus in Dioscoride, ipsi ascribendum puto, quoniam totam materiam medicam ipse tradit, quamvis eam totam videre non potuerit, ut tamen eam totā traderet, coactus fuit, multa ex aliorū relatu docere, & hæc etiā est excusatio Aristotelis, dum & ipse errat multoties in tradenda Astrologia & anarom. quoniam cum nec ipse omnia videre propriis potuisset oculis, aliorum opinionē in plurimis refert, ut perfectam pro viribus traderet tractationem.

De necessitate cognitionis Medicamentorum.

CAP. III.

Dicebam in superiori cap. Dioscoridem tria facere in proemio, primo reddebat causam istius sui libri, secundo dedicabat illum librum: tertio præcepta quædam tradebat, & quod ratio, qua motus fuit ad scribendum, ea erat, quoniam totā tractationem nemo compleuit, & ideo plurimos damnauit hanc materiam tractantes: postea dicat Arreo amico librum, atque viro docto, quem laudat sine adulatione, commendatque suum librum à puritate & ordine, cum quia totam materiam medicalem contineret. Cum enim miles fuerit, multas regiones vidit, & lustrauit multa medicamenta. Circa autem medicamenta peregrina illud dixit, in quo multi consentiunt & fere omnes,

& statim laudat medicamenta ipsa simplicia, de quibus acturus est. Cognitio enim medicamentorum necessaria est, quoniam est vnum instrumentum artis, & cognitio ista adaugeret artem, & addit tres rationes, inquiring, quod per cognitionem medicamentorum primo cognoscimus modum præparandum simplicium, & hoc maxime necessarium est, & docet nos causas multarum rerum ac problematum naturalium. Tertio & ultimo cum medicamentorum cognitio haberi non possit, nisi aut histotia, aut arte, aut experientia, experientia tamen ipsis vnus homo non potest medicamentorum cognitionem habere: quoniam, dum Medicus experitur medicamenta, inuenit causam multorum affectuum & problematum. Metito igitur ista tractatio est magni facienda & capescenda ab omnibus Medicis, qui Medicinam perfecte adipisci cupiunt. His prædictis Dioscorides ad præcepta quædam deuenit circa collectionem, conseruationem ac præparationem horum medicamentorum. Primum autem circa collectionem cognoscendum est tempus collectionis. Secundo locus, in quo debent colligi. Tertio modus colligendi. Quarto modus conseruandi. Antiquius enim non erant Sepiasarii isti ita tardi, imperiti, ac patriales, sicuti sunt Sepiasarii temporum nostrorum, qui vt plurimum sunt crassi ingenii, & etiam ignorantes propriæ lingue, quod factum est cum maximo dedecore & artis etiam damno. Quare quamuis hæc præcepta videantur attinere potius ad pharmacopolas, ad, vetum tamen etiam Medicum attinent. Cognitio enim medicamentorum Medico maximum præbet ornatum & vsum.

*Præcepta
circa colligendum
simplicium.*

*Tempus colligendi
simplicia.*

Circa primum caput autem, quod est de tempore colligendi simplicia, notandum est, quod per tempus intelligere possumus vel tempus anni, vel diem, vel mensem. Nostri autem apothecarii non curant, vt plantæ vel sereno die colligantur, vel potius nubiloso, cum ramen maxime referat: neq; curant, an hoc vel illo mense colligantur: cum tamen potius sint hoc, quam illo mense colligenda. Per tempus autem anni intelligimus tempestatem anni, videlicet vel ver, vel autumnum, vel hyemem, vel æstatem, vt aliqui dixerunt atque scripserunt, inter quos aliqui proposuerunt quæcunq; medicamenta quolibet quoq; mense sint colligenda. Arnouldus de villa noua, & alii multi dixerunt, quod materia medicinalis colligenda sit, cum sol est in arietem, cancro, libra & capricorno, quia materia hæc tunc magis viget. Quando vero sol est in tauro, leone, scorpione & aquario, colligenda est materia frigida. Sole autem existente in virgine, sagittario, piscibus & geminis, colligenda est materia soluens. Sed ego nunquam negavi vires corporum superiorum in his inferioribus, huic tamen dogmati, vt verum fatear, nunquam credidi: Euenus enim eorum, quæ isti asserunt, inuenire nescio. Cum ergo materia viget, tunc colligatur, quodcumque tempus existat. Per tempus etiam possumus intelligere ætatem plantæ colligendæ: nam aliæ colligi debent dum pullulant, aliæ vero cum iam effluerunt.

Locus colligendi materiam medicamentum.

Secundum caput erat de loco colligendi materiam hanc. Nam distinguemus medicamenta in montana & campestria, sicca & humida. Et hæc sunt cognoscenda & consideranda à Medico, quia eadem medicamenta non in eodem loco sunt, & oriuntur, neq; in eadem perfectione. Nam in animo habeatis naturam locorum & regionum, & pro hoc legatis Theophrastum in lib. 9. c. 12. de hist. plant. à quo maxime laudatur Græcia, Ægyptus, &c. hæc enim loca multa & optima afferunt medicamenta.

Modus colligendi.

Succedit modus colligendæ huius materię, per modum autem duo intelligimus: aut scilicet communiter aut proprie. Communis modus est, vt pure, atq; munde ista materia colligatur, & hoc omnes sciunt, atq; fatentur. Modus autem proprius est, quia quandoq; colligimus quædam inuectis prius partibus nostris, quædam a uersa facie, quædam quandoq; recta facie, vitro scilicet aut vesica. Sed quoniam ista ad singularia pertinent, ideo à Dioscorico singularia medicamenta docentur. Vltimo in loco erat conseruatio, in qua maxima est adhibenda diligentia, & primo circa præparationem, ad quam pertinet exquisita purgatio medicamenti, & no rate, quod ego nunquam potui obtinere ab istis pharmacopolis, vt materiam illam, quæ dicitur cribellato & sordities, abicerent, vt faciant, vt semper seruarent medicamenta purgata, non autem in expurgata detinerent, vt faciunt. Et de exemplis. In Euphorbio, citra quod obseruatum est, quod in tota vita hominis non videntur duæ drachmæ optimi Euphorbii, quoniam statim cortumpitur propter sorditiem illam & lurti, cum tamen hoc possit fieri per cribrum vel ablutionem aut siccationem, quoniam ad ipsam conseruationem pertinet etiam exiccatio, quam diligenter facere oportet. Nam commune præceptum est, vt herbe siccentur in ymbra, aliqua sunt tamen siccanda in sole, aliter enim marcescunt, & hoc etiam fieri potest per coctionem: nam aliqua elixamus, alia assamus, & aliqua vrimus. Conseruantur itaque medicamenta aut primo per emundationem & expurgationem, secundo per exiccationem, tertio per coctionem: nam aliqua elixando conseruamus, aliqua

*Conseruatio
materie medicinalis.*

aliqua assando, & aliqua vrendo. Et ad hoc optime consequendum cognoscendæ sunt omnes species coctionis & rostitutionis. Et ob id Medico valde utilis est cognitio artis chymicæ, ut sciar olea destillare & aquas, ac etiam sublimare, non ut faciat aurum & argentum, vel aurum & argentum proiciat in his nugis & vanitatibus. Additur vltimo ipsa conditura: nam multa non possunt conservari cum propriis suis viribus, nisi condianrur, & ideo debent condiri. Fit autem talis conditura aut melle aut saccharo. Cassia autem illa tenera saccharo condita servat vires suas, & durat vsq; ad decem etiam annos. Condiuntur etiam medicamenta quandoq; sapa, quandoq; aceto, quandoq; sale.

Vltimo loco est caput illud, quod pertinet ad locum, in quo conservanda sit hæc materia medicinalis, & hoc respicit apothecam. Nam aliqua sunt nobilissima medicamenta, quæ merentur, ut Medici ipsa habeant apud seipso, ut solebant antiqui Medici: & in ior de nostris Medicis etiam dicitur, quod hæc non faciât & obseruent. Eligendus autem est locus siccissimus, non autem calidissimus, sed temperatus: nam corruptela prohibetur, ac evitari potest à medicamento per locum siccum. Sub capite loci continentur etiam vasa ipsa. Nati aliqua medicamenta non sunt in ipsa vasa reponenda: alia enim in faccis, alia in vitro, alia in lapide conservantur: imo non desunt etiam aurores, qui antidota in auro atq; argento conservanda esse dixerunt, atq; continenda in huiusmodi vasis affirmarunt. Sed nobis satis erit ea detinere in vase incorruptibili aliquo, ut ex ferto obducto stanno. Et hæc dicta sunt à Dioscoride in præfatio, circa quæ aliqua etiam dicenda sunt in sequenti capite.

De expositione literæ a Dioscoridis, ut & de præceptis circa collectionem plantarum, collectionis tempus & circa loca.

CAP. IV.

Præcepta à Diosc. posita circa medicinalem materiam in præcedente capite docuimus, restat ut verba Dioscoridis exponamus. Primo enim ipse reddit rationem, cur habenda sit cura, atq; ratio temporis, atq; ætatis plantarum, ne se colligamus medicamenta nimis vetera, neq; nimis nova. Primo autem circa tempus observandum est in collectione plantarum cælum serenum, quoniam multum differt collectio plantarum per imbres à collectione ipsarum per squalorem, circa quam vocem notandū est, quod vox illa *Squalor* plura significat apud Theophrast. lib. 9. c. 14. Nam per squalorem ipse aliquando intelligit lumen lucernarum: Secundo idem lib. 5. c. 9. 10. & 12. intelligit per squalorem siccitatem ac vetustatem plantarum. Tertiū vero habitum aeris siccum, ut asserit ipse lib. 5. c. 3. quod non est legendum, ut facit Ruellius, neq; addenda est vox illa *in festi*. Credo autē ego omnes plantas colligendas esse per squalorem videlicet per habitum aeris siccum, sed ante earum siccitatem ac vetustatem. Aliud subdit Diosc. præceptum circa loca: quoniam plantæ colligendæ sunt ex montibus altis, cum aqua aliqua, & platis vento, non autē in campetribus locis & infimis. Si quis autem dubitaret, quoniam plantæ montium duriores sunt, & non possunt ita confici à calore naturali ut campestris: vidit hoc Aristoteles 2. de plantis dicēs, quod plantæ montanæ duriores sunt vel robustiores ad medicinam, quā campestris, quæ molliores sunt pro cibis. Et quamvis illa materia montana durior sit, tamen concoquitur in medicamentis. Et Hipp. in Epistola ad Crateum docet talia præcepta multa, & præcipue dicit plantas esse colligendas ex montibus altis: quoniam plantæ illæ sunt viuaciores & robustiores propter tenuitatem aeris ac subtilitatem: nā optime alunt plantæ illæ. Subdit autem ibi Hipp. vnum difficile, quod se ex palustribus etiam colligit Crateus plantas aliquas, sed Diosc. intelligit semper de eadem plantæ specie: quæ enim colliguntur ex montosis locis & palustribus, præponenda sunt montium ac collium medicamenta palustribus medicamentis, quoniam vim robustiorem habent. De eis autem, quæ non nascuntur, nisi in paludibus, non intelligit Diosc. sed Hipp. voluit illa medicamenta ex palustribus esse colligenda, quæ in montibus non oriuntur, vel his vitur ac contemperanda medicamentum montana. Nostrī autem seplasiarī, hortulani & Medici videntur probare ea medicamenta, quæ orta sunt in loco respiciente meridie, Theophr. 5. de hist. plant. loco citato. Plin. & Diosc. etiam volunt materiam medicinalem esse colligendam ex facie aquilonati. Credo ego nostros errare, & vsum ac assumptum id esse ab illis, qui de rusticis egerunt, dum de fructibus agunt. Nam fructus illi maturantur cito & optime, qui expositi sunt ad meridem, quoniam à sole illustrantur ac concoquantur celeriter. Sed nos non loquimur de fructibus, sed de alia materia tota medica, de qua dico, quod eligenda est materia existens in loco perfuso à vento frigido & boreali, & causa est, quoniam omnia præco-

At chymicæ hæc res cognoscenda.

Conditura medicamentorum per quæ fiat, dicitur, in quo medicamenta conservari debent.

Observanda circa siccitatem plantarum.

Optimis præceptis.

Præceptum circa loca.

Plantæ montana qualis sint comparsa campetribus.

An plantæ spectantes ad meridiem sint alius meliores.

cia non sunt bona. Plantæ ergo ad meridiem respicientes optimos fructus ac celeres faciunt, non tamen multam materiam generant pro medicamentis, eamque male concoctam & debilem. Contra vero plantæ aquilonarës robustiores sunt & densiores.

De astate plantarum & earum commutatione, ut & de plantis odoratis.

CAP. V.

Ita plantarum cognoscenda.

Communitas esse per triennium plantarum.

Contradictio.

Solatio Marcelli.

Solutio propria.

Nulla medicamentum excepto Elleboro post triennium durat.

Plantæ odorata quædo sint colligenda.

Flores colligendi.

Frustrum Seminum.

Succorum.

Succus duplex.

Cognoscendum est etiam tempus vigoris vniuscuiusque plantæ, ut omnes plantas in suo vigore seu tempore & ætate, quæ magis vigent, colligere possitis. Nam monet Dioscorid. cognoscendas esse ætates plantarum, ut earum vigor haberi atque cognosci possit, & eo tempore, quo magis vigorosæ sunt, colligantur. Sed quoniâ multæ ex plantis seruantur ad vsum, & siccantur, ideo transit Dioscorides ad ætatem plantarum mortuarum, præceptum ponens, quamdiu durent plantæ illæ, & inquit, quod semper post triennium omnia sunt commutanda, quoniâ omnia dissoluuntur ac corrumpuntur præter Elleborum. Nostri autem seplasiarii solent quorannis commutare materiâ communem: at si nos non poterimus quorannis commutare plantas, cum multæ ipsarum sint peregrinæ, & delatæ à longinquis admodum regionibus, propterea saltem per triennium commutare debetis. Attamen nostri pharmacopolæ, ut in pluribus hoc non agunt, sed inueterata seruant multa vltra triennium, quæ cum exoleta sint atque resoluta, non est mirandum, si medicamenta non agunt: ingredientia enim sunt vigore proprio destituta. Plinius autem lib. 17. c. vlt. dum loquitur de duratione plantarum, meminit de pluribus aliis præter Elleborum dictum à Dioscorid. quæ etiâ vltra triennium durant illæ. & Theophr. dicit, quod Aristolochiæ radix durat ad quinque annos, & alias plures plantas nominans affirmat ipsas esse maxime durantes. Videntes autem aliqui hanc contradictionem, ut Vergilius Marcellus putauit Dioscorides eodem esse deprauatum, hac ratione ductus, quod Dioscorides legit Theophrastum. Ego autem dico Dioscoridæ à Theophrasto dissentire, aliter totus Dioscorid. esset corruptus. Nam Dioscorides dicit, elaterium durare ad 10. annos, Theophr. vero ad centum annos: sed mens Dioscorid. hæc est, quam dixi, & non dubito ego, quod si vsum consulemus, reperiuntur aliquæ amaræ, quæ diutius durant, & cum hæ plantæ sint, non debet hoc præceptum commune immutari: & ideo duratio plantarum alio modo cognoscenda est à Medicis, quam à seplasiariis & aliis, ac diligentius inuestigari talis duratio, quoniam de dosibus loquuntur, atque de viribus ipsarum, quæ ad tempus variant, cum medicamenta tamen debeant esse eandem virum, ne fiat error. Et idem Dioscorides ad hoc respiciens dicit, plantas omnes post triennium debilitari, quod maxime locum habet in medicamentis purgantibus. Habemus enim certam normam horum medicamentorum, ut exempli gratia, Rhabarbari, quod si exoletum sit, non erit eadem dosis exhibenda, ac si esset virens ac proprio præditi vigore, ideo maior est dosis danda, aliter nil faciet: quare sciatis, quod nullum medicamentum est excepto Elleboro, quod post triennium seruet vigorem suum. Philosophi autem alio modo obseruant durationem plantarum, quarum seruant colorem, odorem & gustum, ramen eas vetustas dicunt, quæ omnino corruptæ sunt, omnesque vites amiserunt, & omnia simul accidentia. Addit Dioscorid. præceptum de collectione plantarum, & inquit, plantas odoratas colligendas esse cum semine, quia tum odoratæ sunt, & quoniâ in omni materia odorata ea perfectior est, quæ magis odorata existit, cum planta odorata non habet proprii odorem, dicimus eam esse corruptam. Odoratiore autem sunt plantæ, cum semina perfecerunt, quoniam humiditas extrinseca nunc est exiccata, atque à materia elaborata, exemplo vobis sit opiatum basilicum dictum.

Flores autem colligendi sunt antequam decidant, quia si expectemus quousque per se decidant, aut erunt sicci aut corrupti: non cadunt enim, nisi deficiente materia, aut ratione frigoris & nebularum. Fructus vero colligendi sunt, quando maturi sunt. Semina autem cum sunt siccata, quamuis nostri seplasiarii colligant ea antequam siccantur, & postea ipsa siccant, sed amittunt vires, ideo non est expectanda extrema exiccatio, quoniâ cadunt & corrumpuntur, & sic eorum usus vanus est. Succus autem & foliorum & plantarum colligendus est, cum planta est magis turgida, & maxime cum germinant ipsi cauliculi teneri. Per succum autem intelligit duplicem succum, alter enim succus est, quando contundimus herbam, & torculari exprimimus; alter vero, quando confusa affundimus liquorem, & exprimimus. Lac autem & lachryma à diuersis fiunt plantis, & est substantia vniuersa, qua turget tota planta, sicut homo sanguine. Et iste succus tum extrahendus est, quando planta est in suo vigore, quia erit magis coctus atque à natura elaboratus. Exempli gratia, si uti velitis lacte fici, etiam hyeme & vere habebitis lac, ac in consistentia plantæ, lac erit melius, & magis concoctum. Cum autem fructus maturescunt, colli-

colligendum est lac, quoniam tunc planta erit in suo vigore. Idem dico de lacte tithymali, quod extrahit (spinas infixas corpori, non recurritis autem ad teneras plantas, sed ad adultas. Idem dico de opio quod fit ex lachryma papaueris. Addit Dioscorides, quod si velimus radices colligere, hoc est agendum, cum ipsę plenę sunt succo, ac quādo cadunt folia, quoniam tunc rota vis concentratur: Quare incipiēte autumno ante pluuias colligendę sunt radices, ac vbi humido excrementitio sunt repletę.

Pręparationem postea docet autor noster Dioscor. dicens, quod plantę siccantur, abluantur & reponantur in loco conuenienti, & conseruationem docet, ad quam attinet locus, tempus & mixtio. Notandum est autem, quod materia odorata diligentius est seruanda, quia euaporat; nam nostri seplasiarii suspendunt eas in apotheca, sed spatio tantum duorum mensium corruptę sunt. Vnum dico ego, quod seruandę sunt in lignis tileis, quoniam talia ligna non augentur nec minuūtur, vt faciunt ligna abietina, quę ratione humiditatis augentur. Laudandi autem sunt, qui sacculos coriaceos conficiunt pro conseruatione huius materię. Addit postea sermonem de vasis, in quibus seruantur medicamenta, eaque optima eligit pro varietate medicamentorum. Sed nos habemus vitrum & vitreata vasa, quę optima sunt pro litorum conseruatione. Sequitur modo singulariũ tractatio,

*De preparati-
one.
De conser-
uatione.*

De iride & quo ad nomen & de eiusdem viribus ac proprietatibus. CAP. VI.

De iride primum tractat Dioscorides inter aromata, quia reuera aroma est, vt patet de eius natura & scriptorum autoritate. Nam in aromate est odor suauis, caliditas insignis, siccitas & tenuitas partium, & semper seruat suum odorem & substantiam, quomodo cumq; paretur ac misceatur, & talis est aromatis natura. Cum autem iris radix talis sit, merito ergo inter aromata connumeratur. Habemus etiam Galenum lib. 7. meth. med. cap. 4. connumerantem hanc radicem in aromatib. & Theophrastus idem testatur: imo dicit hanc solam aromaticam radicem nasci in Europa lib. 4. de histor. plant. cap. 3. Quam autem ratione primo egerit Dioscorides de iride, hoc fit pluribus de causis, quarum prima est, quia domestica est; secunda quoniam signata est hęc planta nomine nobilissimo iroidis: tertia quia radix hęc fuit maximę autoritatis apud antiquos ex Plinio lib. 20. cap. 7. qui dicit, quod habebatur pro sacra planta & maxima mysteria cōtinere credebatur, merito ergo ab hac incepit Dioscorides. In hac autem tractando primo nominis rationem reddit, secundo plantam describit, tertio colligendi ac conseruandi eam modum docet, quarto eligit inter omnes irides meliorem, quoniam vires exponit.

*Aromatum
natura.*

*Conserua-
tio iris inter
aromata.*

Ad primam partem ergo accedens Dioscorides reddit causam nominis, & dicit iridem esse dictam à similitudine arcus cęlestis: hęc autem similitudo potest esse & ratione caloris & figurarum. Flores autem vtręq; similitudinē iridem exprimunt nam figura conuexa est, & variis adfunt colores, vt in arcu cęlesti. Debetis autem scire, quod iris apud Plinium lib. 37. ca. 9. significat lapidem illum, qui dicitur crystallus, qui sexangula constat superficie, & est radix crystalli: sed de hoc non loquitur hic Dioscorides. Secundo iris apud Scholastem Nicandrum significat medicamentum venenosum. Tertio apud Hermolaum Barbarum erat medicamentum confectum ex croco, myrrha & alumine, & dicebatur iris ab antiquis, neq; de hoc loquitur Dioscorides, sed loquitur de planta sic dicta à similitudine arcus cęlestis. Hęc autē plāta à seplasiariis dicitur iroides vel iroides nomine corrupto atq; inflexo, vulgo autem dicitur giglio azurro, quia refert cęruleum colorem, & dicitur etiā giglio celeste à colore: vltimo dicitur hyacintho ab istis herbariis. Auicenna vero hunc vocat aierfalib. 2. tract. cap. 357. Serapio autem cap. 189. vocat asmeli. In codicibus vero Dioscoridis reperietis varia nomina, quę vana sunt & ideo à Ruellio & aliis omissa.

*Iridentia-
tur iroides.*

*Varia signi-
ficationes
iridis.*

Post nomen tractationem explicat Dioscorides plantam ipsam dicens, quod folia gladioli habet, sed maiora, longiora atq; crassiora: nam gladioli folia habet producta ac tenuia ad similitudinem gladii, sed gladioli folia sunt strictiora foliis iridis & nervos manifestos inintersecantes folia habet, iris autem ignotos. Sed capiamus similitudinem Theophrasti à foliis arundinis, quę omnibus nota sunt. Profert primo caulem cubitalem, vt dicit Plinius, & raro excedit ex lib. 21. cap. 7. Caulis autem est virens crassitudinis vnius digiti & similis cauli asphodeli, vt testatur Theophr. lib. 7. de histor. plantar. cap. 12. Flores æqualibus spatii distant, & curui sunt campi, & pediculi habent inortum, & flores varii quacumq; varietate sicut arcus cęlestis: nam in compositione, figura & coloribus varietatem habet; in compositione quidem, nam folia floris quędam pingua sunt, quędam louia & tenuia, alięq; crassa, aureęq; coloris. Fuere aliqui credentes, quod Dioscorides de

*Planta iri-
dis descri-
bitur.*

Error Marcelli in Monardo reser-
uatur.
De colorib.
floris iridis.

Radix de-
scriptio.

Iridis radix
quanto ve-
tustior, tan-
to odorata-
rior.

Iridis colle-
ctio & con-
servatio.

Electio.

Iridis plu-
res speciei.

Discordia
inter Mat-
theolum &
Amarum
Lugit.

Qua iris fit
in usu.

Iridis matu-
ra & virtus.

coloribus quibusdam fictis loqueretur, ex varia mutatione solis: sed horum ratio impro-
batur, & opinio hæc fuit potissimum Marcelli improbata à Monardo lib. 8. epistol. 1.
Alii vero dixerunt hanc varietatem esse in tota specie, quoniam in specie iridis varii sunt
colores florum, sed hæc opinio est falsa, quoniam hac ratione etiam viola purpurea esset ap-
pellanda iris. Sed Aristoteles in lib. de coloribus cap. 29. loquens de variis coloribus variis
stentibus in eodem folio ponit & enumerat iridem, quæ habet in eodem folio floris variis
colores, & inquit hanc varietatem fieri ratione varæ concoctionis: nam in variis partibus
floris variis modo fit concoctio, & ideo varii resultant colores, & hoc apparet etiam in co-
loribus pennarum avium. Subdit postea Dioscorides descriptionem radiceis, quæ est ma-
gni momenti, & dicit radices genicularas esse, id est, inæquales ac veluti copulatas nodis, &
quoniam inter articulos connuuntur getu, hac ratione nostri herbarii nomē genicu-
li assumpserunt plantis attribuentes. Subdit esse odoratas, quia in te non decipiāmini, quo-
niam dicens, quod sint odoratæ, intelligendus est de radicibus siccis, cuius testis est Theo-
phrastus lib. 6. cap. 17. & 2. d. dum dicit quod radix iridis siccata sit viridis, & ratio est, quo-
niam in radice viriditas est multa substantia cruda: & quoniam omne odoratum habet
partes tenues & calidas optime coctas, atque adeo coctas, vt perveniant ad concoctio-
nem spirituum. Per odoratas autem plantas intelligimus habentes bonum odorem, & hoc
patet, quod scilicet tanta requiritur concoctio, quoniam fit voluptas in odoratis ipsis, quod
fit ratione similitudinis. Si ergo siccetur radix iridis, est odorata, quoniam resolvuntur par-
tes illæ aquæ ac crudæ: nam hæc radix quanto vetustior est, tanto magis odorata existit.
Huius oppositum autem videtur in aliis odoratis, quoniam in iis odores ex vetustate cor-
rumpuntur.

Docet postea Dioscorides modum colligendi hanc radicem & siccandi in umbra &
conseruandi, quoniam hæc facile corrumpitur, imo Plinius dicit iridem etiam viam facie
le carie infici ac corrumpi, quod signum est malæ humiditatis, quare ea acquirit malum
odorem, vult Dioscorides, vt filo ipsam traiciamus & suspendamus in umbra, & ita siccetur
radices, postea reconduntur: non enim vult, vt recondamus in filo, sed modo illo re-
condamus, vt conveniat aromatibus. Notandum est autem, quod vbi legimus *subruffo co-
lore & gustu amaro*, mihi placet, vt legatur, *gustu ferido*, quoniam amara est deterior. Et hoc
etiam notandum caput, quod continet iridis electionem: nam iris fertur ex Illyria & Ma-
cedonia: illyrica autem iris præstantissima erat, secundò in loco autem macedonica, quæ
erat amara. Aduertendum est tamen, quod Plinius lib. 2. cap. 2. meminit radicis illyri-
cæ & libycæ atq; aphricæ, quæ mala erat, & reprobatur à Galeno lib. 8. de antidotis, san-
tum enim hæc cedit illyricæ, quantum cadauer corpori viuo: macedonicæ autem memi-
nit Galen. lib. 2. de compos. medic. per gen. cap. 1. quæ deterior est etiam ex Plinio illyri-
cæ, & hæc duplex erat, altera raphanitis dicta, quoniam erat similis raphano, & erat peior
inter illyricas: altera dicebatur risothomas, & erat melior. Hic autem notat discordiam
inter Amatum Lusitanum & doctissimum Matthiolum; scio enim, quod lib. eodem, cap.
22. dicit raphanitidem esse peiorem alia, vbi vel littera est corrigenda, vt Amarus inquit, ne-
que hoc nouum est, quoniam scabrosissimus est Plinius in loquendo. Nicander autem
facit mentionem duorum fluminum in Illyria, à quibus asportantur radices multæ iridis,
& à Galen. habemus calcidicā & astragalicam Troglotidem, cuius meminit Apthricanus
in libro de agricultura: & habemus etiam ex Plinio iridem Phricam. Habemus autem nos
nostram iridem italicam, quæ optima est, & easdem vires habet, quas habebat illyrica. Iri-
dem autem satis bonam habemus ex agro Veronensi & ex Hetruria: sed si haberemus il-
lyricam illam scilicet quæ ex Illyria delata esset, procul dubio optatam haberemus. Habemus
etiam nos iridem syluestrem, cuius meminit Galenus in lib. 10. de compos. med. per loc.
vbi de nephriticis Aesclepiadis agit. Domestica autem est in usu. Sylvestris etiam alia oritur
in collibus, & est tenuior domestica, & non ita odorata. Secundo habemus aliam, quam
vocamus iridem illyricam, quæ colitur in hortis, & habet florem odoratissimum, & quæ
dicitur sylvestris, quoniam non seruatur ad usum Medicinæ, licet in hortis colatur, quoniam
etiam illam, qua vimur, non colimus, quoniam illa nihil culturæ desiderat auctore Theo-
phrasto. Dicit præterea Dioscorides loquens de hac iride, quod in veritate teredine
corrumpitur, nihilominus seruanda est, quamuis vetustissima existat, quoniam quanto ve-
tustior est, tanto etiam præstantior ac odoratior, quoniam humidæ partes corrumpuntur.

Vltimo agit de viribus radicum iridis dicens, quod habeat vim calefaciēdi, & exio-
candi ac incendi. Auicennas autem dicit calidam esse & siccam in tertio gradu non ta-
men intenso. Licet Serapio dicat esse calidam & siccam in secundo ordine, cui ego non
adhæreo, sed potius Auicennæ & Mesuæ idem dicentibus. Descendit autem Dioscorides
ad vi-

ad vires iridis particulares à tota substantia, inter quas est purgare bilem & crassam pituitâ, addatis etiam pituitam tenuem & aquam, nam nostri Medici dant huius radices iridis vsque ad drachmas tres cum syrupo rosato solutino ad educendam aquam: Ego autem vsus sum succo radices huius in hydropse: sed quoniam facit tormina, licet corrigi possit cû puluere thuris & mastiche, non transiui pondus drachmarum duarum admixto melle vel saccharo: sed medicamentum hoc viribus fugio propter tormina ista. Sed dicit quis, ergo male Dioscorides inquit, quod torminibus medeatur: at ego respondeo, quod ibi loquatur de radicibus siccis, ego autem loquor de succo radices virentis, in qua est multa humiditas cruda. Nam non est mirum, si facit tormina, vel dicamus, quod si adsint tormina ex materia biliosa aut pituitosa in intestinis, euacuat causam illam, & medetur sic torminibus.

Subdit autor noster, quod medeatur etiam profluuium seminis, pro quo aduertendum est, quod non intelligit illud profluuium, quod solent pati iuuenes propter nimium coitum, quoniam tunc nocet: sed intelligo de gonorrhœa illa, quæ fit propter laxitatem vasorum, & de illa gonorrhœa seu profluuium, in quo homines vix tacta muliere emittunt semen, involuntarie scilicet. & de hac gonorrhœa credo etiam Dioscoridem intelligere, quam etiam sunt infiniti patientes. Addo experientiam, quoniam ego hoc pluries vsus sum cum saccharo rosato in his casibus, per dies quadraginta maximo cû successu hoc modo: R. radices huius iridis: puluerisatæ ʒj. sacchari rosati ʒj. s. & quotidie hora matutina exhibeo huius mixturæ cochlear vnum. Eodem modo curo etiam gonorrhœam propter laxitatem meatuum.

Monet præterea Dioscorides, quod radices prosint tumoribus, & reuera domini in strumis puerorum nullum maius reperi remedium, sed hoc modo elixo radices virides, & cû melle facio emplastrum, addo tum puluerem iridis & thuris, & repleo vlcus, & deinde superpono emplastrum hoc: & hinc fit, quod in ceratis illis reperitur iris, quoniam emollit. Addit Dioscorides, quod ossa carne cooperiatur, & ideo in pulueribus illis recipiatur, qui capitales vocantur. Vltima facultas est deterforia: nam miro quidem modo valet ad maculas à sole prouenientes, pro quibus potissimum habemus remedium pastillum quendam Francisci Frisimelicæ confectum ex farina fabarum, cicerum & iride & amygdalis amaris faciendo ex his trociscos, qui postea dissoluti lixiuio maculas tangendo sanant optime.

Particular
res virenti
du à tota
substantia.

Dubium an
vires tormi
nibus me
deatur.

De Acoro. CAP. VII.

Sequitur cap. de acoro: quoniam similis est iridi. Sed notandum vnū est, quod acorum teste Plinio lib. 25. cap. 13. significat quandoque radicem musci, quæ planta est spinosa. De hoc autem non loquitur Dioscorides, sed de illo, quod habet folia iridis, angustiora tamen. Sciatis autem quod vocatur acorum, quoniam pupillæ medetur: nam Galen. lib. 6. de simpl. med. fac. dicit, quod sicut asplenium cetrach dicitur à splene, ita acorum à pupilla vocatur, latini vocant plantam hanc veneream, Galli vero piper apum, vt dicit Apuleius, & dicitur condimentum apum, quoniam si in earū alueis ponatur, nunquam fugiunt. Folia habet planta hæc iridis, tamen angustiora, radices habet albas nec dissimiles ab iride secundum figuram scilicet. & colorem, tertio in geniculis, quarto, quia radices iridis sicut altera superficie deiectæ manent, ita & acori radices. Plinius autem lib. 25. cap. 13. dicit radices acoti esse nigras: nam credo locum esse deprauatum, quoniam nemo alius de radice hac nigra mentionem fecit, imo in eodem loco dicit radices cretici acori esse candidiores quam pontici, quare supponit vtriusque radices esse candidas. Addit Dioscorides radices acori esse gustu acres, odore autem non ingratas, addit Galenus amarorem, Hermolaus vero non creditit Apuleium errasse dicentem hanc plantam raram esse, & reuera non reperitur vera, nisi in Ponto & Creta. Dat postea Dioscorides eius dotes & electionem, dicens, quod habemus tria genera acori. Primum est ex Colchide, secundum ex Galatia, tertium ex Creta, horum autem primum melius est. Habemus nos in officinis medicamentum, quod dicitur diacorum, pro quo consueuendo antiquiores nostri capiebant plantam illam dictam acorum in palustribus natum, & quidam voluere hanc esse verum acorum, sed errât, quoniam planta hæc communissima est, & radices habet rubras, non aeres, neque amaras. Alii volunt esse gladioli speciem, quibus ego non consentio, quoniam folia acori non sunt neruosa vt gladioli, nec radices similes habet, neque flores, neque est species cyperti: nam ego potius dicerem esse xiridem aquaticam, vel sub nulla specie horum reponi debere censeo, & ratio me mouens est, quoniam radix ista habet vim extrahendi specula in fixa, sicut facit radix xiridis. Alii voluere acorum esse maiorem galangam officinarum. Nam habemus duas galangas: nam Leoniceus, Brassauolus, Fuchsius & Cornarius dixerunt galangam istam officinarum esse radicem acori: sed errant, nam color rubescit.

Acoti nomi
na & signi
ficata.

Causa nomi
nis.

Planta de
scripta.

Plinii re
atur deprau
atur.

Acori gene
ra.

Acori pa
lustrum
est verum
acori Dio
scorides.

Acori radi
ces sunt ex
trahendi
specula.

radici inest vtrique, secundo vtraque galanga ex calidis regionibus prouenit, acorum vero à frigidis. Præterea non est amara galanga, vt dixit Galenus de acoro. Præterea galanga habet geniculos, sed tota operata manet sub terra. Et hoc dico, quia radices habet capillares circumpositorum radici crassæ, ac vndequeque circumdantes ipsam: in iris radice in vna tantum parte sunt radiculæ illæ. Possem & alia dicere, sed nos remitto ad Matthioli commentaria. Alii autem credidere calanum aromaticum esse verum acorum; sed ego semper in hoc Monardo cōsensui, & tota schola Medicorum hoc accepit, circa quod rationes multe ab ipso & à Matthiolo traditæ fuere. Et ad hoc primum me mouet regio, quoniam ex Lithuania, Polonia, Colchidæq; affertur calanum aromaticum hic, & ego audiui quod etiam in Creta reperiatur hæc radix, cum tamen calamus aromaticus ibi non inueniatur, quare multum non laboro in hoc.

Radix autem hæc vim habet calefacientem, & hoc notauit circa hanc radicem, quod mulum facit ad lorium & menstrua. Nam sciendum est, quod ego hoc vtor cum succo botraginato ad vrinam ciendam, & maximum apud me est remedium; coquo autem radicem in vino tenui, & huius vsus ad quatuor cithos exhibeo, & ipso quidem infinitos loci suppresseione laborantes sanitati restitui. Et hæc de acoro dicta sufficiant.

De Meo vel Meu. C A P. VII.

Equiri dicebamus superius, quod atoma esset odoratum, & haberet etiam vim viuificam, qua reciperetur ista antidota, ac roboraret viscera. Cum ergo Meu & radix eius sitalis, merito inter aromata ponitur; non tamen est planta nimis peregrina, incipit enim Dioscorides à domesticis. In hoc autem capita tria facit Dioscorides: primum plantam describit, deinde loca proponit, vbi nascatur hæc planta; tertio vires eius exponit. Meu vocant latini plantam hanc. Et Meum ex Plinio lib. 10. cap. 23. Serapio autem cap. 182. vocat Mui quasi Meu, sed rationem certam nominis non habemus. Athamaneum autem dicitur, quoniam illud est preciosissimum, & sic vocatur duplei de causa auctore Plinio, aut scilicet, quod ab Athamane rege inuenta sit planta ista, vt Eupatorium atq; Lyfimachia à Lyfimacho & Eupatore regibus nomen sumpsere; neq; legimus alium Athamanem fuisse, quam filium Aeoli regem Thessaliæ, qui phrenitis laborans filium persequeretur, & fortasse ex continuo plantę huius vsu rex iste in furorem incidit, & sic nomē plantę huius indidit. Altera occasio huius nominis est, quod sic dicatur à regione Athamane, in qua oritur Meu copiosum. De hac autem regione mentionem non habemus apud Geographos: reperio autem tantum populos Athamanos dictos, quos Stephanus reponit in Illyria aut Thessalia; Plinius vero ponit in Aetolia, quamuis Strabo dicat, hos esse inter gentē Epitoticam, quæ alias venit ex Aetolia, nam venio in hanc sententiam, quod ab istis populis nomen acceperit hæc planta, qui conipes sunt Macedoniz: nam planta hæc oritur in Macedonia & Hispania, quare aroma hoc est domesticum ortum in Europa. Vox autem Hispaniz non est in omnibus eodictis grecis, & forte adiecta est, nam nullus auctor eius meminit. Nullam autem præsto ego fidem Amato Lusitano in hoc: nam mutauit ipse nomen & sententiam, nam inconstans est; quare non audeo vocem hanc Dioscoridis proferre. Contenti ergo erimus, quod oriatur in Macedonia. Plinius tamen negat plantam hanc oriri in Italia; quamuis alii herbarii dicant, quod reperiatur. Alias vendebatur radix vna pro Meu, quæ erat adulterina, & in montibus reperita est radix vna, satis Meu respondens, sed est daucus primus Dioscoridis. Reuerendi fratres, qui in Mesiensi commentaria scribere copinati sunt imperatoriam ex montibus Apuliz esse, & Medicis etiam hoc recepere. Et si hoc verum est, non solum oritur Meu in Macedonia, sed etiam in centro Italiæ.

Describit Dioscorides plantam hanc, dicens quod habet folia & caulem similia anetho: sed noranda est varietas, quia Marcellus legit aniso, non autem anetho, nam dicit, aniso loco anethi ex autoritate Plinii, qui dicit Meu habere folia similia aniso non anetho. Verum ego cum eo non consentio, & credo mendosum esse nomen eius & Plinii: quia omnes alii codices dicunt anetho. Oribasius & Arabes omnes mentionem faciunt de anetho; non de aniso, quare integra maneat hæc lectio. Meu habet caulem crassiore, & surgit ad maximam altitudinem, & altitudo indicat necessario maiorem crassitiem. Descripsit postea Dioscorides radicem, & nihil meminit de flore & semine, sed omnes qui videre plantam hanc, dicunt eam habere umbellam foeniculo similem, floribus candidis scatentem, & cum semine petroselinii. Radices autem sparsæ sunt, & plures in rectum & obliquum tendentes, & Plinius addit, quod in profundum descendit, & imperatoria apula habet radices longissimas, tamen satis crassiusculas. Radices autem Meu reuies intelliguntur, si referantur ad duas

ad duas prius describas. Oloratæ sunt radices, sed graul odore calefaciunt linguā; per calefactionem autem intelligimus quemcumque feruorem: calorem. n. quemlibet excitant, & quandoque etiā cient saluam. Hæc igitur sunt notæ radicis meæ. De colore autē nihil dicit, sed Plinius dicit esse nigras. Succedunt ipsæ facultates, quibus medetur renum affectibus, totumq. & thoraci prodest atq. mensuris. Gal. inquit, quod Meū sit calidū in tertio gradu & siccū in secundo. omnia autē talia habent vim validā calefaciendi. Serapio autē dicit esse calidum in secundo gradu, sed vos ipsum corrigatis. Dioscorides autem monet: quod si bibantur radices in quāritate nimia, excitant capitis dolorē; & ratio est, quia si sint in vetriculo cruditates, ex meū ascendunt vapores, qui excitāt dolorem capitis, sed facient hoc etiam omnia medicamenta calida sumpta repleto ventriculo. Et hæc sententia vera est in omnibus odoratis & calidis, & credo quod Dioscorides doctus ab experientia hoc obseruauit, quoniam radix meū præter modum halituosum, & habet grauissimum acremq. odorem, & abundat humiditate plurima quæ diu durat. Notandum est autē, quod ex notis propositis ex Plinio & Dioscoride vnam habeo, quæ impedit, ne dicam, imperatoriam illam esse meū: nam radices meū sunt plures ex Dioscoride ac sparsæ, sed omnia ad sunt alia dicta ab ipso Dioscoride. Adest alia difficultas ex Plinio de folio anethi & anisi. Sed locus Plinii iudicio quidem meo mendosus est, quare restat vnica difficultas, quæ aliis doctissimis non obstat. Ego itaque cum istis monachis, Matthiolo & aliis dicam esse meū Dioscoridis, vel si vos vti vti volueritis, poteritis hac radice vti imperatoris apulæ, vt faciunt omnes nostri Medici, quam ego ob id vobis ostendam.

De Cypero CAP. VIII.

DE Cypro vertit Ruellius noster, sed inscribendum est de cypero: Sio enim semper latini vocauerunt, & Apuleius cap. 12. tractat de hoc, & Dioscorides ipse tanquam de aromate. Theophrastus autem lib. 9. cap. 7. enumerat cyperum inter aromata atque odorata medicamenta. Quatuor facit Dioscorides in hoc capite: primo nomina tradit, secundo plantæ descriptionem, tertio electionem, quarto vires, simulq. descriptionem cuiusdam similis ipsi cypero.

Plurima sunt verba in textu Dioscoridis lecta, in quibus nomina cyperi explicantur, & in quibus describitur planta, quæ tamen desiderantur & desunt in textu Oribasii. Nam cum omnes textus græci & Arabes hæc verba habeant, ideo crediderim ego hæc potius deesse in Oribasio, quam superabundare in Dioscoride & aliis. Notandum est autem, quod planta hæc dicitur apud græcos omnes *κύπερον*, & ita vocatur à Theophrasto: sed lib. 1. & 4. c. 11. & lib. 7. de caus. plantar. cap. 17. vocat eam *κύπερον*; nam possumus nos vtroque modo eam appellare. Paulus etiam aliter eam appellat. Sed non refert quomodocumque appelletur; nostri autem latini appellant cyperum neutro genere, in qua parte decipitur interpret Theophrasti vertens gladiolum pro cypero. Apud Plinium autem reperieris Cypirum & Cyperum. Cypirus est gladiolus reur; & ob id deceptus fuit interpret ille: at cyperum est idem medicamentum, quod est apud græcos.

Inquit etiam Dioscorides quod vocatur Crisiseiton, fortasse similitudine accepta iunco, quia hæc planta sit veluti virga iuncea, vel, & melius, quia in summo caule ferat calicem continentem semen. Similis est enim caulis huius plantæ malo nauis atq. arbori, habens calicem illum in summitate & calathum: & nisi hæc sit vera causa nominis, à me alia ignoratur: à latinis vocatur Iuncus angulosus & triangularis, vt à Plinio lib. 21. cap. 18. vocatur. Celsus autē lib. 3. c. 21. vocat iuncum quadratum, quia aliquando caulis eius habet quatuor angulos: nam cum Mutinq. copiosus sit cyperus, & eum quatuor angulis, dicitur ab ipso vulgo quadrilatero. Radix iunci etiam appellatur à Columella lib. 12. cap. 51. & ego probo hoc verum esse ex Marcello Medico c. 12. vbi dicitur iunci radicem vocari cyperum à græcis; ab Auicenna autem cap. 149. vocatur Shad, à Semapione vero cap. 192. Shaerade, quæ voces diabolicæ sunt ac nimis barbaræ.

Deuenit Dioscorides ad plantæ descriptionē, dicens quod folia cyperi sint proxima porraceis, licet angustiora & exiliora. Democritus inquit, quod habet folia si milia cartæ ac papyri foliis. Theophrastus ponit similitudinem à foliis arundinis, tamē subiunxit quod sint folia habētia veluti carinam & angulū; nam assimulantur foliis porraceis. Habet caulem iunci, non legatis tamen illud odorati, quoniam non adest hoc in vllō autore. Altitudo caulis est cubitalis, & aliquando maior sine nodis, atque angulosus est & levis. Theophrastus etiam testatur lib. 1. de histor. plantar. c. 8. caulem esse sine aliquo nodo, & angulosum esse, in cuius caulis altitudine est calathus cum foliis minoris & seminibus, ex quibus foliis erumpunt flores & semina in panniculis. Semina autē describuntur à Democrito, qui inquit

Semina cyperi comesta inebriant.

Plantarum imperium triplex est.

Cyperi duplex genus.

Pauci ad nos deferuntur ceterum cyperum.

Discordia inter Dioscoridem & Theophrastum circa saporem radicis cyperi. Cyperi electio.

femen esse veluti milii, & est semen infestissimum in nostra oriza in nostris regionibus, & si concedatur, inebriat, ut lolium, corticis est nigri & duri: radices habet conuolutas inter se, ut dicit Theophrastus lib. 4. de hist. plant. cap. 11. qui eas ibi describit. Infinitae autem sunt radices inuicem complicatae, ut sunt radices arundinum; adsunt & aliae aliquae radicales festucae, quibus appenduntur aliae radices oliucae: nam haec planta habet duplicem indicem ad superiora & inferiora, cum tamen aliae plantae sursum, aliae deorsum magis feruntur, aliae in utramque partem, & huius rei habemus exemplum cyperi esculenti, qui dicitur dulcichinum, in qua planta discordia est maxima inter Mathiolum & Guiladinum, & res quidem difficilima est, circa quam ego manum non impono. Planta autem haec dicitur Thraisci & dulcichinum, neque mihi dubium est, eam esse speciem cyperi, licet planta esculenta sit, & Verone copiosa nascitur, quare colligotracum esse cyperum esculentum. Radices ergo cyperi sunt aut rotundae, aut similes nucleis oliuarum, ut inquit Democritus. Sed notandum est, quod duplex est genus cyperi, alterum radicis oliucae, & hoc non nascitur in marchia Taruina, sed fertur ex Creta. Sed habemus hic cyperum cum radicibus similibus radicibus illis, non tamen exquisitis, cyperus tamen est, sed Mutinae ac in Hetruria habemus optimum cyperum, radices eius sunt nigrae ac rubrae praeter partem proximam cauli, & suauem habent odorem radices istae, qui tamen diuersus describitur ab istis, & mihi videtur odor veluti vini, nam quasi inebriat, & ideo mirum non est, quod quadrilettum rusticos inebriet. Dioscorides autem inquit, quod radices istae sint amarae, ac Theophrast. lib. 6. de causis cap. 16. dicit radices esse dulces ac odoratas, non folia nec caulem, quare discordia maxima est, & nisi per radicem intelligamus partem illam, quae producit caulem, siue à qua oritur caulis & radices omnes: nam radicio illa non est amara, sed odorata ac veluti dulcis: nam dico, nisi hoc modo intelligatur Theophrastus, nescio quidē quid dicam, nisi quod codex sit deprauatus, ut loco cyperi reponamus gladiolum: hoc autem alii iudicent. Theophrastus autem lib. 4. de histor. plantar. cap. 12. inquit, quod nascitur in aquosis locis, & locis in quibus deferri possumus nauigiis. Postea ponit electionem, quod sit radix eius grauis, plena, densa, aspera, odoris iucundi cum attritione aliqua ex Sicilia Syriaca & Cycladibus insulis. Plinius autem probat illam, quae fertur ex Ammonia primo, secundo ex Rhodo, tertio ex Aegypto, & magis credo Dioscoridi in hoc, empyreus enim fuit. Creticum cyperum optimum est vel ex Hetruria, ultimo ex locis his notiss. In vltima autem parte post facultates notas subdit, quod sit alterum cyperum in India nascentis, quod manducatum croci calore affert, & est psylotrum haec planta, seu plantaila, quam vocant curcumam, quae etiam dicitur terra emerita, haec autem radix similis est zinziberi, & est psylotrum etiam.

Notandum est tamen in hac voce curcuma, quod omnes recentiores cum legerint compositionem illam Mesuae diacurcuma corruptam, digladiantur inter se: sed compositio est diacurcuma, quae est compositio ex croco. Alii autem multi per curcuma intelligunt radices rubrae tinctorum, hanc tamen expositionem non reperietis apud vllum Arabum. Alii volunt quod intelligamus radicem chelidoniae, & adducunt Serapionem, qui male interpretatus est. Alii intelligunt cyperum indicum per illud curcuma, sed omnes male faciunt, & imponendus est crocus, & inscriptio corrigenda est. Curcuma autem officinarum est cyperum indicum.

De Cardamomo. CAP. IX.

Coniungitur Cardamomus cum reliquis aromaticis medicamentis. Habet enim omnes notas requisitas. Theophrast. lib. 9. de histor. cap. 7. ipsum enumerat inter aromata: merito itaque Dioscorides de eo hic agit. In hoc autem medicamento habemus infinitas tenebras, circa quas dicam ego sententiam meam liberam, ut audieris. Caput hoc Dioscoridis habet tres partes, in quarum prima loca tradit, in quibus oritur haec planta: in secunda electionem & in tertia facultates proponit: quo enim ad plantam, nullam proponit ipse descriptionem. Quod itaque ad primum caput Dioscoridis, dicit quatuor vel quinque esse loca à quibus prouenit haec planta, ex Comagene scilicet, ex Armenia & Bosphoro, ex India & ex Arabia cardamomum asportari dicit. Galenus autem inquit, quod hoc cardamomum, quod habemus, sit semen quoddam, cuius figuram tamen neque Galeno, neque etiam ex Dioscoride habemus: sed Galenus dicit, quod contineatur hoc semen in siliquis vel calicibus: reliqua vero habentur à Plinio lib. 12. cap. 13. semen dicente esse oblongum & virens, ac non omne semen hoc tale est, sed aliqua tantum eius species: nam alia species est coloris rufi, & est pingue, angulosum, fractu contumax: haec autem

Cardamomum quid sit & quale.

tem partim colliguntur ex Dioſc. partim vero ex Gal. & Plinio. Addatis autem, quod ſemen eſt amarum atq; odoratum: Item quod habet medullam aliquam internam. An vero noſ habeamus hoc medicamentum, cardamomum ſcil. græcorum, credo ego quod non. Comagene eſt regio Ciliciz prope montē Amanum Syriz proxima, quæ poſtea dicta eſt Euphratiſia ab Euphrate amne. Ex Armenia etiā ferebatur & Boſphoro, ſed nō explicat ex quo Boſphoro habemus. n. & Boſphorū Thracium qui dicitur ille Stretto di Conſtantino- poli: alter v. Boſphorus eſt Cimerius, per quē tranſit palus Mæotis in Pontū, & eſt quædā anguſtia diſtinguens inter paludem Mæotidem & Pontum & mare Ionium. Theophr. ſtus autem confirmat, q. ex Media & India feratur & ex Arabia. Credo tamen ego q. cardamomum græcorum vero. Poſtea autē Dioſcorides notas electionis cardamomi proponit dicens, q. oportet viſi plenū, nō exſum, ſtractū cōtumax & concluſum in val- uulis ac ſiliquis, & quod ſiracte, ſubamarū & valde odoratū, imo maxime odoratū. Apud Plin. autē li. 12. c. 13. habemus 4. genera cardamomi, quorū primū eſt viride & cū aliis cō- ditionib. dictis, & eſt optimū cardamomū: ſecundo proponitur cardamomus ruſſus & cā- dicans, tertio nigrum, quarto vero vacuum, exſum & peſſimū, cum ſuppoſuerim verum cardamomum eſſe ſemen plenū, & habere illas conditiones quas propoſui. De hoc autē loquitur Arabes ſub nomine Cordumēni, cuius ſemineſcit Serapio c. 116. & Auic. c. 159, canon. 2. in quo cordumēni ipſum habemus duplex, alterū, quod dicitur Corda, Cordu- menī, Cardamāna, quod penitus eſt Cardamomū ipſorum græcorū & nihil diſfert; alterū eſt cordumēni, quod dicitur corduhemana, & non eſt cordumēni vel cardamēni Arabū, ſed eſt ſemen illud, quod proprie eſt carui græcorum, de quo loquitur Rhafes lib. vltim. continētis tract. 2. Exiſtū ſecundū cardamomū eſt caros græcorum, quod eſt carui agreſtis, quod fuit cauſa turpiſſimi erroris Serapionis & Arabum: interpretatus eſt n. dicta de primo cordumēni, de hoc ſecundo ac de carui, cum debuiffet interpretari de cardamomo græcorum, & hoc eſt notandū, quoniam facit difficultatem; non habetis. n. caput in Sera- pione de cardomomo, ſed de carui agreſti. Notandum eſt etiam in Auerrhoe 5. collect. 42. quod interpres eius recte interpretatus eſt, ſed apud Arabes inuenietis caput de car- damomo, quod non eſt cardumēni, ſed dicitur Sachola vel Nakola, & Auicennas de hoc tractat in 2. canon. 158. & Serapio c. 54. & Rhafes vlt. continētis tract. 1. & 2. neq; hoc eſt carda- momum græcorum; imo hoc cardamomum græcinon nouere, cuius teſtem habeo Auerrhoem 5. collect. 56. qui enumerat Sachola inter medicamenta ignota græcis. Hoc autem Cardamomum deſcriptum fuit ab Arabibus omnibus, & etiā ab Iſaaco ſub litera C, Se- rapio autē mihi in hoc nō placet, quia citat Iſaacum, at corrupte: Habemus enim Iſaacum integrum, Auicennam vero ſatis conuſum: nam ego ex Rhafes & Iſaaco colligo ſemē hoc eſſe contentum in ſiliquis triangularibus, & habet neruum complectentem totum ſemen: & hoc duplex eſt, maius & minus; & minus eſt magis calidum: nam cum videam carda- momum delatum ex India duplex eſſe, & non videam copulam illam, credo has duas ſi- liquas eſſe cardamomum vtrumque Arabum: & in officiis deſerri cœpit hoc medica- mentum pauco abhinc tempore, & in aliquibus locis reperitur. Nam ante tempora no- ſtra in officiis duo ſemina erant in vſu pro cardamomo, quorum primū erat Nigella pal- lida, qua utebantur apothecarii pro cardamomo minori. Secundū vero erat ſemen quod- dam delatum ex Albania & Indiis, quod dicebatur melegeta, quoniam ſimilitudinē me- licæ præ ſe ferebat, & erat in vſu pro cardamomo maiori, & dicebatur etiā granū para- diſi, ſed detectum eſt ſigmentum, quamuis medicamentum eſſet opportunum in offici- nis, & error hic fuit à Manardo detectus, ita vt medicamentum hoc ſiſt illud, de quo Auicennas loquitur cap. 203.

Adiuñctum eſt autem tertium ſemen, quod dictum eſt cardamomum minus, & eſt verum cardamomum minus Arabum, quod ſeruatur extra ſiliquas. Aliquo vero diligen- tiores inuenerunt etiā cardamomum maius, quod & ego vobis oſtendam: nam errant, qui dicunt, nos carere cardamomo Arabum, & eſſe idem cum cardamomo græcorum. Expli- cat deinde Dioſcorides vires huius medicamenti, quas tamen ego non dicam, quoniam reuera medicamentum hoc non habemus; diſco tamen quod calidum & ſiccum ſit in ter- tiogradu, & parum minus, quam ſemen naſturtii, quod eſt calidum & ſiccum in quarto. Hoc autem ſuppoſito video, quod pro cardamomo ſupponitur myrthus: ſed ego miror, cū myrthus ſit frigida. Galenus ſupponit pro cardamomo carpaſum; quam tamen non habemus: & ſi haberemus, ego non ſupponerem: Eſt enim eius lachryma venenofa: quandoq; ſupponitur radix cyperi, neq; mihi placet, quoniam non eſt adeo calida: ammoniaci & gala- nga minor meo quidem iudicio poſſet ſupponi, quoniam forte eſt vera cyperis ammo- niaca. Galenus autem lib. 7. de compoſ. medic. ſec. loc. cap. 2. ſupponit ſemen ſinapis, q.

est calidum & siccum in quarto gradu, ideo sit eius minor quantitas. At Galenus ex Democrate supponit cinamomum, quod facere etiam potestis, aut supponere galangam vel cardamomum minus Arabum, quod calidum est & siccum in tertio gradu. Difficultas autem quædã est apud Ianum Cornarium de medulla quadã, cuius mentio fit in 2. de antidot. cap. 10. & 11. ideo loca ipsa vos potestis videre, quoniam hic omitto.

De spica nardi indica.

CAP. X.

ERat opinio græcorum omnium nardum connumerandum esse in aromata, testes habemus Medicos & historias: nam Diosc. inter aromata ponens nardum primo tractat de nardo indica, eo, quia nobilior est; duo n. sunt genera nardi indicæ alterum (quod indicum est, & alterũ Syricum. Nardum autem indicũ vocant, quoniam ex India ferebatur & probatus est aliis; & hoc genus nardi duplex est, alterum indicum, alterũ syricum; quoniam oritur quidem in montibus Indiæ, sed vergentibus vna facie ad Syriam. Et potestis tollere difficultatẽ illam, quando legeritis Gal. in lib. de antid. probare spicam indicã, Dioscoridẽ autẽ approbarem syriacam; quoniam nulla est contradictio, quamvis videatur, quoniam etiã spica syriaca est indica spica: & indica apud Diosc. differt tantum ratione aspectus loci: at indica apud Gal. probatur ratione eius, quæ ferebatur ex Creta & Arabia, non autẽ ratione Syriacẽ illius; quare non contradicunt sibi ipsi hi scriptores. Præterea distinguitur hoc genus nardi in campestre & montanum. Ortum autem in campestribus deterius est propter Gangem fluvium: Ortum vero in montibus robustius est, præsertim in facie respiciente Syriam & meridiem vel occidentem. Nescio autẽ ego, cur Dioscorides retineat descriptionem huius plantæ. Credo autem quod dimiserit eam, (descriptionem) quoniam integram ignoravit historiam, quæ tamen ab alio non est descripta: nam reliquit nobis ferupulum, an habeamus spicam nardi. Manardus 4. epistolarum suarum lib. 6. inquit, nos non habere spicam veram indicam, quare ab eo nihil accipere possumus. Ad Plinium ergo deveniamus, qui etiam ignoravit hanc plantam: nam lib. 12. cap. 13. describit fruticem crassa radice constantem brevĩ & nigra, redolente cyperum, aspero sapore, frãgibili, levi folioq; parvo & denso, ac producente in summo aristas & spicas. Inquit præterea, quod habeat duplicem facultatem: primo enim venduntur spicæ, secundo cespites, qui dicuntur Sphæron. Sed decipitur hic vir, & transiit ab aliquo vano scriptore sine vlllo delectu: hæc enim planta potius est iuncea, quam fruticosa: nam talem proponatis vobis cespitem nardi indicæ, qualis est cespes iunci odorati, & eadem est radix cum iunco odorato. Præterea addit quoddam contrarium, quod scilicet ex cacumine promittaristas; sed spica illa est pars radicis, non autem oritur ex cacumine. Nam ut meam proferam sententiam partim doctus experientia, partim vero auctoritate scriptorum dico, quod credo hanc esse plantam iunceam cum radicibus iunci desinentibus in quoddam caput in duas partes distinctum, in spicas & folia & caules: non dicam autem vobis foliorum figuram, quoniam non fertur ad nos integra planta: spicæ autẽ videntur veluti flores quidam confecti ex lana vel gossypium, & istæ spicæ sunt in infimis radicibus. Galenus autem lib. 1. de antidotis testatur spicam nardi non esse spicam, sed radicem, nec intelligendũ est de radicib. nutritientibus plantã, sed per radicem intelligendũ est hoc in loco id, quod adhæret cespiti. Philo Tharsensis dum describit antidotum, appellat plantam hanc radicem falsi nominis, quia nõ est propriæ radicis, sed pars cespitis inferioris, qui hæret terræ ac radicibus veris: nam nos colligimus nardum esse plantam iunceam vel graminosam: quare falsã est historia Plinii; veraq; sententia Galeni: locus autem Philonis est lib. 9. de compos. med. per loc. cap. 4. ubi habetis epigramma quoddam dissillimum, in quo medicamentum hoc appellat radicẽ falsi nominis, quoniam radix est, & tamen dicitur spica. Aliquis tamen non intelligentes Galenum nec Philonẽ, credidere, quod falso dicatur radix. Talis autem ad nos deferretur planta hæc, & miror maxime de Manardo. Habemus ergo nardũ indicam vel syriacam vel non, & deferretur ex regno Cambaie vel Gambage: & huiusmodi regio est Gedrosia, quæ dicitur a Ptolomæo Gogiamba, & est maioris Asiæ regio: fertur etiã ex loco dicto Sagapeno a Ptolomæo. Postea distinguit Diosc. nardũ in campestrem & montanã, eligitq; montanã, quoniam calidior est habetq; notas syriacæ, & credo omnẽ hanc plantã oriri in locis riguis, quoniam planta est iuncea, & amat aquas locaq; irrigua: præterea describit Dioscorides nardũ alterum genus, pseudonardum dicam & samphoriticum, & hoc indicum non est, quoniam tria tantum genera sunt nardi indicæ: hoc autem ferebatur ex Arabia foelici ex Saphtha vel Sathpha metropoli Sabæorum, ut ex libro 17. Strabonis colligimus. Recetiores autem habent vnam plantam quam vocant pseudonardum. In hortis. n. oritur fruticosa planta quædam referens folia stœchados cum floribus rosinatinis, & cum spicis seu spicatis floribus.

Spica nardi
indicæ
p. 10.

Contradictio
apparet
inter Gal.
& Dioscor.

Cur Diosc.
decriptio
hanc plantam
omiserit.

Descriptio
ex Plinio.

Propria opinio
de hac
planta.

Error Manardi.

Electus spica
montana.

Pseudonardum.

floribus, quæ planta vulgo dicitur spigo, cuius species alia facies spicas breuiiores, dicitur lauanda aut lauandula, & hæc planta pseudonardus dicitur à quibusdam. Alii autem credere hanc esse spicam Plinii, sed maxime errarunt; non enim habet coniunctionem illam cum nardo: nam potius ego ipsam coniungerem cum arabico stoechade, credens quod sit pseudostoechas, licet nesciam an descripta sit duplex hæc planta ab antiquis.

Narrat denique Dioscorides adulterium ipsius spicæ nardi, & ipsum detegens facit nos cautos in ipso dignoscendo. Vim autem habet nardus calefacientem & siccantem: nam Gal. in lib. de simpl. med. fac. cap. propr. inquit, quod calefacit in tertio gradu, quiloocus deprauatus est: nam credo ego legendum esse in secundo gradu idem enim testatur Aui-
10 centias cap. 640. & Aetius atque Serapio, nec spica nostra calida est in tertio gradu, ut patet ex gustu; non enim fugat gustum à se ac exurit, ideo non est in tertio.

De Spica celtica.

CAP. XI.

TRes dicebam esse species nardi, indicam scilicet celticam & montanam: & indicam distin-
tam esse diximus in Syriacam & indicam: & quia Dioscorides de indica iam egit,
merito itaque de secunda in præsentia tractat, videlicet de celtica, & præcipue cum habeat
omnes easdem dotes, quas indica, licet non sit adeo nobilis: nardus autem vocatur gallica,
quia in Galliis copiosa oritur, & per Gallias, regionē intelligimus illam, quæ continet Me-
20 diolanum & Pedemontanam regionē. Triplex enim erat Gallia, Togata, quæ sub Italici
nomine continetur. Secunda autem pars Galliarum erat Bracchata, quæ dicitur Prouincia,
seu ut vulgo vocatur Prouenza, ac Narbonensis: Tertia erat Gallia comata, quia comæ fe-
rebant homines regionis illius. Notandum est autem, quod Auicennas cap. 646. & Se-
rapio cap. 52. appellarunt hanc spicam romanam, quoniam ex regionibus romanorum ad
suas regiones ferebatur. Statim postea describit locos, in quibus nascitur hæc planta, di-
cens, quod copiosa reperitur in Liguria, & ibi est metallum istius plantæ ex Plinio lib. 20.
cap. 21. & lib. 12. cap. 13. & præcipuus locus, qui laudatur à Plinio, est in confinio Ligu-
riæ, qui dicitur Eporea, quam inquit Dioscorides, quod latini vocant Saliuncam, ut pa-
tet ex Virgilio in bucolicis eclog. 5. cuius Saliuncæ meminit Plinius lib. 21. capite 20.
30 Sed notandum, quod variz suntlectiones in Dioscoride, atramentum non reperiam aliam vo-
cem in autoribus, quam saliuncam, credo sic legendum esse, nec esse expungendam istam
vocem, licet Matthiolus hoc velit, quoniam saliunca non est reueratidem cum nardo cel-
tica, quia Plinius separatim de his agit. Præterea habemus Virgilium conferentem Sali-
uncam cum rosetis: ergo nulla esset comparatio, & Serulus inquit, Saliuncam vocatam
esse ore unicam, quæ est species anemone pilosæ. Non possumus ergo hoc asserere, quod
Saliunca sit nardus celtica. Deinde varia prodit Plinius de nardo & Saliunca, & omnes hæ
rationes fundantur in his autoritatibus: nihil tamen paream ego aliter sentio, & quæ me
mouent, ista sunt: quando volumus probare duas plantas esse vnā & eandem, primo ac-
cipimus descriptionem plantæ, odores, sapores, vsus, loca ubi oritur, culturam etiā & col-
lectionem. Additur autoritas Dioscoridis, quia de vtriusque plantis agit tanquam de vna; &
40 mirum non est de Plinio, quoniam ab aliis transcripsit, & ideo de nardo egit, sicuti transcrip-
sit ab aliquo greco: de Saliunca vero accepit à latinis. Plinius ergo inquit Saliuncam ori-
ri circa alpes ad Eporediam ciuitatē, & ibi est metallum, & hoc fecit difficultatem multis do-
ctissimis viris non aduertentibus hanc locutionem poeticam esse, & metallum significare
locum, ubi copiosa colligitur hæc planta. Sed hæc loca sunt Liguriæ partes, ubi dicit Dio-
scorides oriri nardum celticam, & subdit Plinius, quod in Pannonia & Norico oriatur ista
planta, & hæc sunt partes Istriæ, de qua dicit Dioscorides, & ex istis locis nunc habetur co-
piosissima hæc planta. Addit Plinius colligi hanc plantā, & comprimī in fasciculos, quæ verba
videntur capta ex Dioscoride in nardo celtica. Addit Plinius vtro hanc plantā habere ra-
50 ditem densam & numerosam, Dioscorides autem approbat illam radicem, quæ densior
est. Plinius inquit, quod robore ventriculū & vomitui resistat, quod tamen videtur sum-
ptum ex Dioscoride; & licet aliqua varient, non tamen sunt contraria. Marcellus Medi-
cus lib. 20. in antidoto ad ventriculum dicit Saliuncam vocari nardum celticam. Scribo-
nius Largus c. 153. vtriusque Saliunca ad affectus vesicæ, & nardus celtica præcipuum est me-
dicamentum, ut patet ex Dioscoride. Ex his autem rationibus autoritatibusque concluden-
dum est esse eandem plantam, nec mirum esset, quod Seruius ignorauit hanc plantā. Sed
concesso, quod sic vocaretur planta hæc suis temporibus, nihil concluditur propter hoc.
Ad Plinium autem dixi, quod ex aliis transcripsit, & mirum non est de varietate illa.
Comparatio autem saliuncæ cum rosetis est in nobilitate ac odoribus florum ipsorum

Nardum cel-
ticum cur di-
catur gal-
lica.
Triplex Gal-
lia.

Loca ubi na-
scitur.

Saliunca.

An saliun-
ca sit spica
celtica.

Opinio præ-
pria.

Declaratio
Plinii.

Nardi cel-
tica vides

Planta de-
scripta.

non autem alia ratione. Subdit postea Dioscor. descriptionem plantę dicens, quod folia sublonga sunt, flos luteus: nā hęc nardus est species phu, i. e. valerianę, & oritur in his mōtibz, & ab istis dicitur valeriana montana. Caulis parvus est cum umbellā florum luteo-
rum, radices sunt capillares, quę spicatam habent radicationem, quę amarę sunt & odo-
ratę, vt nardus indica, & dicitur nardus propter hunc odorem nardi, & qualitates eius sunt
quales describuntur a Dioscoride. Copiosa fertur ad nos hęc planta ex Carinthia vel Ca-
rina & ex Norico in maxima copia. De præparatione autem & electione agens Dioscori-
des, dicit ea, quę nota sunt, quęq; omnia ab ipso traduntur. Subdit deinde adulteriũ spicę
celticę. Plin. lib. 12. cap. 12. mentionem faciens de quodam Hirculo, quo adulterabatur
nardus celtica, ego autem non noui hunc hirculum: scio tamen omnes decipi credentes
nostram spicam esse spicam celticam. Alii voluere laundulam esse nardum celticam, ta-
men falluntur. Alii etiam voluere ipsam esse saluncam, cum tamen toto ccelo aberrent, &
miror de istis, qui non vident autores omnes in contrarium facere. Errant etiam, qui pseu-
donardum appellant; nam potius est, vt iam dixi, pseudostech, has, cum ipsi sint maxime si-
miles istę plantę.

Electio &
preparatio.
Adulteriũ.

Error alie-
rum.

De Nardo montana.

CAP. XII.

Nardi ge-
nera & spe-
cies.

TRia habemus genera nardi ex Diosc. indicum & celticum & montanũ: illius primi ge-
neris quatuor sunt species, videl. spica indica & cretica. Indica autem diuiditur in gan-
geticā & Syriacam: Syriaca rursus in montanam & gangeticam simplicitate: & hęc mon-
tana quę constituit tertium genus multũ differt ab illius primi generis montana. Diosc.
ergo primo voces pponit, secundo descriptionem, tertio electionem, quarto autē propri-
etates. Quo ad primum, dicit Diosc. quod hęc spica dicatur thylacitis & niris, quę voces
leguntur apud Paulum & Gal. & ideo credo ego voces has esse legitimas. Thylacitis dicitur,
id est, vesicaria ratione radicis, quia proferit radices similes radicib. asphodeli, quę sunt
flaccidę, & veluti folliculi, & huius explicationis autor est interpres Nican diti Scholiastes
in alexipharmacis. Noster autē Auic. vocat nereidē montanam. Niridis vero nominis cau-
sam non cognosco, quāuis vox legitima sit, vt patet ex ipso Auic. Galenus etiā vocat ipsam
hoc nomine Pyritidē, hęc ratio satis constat. Scimus. n. omnia medicamenta habetia in se
vocem Pyri habere etiam in se fetuorem & ignem: nam marchesia dicitur Pyritis. Pythe-
trum etiam hunc dictum est. At hęc planta ignem non habet nec feruorem, nam credo e-
go vocem esse corruptam apud Gal. & ideo legendum esse niriqum, nulla enim est diffe-
rentia nisi in prima litera: nam facilis fuit transitus a niriude in Pyritidem. Si vero non pla-
cet hęc expositio, asserendum tamen corruptam esse vocem; legi posset fortasse pyrititis,
id est, nuclearis, quia radices eius sunt veluti nucleę oliuarũ. De hac spica Plinius nō me-
minit: meos autem præceptor Brasauola etiam errauit: creditit. n. spicam existentem in
officinis esse hanc montanam, cum tamen hęc duerũssima sit: illa enim indica est, & po-
test esse montana, non tamen hęc montana tertia est. Inquit autem Diosc. quod in Cili-
cia & Syria oriatur: habemus tamē etiam in Italia, in Marchia Anconitana, in monte Sybil-
le & collibus romanis, e quib; copiosissima efferebatur. Ciliciz autē ea pars Carmania di-
citur, in qua oritur hęc planta. Pōit deinde Diosc. descriptionē plantę, in quies quod oria-
tur furculo & foliis eryngio similib. sed hęc interpretatio mala est; nam vos legere debetis,
quod oriatur caule & folio similibus eryngio, nec tamen planta spinosa est: nam errauit A-
matius Lusitanus tum in prima tum in secunda commentatione & multas nugas proferit.
Habemus enim in Italia hanc plantam: folia similia eryngio sunt diuisa & figura, non ta-
men spinis, sed minora sunt folia: nam minor de Marthiolo, qui nunquam voluerit
hanc plantam cognoscere pro spica montana, cum tamen habeat folia valerianę.

Ordo Dio-
scoridi.
Nomen Ge-
neris.

Corruptio
natus Ga-
leni.

Brasauola
error.

Error Ama-
ti Lusitani.

Error Mar-
thioli.

Idem dicit Auicennas, additque quod stipites sunt citrini & minores stipitibus e-
ryngii, & hoc, quod addit Auicennas, est a Dioscoride prætermisum, quod scilicet ra-
dices habet binas vel plures similes radicibus hastulę regię, subnigras, & odoratas: In
hęc autem nostra nardo sæpiissime inuenimus nos duas radices similes Saryrioni ac velu-
ti duas oliuas coniunctas: quandoque vero vnam, ac tres vel quatuor radices habet. Ni-
greto autem est in cortice tantum. nam Oribasius inquit, quod sint albiiores, quā radices
asphodeli; quę tamē additio est suspecta: quoniam asphodelus habet radices subalbas, neq;
caule neq; fructũ neq; flores proferit, & valet ad ea omnia, quę facit nardus celtica. At no-
tandum, quod hic est contradictio magna: nam superius dixit hanc plantam habere cau-
lem similem eryngio, nunc autē dicit non habere caulem nec flores: nam illi hoc animad-
uertentes loco caulis furculos conuerterũt quod tamen agendum nō erat, quoniam furculi
a caule

caule oriuntur. Sed, vt ego arbitror, difficultas est in illo verbo *et loco*, loco cuius legendum est *et hoc*, & hoc probō: nam in capite de dictamno cretico idem dicit, scil. *fert pro confert*: nam sic significat, neq; caules neq; flores conferunt in re medica nec fructus: nam reuera huiusmodi plantę, huius partes sunt similes, & etiam Matthiolus probat hanc castigationem meā: nam verba illa legatis vos in nominatio ac primo casu, uō autem in accusatiuo. Postea dixit Dioscorides, quod sola radix habeat vires nardi celtice, & materia optime cōsequitur. Hęc autem dicta sufficiunt de nardi generibus ac speciebus omnibus.

De Asaro. C A P. XIII.

Quoniam radices Asari odoratę sunt, seruantq; semper odorem, alijsq; ipsum commu-
nicant, merito de iis hic agit Dioscorides, cum præsertim similes sint nardo odore ac
virtutibus. Tria autem facit Dioscorides in hoc capite; primo historiam prodit, secundo fa-
cultates: Tertio loca, in quib. copiosa nascitur hęc planta, & aduertatis quod maxima o-
pus est diligentia in hac planta, quoniā multa ex capite de bacchari huc translata sunt. In-
quit Dioscorides, q; hęc planta vocatur syluestris nardus, quę pars potest legitima esse, cū
tamen alię multę voces expungendę sunt. Plinius lib. 12. c. 13. & lib. 21. c. 6. vocat asarū nar-
dum syluestre & rusticū. Dicitur autē asarum, quia non potest commisceri ac complicari
in coronis teste Plinio. Nam Ruellius optime fecit expūgens verba illa in codicib. aliquot
inuēta, quod si hęc herba sit coronaria. Qua in re Virgilius Marcellus maxime laborat, vt
pber asarū plantā esse coronariā, licet odorata nō sit, & verba illa sunt in capite de baccha-
ri. Pręterea est autoritas Oribasii, qui dimittit voces illas, q; sit odorata & coronariā. Ad-
datis Sorapionē, qui huius vocis nullā habuit mentionē, verum similitudo sūt causę erro-
rū multorum. Antiqui .n. habebant baccharim plantam ad coronas aptā atq; odoratam ac
pulcherrimā, cuius radix thus odore redolebat, habebantq; nardum rusticum asarū, quam
plantam voce gallica *baccar* dicebant: nam aliqui ineptiores baccharim etiam vocarunt a-
sarum: & ita postea confusus nominibus facta est cōfusio medicamentorū, & multa trans-
sumpta fuere ex capite de bacchari, & huic capiti de asaro addita atq; apposita. Et error hic
tantū tempore valuit, vt in his officinis nostris asarū baccharis vocetur. Dicebatur autem
hęc herba vuluago à latinis, vt habemus in Macro Poeta, fortasse quia flores eius sinum
muliebrem referunt, vel quia luuant vuluam: quoniam expurgat vterum & totum corpus
per locum illum, si supponatur. Arabes vocant eam Asaron, iam describit plantam Dio-
scorides inquit, quod habeat folia hedere, & rotundiora ac minora, quā in re tamen ex
Fuchsiō est difficultas, cum variz lectiones sint in textu gręco: in aliquibus enim codici-
bus legitur *minora*, in alijs *densiora* vel *crebriora*: Fuchsius tamen vult legendum esse *molliora*,
additq; autoritatē Plinii. Tamen cū reuera folia asari montani breuiora sint ac minora, ego
potius legerē *minora* quā *crebriora* vel *molliora* secundū autoritatē Oribasii aliorumq; mul-
torum. Flores sunt similes hyoscyami florib. nec sunt odgrati, vt dicit Oribasius, ideo corri-
gatis text. Dioscoridis, & vocē illam expungatis. Hęc sunt isti flores pediculo breui radicib.
quorū semen est acinosum, quia est simile acino contento in vuis, Serapio autē ipsum car-
damo assimilauit & recte. alia verba sequentiā expungatis. Descriptio autē radicis optima
est, & indicatur ex historia ac Plinio, sciatisq; solas radices esse odoratas, non autem reliquā
plantę: neque hoc mirum esse debet: radices enim istę calidę sunt & mordent linguam.
Sed Plinius videtur has facultates ad sōmen referre, q; est falsum, ideo caute legatis. Mesue
autem voluit has radices calidas esse in secundo, siccas autem in tertio; quę tamen omnia
expungenda sunt. Nam Auicenna s dicit, quod hoc medicamentū sit calidum magis quam
siccum: ego autem dico, quod sit in tertio gradu calidum atque siccum. Galenus inquit,
quod habeat vires acori, & ideo loco eius hęc radice vtitur. Idemq; dicit Serapio: Pro-
bat etiam hoc Poeta ille Macer duobus carminibus, quę videre potestis. Inquit autem
Dioscorides, quod facultates plures habeat, quas etiam per vosmetipsos videre pote-
stis: vim enim habet purgantem, de qua nil aliud modo dicens id tantum assero, quod a-
sarum maxime purget vterum. Postea explicat loca vbi proveniat hęc planta. Plinius
autem vult priorem locum esse Pontum, secundum Ciliciam, tertium Illyriam & in Ira-
lie agro Iustinienſi. De qua tamen regione pauca habeo, quod dicam; non enim est Iusti-
nopolis, quamuis credam Iustinos montes locum esse prope Marſos, vbi habitabant Iustini
populi in regionibus Apuliz. Et hęc sufficiant de asaro: breuitati enim studens, vt ad vti-
liora me accingam, quę magis necessaria sunt, tango, quęq; à Dioscoride vel alijs
tacta non fuere. Quę enim ipsi pertractarunt, oculis cuiuscunq; le-
gentis patere possunt & patent.

Radices Phu radicem nardi sequuntur odore & viribus ac proportionē illa, ut solz radices odoratz sint, reliqua autē planta inodorata est, ut in nardo. Primo de phu post nardum Dioscorides egir, quoniam omnes conditiones habet aromatis, præter hoc, quod domesticum est medicamentum. Plinius lib. 12. cap. 12. enumerat phu inter species nardi. Dioscorides autē primo describit plantam, secundo loca ponit, in quibus nascitur, tertio vires proponit, quarto deprehendit adulterium & correctionem huius radicis. Inquit igitur, quod phu dicatur sylvestris nardus à quibusdam, & merito, quoniam etiam Plinius idem testatur; nam ipsum vocat nardum agrestem: alii vero nardum creticam. Philo autē Medicus describens philonium romanum in suo epigrammate mentionem habet de nardo cretica. Galenus lib. 7. de comp. med. per loc. cap. 4. describit nardum creticam, & declarat verba difficilia Philonis, quæ nardus cretica Galeni & Philonis non est phu, sed spica indica. Nascitur hoc medicamentum in Ponto præstantissimum, non enim est dicendum, quod tantum ex Ponto feratur, fertur enim ex pluribus aliis locis, imò fere vbiq̃ reperitur, sed illud ex Ponto est præstantissimum. Andromachus laudat illud phu ponticum in theriacis. Dioscorides describens plantam inquit, quod habeat folia olusatri, id est, hippofelini. Nam Plinius lib. 19. cap. 8. inquit, quod olusatrum dicatur à græcis *λευκάνθη* & *εὐφράσιον*. Columella idem testatur, quare Ruellius vertit pro hippofelino olusatrum, sed ego vellem, ut legeremus potius hippofelinon, non quia errauit Ruellius & cum illo alii, sed ut tollatur ambiguitas; nam Plinius & Columella volunt olusatrum esse hippofelinon & smyrnium, quæ tamen plantæ apud græcos diuersæ sunt: Galenus enim lib. 2. de alim. fac. cap. de apiis inquit, quod smyrnium à romanis dicatur olusatrum, & tamen diuersa est planta smyrnium & hippofelinon. quare magna est varietas inter hos. Sed aliud notare, quod smyrnium ex Galeno est olusatrum; quomodo autem hæc difficultas tollenda sit & contradictio, locus non requirit ut dicam: sit est, quod ad tollendam ambiguitatem dicam modo, ut vertamus hippofelinum. Habet etiam ipsam phu folia elaphobosci, ac in quibusdam codicibus legitur ellebori: at vtraque lectio potest stare, tamen maior pars codicum legit elaphobosci. Caulē cubitalem habet aut altiorē. Sciendum tamen est, quod planta hæc, quæ dicitur phu, est valeriana dicta ab omnibus, quia multum valet in affectibus mulierum, & ad institūda præstigia multa, nam mali nominis est plāta. Valeriana autē multiplex est: nam primo habemus valerianā optimā, parūā, ortā in collib. circa Romā & in Marchia Anconitana, & hæc est nardus mōraba: habemus secūdo valerianā parūā montanā ortā in monte Baldo & tota Illyria: & hæc est ex omniū consensu nardus ecclia: tertio habemus valerianā magnā, quæ est phu Dioscoridis: Habemus etiā valerianā sylvestrē, quæ vbiq̃ oritur, & potest referri ad ipsam phu. Aliā habemus valerianā mediā ortā in montib. Vincentinis, & hæc etiā refertur ad phu, quamuis notē omnes non respōdeant. Adest sexto in loco valeriana aquatica, quæ credo ego referendā esse ad Thalictrū Dioscoridis, quæ quibusdā in locis dicitur Verdemarco, cum parūā similitudinē habeat eū ipso. Ex his autē omnib. Dioscorides describit nobis tantum illā magnā, quæ ex marchia copiosa habetur, & caulē habet huius altitudinis. Caulis autem sylvestris quandoq̃ ascendit ad tres cubitos, mediā autem semper excedit cubitum vnum. Caulis etiam valerianæ maioris levis est, & vestigiū habet cavitatis, dummodo caulis perfectus sit & integer, & decidentib. floribus non autē antea: verum in valeriana sylvestri apparet magna, & in montana etiā mediā. Caulis autem mollis est, & in purpuram vergēs. Primo. n. viridis est, deinde purpureū colorē semper acquirit. Geniculi interfecant caulē, nam sunt folia, in summo caule sunt flores similes narcisso, & maiores, teneriores ac ex albicante purpurei, id est, subrubri. At notandū est, quod hic locus difficilis est, & quod sit mendū patet, nam flores phu non sunt narcissi, illius s. qui oritur in hortis, & nobilis flos est: nam flores phu erū puri in umbella: præterea flores narcissi sunt magni ac longi, flores autē phu sunt similes magnitudine floribus ebuli vel sambuci: nam omnes volunt ut locū corrigamus. Facilis. n. potuit esse transitus à minori in maiore, nam vbi dicit *similes narcisso & maiores*, legere debemus *minores*, ita ut lectio sit, quod flores phu similes narcisso & minores, quamuis similitudo sit florū vtriusq̃. Dicantur itaq̃, quod flores narcissi sint sed valde minores & in umbellam collecti: color autem iste florū magis videtur esse in valeriana sylvestri, ac in maiori non tantū. Sciat is etiam, quod vox illa *molliores* non legitur apud Oribasium, sed parum refert. Dein de dicit Dioscorides, quod radices habeat duum generum: pars enim superior est erassa, ut digitus, nam oriuntur laterales radiculæ, ut in irido, acoro, & similib. sciat is autem, quod cum alias crediderim valerianam sylvestrem & montanam esse verum phu Dioscoridis, eas apponebam in theriaca, antequam hæc valeriana maior ex Mar-

phu nomen

In Ponto præstantissimū reperitur phu.

Difficilis magna de hippofelino & olusatra.

Valeriana multiplex.

Valeriana altitudo.

Caulis descriptio.

Correctio loci circa flores phu.

Opinio propha de phu vera.

ex Marehia Anconitana in notitiam herbariorum venisset, quæ est verum phu Dioscoridis, & omnes meam sententiam hac auctoritate refragabantur, quoniam præter radicem illam crassam, omnes alias notas habet, & hoc cognoui ex collatione huius valerianæ syluestris cum vera ipsa maiori: quare cognoui etiam hanc non esse malam sententiam, maiorem enim vim aromaticā habet valeriana hæc syluestris, & calidior est, atq; magis odoratas radices habet: quare nec vos errabitis, si in vestris compositionibus hac utemini, cum non habebitis valerianam maiorem, ex Marchia anconitana, neq; enim Venetiis venalis, habetis passim. Radiculæ autem ibi illæ sunt, veluti iuncea odorati, & elleboris nigri, radicibus crassis appensa, nervosq; intercurrentes intus habent. Color autem viridis est aliquando flavescent, loquendo de viridibus radicibus; nam sicæ nigræ sunt, quarum odor est quasi ipsius nardi. Deinde narrat Dioscorides facultates ipsius phu, quæ omnes resultant ex caliditate & siccitate, quam Serapio cap. 62. dicit, esse in secundo gradu: Auicennas vero c. 261. dicit: phu calidum & siccum esse vt nardum: sed Gal. vult nardum in primo gradu calefacere, & exiccare in secundo, & sic etiam phu calidum erit in primo, & siccum in secundo, atq; hinc est, quod in facultatibus magis siccet, quam calefaciat. *Adulteratur phu radice rusci admixta, sed facile discernitur impostura, quoniam radix rusci dura est, fractu contumax, & inodorata: & hinc etiam colligo, quod antiqui totam radicem non servabant integram, sed tantum radículas illas crassas hortenses, ipsi utebantur: quoniam radices rusci tenuissimæ sunt, ac multo dissimiles radicibus crassis: & omnia dicta in hoc capite, ad has radices tenues sunt referenda: quare hæc satis sint de phu dicta.*

Facultates phu.

De Malabathro.

CAP. XV.

Si quod est medicamentum, quod odoris præstantia & suauitate condire possit medicamenta, siue vnguenta odorata reddere, certe malabathrum hoc est, aromaticum enim maxime est, & omnes istas vires habet præstantissimas, & recipitur in antidota, & potissimum est medicamentum ad condendum halitum oris, meritoq; de hoc Dioscorides in hoc cap. agit, in quo primo proponit historiam, secundo electionem, tercio facultates. Quo ad historiam, explodit Dioscorides falsam sententiam, quod Malabathrum sit folia nardi indicæ: nam sciendum est, quod malabathrum est folium quoddam dictum in India Bethre, vt opinatur Amatus Lusitanus, quia oritur copiosum hoc folium in regione dicta Malabar in indicis regionibus, quod malabathrum à regione illa nomen non accepit, patet, nam Malabar est regio circa Gangem, quæ nunquam nominata fuit à græcis: sed malabathrum vox est antiquissima omnibus nota græcis, quare non possumus dicere hoc nomen Malabathri inde ortum esse, sed potius fortasse dicerem ego, ab ipso malabathro regionem illam nomen sumpsisse, malabarq; fuisse vocatam. Sed cur malabathrum dictum sit hoc medicamentum, ignoro propter hoc: & quoniam hoc medicamentum dicebatur etiam folium malabathri à Galeno & antiquis, hinc factum est, quod nostri appellarunt ipsum folium simpliciter: nam idem est folium nostrorum, & folium malabathri: ab hoc autem medicamento nomen accepit vnguentum illud, quod vocatur foliatum, & à græcis malabathrinum vocabatur. Non est tamen dicendum, quod vnum & idem medicamentum sit, malabathrinum enim vnguentum dicebatur à græcis, foliatum vero à latinis, & huius differentie testis est Gal. lib. 7. de comp. med. per gen. c. 12. vbi in eadem compositione recipit vnguentum malabathrinum & foliatum: neq; de hoc miremini: nam antiqui etiam ex nardo indica conficiebant vnguentum spicatum: græci vero conficiebant vnguentum nardinum, & idem erat vnguentum vtriusq; vnguento nomen imponens, nec tamen vnum idemq; erat medicamentum, sed diuersum, quod probatur libro 3. de comp. med. per loc. cap. 1. vbi Galenus dissoluit spicatum, & foliatum vnguentum nardino vnguentum, quare vnum non est medicamentum. Reuertor ergo ad nostrum propositum, dicens de vnguento foliato, & malabathrino. Notandum est aliud, vt per malabathrum non semper intelligatis medicamentum simplex, sed in lib. 7. de compos. medic. per loc. cap. 2. intelligatis vnguentum malabathrinum: facit enim ibi & alibi mentionem malabathri alexandrinum, intelligitque vnguentum: nam & Cornelius per rosam intelligit oleum rosæ, & hic latinorum etiam mos est. Vnum aliud notandum, quod cum Plinius rem hanc diligenter non considerasset, ac obseruasset libro decimo tertio capite primo, credit, vnguentum foliatum & malabathrinum esse idem, cum tamen magis Medicis credendum sit. Arabes autem ipsum vocant sedel vel sadegi, vt testatur Auicennas capite 288. & Serapio capite 33. quare illi decipiuntur, vt dicit Dioscorides, qui credunt malabathrum esse folium nardi indicæ, & credo hunc antiquum fuisse Flaccium, qui descripsit historiam maritimæ Indiæ ad Hadrianum Imperatorem, qui

Ordo Dioscoridi in hoc capite. Historia. Amatus vnde interpretatur.

Causa nominis interpretatur.

Notandum.

Aliud notandum.

facit tria genera malabathri, pleniusq; testatur species illas esse folia nardi. Brasavolus autem inquit, quosdam opinari medicamentum hoc esse lenticulam palustrem: nescio autem ego, unde hoc acceperit, & quis ita stolidus fuerit, quod hoc dixerit.

Reddit deinde Dioscorides etiam causam erroris illorum, quoniam odorem habet nardi: sed multa alia medicamenta sunt odorata, ut nardus, & tamen nardus non sunt, nec eius species. Subdit deinde Dioscorides, ut *plm* describens plantam, & inquit, aquaticam esse, & vnicum habere folium, natans super aquas, radix autem ignota est, & tam profunda, ut cognosci non possit. Non enim dicendum est, quod non adsint, ut aliqui credere, quoniam planta nec alteratur, nec crescit absque radicibus: lenticula enim palustris & ipsa habet radicales tenuissimas dispersas per aquam, viola etiam aquatica recentiorum. Præterea fungus habet radices manifestissimas & tubera: & omnia comprehendens paucis dico, quod omnes plantæ habeant radices, nisi tamen super alias plantas oriatur, ut viscus & aliqui fungi, scilicet arborei, aluntur enim hæc ab arbore ipsa: quare ego Dioscoridem sic intelligo, quod scilicet radices habeat occultas. Omnia autem quæ pertinent ad hanc historiam, non leguntur apud Oribasium, nec apud Serapionem, sed hæc sunt in omnibus codicibus Dioscoridis. Expossunt tolerari. Plinius vero facit duo genera malabathri, alterum ortum in Ægypto coloris albidum, non aridi, & sic correxit Cornarius: sed hoc etiam apud Plinium potest tolerari, ut arbor illa colore præferat ariditatem quandam, quoniam ariditas etiam visu cognoscitur cognito colore: quare non peccat lectio illa Plinii: inquit ergo, quod est arbor aridi coloris, & inuoluti folii, quod testantur ariditatem à Cælo.

Sed hæc prima Plinii species est valde distans à malabathro Dioscoridis. Secunda species indica est, & à Dioscoride descripta, unde omnes iubent, ut à prima specie caueamus, quam tamen non habemus: & quamvis superioribus annis ferretur per officinas sub nomine folii indi, omnibus tamen ignotum est, quid sit. Tertio ferebatur folium quoddam simile lauri cum pillulis, veluti lauri sub nomine malabathri, sed illi decepti sunt, quoniam reperiunt apud Galenum, Paulum & Aetium mentionem pillulæ malabathri, sed ipsi per pillulas intelligebant fasciculos, & manipulos malabathri. Vltimo aliqui folium garyophilli afferebant, & pro malabathro vendebant ubique: sed furtim deprehensum est. At Amatus Lusitanus, quamvis credant omnes docti viri nos carere vero malabathro, probare conatur, se habere verum malabathrum, delatum ex India, & esse folium illud dictum Bethre, quæ planta est descripta ab omnibus historicis Indiæ, & planta est fruticosa, & foliū habet viride, & conuoluitur planta hæc circa alias, ut conuoluelus, folium cuius est magnum, ut iuglandis, & nervulos habet aliquos. Sed decipitur Amatus, non enim est malabathrum Plinii primum, quoniam illa planta Plinii arbor est, at hæc fruticosa est: tertio folium non est conuolutum, nec expressum oleū emittit: addatis quod in Syria oritur malabathrum primum Plinii, hæc autem planta Bethra dicta oritur tantum in India, ubi mandunt concinuo folium plantæ istius, ad venerem excitandam, & roborandum cor, & omnia viscera, quæ non facit malabathrum primum Plinii. Vnde ego credo, quod hoc folium bethre vel bethel, vel bathrum sit tembul Auicennæ, de quo meminit cap. 707. præsertim cum vires correspondant: & referunt historici, quod hoc dicitur tambur ab Arabibus nigris: & sciatis nulla ratione nos posse dicere, hoc bethel esse malabathrum, imo dico, quod non habemus malabathrum. Præterea folium illud indum odoratum non est, & habet pillulas, nec folium garyophyllorum sunt malabathrum.

Cum autem malabathrum non habeamus, eius loco uti possumus nardo indica: nam non tantum easdem, sed etiam maiores habet ipsa vires. Electionem postea tradit Dioscorides, & similitudinem malabathri cum nardo indica, asserens, quod nullum habet salis gustum, quamvis Plinius dicat, quod aliquem habet salis gustum, & Ianus Cornarius conatur soluere contradictionem hanc, cuius tamen solutionis necessitatem non video: sed dixerim ego Plinium potius errare, quam Dioscotidem. Transiit deinde auctor nostro ad facultates, & inquit, quod habeat facultates nardi: quare Galenus loco malabathri nardum supponit, & ideo nos supponemus etiam. Auicennas autem cum vidisset

Dioscoridem, credidit hoc medicamentum calidius esse nardo, & ideo calidum esse in secundo gradu affirmat, unde & ego crediderim cum Auicenna malabathrum calidum in secundo gradu: sed quoniam hoc medicamentum non habemus, ut dixi, nihil aliud de eo proponam.

Cassia inter præcipua aromata est aptissima ad munus omne explendum. de hac autem Cassia multæ difficultates existunt, quoniam multas cassias habemus. Cassia similis est cinnamomo, cuius tamen nullam habemus cognitionem. Præterea historia de cassia est a antiquis ignorata: nam ex relatu scribebant antiqui, qui nec locum nec plantæ descriptionem habuere. Dioscorides ergo primo ponit descriptionem cassiæ, secundo electionem, ultimo vires. Cassia dicitur hoc medicamentum à græcis: à Serapione autem cap. 101. & ab Auicenna cap. 19. 4. Selica. Inquit ergo Dioscorides cassiā oriri in Arabia, quod tamen falsum est, nam cassia antiquorum est cinnamomum officinarum; quo stante, si verum est, quod scribunt recentiores, & videre de ipso cinnamomo, patet in Arabia cassiam non oriri. Theophrastus enim de cassia tractans libro nono de histor. plant. capite 9. ex aliis refert cassiam ex Arabia oriri, qui error communis græcorum omnium est: quare scitis nunc oriri tantum in India, & in Insula quadā dicta Zeita, secundo in Malabar: tertio in mutir, neque credatis oriri in Arabia, imo nec cognosci: nam pretiosum est medicamentum, & inferuit gulæ: & medicamenta, quæ inseruiunt coquinæ, amissa non sunt, sed magis ac magis indies innotescunt, ut piper, cassia &c. vnde mirum esset admodum, quod Arabia alias & retro actis temporibus produxerit cassiam, nunc vero non, vel ignota sit: nam habemus historias fidelissimas. Plinius lib. 12. cap. 29. ex Herodoto refert, quod cassia habebatur ex nidis auium, & præcipue Phœnicum; sed ecce, quomodo ad fabulas conuertuntur quandoque autores. Male autem quidem nobiscum ageretur, si tota cassia colligenda esset ex illis nidis: cum videtis ego onustas naues cum cassiatantum, cumque maxima copia cassiæ absumatur ubique: quare dixerim ego, quod vere antiqui non nouero cassiæ historiam. Nugæ etiā sunt Theophrasti, cum lib. 5. de hist. plant. multa de valle atque anguibus illis enarrat. Tractans autem Theophrastus de figura cassiæ, dicit esse fruticem paruum, lignosum, cum paruo cortice, atque nodos plures habens; at hoc dicit ex aliorum relatu. Galenus autem vidit plantam cassiæ integram. Nam dum populi ferebant munera ad imperatores suos, inter ipsa ferebatur pro munere valde preciosa rota cassiæ planta, sicuti lib. 1. de antidot. c. 1. dicit Gal. asserens longitudinem huius plantæ maiorem esse, quā hominis longitudo. Dioscorides dicit, quod corticem habet crassum: Plinius autē e contra dicit habere corticem tenuissimum, ut sit ex corticabilis: & hoc dicit etiam Theophrastus. Sed cum solus cortex ad nos deferatur, inquit quod lignum aufertur hoc modo: nam secabantur plantæ cassiæ in fructu, deinde in sacco confecto ex corio animalis nuper machati imponebant eas taleolas fructuabellas, & ita in ea vermes fiebant, qui lignum comedebant, relinquentes corticem tantum. Sed hæc nugæ: vnde nihil mirum dicit. Dioscorides autem inquit, quod habeat folia piperis. Plinius vero dicit piper oriri in Italia, & esse plantam myrto similem: ergo à primo ad vltimū cassiæ folia erunt similia myrto, vnde hæc habemus de cassia, sed omnia vana & erronea, (mihi parcant omnes, qui talia dixerunt) nam omnes fere & doctissimi viri dicunt canellam officinarum esse veram cassiā aromaticam antiquorum, & dicitur cinnamomum, quia pro ea supponitur, imo reperiuntur etiam sub nomine canellæ cortices cinnamomi confusi. Quare cum hoc constituerim, miror de Iano Cornario, qui quamvis doctissimus sit, ita tamen excæcatur, ut dicat cassiam ligneam officinarum esse veram cassiam, & cinnamomum officinarum esse verum cinnamomum. Est ergo cassia arbor orta in illis tribus Indiæ locis, iam ante à nobis dictis Malabar, mutir & Zeita. & omnes hist. pri, qui videre loca illa, & peragratunt à Cayro vsque ad Molucas, imo totum ambierunt orbem, testantur, cassiam in his tantum tribus locis oriri, cuius folia sunt veluti lauri, sicuti visa sunt sæpe in Italia, & etiam profert baccas veluti laurus.

Folia autem inodorata sunt præter pediculum, circa quem adest odor, & mirū non est: Nam etiam Plin. dicit cinnamomū virens esse in odorū, ramos deinde plures fert à truncō cortice satis crasso, in quibus ramis sunt folia & baccæ lauri. præterea absciunt ramos, & exponunt soli, & cum cortex rimas contraxerit, extrahunt, & tunc inodorus est cortex, sed post duos menses habet suauitatem illam odoris: & hæc vera est cassiæ historia. Electionem postea describit Dioscorides, & etiam nostram canellam, quæ non solum mordet, sed maxime mordet hæc nostra, ita ut ea possemus uti aut cauteria. Annotandum maxime esse discordiam inter Galenum & Dioscoridem. Nam Galenus vult eam primam esse discordiam inter Galenum & Dioscoridem. sed rufam. Ego autem potius cum Galeno consentio veluti viro peritissimo, qui expertus hoc sit, & viderit cassiam copiosam in scriñis suorum Imperatorum, & hæc dicitur cassia sulua, vnde locum corrigatis in libro 7.

Difficultas circa cassiam esse multam.

Cassia vera.

ubi oritur cassia.

Error communis græcorum.

Plinius facit casiam ex nidibus auium.

Theophrastus.

Descriptio plantæ ex Galeno.

Canellam vera esse veram cassiam.

Iani Cornarii error.

Quibus in locis nascitur.

Electio plantæ.

Discordia inter Galenum & Dioscoridem.

Cassia speciosa.

de compositione medicamentorum per gen. vbi facit mentionem sicca, cum omnis sit sicca, sed vos loco illius vocis siccam fuluam restituatis. Plures autem sunt cassiæ species, quæ reperirentur in saccis nostri cinnamomi, si eas perquireremus cum diligentia. Post veram cassiam habemus etiam pseudocassiam, cuius habemus corticem, qui inodorus est, & niger, & similis etiam est cassia: & de hoc locutus est Galenus, & forte Theophrastus de cassia hac illa verba dixit de verbis, quilibet erodunt, nam hæc integro ligno habetur. Hanc autem pseudocassiam, credo ego cassiam illam ligneam, & Syringam Galeni, & cassiam fistulam Nicolai Myrepsii: in qua dubito, an Fuchsius deceptus sit, cum credat, hanc cassiam Nicolai esse cassiam illam nigram, cum intelligat Nicolaus cassiam fistularem, & pseudocassiam, & huius descriptio proponitur à Dioscoride, quæ facilis est.

Facultates veræ cassiæ consistunt in partibus calidissimis, & terrestribus quibusdam adstringentibus: calida enim in tertio gradu, intenso tamen, quoniam exurit, & facit sensum aucti ab ipsa, quare sapit naturam quarti gradus, & nisi adessent partes illæ terrestres, esset medicamentum causticum: exemplo sit vobis oleum ex ea educum, quod acrem nem maximam habet, & vesicas facit, etsi odoratissimum sit magisque quam moschus. Educimus etiam ex ipsa cassia aquam suauissimam, quam alias vendebant aliqui pro aqua florum canellæ, & vendebant ob id magno quidem precio. Nos etiam possumus facere ex puluere cassiæ huius cum aqua vel vino liquorem suauissimum: sed melior est cum aqua; & præstantissima est hæc aqua in affectibus vteri, & aliis affectibus frigidis, neque opus est aqua rosacea, neque alio medicamento, sed sufficit aqua cocta. Facultates autem omnes cassiæ notæ sunt omnibus ex ipso Dioscoride. Quoniam autem cinnamomum copiosum non habebatur, inquit Dioscorides, quod antiqui apponebant duplex pondus cassiæ pro cinnamomo, sed Quintus hos deridebat, ac dicebat Galenus, quod potius ipsæ Quintus deridendus sit, nec eius ratio valet, ut probat ipse in medicamentis compositis. Et hæc de cassia dicta sufficiant.

De Cinnamomo.

CAP. XVII.

Cinnamomum nomen.

Locum ubi oritur.

Planta descriptio.

Antiqui non nouerunt cinnamomum nec cassiam.

Cinnamomi varietates genera & sectiones varietates.

Opinio propria de cinnamomo.

Cinnamomum in eodem aromaticorum genere reponitur, & cinnamomum hoc est præciuosissima cassia, quod etiam dicitur cinamum, & ab Arabibus Darseni, de quo loquens Dioscorides, dicit cinnamomi plura esse genera. Deinde electionem proponit & vires, & de pseudocinnamomo agit etiam. Ex Plinio autem & Theophrasto diximus cinnamomum oriri in Arabia felici, sicut cassia ipsa, ac in locis inferioribus oritur cinnamomum, non autem in montibus ut cassia: & præterea oritur cinnamomum inter spinas, & est fruticosa planta similis viteli, & magnitudine constat duum cubitorum ex Plinio. Sed Galenus libro primo de antidotis inquit, quod sit admodum tenuis hæc fruticosa planta, & ramos habet pedales tantum. Præterea Galenus inquit in eodem capite, quod ferebatur arca longa quatuor cubitorum cum dimidio, in qua erat planta integra cinnamomi, quare coniectura assequi possumus, quod planta sit longior. Sed Strabo dicit, quod Indi soleant vi ad ignem excitandum arbore cassiæ, & cinnamomi ex quibus omnibus colligere possumus, antiquos non nouisse cinnamomum nec cassiam, quod patet ex tot fabulis ex ipsis dictis. Habuere ergo antiqui etiam plantas integras, & Galenus, sed non cognouere, vbi oriuntur plantæ ipsæ. Medici autem describunt plantam cum radice, quia viderunt ipsam, ut Galenus & Dioscorides. Planta autem erat tenuis, cum plurimis virgis & sarmentis: sed de loco ignari fuere penitus meo quidem iudicio antiqui. Hoc autem non dico ego ad delendam eorum authoritatem, sed ut meam simpliciter & recte proferam sententiam. Huius medicamenti quinque genera facit Theophrastus. primo enim proponit vnam plantam, quæ habet ramos dodrantales, secundo aliam, quæ habet ramos minores, tertio iterum aliam, quæ habet ramos adhuc minores, quarto adhuc minores, & quinto tenuissimos. Diuidit deinde cinnamomum in album & nigrum. Et hæc diuisio acceptatur à Plinio, quia eius tria genera facit, candidi, nigri & varii. Galenus etiam in libro de theriaca ad Pisonem quinque genera enumeravit cinnamomi, & ea descripsit. Dioscorides etiam quinque cinnamomi genera proponit. Amatus Lusitanus in hoc loco testatur, se adiuuasse à quodam fide digno, quod in Zeila Insula Indiæ cinnamomum oritur, & dicit plantam esse quatuor digitorum crassam, cum sex aut septem ramis, qui quotannis exciduntur, & cortex seruatur ad usum, folia sunt iuglandis, quæ alias vendebantur pro malabathro. Scio ramen ego, quod hæc historia non consentit cum Galeno nec cum aliis, quoniam describunt tenuissimam plantam non arborescentem, quare nescio quid credam.

dam Amato: credo tamen, quod habeamus verum cinnamomum: sed abundantia rei nos decipit equidem: nam cassiæ plantæ in thesauris imperatorum reponerantur, ac nostris temporibus reges hoc irrident: credo ergo nos habere cinnamomum confusum cum cassiâ. primo enim cum canella ipsa habemus corticem tenuissimum, leuem, expolitum, non ita acrem, ac habentem notas omnes cinnamomi, quare cortex hæc verum mihi videtur cinnamomum: habemus quinetiam cortices crassos, qui habent naturam, & notas cassiæ: atque etiâ cortices mediocres sapientes utriusque naturam. Quando autem antiquis ferebantur hæc plantæ, ferebantur integræ, qui tamen utebantur tantum cortice, & hoc patet, quia describunt totâ plantam, nos autem habemus tantum cortices ipsos detractos & siccatos: unde mirum non est, si decipiamur, nec possumus recte distinguere hæc medicamenta, quia habemus tantum corticem. Quod autem me ad hoc credendum mouet, est vna suspicio, quod vna & eadem planta fuerit cinnamomum & cassiâ. Nam cinnamomum differt tantum à cassiâ, quoniam est minus crassum, & magis me firmat Galeni autoritas, qui ex planta cassiæ colligebat cinnamomum iam virgultis teneris, unde dum cassiâ est parua & tenella, est cinnamomum, & habet corticem tenue, & leuem, & minus acrem. Dum vero planta crescit, fit cassiâ, quæ corticem habet crassiore: & hoc coniectura assequor, & quotannis facit ramos nouos & tenues, qui possunt esse materia cinnamomi ipsius, quoniam corticem habent leuem, & sic Galenus in cassiæ planta poterat repetire etiam cinnamomum. Hæc autem opinio confutatur ab ipsis, primo, quia antiqui habebant cum ligno cinnamomum, nos autem habemus tantum corticem: sed nec cassiâ haberemus, quoniam corticem solum habemus.

Præterea arguunt, quod cassiâ parua non sit cinnamomum, quoniam Galen. inquit, quod cassiâ vertitur in cinnamomum, non autem, ut dico ego, cinnamomum in cassiâ. Sed Galenus est interpretandus: nam omnes versiones sunt, aut per corruptionem, aut per vtheriorem concoctionem, unde ex feno fit latamen, per corruptionem ac putredinem, ex pane autem fit sanguis & caro per concoctionem. Quæro ergo, quando ex chalcanto, fit chalcitis, quomodo fiat? certum est, quod sit per concoctionem, per putredinem autem ex pyritide fit biphrites. Quæro pariter in cinnamomo factum in cassiâ, velex cassiâ, quomodo factum sit ipsum cinnamomum: non per corruptionem, quia perfectius est cinnamomum ipsa cassiâ. Ergo per concoctionem: at si per concoctionem, cur magis est concoctus tenuis, quam tota planta? quare non credatis ex cassiâ fieri cinnamomum per conuersionem, sed quod ex ramis cassiæ sunt rami tenuissimi, qui sunt cinnamomi plantæ, nec cinnamomum oritur in plantis aliis, ut viscum, unde credo ego, quod tenera cassiâ est cinnamomum, vetus autem sit cassiâ ipsa, unde plantæ delatæ tunc temporis ad imperatores cassiæ ipsius, habebant etiam cinnamomum, quod est cortex tenerior ramorum tenuiorum cassiæ: & hæc dicta sint tamen à me ex coniectura tantum non autem scientia; nullam enim ad hoc demonstrationem habeo.

Dioscorides inde promit electionem, & notas probi cinnamomi, & potissimum primi, quod vocat mossylicum ab aliquo loco, vbi oriebatur, de quo Galenus locus citatis egit abunde. Secundum proposuit genus, quod dicitur montanum, quoniam in montibus oriebatur, de quo itidem Galenus egit. Tertium addit genus, de quo etiam Galenus egit inquit, quod sit nigrum, & fere fibrosum. Quartum vero genus candicans est friabile, fungosum cum cortice cassiæ, & corticem habebat crassiore: unde colligo vetustatem distinguere inter cassiâ & cinnamomum. De hoc etiam quarto genere Galenus loquitur, & inquit habere radicem paruam, cum tamen sit legendum magnam habere potius radicem.

Addit & quintum genus, de quo etiam Galenus egit. Vires autem notæ sunt, & electio pariter. At notandum est circa textum Dioscoridis, quod vbi dicit *deligito scabrum*, candicans, rugosum, non est ita legendum, sed relicto *scabrum rugosum*, quia in re solus Cornarius recte transtulit, maleque Ruellius & Virgilius Marcellus. Male enim iacet vox illa *deligita*, loco cuius legendum est *relicto*. Proponit deinde Dioscorides cinnamomum falsum; in quo tamen verba Dioscoridis multum inuoluta sunt; videtur enim loqui etiam de xylocinnamomo & pseudocinnamomo, tanquam de vna & eadem re, cum tamen diuersa sint medicamenta ex libro de theriaca ad Pisqnem. Attamen si Dioscorides recte consideretur, facit & ipse inter hos differentiationem, nam pseudocinnamomum differt specie à vero cinnamomo: xylocinnamomum vero differt genere à legitimo cinnamomo. Quare recti decipiuntur, qui credunt lignum cinnamomi esse xylocinnamomum: quoniam Dioscorides inquit differre toto genere.

Reliqua omnia à Dioscoride dicta in hoc capite spectant ad facultates, quæ, quoniam non sunt, omitto, hoc tantum colligens, quod habemus corticem tenuissimum in cancella coloris cineritii: qui est veri cinnamomi cortex, cortex autem crassius est vera cassia, mediocris autem est aliqua species cinnamomi, cum differant tantum per magis & minus species illæ cinnamomi, quare vos ex vobismetipsis reliquas in hoc capite videre poteritis facultates cinnamomi, & quæ etiam ad ipsas spectant ex eius dictis abunde satis elicientes. Hoc itaque omisso deueniendum est ad tractationem de amomo nobilissimo aromate.

De Amomo.

CAP. XVIII.

*Dioscorides
obscure in
hoc capite.
Nomen.
Interpret
error.*

Sequitur Dioscorides agens de amomo nobilissimo aromate apud antiquos: sed ita inuolure & obscure agit de ipso, ut adhuc ex eius verbis non didicerimus, quid sit hæc planta.

Describit autem primo plantam, secundo species enumerat, tertio facultates, quarto adulterium & sophisma ipsius. Hoc medicamentum autem ab Auicenna vocatur hammama cap. 52. Serapio vero cap. 179. appellauit ipsum amamis, in qua re errorem notare interpretis, qui transtulit de pede columbino, cum debuisset transfere de amomo. Pes enim columbinus est, vel granii, vel barrachii species. Amomum ergo planta est palmatis & exigua, & ex se conuoluitur in lignum: hoc autem difficile est intelligere. Miror autem ego vnum, quod scilicet video Dioscoridem describere figuram racemi totius plantæ: alii autem scriptores videntur facere racemum distinctum à planta: vnde, ut vetum fatear, nescio ego diuinari, quid sibi velit per illa verba Dioscorides: multi multa dixere, sed non absolvere difficultatem. Flores sunt albæ violæ, folia viciis albæ, quamuis Plinius assimilet folia ammomii foliis punici mali, vnde nescio quiddam de hoc. Plinius ramen libro duodecimo, capite 13. eadem proponit, quæ proposuit etiam Dioscorides. Aliqui credidere rosam hiericonis vel beatæ virginis dictam esse amomum, quoniam cum radice vellitur, & est palmatis, nam etiam lignosa est & conuoluta. Ex Syria enim ferrur cespes quidam lignosus, paruus, conuolutus in se ipso, ac si faceret orbem, qui quidem partes exteriores habet lignosas, intus habet folia, & flores, & est planta hæc in maximo precio apud mulieres parturientes, quoniam faciliat partum. Sed notare, quod si semel post madefactionem siccata sit hæc rosa, non amplius aperitur. Hæc autem planta amomum non est, ut credunt ipsi, quoniam lignosa est, dura, sine odore, non racemosa, nec folia habet correspondentia. Alii voluere esse amomida, id est, falsum amomum, quod tamen ego non ausim confirmare, superioribus autem annis delata fuit planta quædam, cuius folia odorata sunt, sed planta illa potius relata est & referenda. Alii aliam similem illi attulere, quæ nec amomum est, licet aliqui eam pro planta piperis vel amomo vendant, ea enim planta altior est, quare fateor, quod hucusque non viderim amomum. Notandum est autem, quod descriptio hæc Dioscoridis apud Oribasium desideratur. Sed cum ea sit etiam apud Arabes, credo legitimam esse. Laudat deinde etiam Dioscorides armenam plantam & præstantissimam, cuius meminit etiam Plinius, proponitque Dioscorides duplicem speciem, quæ nascitur in Media in aquosis locis, nec est adeo præstans amomum, ut prius erat. Theophrastus lib. 9. histor. capite 7. de hoc mentionem habet, credoque legendum esse in Dioscoride, quod habeat odorem rutæ, & saporem origani, quod ego colligo ex Serapione. Nostri autem seplasiarii inuenere semen quoddam paruum, nigrum, simile nigellæ, quod volunt esse amomum, ar nescio ego hoc diuinari, num omnes scriptores de racemo meminerint. Tertia species est amomi ponici, quod est subrustum, non magnum, nec tamen admodum paruum, sed mediocre, racemosum, nec fragile: Oribasius abicit negationem illam, nec, sed quicquid sit, res ignota est, non multum igitur in ea laborandum. Credo autem ego Scythicum amomum à Galeno nominatum idem esse, atque vnum: Scythæ enim magnam partem Ponti occupabant. Docet deinde Dioscorides electionem amomi, & eligit recens, candidum, subrustum, quod reprobat à Plinio, qui dicit candorem à vetustate provenire: quare ut hos coniungam, dico duplicem esse candorem in hac planta, alterum naturalem, alterum à vetustate provenientem, qui pessimus est. Auicennas autem voluit, quod inclinaret in album & rubrum præstans amomum, qui color subalbidus dicitur à græcis, & hoc forte à Plinio sumpsit. Dioscorides deinde alias notas præstantis amomi ponit, postea facultates, de quibus Galenus lib. 6. de comp. med. sec. loc. cap. 1. dixit, quod discutit, adstringit, & siccatur, & habet omnes a cori vires: vnde siccum est amomum, est amomum in tertio gradu incipiente: quare loco amomi possumus uti radice acori, & calamari aromatici officinarum. Amomum a duleratur planta simili, quæ

*Rosa beata
virginis.
Historia.*

Impatiens.

*Amomum
verum non
habetur.*

*Seplasiarii
falsum amomum.*

Electis amomi.

Amomi verum.

Substitutum.

quæ dicitur amomis, sed est planta sine odore & fructu, quare rosa illa hiericonis non est amomum: nam profert semen, nec folia habet origani.

*Resa hieri-
coni non est
amomum.*

De Balsamo.

CAP. XIX.

Ubi Dioscorides de medicamentis tractare instituisse, non immerito incepit ab aromatis, tanquam à nobilioribus, & viribus, & odore, & gustu, & similibus notis ceteros antecedentibus. Adde quod in aromaticis quædam ingenua vis occultalacet, quæ venenis resistunt eorum vim deleteriam reprimendo; ideoque non immerito principem locum obtinent. Et quoniam istorum aliqua externa sunt, aliqua in nostris nascuntur regionibus; incepit à nostratibus ab iride scilicet, acoro &c. postea ad peregrina sermonem conuertit; inter quæ liquor balsami est hic tractandus: Balsami inquam rei mirificæ, non solum à communioribus scripturis, sed à sacris paginis celebratæ. Primum autem describit plantam; secundo lachrymam, tempusque collectionis; tertio quomodo alteretur, ut cognoscatur bonum ab adulterato. Quarto agit de ligno, & tota planta. Quinto de fructu necessario in medica materia. Sexto, & ultimo explicat vires omnes tum liquoris, tum ligni, tum etiam fructus. De quibus omnibus huic eidem ordini inhzrentes succincte & breuiter Dioscoridem interpretantes agemus.

Balsamum ab omnibus Græcis *Balsamum* dicitur, excepto Paus. lib. 9. qui vocat *trachin*, at hoc nihil refert. ab Arabibus *belsan* vocatur, ex Aul. appellatur etiam *bellesem*, vel *bellestina* à Serap. cap. 160. quæ omnes voces deductæ sunt à Græco idiomate. Nostri latini balsamum nuncupant, quicquid loco balsami substituitur; quoniam reuera non habemus, nisi substituta figmenta fictitia: licet aliqui verum balsamum habere contendunt.

Ex verbis Diosc. colligimus inter arborescentes plantas locum habere balsamum, habere enim dicit perpetuos caules, ramos & folia, herbarum autem habent isthæc spatio vnius, aut ad summum duorum annorum: & hæc est causa, propter quam balsami planta connumeratur inter arbores: non quia altitudinem magnam proceris arboribus non assimilem habeat: quoniam est magnitudinis albae violæ, quæ attollitur in moderatam & breuem altitudinem, sed Plinius inquit, balsamum crescere ad altitudinem duorum cubitorum, quæ valde maior alba viola. Paus. loco citato dicit esse similem altitudinem myrti. Theophrastus dicit esse magnitudinis mali punice, & in hoc notare, quod malus punica habet duplicem altitudinem: alteram naturalem, alteram arte paratam. Naturalis non excedit altitudinem hominis: sed si malus punica truncetur circumcirca, expurgatur caules illi suberescentes: & sic magis proceræ. quum ergo Theophrastus dicit hoc, intelligit malum punicam naturalem habentem magnitudinem, & ita consentit cum magnitudine proposita à Paus. si igitur ab his scriptoribus talis proponitur altitudo, certe proposita à Dioscoride magnitudine maior erit. Sed Virgilius Marcellus, qui primus Dioscoridem transtulit, credidit textum corruptum, & vult, ut expungatur vox illa *alba* cum habeamus Serap. qui transcribit omnia à Dioscoride dicentem habere magnitudinem grani viridis, id est Terebinthi: quoniam eadem est quantitas terebinthi, myrti, & mali punice. Auic. etiam loco dicto asserit, habere lycii magnitudinem, & lycii planta numeratur inter arbores paruas. Vnde miror, quomodo hi transferentes Diosco. ponant utrunque, scilicet albam violam, & lycium. subiungit Dioscorides, huius proceritatis esse pyracanthem, quod quid sit, ignoratur. Hæc vox legitur in Dioscoride cap. de primo mespilo: aliqui volunt, ut legamus pyracantha, id est spinam buxæ, nam est arbor, quæ profert lycium; ita ut non notes aliam plantam distinctam à lycio. nam planta vocatur pyracantha; lycium est liquor profluens à planta ista; & certe non esset præter rationem, quod si vos volueritis non apponere hanc vocem pro expositione, ponatis pyracantham. legite Diosc. in c. de oxyacantha. i. acuta spinâ, quæ dicitur pyri, ex hac voce facta est vox composita pyracantha, id est, spina acuta, quæ numeratur inter arbuta, & paruas plantas: hoc credo quod velit dicere Diosc. si pyracantha legatur: sed prima lectio magis placet. Præter magnitudinem propositam à Diosc. Plin. addit formam: in genere enim plantarum paruarum aliquæ non subsistantur per se, veluti etiâ quædam magnæ, ut vitis, quæ dâ subsistant se: plâta iasmini arborescit, ita vepres, & rubus caninus &c. & oportet subsistari: aliquæ vero per se stant, ut rosmarinus, alba viola, &c. ista planta balsami quam formâ habet? Respondent: similis est viti, & disponitur per scrobes assumtis malleolis, & per se ipsam subsistentur, non opus habens palo, aut alia planta subsistente: Habita magnitudine & aspectu, Diosc. folium explicat, dicens, habere folium rutæ proximum, candidius

Propositi.

Ordo.

*Varian-
tina.*

*Lib. 9. Trach.
scap. 1.*

*Descriptio
naturæ.*

*Lib. 12. c. 37.
Lib. 9. c. 6.*

*Duplices
altitudo mali
punice.*

*Forma sua
aspectum.*

In Loc. sp.

In Reg.

In Reg.

Pausania,

Strab.

opinio.

Recentiores

opinio.

Pid. Seb.

Munf. lib.

1. in Reg.

in dictis.

Terre. nam

lib. 6. cap.

prop. cum

1. 4. cap. 31.

P. in Reg.

P. in Reg.

P. in Reg.

P. in Reg.

P. in Reg.

P. in Reg.

P. in Reg.

P. in Reg.

P. in Reg.

P. in Reg.

P. in Reg.

P. in Reg.

P. in Reg.

P. in Reg.

P. in Reg.

P. in Reg.

P. in Reg.

P. in Reg.

P. in Reg.

P. in Reg.

P. in Reg.

P. in Reg.

P. in Reg.

P. in Reg.

P. in Reg.

P. in Reg.

P. in Reg.

P. in Reg.

P. in Reg.

P. in Reg.

P. in Reg.

P. in Reg.

P. in Reg.

P. in Reg.

P. in Reg.

P. in Reg.

P. in Reg.

P. in Reg.

P. in Reg.

P. in Reg.

P. in Reg.

P. in Reg.

P. in Reg.

P. in Reg.

P. in Reg.

P. in Reg.

P. in Reg.

tamen, & semper virens. Recentiores, vt Ioannes Leo inter Historicis celeberrimos Africanus describens totam Africam optimo ordine dicit habere folia vitis: Non possum reperire aliquem, qui mihi in re Geographica, eo magis satisfaciatur, quem voluit Deus fieri Christianum: sed non consentio cum eo: quoniam omnes vna uim dissentunt. Theophrastus probat sententiam Dioscoridis, addit enim esse multorum ramorum, & plurimifcarere furculis, ex quibus folia subalida, id est parum excedentia folium rutæ in candore. Plinius omnia sumit à Theophrasto, sed candoris mentionem non facit. Per folium rutæ vnicum intelligimus folium, quoniam natura foliorum rutæ est, quod aceruat tria, vel plura simul, non ergo totum aggregatum, verum foliolum vnum accipimus. Sed ego sequor Pausaniam, & Strabonem sententiam. Inquit Pausanias habere folium samfuchi, maioranæ. Strabo describens plantam, dicit habere folium cythi, quod habet eandem figuram, sicut, & lanuginem cum folio samfuchi: & omnes scriptores consentiunt habere lanuginem, folium balsami. Recentiores id etiam confirmant. Quidam enim Pedemontanus fuit in Aegypto in hortis Solis, ubi vidit balsamum. Moueor autoritate cuiusdam Capitanici Poloni insignis, qui circuegit plurima orbis loca, & vidit Sanctissimum Christi sepulchrum, & que plantas balsami in pomario Cairi: & affirmavit habere effigiem samfuchi: & ideo venio in hanc opinionem, quod planta samfuchi folium habeat, quamuis folium rutæ simile sit folio samfuchi: excepto, quod oportet addere lanuginem. Nec miremur de Theophrasto & Dioscoro, quia transtulerunt ex aliis. Postea Dioscorus prodiit loca, in quibus nascitur, quæ duo sunt. Iudæa scilicet, & Aegyptus. Vnde deceptus Plinius, qui inquit tantum reperiri plantam in Iudæa: fallitur etiam Solinus: cum falsum sit tantum in Iudæa prouenire. Sciamus tamen, quod ista planta non proueniebat sua natura in Iudæa, quoniam iam nasci desit: ego enim credo semper homines tales fuisse, quales nunc sunt, ita dico de plantis, quæ profertur à regionibus sibi propriis: Habeo & autoritates: nam hi scriptores, qui in Solinū commentaria ediderunt, referunt ex scriptoribus Hebræis, quod inter illa aromata, quæ dedit Regina Sabe Salomoni, fuit planta balsami, quam Salomon collocavit in hortis propriis Regis: & ita cultu ferax facta est in Iudæa: igitur aduenticiam dico plantam illam, sed demus, quod etiam prouenerit sponte in Iudæa: habemus tamen ex historicis istis, non solum in Aegypto, & Iudæa: sed in Arabia etiam oriri: si non vultis credere in nominatis autoribus: credite Straboni dicenti nasci in Sabæis. Addit Pausanias nasci in Arabia, & custodiri à copia Serpentum, & draconum: an vero hæc vera sint, vel non: iudicate vos, ego dico tria esse loca: prima est Arabia, secunda Iudæa, tertia Aegyptus. In Iudæa dicit Dioscorus prouenire in quadam valle, dicit Theophrastus in valle geneserinde nascitur hæc planta, & hanc dicunt esse circa lacum genezareth. Strabo ait, nasci in hortis prope Ierichonem, in quo erant duo viridaria, de quibus sacra pagina mentionem facit: & hi vocabantur horti Regis. Et quando capta est Hierosolyma, cum viderent Iudei plantam illam nobilem, noluerunt, vt ad impios deueniret Romanos violantes templa, thesaurus hic tandem capta sunt loca, & factus ex balsamo prouentus maximus: & adeo creuit, vt vilis deueniret planta illa. De ea autem, quæ nascitur in Aegypto Dioscorides non facit mentionem loci: sed Auicenna dicit in hortis Solis nasci: sed est in Cayro, ubi est hortus, in quo est puteus, habens aquam dulcissimam, qua irrigantur vniuersæ plantæ, & vocatur hortus magni Regis: ab Auicenna hortus Solis. Nostri Christiani, & Arabes dicunt miraculo subortum fontem. Nam cum MARIA mater Domini Herodem fugeret, voluit lauare Puerum, & sic miraculose factus est puteus. Refert Petrus martyr, cum peruenisset ad locum illum vidisse hortum, & plantam balsami perquisiuisse, eamque non inuenisse. Retulerunt Arabes causam ad corruptionem Putei, quoniam mulier Hebræa menstruata minxit in puteum, & sic aqua vires amittente, exicata, & arida facta est planta. Multa referunt Historici, quæ nec ipsi credunt. Quod mulier omnium bonorum destructioni intendens id facere potuerit, credo: sed quod fons amiserit vires, non credo. Accedit quod multi post Petrum Mart. viderunt plantam illam, vt Polonus ille comes Palatinus. Potest tamen esse, vt Petrus non viderit, aut quia fallaces illi Arabes imposuerunt ei: aut quia non est naturalis Planta Aegypto: quoniam retulit ille Polonus, se vidisse ministros plantantes eam, qui referebant delatam germina Mecha, quæ est nobilissima ciuitas Arabiz: Dicuntque quod Arabes deferunt ex sterilibus locis ad arcem Mahometi, sacerdotes colligunt, & mittunt in Aegyptum ad colonos Regis, propterea quod in Arabia non profert lachrymam, sed in Aegypto: cuius dimidia pars seruatur pro Principe Turcarum: aliud dimidium Mecham mittitur pro inunctione partis Templi. Vnde ego colligo huiusmodi plantam esse propriam Arabiz: & quod fuerit primo delata in Iudæam, vltimo in Aegyptum, ubi liquorem profert. Sed notate, quod Lusitanus refert

O. in Reg.

P. in Reg.

refert in Indiis occidentalibus oriri plantam balsami, quæ habet similitudinem pini. Nescio quomodo hic semihebræus voluerit assimilare balsamum pino, cum nemo scriptor mentionem pini fecerit: sed quidam liquor ex orientalibus defertur Indiis, quem Lustrani afferunt: sed reuera balsamum non est: glutinat tamē vulnera, fragrantem odorem spirat, & alias multas notas habet balsami. Ex occidentalibus Indiis affertur liquor Syriacis calamitz, qui non habet multas notas balsami: ideo renete non esse verum balsamum. Balsamum ergo crescit ad hominis magnitudinem, aliquando habet figuram vici, sustentat se: frondes perpetuo virent, pilosæ, ad similitudinem sampsiuchi, odorem spirantes. proferit fructus, qui habent similitudinem rerebinthi. Polonus ille referebat se non vidisse in

*Lustrani
error.*

Epiloge.

10 planta.

[Balsamum plantam vocat & succum, ex planta confundens ramem, ideo sciat, quod balsamum arbuscula est: opobalsamum succus est. nam *iris* succus dicitur: xylobalsamum lignum balsami, *hanc* est lignum. Carpobalsamum fructus est balsami, *supra* enim Latine fructus.] Dictum est qualis forma, altitudo, & facies rotius plantæ: quibus in locis reperiretur, in tribus scilicet, in Arabia, in Iericonite, & in Aegypto: addebam talem plantam adueniam in Aegypto, & Iudæa: Indigenam Arabiæ, ubi non proferit lachrymam: sed oportet deferri in aliam regionem, & hoc non mirum, cum habeamus plurima similia variantia propriam naturam ratione regionū, veluti est persica, quæ in Perside venenatos, in Aegypto eius aptos, proferit fructus: ideo non est mirum, si balsami planta in ea regione, in qua nascitur, non proferat lachrymam, & alibi proferat, dixi habere folia aut sampsiuchi, aut cythi pilosa, odorato ligno, folio, cortice, & fructu. Vnde coloni conficiunt balsamum, quod communicant Principibus: quia sapit naturam veri balsami. ex quo colligatis vos, nos habere verum balsamum antiquorum, & non habere. non habemus: quia non circumferunt lachryma illa: nec est aliquis aut Rex, aut Dux qui de hoc possit gloriari: quia cautum est vita, ne gutta communicateur alicui: Tamen nostri Principes habent illud arte factum, ex eadem materia coctæ, & elictum arte, non ab ipsa natura. Accipiunt enim folia, & ramos viridiores, quos in vase æneo aqua pleno incoquunt, donec absumatur aquæ magna portio, & in suprema superficie aquæ inueniunt liquorem succeretur odoratum & iucundum. & hoc habetur in Ecclesiis nobilibus pro oleis sacrandis: & apud Principes, & hoc est eiusdem ferme notæ cum vero. Nam ut referebat quidam Pedemontanus, (& ut ego vidi) talis est naturæ, ut rerebinthinam, vel oleum abiecinum referat: color ex albo in luteum: quod si attingitur digito, hæret: sed non ita, ut rerebinthum: odorem habet: sed sapit quid inueteratum, rancidum, atque nescio quid mixtum habet. At si quis vellet conferre: non inclinari in resinosum, quia proprium habet odorem, sed non ita iucundum, ut alij testantur.

Adulteratum balsamum, quod circumferunt.

Sed præter hæc scire debetis, quod nostris temporibus circumferuntur gemini liquores, qui habentur pro balsamo: alter ex Orientalibus Indiis, alter ex occidentis. balsamum occidentale oritur in regionibus reperitis ab Hispanis: de quo loquens Amathus Lusitanus dicit esse lucidi coloris, & manare ex arbore similitudinem habente cum Pino. Quæ omnia credo falsa, quoniam semper assuevit dicere falsæ doctrina eius bona est, sed audacia istam meretur poenam. in Centuriis eius tot sunt mendaciæ, ut vix credam tantum hominem potuisse illa dicere. De Historia plantarum, Deus scit, quæ dixerit. sed etenim Gonzalus Ferrandus vir celeberrimus, qui scripsit ocularem & mirabilem Indiarum historiam ad Impetratorem Carolum, dominum illarum regionum, lib. 1. suæ hist. cap. 3. loquens de isto balsamo refert, quod sit liquor pinguis, vii oleum crassius substantia, quod arte educatur, non natura erumpat. Nam accipiunt lignum illius arboris, & incoquunt in aqua, & concretiscentem liquorem supra aquam colligunt, hic autem coloris est subnigri, ut videatur sapa. Balsami nomine donatur ob miras, quibus præditus est, vires. nam præter quod in frigidis adiuvat, adeo conglutinat vulnera, & sistit sanguinem, ut mirum sit: & tanta est vis, ut tardius imponendus sit liquor iste, ne iterum oporteat aperire vulnus, ut defluat materia. Arbor huius ligni est ad piri magnitudinem, scabiosa, & squalida, ita ut sicca videantur folia, & mulantur mali puniceæ folia, sed tenuiora sunt: lignum odoratum est, & in taleolas diuiditur: ita pingue est, ut videatur lignum ex rædæ: Vnde Indi vtuntur ad piscationes nocturnas loco lucernarum, & candelarum. Talis est historia balsami huius, cuius nunquā portiunculam vidi. atramentum credo huic viro. [Scribit Gardan. lib. 8. de subtilitate, ex Insula Hispaniola deferri genus balsami colore iuiubarum, splens dens, ac tenax, odoris suauitate admirabili. arbor aurem, quæ oleum istud parit Goacomax, puniceæ forma, & magnitudine ferme similis, sed follo paulo maiore, & ideo, quamuis huic compareret Theoph. non propterea crederem esse verum balsamum.]

Balsamum nunciatum ex Ind occidentalis. delatum. Lusitanus nomen.

Gonzalus Ferrandus.

Balsamum occidentale quomodo paratur.

Arboris ex qua balsamum Indicum deferitur.

*Balsamum
orientale.*

*Itic est ille
Guilandinus,
qui
Theophrastum
scripsit, in
quo centum
Matthiolum
errata deteguntur.*

Est & balsami orientalis usus etiam, quod affertur à Lusitanis. nigrum est colore, odore prædium suavi, æmulans stircis fragrantiam; unde aliqui statim esse opinantur. Dedit mihi huius portiunculam mercator Mediolanensis, qui referebat in Calecutio accepisse; sed nil aliud potuit extrahere. habet mellis spissitudinē, & ostendam vobis. Deus præstet, ut solers simul & vaser Guilandinus, qui iam capescit iter ad Indias Orientales, redeat ad nos incolumis; quoniam cum & doctissimus, studiosorum omnium gratia patri paratissimus sit, atque oculatus adeo, ut linecos oculos habere credatur, istius balsami veritatem nobis afferret, quod erit studiosis omnibus utilitatis immodicæ. Nam cum peragrarit Arabiā, communicauit mihi multa aperta, & conculcata. etenim hucusque incepit scribere commettaria, & imposterum, si felix succedet ei reditus, prosequetur, atque optatissimo suo labori coronidem imponet.

De Balsamo artificiali.

C A P. XVII.

*Balsamum
artificiale.*

Hæc habeo quæ dicam de balsamo. Quibus addatis balsamum artificiale, quod est chaos quoddam; omnes enim fere teniarunt. habemus compositionem apud Mesuem in libris chymistarum. Habemus Io. Baptiste Rom. descriptionem; quare ego omitto, ne hunc vel illum offendam. Hoc etiam habetis apud excellentissimum Matthiolum; sed sciatis, quod omnia sunt figmenta [habes descriptionem balsami artificialis apud Gardanem libro 10. capite 50. de rerum varietate. Item apud Philippum Vistadium in 10 lib. de secr. nat. cap. 21. Magister Arnaldus de Villanova huiusmodi oleum vires balsami habere contendit. Recipe oleum terebent. olei communis antiqui, olei laurini ana lib. i. cinnam. vnc. iij. eufragiæ, garioph. ana vnc. ij. baccharum lauri, gummi, hederæ ana vnc. i. ladani, thuris, masticis an. vnc. i. omnia prædicta pone ad destillandum. Hoc oleum est maioris virtutis quam balsamum ipsum. valet contra morsum scorpionis, canis rabidi, serpentis, & contra illos qui multum dormiunt, & venenati sunt, bibendo illud cum vino calido, valet contra tremorem membrorum, contra morbum caducum, stranguriam, dolorem dorsi, scrophulas, lachrymas oculorum vngendo tribus vicibus supra frontem. Item contra illos, qui non possunt loqui, ponendo, de eo super linguam cum bombyce. Valet contra dolorem dentium, matricis; dissoluit sanguinem congelatum, purgat 30 matricem. valet contra calculos in vesica, si bibatur cum succo saxifragiæ, millefo. & femin. maluz. patiens debet sedere in balneo ieiuno stomacho. contra dolorem iliorum, pectoris, cordis, stomachi, & aliarum partium. Contra crassos stomachum grauantes humores, atque totius corporis mirabiliter conferre putatur. Alio modo parant. Recipe terebent. veteris partes duas, masticis nouæ partem vnam, opoponacis, & corticum granatorum ana modicum: pone ad destillandum, & serua ut supra. Est præterea oleum mirabile scorpionum, de quo in tract. de bubone pestilenti fusius habetis explicationem. Inter arcana autem nostra inuenimus oleum Nicodemi appellatum, quod mirabiles supra modum vires habet, atque isti voluissent oleum balsami nuncupare, & est eius descriptio isthæc. Recipe semin. hiperic. lib. i. vini albi optimi lib. iij. tereb. antiquæ lib. i. croci vnc. i. olei antiqui lib. ij. litarg. drach. vi. aloes hepat. turc. alex. an. drach. iij. bulliant omnia simul in duplici vase, donec quarta pars consumatur: demum sepellantur in arena in diebus canicularibus per dies decem. postea per pannum candidum cola, separa vinum ab oleo, & utraq; separatim serua. curat omnem dolorem, & omnia vulnera sanat. consimilia multa sunt, quæ breuitatis causa consulo omitto.

Oleum Nicodemi.

*Balsami
species.*

Redeamus ad Dioscoridem: prosequitur, hic post descriptam balsami historiam nunc eius species, & dicit, aliquas esse scabrosas, & duras, aliquas valde eleuatas, nonnullas delicatiores, & tenuiores. istas tres species nouit Plinius loco citato: posteriorem autem vocat euphraston, quam dicit deteriores cæteris; quia cum sit nimis iunceæ, non potest copiosum liquorem, & bonum emittere. sed illa aspera, quæ vocatur trachi, est in primogenio 50 du bonitatis.

*Ad idem
tempus col-
lectionem.*

Descripta planta, descriptis speciebus, docet modum, & tempus collectionis liquoris, & dicit oportere, ut sit æstiuis temporibus, & ut scarificemus corticem. Notat Plin. ut adhibita diligentia, & librata manu scarificetur. quoniam si profundius descendunt, truncum interiore tangunt. addit Plin. vitro, vel lapillis, vel osseo cultello scarificandum. & Solinus confirmat, reddit rationem, quia si tundatur ferro, siccat planta. Diosc. & Theophrast. dicunt vnguibus ferreis: sed cum nemo eorum viderit: ego credo, quod dum librata manu fiat, optimum est utraq; Ad quem usum? ut balsamum lachrymam habeamus, quæ magno erat in pretio.

Hic autem succus, qui ex incisione & scarificatione effluit, dicitur opobalsamum. Balsamū colligimus (inquit Diosc.) in pauca quantitate, ita ut singulis annis tempore Roman. non nisi 54. vel 63. libras colligerent, quæ duplicato argento pendebant, ita ut singula libra duabus argenteis venderetur, id est, viginti aureis securatis; totus ergo prouentus 63. lib. erat, securatorum 1260. Nostri temporibus singula libra venderetur 1000. aureis.

Quantitas
pretium.

Ponit Dioscorides notas optimi succi, quas non explico, quia clara sunt verba Dioscoridis, & istæ notæ conueniunt terebintho, & ideo dico ego, quod possumus uti oleo vel abietino, vel ex terebintho loco balsami in medicinis; sed oportet destillare oleum ex his, ut fiat tenuior substantia. Ego prius eram in hac hæresi, ut sumeremus oleum nucis moscatæ, quo infunderetur pistillum, seruiens in Mithridatica confectione loco balsami: at postea mutavi sententiam: & vellem, ut acciperemus terebinthum, vel oleum abietinum in duplici vase destillatum. Et quod me mouet est; quoniam balsamum præstans est in vulneribus: hoc autem oleo in capitis vulneribus præstantius fere nihil: & expertus sum felicissimo cum successu.

Nota apud
balsami.

Sed varie vitiabatur, admiscebant aliqui terebinthinum, vel ciprinum, vel lentiscinum vnguentum: ecce quod erant hæc similia balsamo, & notis sensibilibus, & viribus, testis Dioscoridis, iacet cipria cera humida, castigare cerato ciprino, vel cerato myrtino humido: quoniam Antiqui vocabant ceratum mixturam factam ex oleo, & cera, cætera sequentia clara sunt.

Adultera-
tio opobal-
sami.

Antiqui vtebantur etiā ligno & fructu, ideo Dioscorides eius notas ponit, & vult, ut si solum & referat odore balsami; hoc autem non habemus in officinis, ostendunt seplasia, & ligna vniuersa; & dicunt esse balsami: nullum habent odorem: dimitte ergo, & vramini potius ligno ex terebintho, vel ex lentisco, vel eo, ex quo refudet materia similis, ut resina tereb. resina abiet. resina larici. potestis accipere & plantam masticis, quæ est lentiscus: vel terebinthum, quam copiosam habemus in nostris montibus. Antiqui habebant semen in usu, quod Theophrastus facit simile fructui lentisci. Dioscorides de eo non facit mentionem. in officinis habemus carpobalsamum falsissimum. sciatis tamen, quod communis inualuit opinio, nos posse uti pillulis, quæ cubebæ vocantur, quæ sunt semina odorata, parua, magnitudine piperis, & suaui. Non sunt cubebæ veræ Arabum, sed possunt substitui pro eis: Nam cubebæ Arabum sunt carpasium Græcorum: nos habemus cubebas, sed non sunt cubebæ Arabum. ego ignoro qui sint isti fructus, quos accipio loco fructus balsami, quia habent omnes eius vires. Fructum describit Dioscorides, & vltimo concludit efficacissimam vim succo inesse. Reliqua ita nota sunt, ut explanatione non indigeant.

Hybalsamum
est
carpobalsamum.

Semen cu-
beba.

Hic autem, ut an sam præbeamus aliquibus veritates rerum intimius perscrutandi referamus id, quod nobis videtur in hac materia de balsamo addendum. scribit Card. libro octauo de subtilitate, ex Insula Hispaniola deferri genus quoddam balsami colore iubarum, splendens, ac tenax, odoris suauitate admirabili, adeo ut quisquam existimare nequeat, quam iucundum sit, vulnera & ipsum recentia celerrime sanat, & rugas tollit. Iulius Cæsar Scalig. refert esse apud ipsum liquorem hunc inter alia Indiarum monumenta. Balsami vires æmulari: non apud omnes expertum esse. Arbos, quæ oleum istud parit (inquit Card.) Goacomax, puniceæ formæ, & magnitudine ferme similis, cortice quasi arido ligno, quod ardet, ut tæda, fructus ut vuarum racemi: Ex qua descriptione facile quis conicere posset hoc Indicum esse verum Syriacum Balsamum, quoniam Theophrastus illius similem plantam facit puniceæ, fructus lentisci, quæ epinas quasdam parit pilulas, quasi vuarum referens. in viribus postea conueniunt, ac in aquam stillatum syriacum diffunditur ita, ut aqua referat lac, fundum petit, non supernat, & lac ipsum cogit, quæ tria Indico deficiunt. atque hæc experientia docentur, nec potest esse, ut lanæ infusum maculam non relinquit, quia balsamum verum, in qua dissoluitur, quia non adeo pingue est, ut supernat, fundum petit, quia graue & terreum est, & ideo non ingreditur lanæ poros. an vero mortuorum conseruet corpora, quum illinitur, an linguam pungat, videant alii.

Aditio de
balsamo.

De asphalto.

CAP. XX.

Apud Medicos Græcos, & Historicos naturales eiusdem gentis geminæ voces sunt similes, Asphaltos, & Asphaltos, cum tamen diuersam materiam medicā distinctissimam naturā, & genere significant. Asphaltos bitumen est, quod inter inanimata connumeramus. Asphaltos est materia animata. hanc vocem corruptā legimus in libris barbarorum.

Asphaltos
100.

apud Rhasm asphaltum pro asphaltato legitur: apud Simeonem Ianuensem asphaltum: apud pandectarium asphaltum habemus. De hoc locuti sunt Arabes darisfaham vocantes, ut clare videre possumus in Auicenna, vel dariscifahan: & in Serap. capite 16. quam vocem, cum interpres Serapionis non intelligeret, interpretatus est arboris granati sylvestris plantam: cum illa habeat similitudinem cum granato. Plantam hanc habebant in vnguentariis ad conspiciendam vnguenta, bono prædita est odore, & non rancescit, nam vnguentarii ad hæc duo oculos habent, primum, ne materiale malum odorem habeat: secundo, ut illud materiale non rancescat, non corrumpatur. Et ideo quamvis infinita opportuna in vnguentis, tamen, quia rancescunt, non sunt bona. Cum igitur reciperetur asphaltus inter vnguenta, quod est munus aromatis ex Theophrasto, merito noster Dioscorides tractauit in isto loco inter aromata connumerando. Dioscorides loquens de hac planta primo declarat faciem eius: secundo loca, vbi nascitur: tertio notas: quarto vires enumerat. Scholiastes Theocriti dicunt, quod vocatur asphaltus, quia si quis vulneratur hac spina, non ita facile potest auelli, nam inter spinosas plantas numeratur, & ideo asphaltos. i. non vulsibilis dicitur. varias habet appellationes. Plin. vocat medissitron, alii adispadon, alii dipacon, quæ sunt occasiones harum vocum non satis patet. Geniliste-
net esse darisfah Arabum.

Frutex est fureulosus, in codice græco legimus lignosus, non fureulosus. fruticem appellamus arborem paruum, sed durantem veluti arbores magnæ faciunt, sed fruticem quidam lignosi, & duri, quidam nec duri, nec lignosi. Ideo dicit Dioscorides, hæc planta est dura lignosa, ramis duris constans. Nota quod hæc pars desideratur apud Orisab. in eap. in quo secundum Diosc. describit hanc plantam: sed hæc descriptio legitur in Græcis, & antiquis codicibus Latinis, idcirco credimus esse legitimam Dioscoridis. Hæc planta spinosa est: confirmatur ex Plin. Theophrast. Auic. & Serap. verum debetis notare, quod habemus à Plin. propositam geminam asphaltum, alteram delatam ex oriente, quam dicit habere in vno loco iustæ arboris magnitudinem, in alio minorem, & ita iste non erit frutex, & de hac orientali loquebatur Auic. cum dixit: darisfah arbor crassa est, & reuera cum nos habeamus asphaltum orientalem, possumus credere hoc. alteram (dicit Plinius) asphaltum esse fruticem, & arborem humiliorem, & nobis describitur à Dioscoride. dicit autem Plinius. hæc arbor crescit in syluis, est alba, vltimo flore rosæ. Describit postea secundam asphaltum, & conuenit cum Dioscoride. Hæc planta ita spinosa est, ut videatur comâ habere spinarum: Theocr. testis est in 4. vbi ait, comâ fert spinosam. Florem habet rosæ secundum Plinium: illa orientalis, reliqua secundum Serap. habet florem croceum, secundum Auic. candidum, & hic concordat cum Diosc. & sunt candidi veluti flores prunorum. producit cadente flore siliquas breues, & pilosas, quæ aliquando gemina, aliquando trina semina parua lenticularia continent. quum nascitur, tria folia producit, quasi rutæ. Hinc cum ex Græcia afferrem hanc plantam, credebam esse secundam acaciam Dioscoridis, quæ habet folia rutæ: deinde inueni in Hetruria, & misi ad Petrum Andream Matthiolum, vnde ille in loco acaciæ descripsit & posuit in acacia pontica. Sed ego diligentius perquirens reperi hanc plantam veram esse asphaltum, vnde opus est, ut pro me, & pro illo doctissimo viro palinodiam canam. Et in omnibus tractibus Græcis asphaltus vocatur. Nascitur hæc planta non solum in isto, sed Pisis in monte nigro, vbi maxima est huius, & aliorum medicamentorum copia: nascitur quin etiam in insula quadam, quæ Nisyus dicitur prope Rhodum, & Coum insulam, & a Strabone inter sporadas numeratur. Nascitur in Syria, & hæc erat ob caliditatem regionis præstantior. Postquam Dioscorides enumerauit loca, docet usum: & dicit: quod vnguentarii vtuntur, quia est planta adstringens. sed Plin. ait, quod vnguentarii vtentur cortice adstringente, & Fullones ad inspissandos pannos, & hoc erat in vsu in Hispania. Vnde Amatus Lusitanus dicit, quod cortex istius plantæ habetur sub nomine bugiæ in Valentia. Amatus est suspectus apud me, ideo ei non credo. citat authorem me rerum, quæ dicuntur falsæ: citat Brasauolum suorum mendaciorum testem. radices vocabantur apud Hippo. radices nigre, vti testatur Galenus, vbi d. radix nigra est radix asphalti. Describit postea Dioscorides lignum, & ait, optimus eligendus est, grauis, si accipiamus lignum, & corticem eripiamus, erit sub rubens in purpuram vergens, quia nigredinem habet quandoque admixtam, est amarum. ex Gal. dicit esse acre, & adstringens, & in adstringentia omnes consensunt. sed ego credo utrunque bene dixisse. Galenus loquebatur de eo, q. in suis oriebatur regionibus. Dioscorides de præstantiori in Syria nascente: nam proculdubio hoc habet amaritudinē, sed in Græcia, & in Italia repertum aeredinē: in Græcia odorē, in Italia nullum profert odorem, ideo non est mirum, si variat secundum diuersa loca. Galen. dicit asphaltus nostris

lib. 2. tract. 2.
cap. 210.

Asphaltum
quod
vnguentariis
vni.

Lib. 2. cap.

Lib. 2. cap. 210.
dicitur lib. 2.
cap. 210.

Descriptio.

Flos.

Arbor.

Locus.

Locus ubi
nascitur.

Lib. 2. cap.

Amatus sus-
pectus.
In lib. qui
de linguis
Hippo. scri-
bitur.

8. de simp.
med. facul.
cap. proprio.

8. de comp.
med. fac.
cap. 7.

nostris in locis nascens adstringentē facultatem habet: ex quo loco colligitur, quod cum loquitur de asphalato, loquitur de eo, quod suis in locis nascebatur, odor eius non dicitur à Diosc. sed est orientalis rosæ. Plinius inquit habere odorem castorei. sed testatur vnum miraculum, si arcus cœlestis inclinatur in asphalati, quod habet odorem asphalati. at hoc numerate inter miracula Plinii. sed ego inuenio hanc plantam habere occultam facultatem, quia solo eius ictu percussæ ceræ eius spinæ moriuntur. ex quo, capitibus sagittarum adaptari possunt maximo cum venatorum prouentu. Est alia asphalati Itala cæteris deterior, & colore, & odore vacans, & Plin. dicit, non ubique tamen odorata. Ex hoc colligimus, tria esse asphalati genera, vnum orientale Plinii, quod nos habemus: alterum descriptum à Diosc. fruticis nomine, foliis tribus, velut rutæ, cum flore &c. quod diuiditur in duo: alterum subrubrum sub cortice, odoratum, quod nascitur in Rhodo, & Syria, alterum est in Italia (& hoc tertium erit) inodorum nascens in Hetruria. Noster Ruellius, cum vidisset hanc plantam oriri in Rhodo, finxit historiam, in qua sunt figmenta multa: confutatur à Matthiolo, Amatus carpit Matthiolum, sed in Apologia impugnatur, & expugnatur ab eo. Vnde decipitur Ruell. fallitur Amatus. Alii voluerunt esse sandalum rubrum, nam in officinis habemus ligum vocatum sandalum, à Græcis *ελεαγιον*, de quo loquar infra, sed decipiuntur. confutatur hæc opinio à Matth. cum quo ego consentio. Aliquando inclinavi in opinionem illam, ut sit lignum, quod vocatur Albacem ex autoritate Bellunensis, à nostris vulgo verzinum, à quibusdam lignum virgineum dictum, eo quod ex huiusmodi ligno conficitur fucus, quo virgines faciem inficiunt, qui belletto, vel pezzuolo vocatur, appellatur etiam brasiliū ab Hispanis, vnde loca, in quibus hæc copiosa planta abundat, vocant brasiliam terram. ego decipiebar; quoniam reuera, vt postea comperi, & ex nauigationibus multorum veris, veni in hanc sententiam, quod lignum quoddam delatum à Ioanne Baptista Pedaldo Florentino (qui nauigauit in Indias Orientales, & detulit secū integras arbores spinosas, & ego vidi truncos satis magnos) esset vera asphalatus. in hac planta inueni omnes notas asphalati. hac planta donatus eam communicavi omnibus volentibus conficere troiscos cyphi. habeo frustra, quibus orbiculos, id est pater noster confeci, quos vobis ostendam. Hic igitur erit primus asphalatus; secundus ex Græcia defertur, qui pingitur apud Matthiolum in capite de acacia, tertium non habeo, sed potestis habere ex Pisaniis collibus. cætera clara sunt.

De Santalis.

CAP. XXI.

Quum loquebar de asphalato, dicebam quorundam fuisse opinionem, asphalatum orientalem Plinii esse santalum rubrum, quod est in officinis, & in vsu apud Arabas, quorum nullam mentionem apud veteres habemus. confutari diximus hanc opinionem apud Matthiolum. sed ego aliquid dicam de santalis. ab Arab. *santal* dicuntur, à nostris santalum vel santalus, à Græcis, qui suffurati sunt ab Arab. *santalos*, Serap. 346. cap. loquitur de hoc. Auicenna etiam loquitur de hoc. Res est ignota antiquis Græcis, quamuis Auicenna non sine nota adducat auctoritatem Gal. consentiunt omnes cum Auer. quod sandal ignota fuerit Galeno. Fortasse Auicenna legit librum spurium Galeni. Lignum hoc affertur etiam ex semiorientali regione, & est trium generum, rubrum, citrinum, & album. & ita nostri indicant tria genera lignorum; & cum in receptis inuenietis: Recipe santalorum omnium, intelligitur horum trium. Verum, vt veritatem sciatis, duo sunt tantum genera santali: alterum rubrum: alterum album: & quamuis seplasiari citrinum ostendant etiam, tamen citrinum, & album vnum sunt, nam est pars exterior, & interior. nec hoc mirum videri debet. lignum enim Guaiacum circumquaq; pallescens, intus vero nigrescens conspicitur: & ego sum testis oculatus in santali, qui maximos vidi eorum truncos. hinc est quod vos apud Auicenna non reperietis factam mentionem santali citrini. Hoc confirmant Historici recentiores; nam qui scripsere itinera ad Calichut, & viderunt sylvas, vbi santala proueniunt, semper meminere rubri, & albi, nunquam citrini. Hæc fuit impostura, & summa diligentia Medicorum, vt diuiserint vnum lignum in duo. & ita ego sum istius sententiæ, quod santali duo sunt genera, & quod album, ratione illa, quia in vna parte sit citrinum, in altera album, distingui potest. Mirum est, quod Historici describentes sylvas, vbi sint santala, omiserunt fructus, frondes, & figuram. Frigidum est in 3. siccum in 2. vbi referunt Arabes. sed cum colligam suauitatem odoris, & acredinem cum aliquo amaro, sciam præterea lignum non esse lachrymam concretam, neq; mucum, neque terram, non possum consentire cum clarissimis Arabibus, quod sit frigidum in 3.

Vires.

& cum decoquam, non inuenio tantam frigiditatem. Vnde credo, quod sit frigidum in primo, vel saltem in 1. consentio, quod sit siccum in 2. cordialis est medicina, & ita in omnib. medicamentis, quæ faciunt ad cor, recipitur. Nam odore fragrantem discutit fulgines, & temperat aërem, quo refrigeratur cor. Habemus vnguentum santalinum, & Antidotum recentioribus notum.

De Musco arborum.

CAP. XXII.

Antiquitus hic erat in vsu ad conficienda thymiamata, & inspissanda vnguenta, & nunc habetur, (credo quod iuuenes norunt) puluis Cypri dilutus aqua luctuosus, & etiam sic-
cus, & inspersus cibariis maximam suauitatem affert. Hic puluis conficitur ex musco in il-
la insula. cum ergo ad inspissanda vnguenta, & ad thymiamata conficienda valeat muscus,
ideo Dioscorides describit eum hic inter aromata. Primo autem declarat, quomodo na-
scatur, & dicit quod est ex illis plantis, quæ in aliis plantis nascuntur, quamuis nascatur et-
iam in terra. Dicit autem Bryon. Hæc vox non solum muscum significat, sed alia
multa: apud Theophrastum significat pilulam quandam spinosam, quæ oritur in quer-
cubus loco floris. illæ plantæ non proferunt flores, sed spinosas pilulas loco eorū, & bryon
à Theoph. dicuntur: quia est quædam conglomerata lanugo ex materia lanosa, & spino-
sa. Aliud est bryon apud Medicos, de quo Gal. Discor. in quarto, qui dicitur bryon mari-
nus. Et hæc est planta Auic. lib. 2. tract. 2. cap. 459. & ab eo dicitur sua lingua Thaleb,
& moschus interpretatur, non autem est moschus ille odoratus, sed bryon, & est illa materia
medica, quam corallinam vocamus. Hæc est parua herba, quæ oritur in fundo maris, quæ
aliquando fit saxum & habet similitudinem coralli, & ideo plantam hanc corallinam vo-
cant, quæ si recens assumitur, soluit ventrem, & utilis est vermibus puerorum. Est ter-
tius muscus, qui solet nasci in fundo riuiulorum aque dulcis, qui ascendit, & est lanugo, quæ
dicitur spongia, & à Plin. conferrum appellatur: quia est opportunum ad conferrum inan-
da ossa. Nascitur in faxis quatuor muscus, quod licha vocatur à Diosco. in 4. lib. vulgo he-
parica vocatur, & figatella, quia vsus eius est in excalescente hepatis. Quinque genus est,
de quo loquitur hic, & de hoc loquamur, quod Arabes vocantur vñee; Serap. c. 93. Auic.
lib. 2. tract. 2. cap. 720. vocatur quin etiam ab Arabibus Afne. in officinis repetitis vñ-
neam, quam bryon vocabitis, sed legimus apud Auic. vñee, vel vñem, de qua Auic.
Cap. 722. & Serap. 257. capite loquitur, & est illa planta, quam Kall dicimus, & est planta marina,
ex qua conficitur cinis vitrarius, & ideo distinctissimæ sunt bryonis species. sed est ma-
xima differentia inter moscum, & muscum, vt audietis infra. At de musco iam prosequa-
mur, quod à quibusdam splanton, tragonon, & spagnon vocari dicit Plin. teste Aetio lib.
primò vocatur ipnon. Hæc itaq; voces idem significant. Non explicat Diosc. huiusmodi
plantam, sed dicit, quibus in arboribus nascatur. describitur autem à Plin. 16. lib. cap. 8. &
12. cap. 13. vbi ait esse villos canos arborum, præterea adiungit esse pannos arentes villosos
musco, & canos, qui arcescunt, & concrescunt in trunco. consentit Auic. qui dicit esse ve-
luti tenuissimos cortices plantarum, non sunt cortices, sed videntur cortices. verum ex
isto bryo duplex est genus: vnum, quod est veluti pannus concrescens, alterum veluti la-
nugines, pannum non cognouerunt recentiores, quod sit bryon. sciat tamen, quod Diosc.
loquitur de hoc, quod non nascitur in omnibus arboribus, sed villosus nascitur in omni-
bus arboribus, & lapidibus. Quæro ego, quænam sit vñee, quæ videtur veluti pannus esse,
quæ pulmonaria à Fuchio dicitur, & est veluti lichen hepatica lapidum. & ista, quæ nascitur
in plantis vocatur muscus, & hanc nominauit Fuchius, sed non cognouit. Nascitur autem
(inquit Diosco.) in cedro, quercu, & populo. Loea, vbi optima nascitur, est Cyrenaica re-
gio, est Cyprus, Phœnicia teste Plin. & tandem Galliz, & Aegyptus, Plin. addit nasci in
Licia cedro, quæ est cedrus magna, nam habemus cedrum paruam, acutam, & magnam.
in magna altissima nascitur muscus. quid sit cedrus magna, disputatur à Petro Bellonio in
lib. de mirab. & est arbor laticis. Et mandare hoc memoriz. cedrus arbor, & cedrus liba-
ni, ex qua facta est cōtignatio templi Hierosol. est larix arbor, vbi nascitur suauissimus hic
muscus, & bene in hoc sentit Matthiæus. Antiqui non cognoscebant laticem sub nomine
laricis, & cum loca Germaniæ non essent peruia, in quibus erat copia magna laricis, Medi-
ci nesciebant, nisi hortum in Libano monte, quem vocant Libanum cedri, & hæc fuit
causa, qua noster Galenus loco musci cedri substituit muscum ex picea. Primum quia
ex materia lignosa odorata nascitur, secundo quia ex ligno resinifero, veluti fert resinam
cedrus liciæ, & nostra larix. subdit Diosc. quod nascitur in populo arbore alba, cuius copia
habetis, & credo quod vos noueritis huiusmodi bryon. Notate tamen apud Plin. qui lo-
quens

Bryon quid
significet.
Lib. 9. de hi.
plant. cap. 6.

Lib. 6. de
simpl. med.
facula.

Corallina.

Vñee.

Cap. 722.

Lib. 12. cap.
23.
Lib. 24. c. 6.

Bryon du-
plex.

Fuchius de
natur.

Loca.

Cedrus est
larix.

Larix signi-
fica antiquis
fuit.

Lib. 12. c. 28.

quens de populo alba dicebat: bryon vna populi albæ, ex quo loco colligimus populum *Lib. 12. c. 28.*
ferre vnam, quæ bryon vocatur. Hoc falsum est: nigra populus affert vnas, quæ disrumpū- *Plin. impu-*
tur, & effunditur lanugo magna, populus alba non facit lanuginem, in agro Mutinensi di- *gnatur.*
citur albarazza. Non credo tamen errare Plini, sed locutum metaphoricè, in populo alba *Defignatur*
nascitur lanugo, & corticosus pannus, qui datus populo albæ loco vix concessit populo *Pliniam.*
nigræ. Tres sunt arbores muscum Diosc. proferentes, prima est nostra larix; secunda popu-
lus alba; tertia est quercus: vos addite quartam piceam arborem, quæ potest substitui
loco laricini musci. Sed per quercum non intelligite omne genus glandiferarum, sed de
quadam specie quercus, in qua pannus iste reperitur. Et ista est, quæ Ægilops à Plinio *Quercus.*
dicitur, & vocatur vulgo Cerro, & à Latinis Acerus, vel Cerrus, & valde laudatur à Gale- *Lib. 16. c. 2.*
no. Dioscorides mox primum locum adscribit cedrino musco, secundum locum piceino
adscibite, at Plin. dat primas populeo nato in Gnido, secundas dat cedrino ex Lycia. *Lib. 12. c. 28.*
Fortasse Gnidas dat populus ita nobiles, sed ego consentio cum Galen, primas dando ce- *Electus.*
dro, secundas pici, tertias populo, quartas quercui. Eligendus autem candidus, & est
qui nascitur in cedro. Plinius laudat altissimum, id est natum in ramis altioribus conco-
ctam à Solis calore, & minus offensum à frigore. Postea Dioscorides explicat facultates, *Facultates.*
& d. esse adstringentis facultatis, habet tamen in se nescio quid temperati, ita ut vim ha-
beat molliendi: Notate tamen, quod emollit vsus musci ratione diuersitatis partium, est
frigidus, & siccus in primo ex autoritate quorundam. Auicenn. restatur frigidum in pri-
mo, siccum in secundo. Galenus vult esse parum siccum, & parum frigidum, ideo non est
mirum, si accedit tantum temperato,

De Moscho.

CAP. XXIII.

M Viscus plantarum, præcipue quarundam arborum, antiquitus seruiebat ad vñsme-
dicos, & ad varia odoramenta, & conspissanda vnguenta, quia non facit ea rancida.
Nostra ætas habet suum moschum, quod facit ad Medicos vsus, & ad odorata vnguenta.
Quæ materia tanto præstantior moscho Diosc. quanto nos viuimus mortuis: ideo cum simili-
tudo vocistrabat nos, atque idem vsus de hoc nostro à Diosc. & antiquioribus nondum
cognito tractare institimus. Nullus inuenit apud antiquiores factam moschi mentio- *Lib. 1. c. 11.*
nem, sed à Græcis recentioribus, ut ab Actio, à quo moschos appellatur: Græci habent
moscon proprium, qui est pediculus, quo sustentantur flores oleæ. Moschos Actii, Si-
meonis, & Actuarii est ista sanies, hoc virus de quo memini. vocatur sanies, quia Ara-
bes vocant misch, à nobis vulgo muschio dicitur. Huiusmodi medicamentum superat
omnia aromata: adest quoddam aliud, cui cedit suauitate, sed nullum habet se maiorem
vehementiam iunctam suauitati, quædam vehementiam, non suauitatem habent, sed nul-
lum est, quod æque iuncta hæc habeat. reperitur odoramentum suauius, & est ambra, sed
non ita validum est. Aliqui describentes moschum dicebant esse carnes maceratas pu-
trescentes: Autor est quidam scriptor populorum orientium, hoc falsum est, non enim
videmus habere carnes fibras. Simeon Sethi dum loquitur de hac materia (ut testatur
Mathiol.) opinatur esse concretionem sanguinis circa vmbilicam cuiusdam animalis. *Quid moschi?*
Hoc mendacium est. Vnde oportet nos sequi sententiam Recentiorum, & Serap. capite *Præceptum.*
185, & Auicenn. 2. lib. tract. 2. cap. 461. & Odoardi Barbesii, qui scripsit navigationes O- *Amatum hu-*
rientales: proferunt enim concorditer historiam verisimilem, Tempore Arabum in re- *manus seu-*
gione Tumeasina, & Senina oriri solebat. nunc ex Sina insula, & ex aliis locis Indiarum Ori- *entis.*
entalis. Credo quod audiueritis à me, & ab aliis, quod nascuntur in corio hominum quæ- *à oporio.*
dam tubercula, quæ habent vesicam, in qua continetur sanies, quæ est aliquando liquida, *Rachis id*
aliquando crassissima veluti substantia lardi. Ita in quodam animali Indico concreuit ali- *oponatur ex*
quando gemina, aliquando multiplex vomica in corio, in qua colligitur sanies crassior, sub- *Serapione*
nigra, inclinans in rubedinem, & hanc vocamus moschum. huiusmodi vomica solent *Lib. 1. c. 11.*
ligare filo, ut concidat, & integrum seruetur animal, & ita secat ant corium resectum, & hu- *Propria opi-*
iusmodi corium cum moscho vulgo vocamus vesicam moschi, id est partem corii il-
lius animalis. Sunt istæ vesicæ magno in vsu apud mulieres ad seruandas vestes à carie, nam
hoc opportunum est, & omnia etiam odoramenta corrumpunt tineas, & sunt in causa ut
dentes earum pereant, Sed ex his vesiculis aliquæ sunt ita vetustæ, ut nullum odorem ser-
uent, aliquæ odoratæ sunt, & recentes, & sunt illæ, in quibus adest folliculus, & membranula,
ubi continebatur moschus. Ideo videte, quando emitis scalpitem digito, si adest pellicula,
ematis; sin minus inquit, quia odorem amittit citius, non ergo negligatis pelliculam
internam. Talis est sanies, de qua loquimur. locus est circa ventrem, & circa pectus.

*Op. seruum,
qui tenent
Gazellam
esse animal
moscha.
Impugna-
tur ab Aute.
cap. 461.*

Aliqui voluerunt Gazellam esse hoc animal. Vnde multa isthæc animalia videbitis in nobilium Edibus: sunt capræ parvæ, quæ incedunt per domos, & domesticæ sunt. Decipiuntur, quoniam quamvis animal illud simile sit gazellæ, tamen gazella non est, quæ faciat moschum. est simillimum gazellæ cornibus, & vellere differt, quoniam gazella habet dentes ea ratione, quæ reliquæ capræ; huiusmodi animal habet prominentes dentes, & rictos, quasi suis duos illos, & elephanti. Illa vomica, necesse est ut putrefeat, & constringatur: Vnde aliqui volunt, quod quandoq; hoc animal prurigine affectum se fricat, & sic & petris colligatur moschus: sed quæ dixi, certa sunt. ista materia solet corrumpi, & ita apud chymicos infinitæ habentur descriptiones conficiendi, & multiplicandi moschum. Accipiunt humanum sanguinem, suspendunt in cloaca, in vesica, admiscunt postea moschum, aliis rationibus vitiant. Sed probatio in nulla ratione consistit, nisi in hoc: quum appetitis vesicam, admove te naribus, si excitat sanguinis fluxum, bonus est: hoc facit etiam, si quis in toto vitæ curriculo sanguinem non emisit. si autem volueritis extra vesicam cognoscere, non potestis, nisi ex odoris vehementia. Facultates huius medicamenti sunt, ut sit calidus & siccus, in tertio ex autoritate Simeonis, calidus in secundo intenso, & siccus etiam in secundo ex Avic. cum quo ego consentio. videtur calefacere, quoniam vaporoso odore incallescunt spiritus. Nam cum odoramenta calefaciunt caput, etiam quæ frigida & temperata sunt: non nisi quia odoratus vapor attractus ad cerebrum nutrit, & miscetur cū spiritibus animalibus: si calidus est, facilius penetrat, faciliusq; spiritus ponuntur in calefacto esse, quia agitantur, & edunt effectus summe caliditatis: & est cum veluti quis præter modum comedat vel bibat, quoniam concitatur servor in corpore propter nimiam copiam alimentum subministrati partibus, hinc fit sudor. Ita facit æstum, & perturbationem capitis omnino odoratum. Est tenuissimum hoc medicamentum, oculos detergit, roborat omnes spirituales partes, ut sit mirum: & ideo cordialis, & capitalis est medicina. si inungamus pudendas partes hoc, augeat Venetrem, quia augentur spiritus. Idem præstat si in pauca quantitate assumatur in cibariis; ratio est, quia vaporosa est materia, augeat spiritus, conciat, & facit tensionem. & hæc ita de moscho,

*Multiplica-
tio moschi.
Modus de-
tergendi mo-
schum parâ
mixto.
Facultates.*

*Oderata o-
mnia calif-
cunt caput.*

Ad Vener.

De Ambra.

CAP. XXIV.

IAm properemus naribus apertis ad Ambram, ut tam suavi odore cerebro bene affecto, de aromate ita precioso discurrere possimus. Nos habemus duo genera Ambrarum: alterum, ex quo sunt orbes, & tubercula, quæ excipiuntur filo, & collo, aut manibus alligata gestantur ad ornatum Mulierum: alterum est, quod venditur parti pondere cum auro, imo magis; ita ut una uncia eius valeat 35. scutatis aureis, nunquam minus 25. & tamen una uncia auri non edit nisi de cæ aureos: ideo duplo, & triplo venditur, tantum est pretium istius. Prioris quedam nigra, quedam ruffa, quedam citrina, quedam alba; ab Arabibus carabe dicitur, à Græcis electrum, à Latinis succinum, de quo loquar, quum agam de electro. nos autem agemus iam de aromate illo, quod ambra vocatur, ab Arabibus ambar, à Græcis recentioribus ampar: apud Simeonem Sethi, ampra etiam, ut ab Actio, apud Mercatores ambracanium, vel ambra canis dicitur. Vocatur ab Hermolao succinum orientale. habebat mentem prophetica ille homo. Ioannes Leo, dum loquitur de hac materia ignota antiquis (nam nemo antiquorum novit hoc aroma, quod superat omnia, exceptis aliquibus gemmis) in historia de rebus Aphricanis dicit, quod reperitur piscis in locis marinis Aphri. vocatus Ambra, qui eiicit sperma. vel sterus, & hoc est ambra. Odoar dus refert, quod sunt aues quædam, quæ sterus emittunt supra saxa, & quod pisces comedunt, ex quorum ventribus colligitur hæc ambra. Nugæ sunt. Serap. refert, quod est fungus nascens saxis. Avic. & Auer. 5. collig. cap. 56. & Simeon recte loquuntur de hac re: dicunt enim quod est bitumen nascens in Oceano, & scærens in gurgibus altissimis eius; & est veluti camphoræ species: quæ comeditur à piscibus, & cetis, & illos interficit; est quoddam genus succini, & bituminosæ materiæ; & ita Domini non habemus Ambracanium, nisi quem colligimus ex piscibus. si cetis interficiatur à piscatoribus, ambram colligunt. & est genus distinctum ceti, quod in quibusdam maribus reperitur, non in omnibus, sed in littore occidentuo Galliz, qui dicitur Cetus ambræ, & ista est ambra, quam habemus. & quod sit bituminis genus, videte: si apponatur igni, eliquatur veluti resina &c. si apponatis flammam accensam, eliquatur ut cera, bitumen, & cætera pingua. Vnde colligo, esse materiam oleosam: ista aut est species pinguedinis ex animali, vel ex plantis, vel ex terra: quia eliquatur, est quid oleosum & pingue. non est pinguedo animalis; quia friabilis est: non habet naturam seui, nec adipis: quia cōvertitur in pollinem. non ex arboribus: quia impossibile esset, ut tan-

Lib. 6. 15.

*3. lib. med.
2. cap. 49.*

10

40

50

ut tan-

ut tandem navigatio non inuenisset huiusmodi atbotes, cum habeatur satis copiosa circa Gallias, & tertas Aphricæ; præterea omnes fere autotes consentiunt ex pisce desumi: quas arbores vultis, ut pisces volantes cetæ, & balenæ ascendant, cū hoc non sit, opus est, ut dicam esse pinguedinem tetrestrem: hoc autem inducit me ad credendum istud, quoniam si ignoramus prioris alterius ambræ, ubi sint fontes, non mitum si latet fons istius in profundis maris scaturiginibus. Adulteratur quum extracta est ex ventre animalis. solent isti corrupti, ut faciant griseum. accipiunt ladanum nigrum, & gipsum, & bene simul cum ambrā miscent. Deprehenditur adulterium hac ratione. eliquate supra ferrum calidum, statim fit coloris subnigri, & non relinquitur nec punctum nigrum, nec punctum album, 10 quando vera est ambicq̃ tota massa. si hæc apparent, adulterata est. In Oriente habetur triū generum, vna dicitur grisea, quæ habet puncta alba, & nigra, & vocatur porrambar, alia est citrina, quæ nunquam apparuit, nunquam eam videte potui; sed ego credo, quod sit illa subnigra, quæ eliquata relinquit citrinitatem quandam. hæc vocatur puambat, apud Indos. tertia pessima est, & nigra vetustate corrupta, & vocatur minambar. Facultates: 15 est calida, & sicca in secundo, ex Auer. & Serap. Auicenna autem d. calidam in secundo, siccam in primo. Dicitur in secundo incipiente, id est in primo intenso. Roborat eor, ce- 20 rebrum, vterum: promouet menstrua; Vnde habemus in officinis medicamentum compositum, quod diambra nuncupant.

Adultera.

Triū generum.

Facultates.

Vires.

10

De Zibetto.

CAP. XXV.

Vltimo est zibettum. Cceptum est vehi animal ex Ægypto, quod habet similitudinem cum taxomelle Plin. Hoc animal in Ægypto facit partum copiosum, & vocant gatto del zibetto. Ferum & agreste est, armatum densib. ferratis, & difficilime tractabile etiam à domesticis suis; vincitur tamen hominis industria; Habet oculum, burfam in parte posteriori intra femora in extrema parte abdominis, siue formina, siue masculus sit: huiusmodi cauerna habet anfractus, & cavitates quasdam, in quib. colligitur sudor, & sanies quedam, quæ zibettum vocatur. Hæc matetia in principio alba est, successu temporis primum fit sublutea, deinde flaua, vltimo nigrescens. Habet grauem odorem cum aliqua suauitate 30 admixtam, sed non multa: Myropolæ capiunt eam pro mixtura, & materia, & miscent cū moscho, & ambrā. Ego præter odorem carnis toltæ, non sentii odorem hoc suauiore, & preciosiorem. Nutriuntur magno sumptu hæc animalia, comedunt enim dulciatia optima, orizam eum ouis &c. & quanto nobilior eis datur alimentum, tanto nobilior matetiam emittunt. Vires huius Zibetti non ita patent, sed maxime venerem protig- 35 tare inuentum est. Et si præputium inungatur hoc zibetto, maxime incitat mulierem ad coitum, qui in ea ingentem excitat delectationem.

F I N I S Tractatus secundus.

60
GABRIELIS FALLOPPII MV.
TINENSIS. MEDICI AC PHILOSO-
PHI PRÆCLARISSIMI DE LVXATIONIBVS,

Tomi II. Tract. III.

De Partibus, quæ ossibus colligantur, & de luxationis natura & causis.

CAPVT PRIMVM.

10

Ossium & partium colligantium



Vnum ossa animalium facta sunt à natura, vt dicit Aristoteles lib. 2. de partibus animalium cap. 8. & 9. vt mollia corpora, quæ quidem requiruntur ad sensum & reliqua munia, fulcirentur, & vt illa formarentur, ita vt illa cōformatio, quæ requiritur, dependeat ab ossibus, sicuti experientia docet, & etiam autoritas Galeni lib. 1. de administr. anatom. cap. 2. cumque vnum sit animal, de necessitate requirebatur vna figura & cōformatio partium inter se, & ideo os, quod sustentaculum & firmatio erat illarum, vnum esse debuit, vt asserit Arist. loco cit. vii. venæ omnes sunt, eo quod omnes compactæ sunt, & ab vno oriuntur principio, ita vnum esse ossium principium oportuit, vnaque figura & formatio, tanquam si vnum tantum esset os. Principium itaque vnum positum est, à quo reliqua oriuntur ossa corporis, ita tamen vnum esse os, quod animalis partes componit, non est, sed videtur. Sed quia non tantum natura respiciebat ad hanc conformationem & vnitatem, sed etiam ad motum, ob quem etiam animal est: & secundo quia plura sunt corpora ad latentia intus, quæ debent communicari externis, vt membræ cerebri internæ cōmunicant cum externis. Tercio ipsa dispathia, id est robur & fortitudo considerata, quæ difficultas patiendi consideratur maxime in capite, ideo quod vnum esse debuerat, in plura fuit separandum: & hac ratione manus ossa ita sunt frangibilia, quia inter se disuncta sunt. Primo itaque fuit considerandum sustentamentum mollium, secundo motus, tertio communicatio internarum partium cum externis, quarto vero robur. Quibus de causis factum est, vt vnum os, & non vnum fieret. Cum enim plura sint, fecit vnum esse, & cum vnum, plura. Hac enim ratione vnum tantum os nunc multiplex, quo inseruiat illis ossibus dictis: hoc vt faceret, accepit plura ossa, & copulauit cum externis adiunctis, vt dicit Aristoteles, vt illud, quod ex duob. adiunctum est, & complicatum, vnum esset os. Verum postea partes illæ, cum non penitus sint integre, pariuntur hoc, vt possint moueri & flecti. De his itaque, si de harmoniis istis & complicationibus loquimur, quibus colligatis recta sit colligatio, & hæc sunt de quibus loqui intendimus, & de illis affectibus, quos solent pati partes istæ, non autem de natura ipsarum complicantium verba faciemus. Sed primo sciendum est, quod partes istæ, quibus ossa colligantur, variz sunt, ac dicuntur ab Aristotele: nam lib. de animal. natura dicuntur flexus ac flexiones, quia in illis partibus, quamuis rigidum maneat animal, tamen flectitur & incuruatur, vt cum pede, genu, cubito &c. vocatur etiam *condyli*: condyli autem sunt articuli, quibus colligantur ossa inter se: & sic vocat Hippoc. 1. de artic. text. 7. artus vero dicuntur communiori voce ab aliis, & ita etiam appellat Gal. lib. de ossib. & lib. de anat. admin. & de fracturis, sed improprie: nam apud antiquos per eam vocem non significatur tota compages, sed vnum ossium, quod proximus & in cauitatem alterius inseritur. Et hoc modo videtur Hippocrates sæpe. Tamen inualuit etiam vsus apud Hipp. vt hoc nomine commissura duorum ossium ab eo q. est sustinere, vel ab eo quod est accōmodare, nostris vocetur. At Plin. vocat tales cōpages nodos, assumpta similitudine à plantis. commissura autē & compages nominatur ab his, qui rectius loquuntur: de his nos loquimur, qui etiam articuli vocantur, quo etiam nomine posteriores omnes vocarunt. Celsus tamen vocat articulum alterum os capitatum ab Hippocrate dictum, tamen quia isti articuli de communis dicuntur, & nos articulos commissuras dicimus, sed quoniam de horum natura superiori anno, cum de ossibus pertractaremus, verba fecimus, sermonem nostrum perstringemus circa nō naturales horum affectus. De affectib. itaq; non naturalibus, qui accidunt in his, tractabo. Vt autē sciat, quinam sint, obseruare debetis, quæ ipsius sint naturalia, & sic quæ præter naturam. Cognoscitur primo figura. Requiritur enim conformatio directæ: nam si duo essent ora rotunda, & vellemus coniungere simul, non recte succederet. Secundo est numerus, vt

scil.

*Partium colligantium
varia natura.*

scilicet tot sint, quot requiruntur ad conformationem. Tertio situs decens, ut scilicet sunt in sua sede naturali. Quarto mediorum ipsorum contentorum vel continentium apra natura & secundum naturam. Cum, n. hæc omnia recte se habent, & articulus bene habebit; si autem contra, male. Vnde quoad primum circa conformationem scilicet, siue figuram, hæc *1. Obferuandum, est figuram conformationis.* solet morbum illum pati, quem diastrophin, ut lib. 4. de artic. cap. 15. ex Hippocrate vocant græci, & est quando vel in ortu, vel alia aliqua causa ossa ipsa veluti cerea sunt ac etiam tenera interius, dum eductus fœtus male tractatur, vnde sæpe fit, ut forma seu figura naturalis destruat ac corrumpatur, & sunt tunc malæ illæ affectiones, ut est distortio *Manuum.* curis in partem exteriori, in qua contingit, ut pes intro conuersus & inclinatus vti conformationem, ita ut non sit tunc luxatio, sed distortus sit articulus, ut accidit ut plurimum in partibus inferioribus infantium, cum tenera & quasi cerea infantium ossa praeue *2. Obferuandum, Numerum.* à nutricibus vel figurantur, vel figurata distortiuntur. Quamuis si ad extra extorqueantur, valgi aut blæsi dicantur; si autem ad intra, vari, ut asserit Galen. lib. 6. de differ. morb. cap. 7. Fit etiam hoc quando porosis græcis dicta, id est, callositas fit; accidit enim quandoq; *3. Obferuandum, Ortum.* ut Galenus asserit loc. cit. quod ex duobus ossibus alterum patiat additionem in extremitate ipsius, & repleat cauitatem ipsam, ut impediatur articulus: & hæc quo ad primum. Secundum erat considerandum, numerus ipse, quo impeditur articulus, modo illo, qui dicitur *4. Obferuandum, Locum.* *5. Obferuandum, Distantiam seu relaxationem commissuræ.* & est quando ex duobus ossibus vel tribus fit vnum, ut ex introductorii autem habetur, ut accidit in gibbosis, in quibus est vna tantum vertebra in parte illa gibbosa flexa. Additur tertio in loco situs, qui immutatur & facit tertium genus morbi, quando accidit ut alterum os deducatur ab altero extra suum situm, qui morbus dicitur *6. Obferuandum, Stigmata seu distorsiones.* à Græcis, à nostris vero luxatio vel exarticulatio: sed aliquando accidit, ut ex toto non labatur alterum ab altero, & tunc à Græcis dicitur *7. Obferuandum, Distantiam seu relaxationem commissuræ.* *8. Obferuandum, Stigmata seu distorsiones.* & à nostris Auicenna secunda quarti, declinatio vel torsio iuncturæ. Aliquando vero accidit ut os alterum non dimoueatur à sua sede, nec ad aliquem locum protrudatur, sed dehiscat alterum ab altero, ita ut elongetur vnum ab alio, ut dicit Celsus libro primo capite octauo, tunc genus hoc morbi dicitur distantia commissuræ; ab Auicenna vero elongatio commissuræ, & à nostris recentioribus relaxatio commissuræ. Quartum genus morborum est ratione continentium: nam patiuntur quandoque ligamenta tumores, distractiones & contusiones, quæ stigmata dicuntur, à nostris vero distorsiones: Est, quando articulus in sua sede manet, sed ligamenta patiuntur vel diuelluntur, ita ut suo officio fungi non possint.

Aliud est ratione contentorum, quoniam si quæ continentur, sunt præter naturam, ut cū fluxerunt humores ad illa spacia, quibus non fieri potest motus, qui dicitur *9. Obferuandum, Causam luxationis.* *10. Obferuandum, Causam luxationis.* *11. Obferuandum, Causam luxationis.* *12. Obferuandum, Causam luxationis.* *13. Obferuandum, Causam luxationis.* *14. Obferuandum, Causam luxationis.* *15. Obferuandum, Causam luxationis.* *16. Obferuandum, Causam luxationis.* *17. Obferuandum, Causam luxationis.* *18. Obferuandum, Causam luxationis.* *19. Obferuandum, Causam luxationis.* *20. Obferuandum, Causam luxationis.* *21. Obferuandum, Causam luxationis.* *22. Obferuandum, Causam luxationis.* *23. Obferuandum, Causam luxationis.* *24. Obferuandum, Causam luxationis.* *25. Obferuandum, Causam luxationis.* *26. Obferuandum, Causam luxationis.* *27. Obferuandum, Causam luxationis.* *28. Obferuandum, Causam luxationis.* *29. Obferuandum, Causam luxationis.* *30. Obferuandum, Causam luxationis.* *31. Obferuandum, Causam luxationis.* *32. Obferuandum, Causam luxationis.* *33. Obferuandum, Causam luxationis.* *34. Obferuandum, Causam luxationis.* *35. Obferuandum, Causam luxationis.* *36. Obferuandum, Causam luxationis.* *37. Obferuandum, Causam luxationis.* *38. Obferuandum, Causam luxationis.* *39. Obferuandum, Causam luxationis.* *40. Obferuandum, Causam luxationis.* *41. Obferuandum, Causam luxationis.* *42. Obferuandum, Causam luxationis.* *43. Obferuandum, Causam luxationis.* *44. Obferuandum, Causam luxationis.* *45. Obferuandum, Causam luxationis.* *46. Obferuandum, Causam luxationis.* *47. Obferuandum, Causam luxationis.* *48. Obferuandum, Causam luxationis.* *49. Obferuandum, Causam luxationis.* *50. Obferuandum, Causam luxationis.* *51. Obferuandum, Causam luxationis.* *52. Obferuandum, Causam luxationis.* *53. Obferuandum, Causam luxationis.* *54. Obferuandum, Causam luxationis.* *55. Obferuandum, Causam luxationis.* *56. Obferuandum, Causam luxationis.* *57. Obferuandum, Causam luxationis.* *58. Obferuandum, Causam luxationis.* *59. Obferuandum, Causam luxationis.* *60. Obferuandum, Causam luxationis.* *61. Obferuandum, Causam luxationis.* *62. Obferuandum, Causam luxationis.* *63. Obferuandum, Causam luxationis.* *64. Obferuandum, Causam luxationis.* *65. Obferuandum, Causam luxationis.* *66. Obferuandum, Causam luxationis.* *67. Obferuandum, Causam luxationis.* *68. Obferuandum, Causam luxationis.* *69. Obferuandum, Causam luxationis.* *70. Obferuandum, Causam luxationis.* *71. Obferuandum, Causam luxationis.* *72. Obferuandum, Causam luxationis.* *73. Obferuandum, Causam luxationis.* *74. Obferuandum, Causam luxationis.* *75. Obferuandum, Causam luxationis.* *76. Obferuandum, Causam luxationis.* *77. Obferuandum, Causam luxationis.* *78. Obferuandum, Causam luxationis.* *79. Obferuandum, Causam luxationis.* *80. Obferuandum, Causam luxationis.* *81. Obferuandum, Causam luxationis.* *82. Obferuandum, Causam luxationis.* *83. Obferuandum, Causam luxationis.* *84. Obferuandum, Causam luxationis.* *85. Obferuandum, Causam luxationis.* *86. Obferuandum, Causam luxationis.* *87. Obferuandum, Causam luxationis.* *88. Obferuandum, Causam luxationis.* *89. Obferuandum, Causam luxationis.* *90. Obferuandum, Causam luxationis.* *91. Obferuandum, Causam luxationis.* *92. Obferuandum, Causam luxationis.* *93. Obferuandum, Causam luxationis.* *94. Obferuandum, Causam luxationis.* *95. Obferuandum, Causam luxationis.* *96. Obferuandum, Causam luxationis.* *97. Obferuandum, Causam luxationis.* *98. Obferuandum, Causam luxationis.* *99. Obferuandum, Causam luxationis.* *100. Obferuandum, Causam luxationis.*

Internæ causæ

Internæ autem causæ sunt plurimæ, inter quas primo est humor copiosus tephæceus, crassius, gypseus, qui sua violentia luxare solet artus, quando multa copia huius ad articulum fluit, quæ incrassata extrudit ossium, vt dicit etiam Galenus libro sexto, de diffet. morb. cap. 7. Secundo sunt tubercula cruda oborta circa ligamenta, quæ ita intumescunt ab vna parte, vt abbrevient illius partis ligamenta, & ad aliam partem ossa detrudant: testis est Hippocr. 2. de artic. 3. & maxime hoc contingit in verberis dorsii, in quibus fit gibbositas. Cum hac autem coincidit illa 2. de artic. 6. vbi dicit, quod abscessus & inflammationes profundæ faciunt luxationes, quia tumores faciunt & contrahunt partes ita, vt ad contractionem ligamenti ipsius luxatio sequitur. Sub hac etiam continetur luxatio ligamentorum, ex qua sequitur dislocatio spontanea partium. Laxitas autem fit tribus de causis, primo enim in vtero quandoque generantur ita laxa ligamenta illa, vt in extractione fœtus ex vtero distrahantur & elongentur, & sic fiat postmodum luxatio capitum ossium, quæ ab his ligamentis continebantur, & hoc ita fiat ex luxatione partium, vt in 2. de artic. text. 24. & 3. de artic. text. 93. Aliquando laxitas illa est præternaturalis, cum mucosus humor collectus humectat ligamenta, vt scilicet 1. aphor. part. 59. & 1. de artic. text. 24. 25. & 26. & apud Galenum 1. de artic. comm. 6. patet, ex hoc enim humectantur ligamenta, & laxantur. Tertia causa est habitus totius corporis, cum scilicet redditur nimis macilentus: ad hoc enim humectatio articulorum & refrigeratio succedit, & hoc Hippocr. probat 1. de artic. 24. & 25. dicens, quod boues luxantur facile tempore hyemis, quia macilenti fiunt. Et huius maciei ratio est, quoniam non possunt colligere herbam paruum, quia productum nimis habent labrum inferius ac obesum eius prominentiam; ex hoc enim sequitur, quod cum macilente fiant, vt eis accidit circa finem hyemis, refrigerentur & humectentur articuli, & sic laxantur facile. Quarta causa solet esse quorundam neruorum vel copularum fractura autoritate Celsi lib. 8. per neruū autem intelligimus vel voluntarium vel copulas vel ligamentum: de neruo voluntario patet, vt cum in parte fracto vel leso neruo voluntario stupida fit pars illa, & sine motu vna appositæ magistra hens luxet articulum. De ligamento autem declaro, quia cum in resoluzione vnius lateris contrahantur oppositæ chordæ, fit luxatio, vel alio modo chordæ vnius lateris consumantur & lædantur. Tercio additur causa illa ab Auicenna proposita in tertia quarti, dum loquitur de fractura superciliorum cavitatum, quia aliquis est articulus, cuius alterum os cavitatem habet. In casu itaque, quod supercilium cavitatis illius frangatur, inde fit facile, vt alterum os de suo loco educatur. Causa autem fracturæ est ictus vel flexio. Vltimo addatis violentas extensiones, quam causam inter externas recentiores ponebant. Ad has succedunt species luxationum, de quibus in sequenti capite dicemus.

Luxatio causa

Boni articuli facile laxantur

De speciebus luxationum, deque earundem signis & prognosticis variis.

CAP. II.

Luxationis species quæ & quot.

Luxationum species plures sunt: nam si primo consideremus naturam luxationis, cum sit mala conformatio, & sit ratione mali situs partium, procul dubio ab vtriusque species elicietur. Nam quandoque vix ex suo situ os alterum dimoueri contingit, sed manet in supercilio, & hæc est luxatio, sed non absoluta & integra, ideo distinguitur in magnā & paruum, & hæc dicitur contorsio, elongatio & Græcis *anaplasia*. Quandoque vero à suo situ penitus educitur os, & est vera ac integra luxatio, quæ *displasie* Græcis nuncupatur. Aliquando tantum fiunt per longum in elongatione articuli, vt cum non tantum cadunt luxata ossa, sed solummodo à se inuicem elongantur & dicitur proprie elongatio hiantique articuli, vt in cubito euenit, cum ossa illa aperiuntur, quia ligamenta tantum laxantur, os non cadit ad latera, sed tantum fit spatium inter os & os, & sic euenit in tibia, crure, femoris osse, & sic in humero: & in hoc solum situs variatur. Aliquando os dimouetur vel ad latera vel ante vel retro vel supra vel infra. Et hæc sunt species, quæ propria habent signa, & de his maxime sollicitus est Hippocrates: nam ex varietate specierum fit etiam curationis varietas. Præterea sunt aliquæ species ratione simplicitatis & compositionis: aliæ enim simplicissimæ erunt atque facillimè curatæ, aliæ cū fractura, aliæ cum vlcere, aliæ cum osse detecto; addatis cum inflammatione vel tumore aliquo, aliæ cum denigratione partium, vt gangræna, aliæ cum callo superinducto, aliæ cum tephacea materia. Effectus etiam ipsi variant species: vnde horum aliæ faciles, aliæ terribiles, aliæ vero robustissimæ, aliæ dolorosæ, & aliæ mites. Variant etiam ratione compositionis, nam aliæ recentes, aliæ inueteratæ, aliæ

aliæ ex recidia, quod accidit ratione imbecillitatis partium, quæ facile laxantur; aliæ sanabiles, aliæ insanabiles, & hæc omnes species sunt considerandæ. Verum dicet aliquis, ego non possum cognoscere istas species, nisi signa sint aliqua, quibus ista distinguantur, quare de signis agendum est.

Pro signis itaq; inuestigandis dicamus, quod aliquæ sunt luxationes ita manifestæ, vt etiam rusticis ipsis pateant: aliæ vero ita occultæ, vt exquisitissimis egeant signis. Ideo de signis agens dico, quod signa trium sint generum, vt dicunt recentiores: vel si, ab his, quæ essentialiter adherent, id est, à natura partium & ossium adherentium: nam cū naturalis situs sit recta conformatio, si non addit illa figura, sed cauitas in vna parte, prominentia vero in altera appareat, primum signum ad hoc sumitur, quod quandoq; visu nō percipitur, sed tantum tactu & per impositionem digiti, vt in humero accidit: non enim visu accidit, sed appposito digito circa alam sentitur caput ossis, ad opposita autem cauitas. Etiam signa habemus à causis: nam cum conspicimus oborta esse tubercula circa coxendicem, si postea quis non potest illum articulum mouere, luxationem adesse sciamus; vel si defluerint materię aliquæ, vel præcesserint torturæ, quæ laxare potuerint.

Ab effectibus etiam cognoscuntur, dicit Celsus: vt si videamus distensiones neruorum: ex casu enim succedit neruis extensio, necessario facta erit luxatio, vel si febris, vel quia gangrena sine causa successerit, luxatum necessario articulum coniicimus. Præterea si situs præcessit, si dolor sit perpetuus, nam cum sit, & isti restitutores mali restituere volunt, nec possunt, succedit ex violenta illa agitatione & motione dolor ingens; Vrille, qui erat ante restitutionem, vnde hoc non restitutum esse articulum cognoscimus. Præterea aliquando ad luxationes succedunt sapores, vomitus, deiectiones biliosæ, vt si luxetur maxilla in vtroque articulo, & aliquis accedat, qui non restituat, sed coarctet articulum & ligamenta, huic superueniunt illa, & ex his coniicimus, non restitutum articulum, si quo soporiatione musculi temporalis, aliquando suppressio vrinæ & fecum, aliquando etiam succedit, vt in luxationibus coxæ, si enim hoc addit, signum est restitutum esse os ipsum.

Analogia autem hoc magis indicat, vt dicit Hippoc. siue Gal. in 1. de artic. 3. 4. vt si conferamus membrum egrum cum sano, & hoc vt ex opposita parte sana cognoscamus ægram: & hoc, quia sunt aliquæ conformationes partium natura male formatæ: ideo si oppositum conspiciamus articulum, cognoscemus an à natura sic conformatus sit articulus nec ne, & hoc maxime iuuat in paruis luxationibus. His itaq; signis luxationis species cognoscemus, quibus addimus signa à coniunctis, quibus etiam luxationis species cognoscere poterunt, & hæc præuidenda sunt necessario, antequam ad curationem veniamus: nam morbus est grauis, quia situs peccat & conformatio: præterea ad sunt solutio partium neruorum & frigidarum, ideo sunt diligenter pertractanda. Quod autem ad prognosticationem, primo præuidenda sunt succedentia, & primo, an mors sit successura: vt cum sit luxatio cum fractione ossis, vt in capite vel parte potenti, mors succedit. Præterea si luxetur vertebra vna, vt ad partes interiores, vel vniuersalis stupor vel mors succedit. Secundo præuidendum est, an sanitas successura sit non successura morte; & hoc multum facit; quia sæpe sunt luxationes insanabiles, licet non succedat mors, vt quæ sunt cum vlcere vel deiectione ossis. Tercio præuidendum est, an possint articuli restitui, exceptis illis, in quibus sunt cauitates expletæ, vt in luxationib. cubiti, postquā mulier aliqua adstringente aliquo medicamento congregauerit & indurauerit materiā ad cauitatē fluentem, vt postea euacuari nō possit: & vt plurimū mihi visum est hoc in his, qui à nebulonib. prius sunt tractati. Præterea luxationes, quæ callo obducuntur, nunquā possunt sanari, hæc quæ ligata appellamus, ideo in his non est tentanda restitutio. Præterea siccati & luxati articuli non possunt restitui: siccati dico, id est, in interna cauitate cum casu aliquo egreditur propria humiditas, vt in vulnere articuli est. Postquam autem luxatus sit articulus, nunquam restituitur, nam ligamenta illa facta sunt sicca. Præterea partes illæ omnes, quæ trahi non possunt, sanationem non admittunt, vt vertebrae & caput; reliqua omnia possunt. Supponatur autē quod possit fieri, quia quādoq; facile, quādoq; vero difficile restituntur, prædicendū est hoc, vt ignominia fugiamus. Facile restituntur luxata, quādo facilis luxatio est facta, vel à luxatione ligamentorum, vel in carne tenui cmaciatq; vel debilitato corpore: in his enim facilis est restitutio, vt Celsus lib. 8. c. 2. asserit. Difficilis autem est restitutio in his, quæ difficile luxantur, vt in fœmore & omnibus articulis siccis, qui s. labore sunt siccati & robore, vt balulotum. Præterea si magna sit chorda articulo applicata. Etiam omnes, qui ad extensionem sunt inepti, difficile restituntur, vt articulus coxæ. Digni autem facile restituntur. Ratione etiā ætatis, vt in pueris & fœminis facile reponuntur, quia omnia mollia sunt, vt in adultis e contra. Quintū præquidēdum est, an articulus restitutus maneat in loco,

preterquam si sit facta luxatio ab emolliatione ligamentorum, ut in coxa ratione ischiadis, ex qua facta luxatione, etiam qui restituuntur, cadunt. Secundum quod hic excipiendum est in diductionibus & hiatus ossium, cum per apertionem & diductionem dilatatur unum os ab alio in hoc enim potest esse, ut post restitutionem ossa simul non maneant, ut in cubito accidit, in quo raro restituuntur & sic accidit in iugulo & sepiissime, non autem huius est, ut Gal. dicit de fe, quia palzstra ludens ipse iugulus decedit: in hoc enim fasciæ sunt apponendæ, & per 40 dies non auferendæ, ipse quidem sanatus est, quia patiens fuit, reliqui autem nulli, dicit ipse, sanari potuerunt. Ultimo est prouidendum, quidnam sit succedendum in restitutione, vel si non sit restitutum inter quæ primum est sciendum, quod quando restituuntur in non opportuno tempore & quis aggrediatur restitutionem, ineptis instrumentis succedere solent febres, sopores, bilis educationes, porri concretio ex materiis fluentibus: præterea inflammationes, quæ leuior est affectio, quæ possit accedere in malis restitutionibus, quæ quandoque etiam suppurantur. Si autem frustrata sit restitutio, primo succedit deformitas articuli, secundo ablatio motus, vel diminutio, tertio membri luxati breuitas, gracilitas & effeminatio, ut in humero luxato, non potenter restitui vel male restituito: in hoc enim breuius sit brachium & veluti stupacea caro, ut asserit Gal. in 3. comm. in lib. de artic. cap. 8. & ratio est, quia articuli non sunt in loco suo, secundo quia partes sunt in otio. Sed notandum est, quod locus iste ille est, in quo reprehenditur Hippocrates à Gal. quirationem reddens dicit, quod vel querimus causam mediatam vel immediatam. Si mediatam querimus, hæc est luxatio: si immediatam, hæc est angustia vasorum, vel otium causa propinqua omnium. Ego tamen non deero, quin dicam duo verba pro Hippocrate, quia levis est accusatio. Hippoc. enim non querit causas omnes, nec per luxationem communem intelligit causam, quia verum est, quod dixit, quod vasorum angustia est causa immediata. Sed hic Hippocrates accipit luxationem pro eodem cum ipsarum distractione. Luxatio enim nihil aliud est, quam corruptio conformitatis partium ad articulum pertinentium, & procul dubio per hanc etiā vasorum distorsionem intellexit, quia & hæc vasa inter partes ad articulum pertinentes continentur, & ob id Hippocrates non dixit luxationem, pro causa communis sed pro mala conformatione illarum omnium partium: otium autē addit pro alia causa propinqua: quia ex otio emolli scit caro & inepta sit ad motum articuli. Dicendum est itaque, quod frustratis restitutionibus breuiiores fiunt artus, graciliores & effeminatiores ex otio & distorsione vasorum, quæ non subministrant alimentum: unde non errat Hippoc. ut vult ipse Gal. Notandum est tamen, quod membro multiplices extenuationes succedere possunt. Exempli gratia si luxetur brachium, extenuatur non tantum ipsum brachium, sed humerus & manus. Aliud notandum est, quod aliqua extenuatio accidere solet propter deligationem, ut 1. de artic. 6. quæ restitui potest per inunctiones & lotiones, & illa, de qua Hippocrates dicit quod accidit, quia non sit restitutus articulus, est immedicabilis. Tertio notandum est, quod non æqualiter omnes partes extenuantur. Superiores enim immediate aliquid patiuntur, sed non multum; quia ut vult Hippocrates 3. de artic. 8. si fiat exempli gratia luxatio in genu, coxa extenuatur quo ad carnem, os autem crescit: sed clarioris doctrinæ gratia vide, quæ ab Hipp. loc. cit. & à Gal. etiam loci eiusdem commento dicantur. Sed a duertendum est circa locum Celsi, quoniam ego credo esse corruptum, & est lib. 8. cap. 2. vel 17. in fine, ubi dicit, quod cum non restituitur aliqua pars luxata, pars immediate luxationi intra existens crescit quo ad carnem, immediata autem minus crescit, sed hoc est contrarium & rationi & rei & Hippocrati etiam ipsi: Ratio autem est hæc, in luxatione brachii brachium mouetur, licet superior articulus humeri moueri non possit, quare potius humerus quam brachium extenuari debet, tamen quia motus adest in inferioribus, magis crescere debent quam in superioribus, credo itaque ego corruptum esse locum, quia Celsus ad verbum recitat verba Hippocratis, quæ tamen sunt contraria ipsi Hipp. Quare dicere ego, quod loco verbi illius *crescit* legendum sit potius *decrescit*, & loco *manus otio* legatur *manus macies*, & hæc satis sint de prognosticis. 50

De curatione simplicis luxationis & ante & post restitutionem, & quot sint species restorationis & laqueorum.

CAP. III.

Curatio autem simplicis luxationis, si habeamus iuuenem luxatum in humero ex casu aliquo, & nulla adsit inflammatio, nullus dolor maximus, quid agendum est? Hoc à morbo indicatur. Luxatio enim est mala conformatio & malus situs articuli: quare bona conformatio & situs rectus restituantur: sed hoc fieri non potest nisi restituto osse ad proprium locum. Verum notandum est, quod

indicatio.

unum

vnum in his accidit, quod etiam in aliis chordis accidere solet; contrahitur enim chorda, postea autem laxatur & recurrit ad principium suum, & si casu frangatur, similiter facit. Hoc idem fit in corpore nostro, omnes chordæ principium habent ab vno osse declinantq; in aliud os, & manent extensæ, donec integræ sunt: cum autem franguntur, trahuntur ad eorum principium, vnde fit, vt os à musculis oppositis ad partes superiores trahatur: hoc stante nobis indicatur, quod si volumus trahere os ad suum locum, extendamus ligamenta & musculos illos, vnde crescunt scopi, conformatio, restitutio articulorum & elongatio musculorum: vnde in his reposicio ossis ad suum locum habet rationem causæ suæ, quæ non ad bonam conformationem deuenire possumus. Si. n. hac repositione ossis bona conformatio fieri non potest, vt & elongatio similiter se habet ad restitutionem. Nam cum in hoc casu statim cognito affectu, primū quod agendum est, est elongatio membri & musculi, ideo elongatio hæc rationem habet causæ, sine qua non ad restitutionem deuenire possumus. Elongatio autem facile fiet, si 4. attendamus: primo tempus, secundo organa apta, tertio modum extensionis, quarto quantitatem. Quo ad primū, tempus ab Hippoc. proponitur 4. de artic. 64. vt statim post luxationem fiat extensio, quia ad hoc calida est pars. Si. n. frigida esset pars luxata, dolores fierent maximi in extensione, & difficilis esset elongatio. Quare tempus elongandi membrum est statim post luxationem. Sed dicit quis, hæc difficile est admodum atq; raro accidere, vt Leo tempore statim post luxationem possumus adesse ad procurandam sanationem per elongationem, quæro itaq; quod tempus sit opportunum? Illi, qui sequuntur Hippocratem, vt Aui-cennas tertia quarti tract. 1. dicit, quod si hæc facimus prima die, vel secunda, vel tertia, non autem reliquis sequentibus, hoc erit tempus opportunum, & dici potest, quod statim factum sit & hoc confirmat etiam Galenus in lib. de ossibus, & ratio est ex Hippocrate: de artic. 3. vbi dicit, quod in quarto die sunt rebelliones maximæ, id est, exacerbationes, compulsionem, ex quibus succedunt multa incommoda, & frustrantur maxce restitutiones. Sed dicit aliquis, si transactum erit hoc tempus, eoque non fuerit medicus vocatus ad restitutionem quo tempore est restituendus? eo tempore, quo transit tempus inflammationis, quod constituitur ad extenuandum corpus ab Hippocrate, vt 4. de artic. 65. vbi dicit, quod extenuatus sit homo inedia vsq; ad septimam, quia tunc inflammationis periculum imminet. Quare septima dies erit pertranseunda. Si autem volueritis esse cautiore, obseruetur ratio nem Pauli lib 6. c. penult. vbi dicit, quod obseruetur inflammatio vsq; ad quartam diem, Quare cum prima die vel secunda vel tertia non potuimus restituere, restituemus septima vel octaua vel nona. Possumus etiam restituere in sequentibus diebus, sed non est tutum: quare in prima vel secunda vel tertia restituemus, nisi cogamur ab inflammatione desistere, quæ prius superuenit. Si. n. prius superuenerit inflammatio, differre debemus post quartam. Et ratio est proposita in 4. de artic. 14. vbi dicit, quod restitutiones ante decimum recte succedant: & ratio huius est, quoniam ante tempus illud natura consuevit mittere multum nutrimentum ad partes, quæ prius inanitæ esse debent, vt dicitur. Post autem, quia multa fuit materia, non possunt ita bene restitui: ex his enim laxiora sunt ligamenta in vna parte quam in alia, vel fuit aliqua materia, quæ impacta capiti alterius ossis obuoluit ad alium situm. Quare ante decimum facienda est elongatio & restitutio. Bene verum est, quod si neq; hoc tempus ante fuerimus vocati, non debemus desistere à restitutione, quæ quidem facienda est, sed sit cum maxima difficultate, nec ita recte succedit. Sed aduertendum est, quod ante restitutionem duo sunt faciendæ; vt si in prima die sumus vel secunda vel tertia, in hoc primo præparandus est articulus ad indolentiam, vt dicit Hippoc. secundo præparabimus ipsum ad facilitatem restitutionis. Extensiones itaque hæc fient commode, si laxentur partes & emolliantur & caleant; si enim mollitæ sunt, facilius trahentur & sine dolore. Emollitio autem fiet per humectationem: calefactio vero per frictionem vel per calefactionem affusa multa aqua calida, vt dicit Hippocrates 3. de artic. 49. & hoc etiam confirmat Paulus lib. 6. cap. 11. 4. vbi vnum habemus à Paulo consideratione dignum, & est, quod non solum aqua calida, sed laxante lotionem vti debemus, per quam lotionem laxante ego intelligo hydrocleon vel decoctum de maluis & althea; hic ergo est primus modus. Secundus modus est ab Hippocrate propositus, & est præmolitio manibus facta, quæ ego frequenter vsus sum in his locis, potissimum in quibus non possumus aptare & affundere aquam, vel vbi non adest aqua copiosa: frico enim tunc articulum & chordas & musculos inuncta manu oleo vel alio pingui, vt lardo vel axungia minime salita. Hoc factum, tertium proponitur, & est quedam leuis mutatio vel notatio dicta. Hippocrates enim vult, quod in luxato humero, cum præpolitus erit humerus & laxatus, mutemus leuiter brachium, quia laxantur chordæ, & præparatur articulus ad indolentiam & facilitatem restitutionis. Huius autem restitutionis duo sunt genera, vnum palestricum dictum, alterum vero Medico-

*Elongatio
mbr. i. quod
requirit.
1. Tempus.*

*Difficilis
est repositio
elongatio-
nis.*

*Ante resti-
tutionem duo
agenda.*

*Restitutio-
nis duo ge-
nera.*

1. Palestrica

2. Medica.

tum, ut habetur ex Hippocrate & Galeno in 1. de artic. 14. Palestricum est restitutio illa, quæ fit à gymnasticis hominibus, qui exercebant iuvenes, qui solis partibus corporis restituebant, & hæc restitutio restauratio palestrica dicebatur. Medicorum autem dicebatur postea, quoniam cum non possint Medici solis partibus corporis ut in restitutione, alia videntur ratione, solis manibus scilicet quæ quidem si leues sint ac in validæ instrumentis vtuntur. Organa autem sunt lora quædam, fasciæ ac linteola plurima, quibus ligantur artus & extenduntur, quando facilis non est restitutio: quia si facilis sit manibus, manibus non administratur. De fasciis autem habetis librum pulcherrimum à Galeno & Oribasio. Præterea utimur instrumentis aliis, ut scala, pilis variis, scamnu etiam hippocratico, de quo 4. de artic. text. 29. tractatur. In pilis omnibus, delicatam compositionem adhibere oportet. Quod vero ad instrumenta attinet, habetis librum Oribasii de machinamentis, & sic extendemus articulos. Modus autem extensionis habetur 1. de artic. Cum autem articuli vel artus conformari non possint, nisi os extra locum proprium positum ad locum suum reuocetur, quod fieri non potest, nisi extendatur membrum, & attrahatur ad locum suum naturalem: unde quamvis non primo indicata sit extensio, quia tamē rationem habere causæ sine qua non, ideo primum illud tractandum est: at quia de tempore opportuno iam egimus, nunc de organis verba facienda sunt. Norandum est igitur, quod extensio fit vel simpliciter manibus, vel loris, vel organis: manibus, ut Medici, ut si digitus sit luxatus, in quo sola Medici manus sufficit: at si valida sit facienda attractio, instrumentis est opus: unde quando non sufficiunt manus, quia vel labuntur, vel quia contractio & validior requiritur vis, ad lora veniemus, in quibus figura primo est consideranda & compositio, quæ non potest à me vobis verbis exprimi, sed in actu practico vos docebo, & poteritis videre, & optime etiā ex Oribasio addiscere, & figurā eius apprehendere. Ex qua autē materia fiant lora, proponitur ab Hipp. & Gal. in 1. de artic. 33. quæ sit tenuis, mollis & facilis plicatu. Aduertendū est tamen, quod materiam lori non explicat Hippocrates, nos tamen scimus ex corio fieri: quod natū autem sit & esse debeat hoc coriū, non explicat Hipp. neque Galenus: Ego autē certuinis femper sum usus coriis & lineis etiā, quæ tamen sint macerata. Nam ex corio bubulo vel vitulino nimis sunt dura: tortores me docuerunt rem hanc, quoniam & ipsi certuino vtuntur molli, quo conficiuntur collecti, & his quidem maximo usus sum cum succellu. Crassum. n. est, molle, plicabile ac facile vnguētū, & pingue quodpiā admittit, nos tamen ē pomata solemus ipsum invngere, quoniam recipitur in corii substantia, & mollescit coriū ex ipsa. Sed quoniam aliquando hæc nō adsunt, ideo antiqui vtiebantur fericis vinculis & funibus, quibus etiam nos quandoque sumus vsi. Sed tunc obseruandū est præceptū Hippocratis, ut loboluamus partes vinciendas pannis laneis vel lineis tenuissimis & mollissimis, cui superindemus funem, ne membrum à fune patiat. Pertinet etiam vnum aliud ad usum laqueorum, ut scitis cui parti apponendi sint laquei, ut si luxatus sit humerus, cui parti brachii vel cubiti sit apponendus. Dico itaque quod quanto remotior erit laqueus à membro collocatus, tanto erit perfectior: tunc. n. multe partes elongantur, nec ira periculū est laxationis, & magis partes illæ extendentur, cum omnes perfecte possunt extendi. Norandū est aliud in vsu laqueorū, quod obseruat Hippoc. Et est cum vult trahere articulū infra, cum duo sint articuli, utriusque apponit vinculum: quia quāto articuli sunt superiores, tanto difficilius reponuntur, quia sunt crassiores & carnosiores, quo sit ut maiori egeant attractione: unde si vni tantum articulo applicetur, nimis trahetur & violentā patietur tractionē, exēmpli gratia, trahendū est brachiū ob luxationē in humero, adsunt infra hoc duo articuli, Hipp. in hoc casu carpo & cubito apponit ligamenta, ut tractio minus sit molesta, dum duo trahuntur, quam si vnus tantum traheretur. Si autem ligamenta satis non erunt, venietis ad organa, & præsertim in luxationibus violentis & difficilimis & inueteratis, quæ semper sunt difficiles. Inter organa autem primum est scala mechanica, de qua agitur 1. de artic. 17. Est enim scala illa, quam lignarii circumferunt. Oribasius etiam hac ad hæc omnia genera luxationum vtitur reponēdarum. Secundum locum tenet capsula, instrumentum in scrinii modum, de quo Galenus agit 2. de fract. com. 64. & Oribasius 6. de machinamentis. Tertium est scamnu Hippocratis descriptum 4. de artic. 49. et infra. Hæc tria sunt, quibus nos agere possumus, circa quæ habetis Oribasii librū de machinamentis, quæ etiam conueniunt, per quæ tandem ad extensionem omnia veniemus, ut optima fiat restitutio.

*3. requisitū
ad modum
extensionis.*

Tertium autem caput, quod requirebatur ad elongationem, erat modus extensionis, de qua nunc merito tractandum est, cum iam etiam de tempore & organis tractauerimus. Duo itaque sciendum est esse genera extensionis apud Hipp. 1. de artic. 1. alia scilicet quæ per suspensionem fit, & alia, quæ per tractionem in diuersas partes agitur. Sed quoniam suspensio ista magis facta erat ad ostensionē, quam ad usum, nec probatur ab Hipp. quare & nos

eam

eam dimittimus, de alia tantum loquemur. Circa extensionem ergo, quæ per tractationem in diuersas fit partes, duo potissimum sunt obseruanda, facilitas & indolentia, quod fiet, si præceptum Hippocratis obseruemus 1. de fract. 1. dum dicit, quod Medicus luxationum & fracturarum extensiones rectissimas facere debet, quod quidem fieri debet ratione ossium, ligamentorum: ossa enim propter figuram obseruantur, ligamenta vero & musculi propter fibras, ut si, exempli gratia, luxatus sit humerus ad partes superiores ischiadis, quod habet caput ad partes interiores, si trahamus ita, ut caput respiciat ad partes interiores vel exteriores, non recte traheretur, quoniam non tantum secundum rectitudinem, sed ad eam lineam in rectitudine est trahendus, quæ in sua natura manet ratione ligamentorum autem, quia si recte non facta fuerit, aliqua breuia, aliqua longa fient ratione musculorum; quia si non recte trahamus, aliqui breuiiores fient, & ad hoc difficultas succedet extensionis, & sic dolor, quia chordæ illæ factæ longiores diuellentur & laxabuntur, & hæc quo ad modum extensionis.

Quartum caput continebat quantitatem extensionis, quam optime sciet Medicus, si capita illa ante oculos habebit, quæ 1. de artic. 6. traduntur, & primo ut sciat, ex quo loco exciderit os, secundo ad quem locum excidit, & quia via os luxatum sit, ut patet ei via ipsa: nam maxime facit ad repositionem cognitio viz luxationis: ut in humero ad infra luxato, circa quem dicit Hippocrates, quod luxari non possit ad interna, quia ibi adsint ossa hoc impediencia: Gal. tamen dicit se vidisse quædam: ergo certauit Hipp. hoc non est dicendum, sed luxatio facta erat ad partem anteriorem, sed violentia musculorum tracta est ad internam partem: & ideo sciendum est, quod non deuenit primo luxatio ista ad partem istam, sed cum primum factum esset ad externam, violentia postea musculorum tracta est ad internam, & hoc maxime facit ad curationem ipsam. Hoc posito, reuocemus os ad locum suum, debemus itaque trahere, & in hac tractatione tantum est trahendum, quanto fuerit dislocatio, & etiam magis est trahendum, quia adsunt in ossium capitibus cavitates inæquales, unde ulterius sunt, ut manibus postea in locum suum proprium truantur. Sed aduertendum, quod in hac extensione adest semper maximus labor Medici & dolor etiam ipsius ægri: & quoniam sæpe accidit, ut nudus reperitur æger, & Medicus præ labore detecto capite vestibusque demissis, ideo nunquam sinatis, ut sub dio fiant extensiones istæ, nam succedere possunt febres, catharri, dolores capitis & alia id genus. Secundum notandum est, quod aliquando ita difficilis est extensio, ut difficulter æger eam tolerare possit, sed in animi defectum cadat, quare in hoc casu curare oportet, ut æger extensus & decumbens maneat. Aliud etiam agendum est, ut antequam ad hoc deueniatis, vinum odoratum & ossa madefacta exhibeatur. Tertio, ut non deficiatis animo, etiam si cadat æger in defectum animi; nam sola aqua inpersa in faciem eius reuocetis ipsum, nec desistatis ab opere. Si autem magnum sit deliquium, restetque magna pars actionis, tunc dimittatis; & hæc de extensione. Secundus scopus est, ut ossa ad locum suum impellantur manibus vel Medici vel ministri: in hoc casu inuictas habeatis manus vel oleo rosato vel cerato aliquo. Impelletur autem duobus modis, vel per motionem siue motionem hinc inde factam vel per impulsum: per motionem, ut in humero, in quo per impulsum non potest fieri, sed circumducatis leniter, nam hoc modo reponitur in suum locum. Impulsione autem in oppositam partem illi ad quam prolapsum est, quod sit vel manibus vel pedibus, vel genibus, vel humeris, vel vinculis, ad quem succedit primus scopus, scilicet conformatio ipsius articuli & situs restitutio, ac restitutio articulo requiritur, ut conseruetur in suo loco & situ, quod in sequenti capite ostendemus.

De conseruatione restorationis factæ per fascias & alia instrumenta. CA. 2. IV.

Extendi articulum, & extensum manib. protrudi inuictis in suum locum debere diximus, quo facto plurima nobis faciunda proponuntur: primo ut conseruemus articulum in loco, secundo ut inflammationem prohibeamus, tertio ut consolidationem ligamentorum restauremus. Primum autem quod est conseruatio articuli in suo loco, fit his modis: primo figura optima partis, secundo addita ligatione, tertio quiete, quarto collocatione bona situs, quinto medicamenti opportuni. Figura naturalis procurabitur, si bene quiescat pars, nec sit cum dolore, unde postea non succedat inflammatio. Deligatio autem conueniens & sine dolore faciet, ut non defluant humores, nec effervescent, & cum sit distincta, nec ex loco excidant partes. Quies idem facit & collocatio conueniens. Hæc eadem medicamenta facient; ultimo consolidatio ligamentorum fiet quiete & medicamentis coagulnantibus, & ideo opus est, ut ista omnia examinemus ac perpédamus. Primo ergo quoadfigurationem,

4. Requisi-
tū est quæ-
ritur ex
fuerit.

Notandum
circa exten-
sionem.

Conseruatio
articuli re-
statur, quæ
& quibus
modo fiat.

*Figura
quatuor
partium.*

hæ geminæ sunt, figura scilicet: articuli restituti, & figura totius membri: exempli gratia luxatur articulus in cubito & restituitur.

*Exemplum
de genu.*

Restitutus debet ne flexus manere an rectus? debet equidem manere flexus, nam naturalis illius articuli est illa figura: quare tum remittendus est articulus in cubito, statim ad figuram flexam reducatur. Cum autem sit in genu, quia rectum genu ut plurimum manere debet, ideo figura eius, cum iam repositum fuerit, instituatut recta. Totus etiam artus figura est obseruanda, exempli gratia luxatur humerus, restituitur, adiungatur ei figura articuli iam dicta: totum autem brachium constituendum est flexum, quia ut plurimum sic manet naturaliter: & ideo in superioribus partibus semper flexa maneant membra, in inferioribus autem recta manere debent. Vnum tamen obseruandum est, quod figura articuli, vel totius membri est apponenda ante deligationem, ut docetur i. de fract. 1.

*Fascia
quæ
esse
debet.*

Si enim primo deligemus, non poterit flecti: & si tunc flectatur, immutabitur deligatio & situs ossium, & quia adstricta erant, laxabuntur, & e contra. Quare primo est faciendæ ac instituendæ figura, & postea sic instituta deliganda. Sed quo fiet deligatio? fasciis: laneis forsitan? non, quia nimis laxæ sunt: nec stuppa: ut quidam faciunt, ideo fiet lineis fasciis, quia hæc optime constringunt: sunt autem molles, mundæ & æquales: molles, ne faciant dolorem: æquales, ut æqualis fiat deligatio: & mundæ, ut cognoscantur excrementa, quæ quandoque solent educi. Latitudo autem fasciarum, quænam esse debeat, non est semper certum, quoniam non eadem sunt partes: aliquando enim partes sunt crassæ, aliquando tenues: inde crassiores partes fascias requirunt latiores, tenuiores vero strictiores, ut

*Latitudo
fasciarum.*

*Crassa
partes
quatuor
quæ
tenues
res.
Numerus
fasciarum.*

li, exempli gratia, laxaretur vertebra dorsii vel costæ, quia tunc totus truncus est aptandus, ideo lata est opus fascia: at in digitis luxatis duorum digitorum latitudinem non excedat. In reliquis autem proponitur in i. de fractur. 37. quod sit quatuor digitorum in crassioribus, in tenuioribus vero trium. Crassiores autem sunt femora & genu: tenuiora, tibia, humerus, brachium, manus. At notandum, quod cum dicimus latitudinem fasciarum esse quatuor vel trium digitorum, intelligimus hoc de digitis ægrotantis, & non alterius. Numerum autem fasciarum etiam obseruare debetis, quod primo in deligationibus his duobus sunt genera, vnum est, quod ab Hippocrate dicitur subligamen: alix vero fasciæ exteriores dicuntur, & tot apponuntur: unde sciendum est, quod primo ligamus articulum, postea quædam splenia apponimus, quibus deinde addimus etiam fascias exteriores dictas: illa autem subligamina sunt interiores fasciæ, & tot esse debent fasciæ. Aliqui vtuntur vinculis Hippocratis, Celsus, Galenus, Paulus duobus vtuntur, & etiam nos: Exteriores vero quandoque sunt tres, quandoque quatuor. Galenus autem vtitur, & ego quandoque vna, quandoque nulla, quoniam quandoque istæ apponuntur causa spleniorum.

*Longitudo
fasciarum.*

Longitudo harum fasciarum describi non potest, quoniam differentia maxima est inter partes deligandas: ideo cum nulla detur proportio inter has partes, longitudo fasciarum, neque sciri, neque describi potest. Ego tamen obseruavi, quod antiqui volunt, quod longitudo fasciarum in deligationibus, sit quatuor vel quinque cubitorum, trium autem in tenuioribus, quatuor in crassioribus. Et hoc etiam ego obseruo: mensura autem sit cubitorum ægrotantis, cubitum intelligendo ab apice digiti medii usque ad articulum cubiti, vel accipio cubitum per duos dodrantes ipsius ægri: unde ut certiores assignemus mensuram longitudinale, fasciarum dicimus, quod cum membra corporis sint in triplici differentia, loquendo tamen de artubus, alia enim sunt maiora, alia media, alia vero minora, siue dicamus alia tenuia, alia crassiora, & alia media: in tenuibus articulis fasciæ, triplo minores esse debent, ut sint paulo maiores vno cubito: in crassioribus vero triplo sint maiores, in aliis medio modo, ut verbi gratia, in coxa deliganda fasciæ sint duodecim cubitorum, quia ad deligandam coxam requiritur, ut etiam illa ipsa deligantur, ideo oportet, ut sint duodecim cubitorum longæ: in brachio vero trium cubitorum: in genu usque ad mediam coxam quatuor cubitorum: in digitis vero minus duorum cubitorum. His enim fasciis partes articuli & ligabimus, & conseruabimus in loco suo, & etiam inflammationem prohibebimus. Inflammatio enim primo solet oriri à dolore luxationis, secundo à dolore extensionis, cum sanguis fluit ad locum affectum, & humores, qui putrescunt, cum fluent ad locum, tumorem faciunt, atque calorem introducent, & sic inflammationem: unde si exprimamus humorem fluxum, inflammatio prohibetur. Sed quoniam loca, ad quæ exprimuntur humores, sunt duo superiora & inferiora: sciendum est, quod vti loca hæc inter se differunt, ita & expressio non eadem, sed differens esse debet: unde si sit luxatus in cubito articulus, ad sintque humores exprimendi, possem ego supra & infra exprimere, sed quoniam inferior artus breuissimus est, ideo humor, qui adhuc exprimi debet, paucus etiam esse debet: quia locus est paruus: superior autem artus, cum sit amplissimus, ideo ad

illam

*Inflam-
matio
à quibus
producat
in luxatio-
nibus.*

*Humoris
expressio
à
luxatione
ad aliam
partem.*

illam maiorem humoris partem exprimemus: hac enim expressione fiet, vt sanguis, qui adhuc fuit, vel fluxurus est, impediatur. Sed quæret aliquis, an hoc sit tutum, cum Hippocrates in lib. de artic. & fractur. meminerit aliquando de tumoribus, qui fiunt ab expresso sanguine: vnde ex hac expressione humorum possunt fieri tumores ad inferiores partes.

Dubium, an expressio eueniat.

Præterea potest recurrere ad partes principales sanguis ipse, & ita interficere ægrum. Ego autem pro resolutione dico, quod est modus in omnibus, ideo moderate hoc est tentandum, & per moderata: & ideo dicebatur, quod id, quod infra exprimitur, sit parum: nã tumor quidem fiet, sed nullius momenti: quæ autem ad superiora siue ad superiorem partem detruditur, ac exprimitur materia, non detrudetur ad partes principales, sed partim ad cutem, cum fient liuores ac maculæ nigræ ac liuidæ, alia autem pars materiz, quæ non est extra venas, ad caviore detrudetur venarum. Etsi etiã detrunderetur ad partes principales, nil damni afferret, quia sanguis bonus est, nec putrescit ita facile. Hoc constituto memoriz mandandum est præceptum Auicennæ, sen. 5. lib. 1. vt scil. sinus solliciti in fasciis, vt non imponentur calidæ & siccæ: quoniam ex Gal. in lib. 1. de fractur. 21. fasciæ calefaciunt, & calefaciendo humorem trahunt: secundo non cohærent inter se multo tempore, vnde postea dissolutis fasciis, articulus potest elidii iterum: frigidæ itaq; sint fasciæ ratione impediendi fluxionem.

Fasciæ quales esse debent.

Ad hanc autem euitandam monet Paulus, vt fascias madesciamus, vt videre est in libro 6. capite 2. vel aqua, vel aceto, vel posca ipsa, id est, aqua & aceto mixtis: item vino pontico & austero: Celsus autem vino & oleo: Auicennas vero cerato infrigidante inficit fascias. Cum autem sint isti diuersi, quo humido sunt fasciæ ipsæ humectandæ. Ego libenter accurro ad vinum austerrum, & præcipue album, vt fasciæ non ita inficiantur, & inde etiam facilius dignosci possunt, qui exeunt & educuntur. Si autem tale vinum non adsit, posca vtamini: aqua autem simplici non vtor ego, nisi æstatis tempore, quod facio, quia frigidus tunc requiritur medicamentum: hyeme vero vtor oleo cum vino austero, oleo scil. simplici communi, vel etiam rosaceo. Bene verum est, quod æstate frigidis, hyeme verocalidishis vtor. quamuis Auicennas moneat, vt vtamur frigidis. Ego tamen calcacio hæc ad humectandas, & madesfaciendas fascias, quoniam obseruaui, quod si statim frigida apponantur, sit rigor & dolor, & etiam retractio quandoq; ligamentorum. Præterea licet hæc calida apponantur, statim etiam refrigerantur: sed quia sensim refrigerantur, non possunt facere rigorem illum, & melius conseruant restitutum articulum. Notandum est aliud, quod si vultis madesfacere fascias, optimum erit, vt semper madidæ maneant, quia postea spatio duodecim horarum ad plus siccabuntur: vnde ego soleo mandare, vt decima quæq; hora aspergantur fasciæ ipsæ frigida aqua vel oleo cum vino mixto, at æstatis tempore sexta quæq; hora: si enim permitterentur siccati, succederent ea incommoda, quæ supra diximus. Notandũ est tamen, q. in ingentibus frigoribus non admitteremus humectatione, vnde quia sæpe succedit affectio quædam semper durans, ita vt postea in mutationibus aeris frigidis, in tempore pluuioso, & in coniunctionibus, atque oppositionibus lunæ patiantur, ita vt etiam veluti, si astronomi essent, ista prædicere soleant, ægri dolore suarum partium luxatarum, quare quandoq; dimittendus horum humectantium vsus, quæ supra dicta sunt: vt fit etiam, quia quandoq; negligentes sunt ministri. Et ideo aliud ex Hippocrate 1. de fract. 21. notandum est, quod scilicet possumus etiam ceratum humidum apponere fasciis præparatis prius, quibus opus habemus: vnde primo madesfacimus locum aliquo cerato arcente inflammationem ex Hippocrate, & quo potest fascia hæerere: hæc autem plura sunt, dicit ipse Galenus in eo loco, 1. scil. de fracturis 21. aliqui autem vino & oleo, aliqui vero accipiunt bolum armenam, sanguinem draconis, acetum & album oui, quo illinunt partes. Sed aduertendum est, quod omnia hæc pessima sunt, vt etiam sunt cerata & emplastra, quibus vrebantur antiqui, quæ omnia mala sunt nullaque bona: nam vinum & reliqui succi statim siccabuntur, & sic fasciæ siccæ manebunt: nec album oui est bonum, quia ita conglutinat fascias, vt non possint separari, & fit dolor maximus in auulsione, & ex ipsius siccatione. Acetum etiam, quia siccatur, non est bonum, & si iterum affundatur, pruritus maximus excabitur.

Fasciæ quibus madesfacienda.

Notandum circa madesfaciendum fasciarum.

Notandum aliud.

Ceratum simius pro arcentia inflammatione dandum.

Ceratis: mudi apponatio Eddescripta.

De mixtura autem illa iam dicta, si loquamur, pessimum est medicamentum, quod credo ego non tantum deuenisse ab Arabibus, sed ex inferno, quia ipsi sunt nigri vt Diabolus: nam nimis siccatur loca, & arripit vt Diabolus. Præterea si non potest hoc educi, qui collectus est, facit, vt congeletur humor ille, & induretur. Emplastrum etiam non est bonũ, quia nimis durum, & excitat dolorem. Imponemus itaq; idem Hippoc. quod in fasciis imponebatur, diciturq; ceratum humidum. Hoc autẽ docet Gal. lib. 6. de comp. med. per gen. cap. 4. Est enim medicamentũ a cera ceratum dictum, & ab oleo humidum, & portio est

§. ij. olei vel rosacei, vel violacei, vel ex oliuis. Sed consideranda est natura ceræ: quia si humidior est cera, tantumdem capietis de vtrisque: contra vero, si durior. Sed notandum, quod duplex est modus conficiendi hoc ceratum, ut i. de fract. 2. asserit Galenus: primū est, in quo tantum ceræ erat, & olei, ut dictum est, & hoc dicitur album humidum, & de hoc etiam nos loquimur, de hoc Galenus 3. de artic. 7. & 16. Aliud habebat paucam picem admixtam, & hoc dicitur ceratum picatum, quod est nigrum, sed ipso non utimur, de quo Galenus 2. de fracturis 21. Vt igitur fasciæ opus suum recte perficere possint, id est partes optime deligare, & deligatas in suo loco continere, opus est illas aliquo humido inungere, inter quæ illa humida a Galeno proposita non probantur, nec etiam illa recentiorum, quia nimis arida sunt, unde refrigerant partem: quare ad ceratum Hippocratis est deueniendum, non tamen ad illud picatum, sed ad album, quod constat ex oleo, & cera, ut supra dictum est. Sed in hoc capite vnum monet Galenus, quod hoc medicamentum id habeat, ut inflammationem impediatur, id est, quod fasciæ contineat, quod sit à cera & oleo rosato, unde aliud additur, quo loco huius uti possumus: nam cum mollescit, & inflammationem arcens, maxime conueniet: quod si non sit molle, dissolui poterit aliquo oleo: hinc fit, ut ego non semper illo iam dicto usus sim, sed aliquando vnguento de cerussa sine camphora: nam etiam consistentia, idem est, & etiam inflammationem arcet: cerussa enim mitigat, cera idem facit & oleum, ac etiam repellit. Vt etiam vtor linimento simplici, & eo partem moderate inungo. Aliquando vtor vnguento magistrali dicto, cum rosaceo dissoluto, hoc tamen ante fasciarum inuolutionem partē inungendo: vel vnguento de thutia magistrali cum oleo myrrino, & rosaceo dissoluto: & ut dicit Galenus 1. de fract. 21. parum est inungendum, quia si copiosa additur, ex copia fasciæ dilabuntur: inuncto oleo, fascia obuoluatur: quorum autē, dextrorsum an sinistrorsum? in hoc consistit maxima occasio erroris, vel bonæ actionis: unde Hippocrates 1. de fract. 35. proponit ritidēs, quo sit vertendum, quod obseruandum est, quo inclinet membrum passum: ut si membrum post restitutionem in aliquam partem decumbat, in oppositam partem est facienda deligatio. Quare si genu, verbi gratia, ligetur, & crus, vel pes, in partem anteriorem declinet, ad oppositam fasciæ est deliganda: nam per hunc ductum fasciarum, cutim simul nobiscum ducimus, & consequenter carnes, & ab his trahuntur ossa etiam. Hoc facto, & obseruato bis aut ter articulum deuoluemus, non semel autem tantū, ut Hippocrates, Celsus, Galenus, & omnes antiqui boni Medici volunt, hocque: ut constructio sit validior, non tamen dolorosa: quia si vna tantum deuolutione valde adstringeremus articulum, dolore ligatura faceret, quare tribus laxioribus hoc est faciendum, & non ita arcte, sed sine dolore fiat compressio.

Deligatione hac super articulum facta, ad superiora veniemus sensim & sensim, & dicit Celsus libro octauo capite secundo, quod veluti in cochlea vertatur fascia, & serpat, id est, eo modo in gyrum ascendat fascia, & hoc ex Hippocrate 1. de fract. 25. in qua multa sunt obseruanda, sed hoc vnum dico, quo ad superiora ligamus, ut defluxus prohibeatur, & humores fluxi exprimantur. Notandum tamen est, quod non sint nimis stricte, sint crebre & frequentes, id est, quod vna inuolutio alteri infideat, ut squamæ piscium, id est, ut posterior sequens anteriorem dimidio liget. Sed dicit quis, quousque ascendendum est? Celsus terminum ponit tres diuolutiones: sed tamen nimis angustus est terminus, quia quandoque fluxus est arcendus, quod non potest fieri per tres diuolutiones, quousque itaque? dicit Galenus in multam partem membri sani, si potest tantum tribus reuolutionibus fieri, fiat, si non, pluribus. Deueniamus itaque hac fasciā ad superiora, & ibi finiemus: postea alia est adiungenda, quia etiam ad inferiora est exprimendum: ita eadem ratione præparata apponetur, sed hæc longior esse debet, nam munere duarum fasciarum fungitur, quia, ut dicit Galenus 1. de fracturis 30. antiqui tribus tantum fasciis utebantur: sed ista vltima duarum munere fungebatur, ut scilicet prima deorsum, postea sursum iterum deuoluatur.

Longitudo itaque non explicatur à Celso, qui dicit, quod dimidio longior esse debet cum superiori dicta, ut si prima sit trium cubitorum, hæc sit quatuor cum dimidio. Hæc fascia huius longitudinis parata obuoluemus, & omnes consentiunt, quod vna deuolutione articulum deuoluamus, quia non egemus tanta expressione, ut in superiori, secundo hæc iam facta est supra expressio: sed quia ratione ducenda est hæc fascia? aduersa ne priori eodem modo: Celsus vult, quod sit priori aduersa: Galenus vero 1. de fract. 33. cum quo etiam est Paulus, vult ut eodem modo cum superiori ligemus. Et ratio Celsi est, ut membrum maiorem habeat æqualitatem, quia in medio per hunc ductum contrarium consistit: Hippocrates autem relinquit hoc iudicio Medici, dicens, quod iudicet Medi-

Medicamentum primum quale esse debeat.

Deligatio modo.

In deligatione quousque sit ascendendum.

Quo ducenda sit fascia secunda, an sit aduersa priori, an vel eodem modo.

eus, an in sinistra, vel dextra, vel vtraque sit ducenda fascia, quare nos, ne iudicio quorundam relinquamus, qui nihil aut vident aut cogitant, sententiam nostram dicemus: ego scilicet in hac aduersa deligatione vsus fui, & hoc quando non multum inclinatum esse membrum in aliquam partem vidi, vt Celsus, cum Galeno tamen ego sentio, quoniam cum ipso nullus fieri potest error, quare cum ipso sum, & Medicus esse debet: Nam cum Galenus à natura rei dicatur, suam maxime laudo sententiam, vt laude magis dignam, quia si genu obuoluam, duco primo istam fasciam extrorsum. Sed quare hoc factum est? quia in illam partem membrum inclinare volumus: si autem introrsum ducam secundam, contrarium faciet: & ita quod prius intendebamus, non assequemur.

10. Quod si etiam hæc nimis in contrariam ducat partem membrorum, non refert. Hippocrates enim dicit, quod aliquid etiam vltra est ducendum in pueris, qui luxati atque intortiti nascuntur, quare nihil refert. Ideo dico cum Galeno, quod semper eadem fascia eodem ductu est ducenda: quare hac vnica deligatione super articulum ducemus eodem ductu, ad inferiora postea veniemus, non frequentibus deligationibus, vt non nimis exprimatur, & præterea, vt sufficiat fascia remouendo sursum, cum deuenimus ad partem inferiorem, iterum ad superiora veniemus vsque ad partem illam, in qua incepit prima: prima enim fascia sursum, secunda vero deorsum exprimit, quare vsque ad principium primæ, ego cum secunda deuenio, vt maior fiat sursum expressio.

De Fasciis, quo ad earum conseruationem & stabilitatem in loco.

CAP. V.

- I mpositis fasciis, quid agendum est, vt stabiles in suo loco maneant ipsæ fasciæ? hoc fiet non, sicut faciunt recentiores, appposito filo deuolutionibus per acum, sed ex Hipp. per splenia sunt detinendæ. Splenia autem ex Galeni. 3. de offic. med. com. 1. & Paulo à splenis forma sic appellantur, quamuis hoc non dicat Galenus, sed additum sit ab interprete: & splenis brutorum figuram tenent non humani, quia hoc modo non est factus splen humanus. Splenia autem sunt panno, & ideo à Celso dicitur pannus triplex vel triplicatus: solebat enim quandoque esse simplex, quandoque duplicatus, quandoque triplicatus, & aliquando multiplicatus. Vfus autem huius est varius: antiqui ipso utebantur quandoque ad extendenda emplastra, & vnguenta parti ægræ applicanda, & hoc etiam modo sepe vitur Galenus in lib. 6. de comp. medic. Alter vsus erat ad explendas cauitates, loco plumaceolorum enim nostrorum ipsis splenis utebantur. Tertius vsus est ad deliganda membra, quandoque enim ita erant longa, vt possent his deligari partes. Quartus vsus est, vt contineat fascias in suo loco, quo modo vitur Hipp. Ex horum autem vsu vario longitudo itidem ipsorum varia esse debet. Sed nostra qualia, & quæta esse debent non erunt simplicia, quia nimis essent mollia, nec possent continere fascias, quare triplicata, vel quadruplicata erunt, vt dicit Galenus 1. de offic. med. 1. Longitudo sit maior latitudine, vt lien est bruti, non sint sicca, quia dicit Galen. 1. de fract. 3. 2. quod essent nimis dura, quia comprimerent, & comprimendo molestarent partem affectam, quare ipsa eodem cerato disco inungemus in parte exteriori, non tamen inungemus copiose, siue apponemus vnguentum illud, hoc autem fit, vt etiam diutius fascia contineantur.

Longitudo itaque horum sit, vt dicit Galenus, tanta, quanta pars, quæ occupatur à deligatione, latitudo quatuor vel trium digitorum, non tamen est semper equalis, sed in digitis minor, vt in digitis vnus digiti, in manibus trium digitorum, in maioribus adhuc membris quatuor digitorum. Numerus horum sit tantus, quantus est opportunus ad totum membrum occupandum. Locus a, applicationis est per longitudinem partis affectæ: nam munus horum est, vt fascias contineant, ne membrum inclinet in aliquam partem, & ita sunt apponenda, vt alterum tantum alterum attingat, non autem superequietur.

10. In his autem notandum est, quod Celsus non vitur his, sed accipit linteolum tantæ magnitudinis, vt est membrum affectum: Ego vero probo modum Galeni, quia non æque bonum facit vnum vt plura. His appositis deliganda sunt hæc fasciæ, quæ dicebantur ab Hippocrate superiores: fasciæ autem istæ erunt duæ, quamuis antiqui tribus vtantur vel quatuor: Galenus vero tantum duabus vitur, & Hippocrates & Celsus, non tamen semper, sed duabus vtuntur. Galenus 1. de fracturis: 3. 6. vsque ad septimam, Celsus vsque ad tertiam, quare à principio semper cum duabus, & cum prioribus eiusdem longitudinis & latitudinis præparabis.

Vfus autem horum est, vt splenia comprimant & contineant membrum in ea figura, in qua constitutum est à primis deligationibus, quare opus est, vt istæ non magis inclinent

*Fascia quæ modo red-
ducatur splen-
ibus.*

*Vfus splen-
is.*

Longitudo.

*Notandum
circa splen-
ia.*

*Vfus fasci-
arum supra
splenia.*

in istam, quam in illam partem, quod fiet si apponantur inter se aduersæ, vt vult Celsus; vel ab inferiori sursum, vt vult Galenus, quod non refert, & dextrorsum, vel sinistrorsum feratur. Quarta fasciæ huic contraria sit & ducta ex principio & fine. Primæ itaque fasciæ sunt obuoluendæ articulo & parti sanæ ex ductu, vt prior ascendat, secundus descendat, & splenia apponantur, vt dictum est, illinita, cerato intus & extra, totumque membrum amplexetur: hæc autem ligentur duabus fasciis, primis superioribus partibus ad inferiora descendant, altera ab inferioribus ad superiora contrario ductu. In hac autem deligatione vltima faciendæ, aliquæ præcepta seruanda sunt. Et primum est Hippocratis, vt scilicet his fasciis membrum ex æquemus, per hoc Galenus intelligens, quod cum membrum in aliquibus partibus sint prominentiora, in aliquibus vero excarnia & excavata: 10 Quare vt situs & collocatio sit commoda fasciarum, vult Hippocrates ex æquare totum membrum: hoc autem fit, vt in fasciis pars caua pluribus deuolutionibus obuoluatur, vt æqualis reliqua fiat, non tamen hoc fiat vna tantum fasciæ, sed parum explebimus vna fasciæ, reliquum vero aliis. Aliud est notandum, quod hæc excavações ita quandoq; sunt magnæ, vt fasciæ linteolo & splenio in his explendis vtendum sit, hoc autem fiet nõ per longitudinem appposito splenio, sed per transuersa; reliqua vero vt in prioribus spleniis fiebat, & hoc ad æquationem membri pertinet. Sed si aliquis dicat, quare hoc tantum fasciis exterioribus faciendum sit, non autem internis: ratio est, quoniam internæ fasciæ factæ sunt ad continendum & exprimendum. Si itaque hæc multum in parte interna deuoluerint, minus magnam in ea facerent expressionem & in æqualem: verum in secundis, quia 20 laxiores applicantur, non succedit. Addatis, quod posteriores laxiores fasciæ sunt obuoluendæ, quam primæ, quia hæc non faciunt ad expressionem, nec continent membrum. Tertium præceptum est, vt secunda harum fasciarum laxior sit & imbecillior quàm prima, quia maior fieri debet expressio ad superiora quam ad inferiora, & hæc recta fiet deligatio. Sed dicit aliquis, quomodo possum cognoscere, an bona vel mala sit deligatio, quia mala erit dissoluenda? Signa huius sunt, primo post deligationem interrogabis ægrum, an nimis stricta vel compressa sit fasciæ, & in hoc blandus sit Medicus, & pietate ac charitate artem exerceat. Si enim æger dicat strictum esse membrum sed sine dolore, bona erit deligatio. Si autem compressum sit membrum, maxime circa locum affectum, mala & iterum deliganda seu dissoluenda erit. Secundum signum erit, si in secunda die dicat æger, 30 quod post deligationem prius sibi visum sit esse compressum magis membrum quam post, sed post addita compressione laxum esse compressionem, recte tunc facta erit deligatio, quia signum est, quod facta erit compressio à loco affecto, & ideo est facta laxitas fasciarum. Tertium signum erit, si secunda die easdem partes extremas illius membri tumorem habere videatis tædema scilicet non scirrhosum sed laxum. Signum est enim quod compressum est quod satis est, atque compressionem factam esse moderatam: Cum vero duri fiunt tumores, plus expressum est quam deceat: quod si nullus adsit tumor, nimis laxa fuit. Et hæc satis dicta sint de deligatione.

De Inflammatione prohibenda & articulo in suo loco conseruando, per viculus rationem & euacuationem.

CAP. VI.

Secundum caput erat vt inflammatio prohibeatur, & vt articulus in suo loco maneat & conseruetur, ad quod caput succedit tertium, quod id est, collocatio membri dicitur ab Hippocrate 3. de officin. medic. 17. Paulus autem in 1. lib. 6. cap. 100. vocat, & Galen. 1. de fractur. 1. Positio itaque sit tertio loco, cuius finis est quies: motus enim cum fit molestus articulis, quia sit attractio, & dolor, ideo situs optimus quietem facit. Trium autem generum est positio atq; situs, quorum primum est, vt quando deligamus membrum alteri parti, vt optime quiescat, vt facit Paulus in humero, qui ligat ipsum thoracem, vt quiescat, ne moueatur. Altera est species positionis, cum suspendimus partem de parte, vt in luxatione cubiti & manus, quas suspendimus de collo, brachium vel manus, & hæc est secunda positio ex 3. de offic. Medic. com. 17.

Tertia species est, cum partem in aliquo loco, vt quiescat, locamus, & ex his tribus speciebus, in articulis hæc tantum tertia vtimur in inferioribus partibus, aliis autem duabus vtimur in superioribus, in his autem sint, quæcunq; volueris, quid obseruandum sit, Hippocrates dicit, quod plura requirit. Primum quorum est figura partis, nunquam enim recte collocatur, nisi figura partis siue membri sciatur: hæc autem nihil aliud est, quam rectitudo maxima partis, verbi gratia, suspēdere volo brachium de collo, possum ipsum suspen-

*Præcepta
circa fasci-
arum obuolu-
tionem.*

*Signa bona
vel mala
deligatio-
nis.*

*Positio quo-
triplex.*

*De striani
quæ requi-
runtur.*

*Exemplum
de brachio.*

pendere manu prona & supina: sed supina figuratio non est bona, quia non est naturalis parti nec indolens, quare alia requiritur, & hæc est prona figura. Pariter in crure, si volo ipsum collocare, possum ipsum flectere interius, & exterius, & recte, & flexo modo, sed figura optima est huius, quæ conseruat modum medium. Secundum quod requiritur ab Hippocrate 1. de offic. medic. 17. est, vt non fiat dolor & attractio, atq; iidem impediat, ne æger molestiam patiatur in perferendo partem affectam in loco: vnde fit, vt articulus immoveatur, nec continueatur in sua sede & loco, quare mollis debet esse actio, vt autem hæc fiat, requiritur secundum Hippocratem 2. de fractur. 63. vt corpora subiecta sint mollia, & puluina plumaceola, itaq; impleta sint pura stuppa vel lanis: quod si ratione molliciti-
 10 ci velitis ipsa plena pluma, optimum erit: Longa sunt autem ita, vt membrum totum continetur. Et notandum est, si fieri potest, quod facta sint ex corio, at molli, vel si hoc non ad-
 sit, in sternatis aliquod corium, vel vt ego facio chartam membranosam, & hoc propter conseruationem humiditatis, ne putredo fiat: diximus enim iam humida esse debere splenia & fascias, sic enim non siccatur humiditas, nec absorbetur.

*Corpora p-
ferri sub
recta quæ
esse debent*

Tertium, quod requiritur, est, vt sit locatio æqualis, quia si inæqualis est, aliquæ partes non tangent locum, in quo locantur ista, vnde extra locum suum decidere potest articulus: & reliqua nimis tangent, vnde comprimuntur, & fiet inflammatio & dolor: & hoc maxime requiritur in suspensione brachiorum: maximum enim incommodum ex parua inæqualitate oriri potest. Quartum, quod requiritur, est, vt sursum reparetur: & hoc, si volumus suspendere brachium, non infra spectet membrum, sed supra: & sic in crure partes inferiores sursum spectent, quia si spectent infra, hoc facit ad fluxionem humorum, hæc-
 20 quæ nobis circa collocationem obseruanda sunt, ne inflammatio fiat. Post hanc requiritur quies, quæ succedit ad positionem bonam. Hæc autem potest etiam ab ægro ipso tueri, & ita necessaria est quies, vt antiqui voluerint ægros ne tantillum etiam moueri: vnde dicit Paulus, quod aliqui perforant lectum & stragula, vt ægri per illud foramen excernant excre-
 menta, ne moueri cogantur. Verum in quiete notandum est aliquas esse partes, supra quas non naturaliter quiescimus, vnde vlceraiones fieri solent, quod notat Hippocrates 3. de fracturis 16. quia cum diu manent partes in eodem loco, incallescunt, & torpore adu-
 30 runtur & inflammantur. Præterea solent stuporem contrahere, vnde priuatur locus cal-
 loratione compressionis venarum, vnde succedit vlcus. Ad hoc etiam est aduertendum maxime, & ideo alternis diebus, vel parum tardius mouemus corpora subiecta ipsis parti-
 bus, variis enim suppositis molliora euadent. Præterea, si frigidum corpus supponamus, optimum erit, vnde ego soleo quocidie supponere lanam, vel gossipium veluti pilam mollem, quam inungo vnguento rosaceo, vel de cerussa: hoc enim prohibetur inflammatio-
 nes. Si enim inflammationes, vel quid simile succedat, diffi-
 40 ciles sunt ad remouendum, & maxime ob hoc, quia non habemus postea situm commodum. His suppositis & præmis-
 sis inflammatio etiam alio modo arceri potest, communibus scilicet capitibus, quæ sunt vi-
 tæ ratio, & euacuantiæ: vnde victus ratio attenuans sit, ne humores, & potissimum san-
 guis perferredunt ex 1. de fract. 17. & 4. de artic. 64. & ex Celsolib. 8. cap. 17. talis autem
 40 est ab Hippocrate propositus, qui non sit febriculosus, id est, non calefaciens, vt 4. de
 articulis 36. Quælis autem esse debet, exquisitus ne an mediocris? Procul dubio ad hoc
 consideranda est regula Hippocratis 2. de fracturis 57. vbi dicit, quod perspicuum sit,
 sicut ea, quæ parum prolapsa sunt diligentia minori indigere, ita quæ amplius excessere,
 & victum, & reliqua omnia exactiora requirere, quibus corpus attenuatur. Suppona-
 mus itaq; difficilem esse luxationem cum dolore vehementi, & etiam cum inflammatio-
 ne, in hoc exquisitissimo victu & tenui vtendum est, vt solo oxycrato vel mulla, vel alica,
 & hoc modo etiam fiet, si non adsit febris vsque ad tertium diem, vt dicit Celsus. Quod si
 influxionibus adsit febris, vsq; ad tertium diem sine cibo seruetur æger, non tamen sim-
 pliciter intelligendum est sine cibo, atque penitus, sed tenuissimo victu. Si autem me-
 50 diocris sit luxatio, mediocris itidem sit victus, quæ 1. de fract. 45. subvulgaris dicitur, vt
 est beta cocta, malua atriplex, cucurbita & similia, quæ parum nutriunt & refrige-
 rant, & aluum etiam subducunt. Et his nos vti debere docet Hippocrates 4. de artic. 65.
 vsq; ad septimam diem, quia illuc vsq; proponitur terminus inflammationis. Et si cautio-
 rus esse vultis, vsque ad notam & decimam vti possentis, vt dicit idem Hippocrates. Post
 autem plenioribus exhiberi potest, vt vinum & carnes, in quo notat Auicennas, vt exhi-
 beamus cibos facientes ad articuli firmationem & permanentiam. Et hæc sunt in com-
 muni vsu, videlicet extrema animantium & nervosa, vt pedes vitulorum capitæq; ipsorum,
 vinum crassum, austerum etiam exhiberi potest, sed post decimum diem, sensim tamen ad
 sensum, ad hæc venientes & ascendentes.

*Quies con-
ueniens post
posicionem.*

*Obseruan-
da circa
quietem.*

*Inflamma-
tione prohibe-
tur per va-
tiam Gie-
am.*

*Victus sub-
vulgaris
differencia
tuo sit.*

Somnus & vigilie.
Act.

Succedit somnus & vigilia, quæ moderatiora sunt.

Animi motus.

Ambiens non sit præter modum calidum, neque frigidum, vnde estare frigida, hyeme vero tepida sint loca. Sicut enim frigiditate frigent extremæ partes, & dolor fit: ita caliditate calefcunt viscera, & succedit inflammatio. Animi motus sunt mediocres, quia agunt maxime, ut inflammationes succedant: calefaciunt enim humores, ideo spondeat Medicus semper citam sanationem ægro, ut hilari sit animo, & facilem promittat ipsi restitutionem, si forte primo non sit recte facta.

Febris.

Veneræ præter modum fugienda, quoniam maxime nocent tum calefactione, tum motu, & frigefactione etiam.

An in simplici luxatione secanda sit vena.

Euacuatio succedit, quæ est per sanguinis missionem, & per pharmacum: at in simplici luxatione est ne secanda vena? Nulli meminere de hac, nec Hippocrates, nec Galenus, nec Celsus, solus Albucaſis libro suo chirurgico dicit, quod si adfit inflammatio, secanda est vena: sed hoc non facit ad nostrum propositum: quia non hoc supponimus nunc adesse: & hoc in omni inflammatione est faciendum. Sed quærimus modo, an in luxatione simplici sit secanda vena, vnde dico ego, quod si luxatio sit in articulo alicuius momenti, & difficulter facta sit repositio, tunc secanda est vena: quia primo hoc indicatur: nam magnum quid agimus, difficulter enim & cum dolore restitutus est articulus, morbus etiam magnus est, cum potissimum timeamus inflammationem successuram ab humore fluente sanguineo, ideo secanda est vena post repositionem statim, & quamvis hoc non sit ex proposito dictum à Galeno, dictum est tamen per accidens ab eodem in 4. de vict. rat. in acut. 10 ubi dicit, quod etsi non adfit plenitudo sanguinis, tamen in omni luxatione secandam venam dicit, ne dolor faciat inflammationem ex defluxu humoris sanguinei. Si igitur fuerit digitus luxatus, leuiterque restitatur, & sine dolore non secabitur: sin contra acciderit, ut scilicet si fiat dolor maximus, & difficilis restitutio secetur, & hoc in omnibus luxationibus, in quibus hæc adfunt, præmissa tamen clystere: vena autem secanda venit ex opposito, vel superior, vel inferior, secundum reſtitudinem tamen.

Euacuatio per pharmacum.

Succedit euacuatio per pharmacum, quæ probatur ab Hippocrate 4. de artic. 31. ubi dicit, quod si sit luxatio, & cutis frangatur, & os denudatum remaneat, vel restituamus, vel non exhiberi debet Elleborum timentes conuulsionem, quia multum patiuntur nervi, & conuulsio ipsa facile succedit, & etiam mors, ut habetur 2. de fracturis 37. vnde qui 30 cadit ex alto, & os calcis luxatur, purgat per superiora Hippocrates Elleboro, timens gangrenam & conuulsionem, quare in his duobus casibus tantum expurgat Hippocrates per superiora, alibi autem non meminit Hippocrates neque Galenus, neque Celsus: quare colligo ego ex his locis non esse exhibendum pharmacum, nisi in magnis luxationibus, ubi sit periculum conuulsionis vel gangrenæ, secus non, & hoc ita ego ſento, sed tamen secandam venam dico, quia in leuioribus vel mediocribus luxationibus non timeamus gangrenam, nec conuulsiones ideo in his non debet exhiberi pharmacum purgans. In violentissimis autem exhiberem, non tamen veratrum album, quia non est in usu, nec vidimusquam exhibitum, nisi à mulierculis, in incantamentis earum, vnde postea multa mala succedunt symptomata. Bene verum est, quod Galenus exhibet ipsum cum radícula, & 40 facilis est modus exhibendi. Hippocrates autem non docet modum. Galenus vero radices Ellebori nigri in radícula imponit, & permittit in aceto per noctem, postea radices illas comedendas exhibet.

Dubium de exhibitione Ellebori.

Sed hæc nimis facilis est ratio: in periculosa itaque deuenire potest: & debetis ad scammoneata varia atque plurima ab autoribus describere: attamen lenientia mihi magis probantur, ac maxime laudo cum imminet conuulsio violenta: & hæc facienda sunt prima die: secunda die quiescat æger, & conseruet hanc victus rationem, nisi aliud quid accadat.

De tractatione loci affecti per manuales operationes & lotiones, & de signis vlcærum subsistens latentium.

CAP. VII.

Quænam sint agenda pro inflammatione arcenda, & per victum, & per alias res non naturales, & per sectionem venæ, & per pharmacum, in præcedenti capite diximus, in fine cuius his verbis vsi sumus, quod in prima die illa dicta sint facienda, in secunda a. quiescat æger, & obseruet victus rationem iam positam, nisi aliud contingat, & accadat: sed quænam illud est, quod accidere potest: hoc est, ut si casu tumor durus appareat in extremis partibus, quia constringentes ligaturas indicat, ideo dissoluere ligamenta oportet & reli-

religare, tumoreque & membro aquam tepidam, cum oleo mixtam inspergere, & hoc pluribus de causis: primo vt reuocemus calorem in partem strictam, ne refrigeretur pars ipsa, & sic succedat gangræna, secundo, vt mitigetur omnis dolor, tertio, vt impediamus inflammationem in parte tumente, quarto, vt discutiamus materiam collectam in tumore illo, postea recte religabimus, vt supra dictum est, sed laxior fiat deligatio. Si autem accider, vt non succedat nec bonus, nec malus tumor, signum est potius male deligationis, quia laxa sit, non tamen est dissoluenda, nec religanda, sed ita permittenda in tertium diem, quia tertio quoque die est religandum: tertio autem die resoluemus, & iterum aquam puram calidam affundemus pluribus de causis: primo quia talis perfusio mitigat dolorem, qui excitatur in dissoluendas fascias, vt qui remansit etiam post primam ligaturam: Secundo discutit omnes humores illos serofos, si qui remansere impressi ex ligatura: tertio soluit pruritinem, quæ solet fieri in deligationibus, quia eleuatur vapor, & excitantur à ligatura, qui postea non possunt educi, quia munta est cutis, & veluti obturati meatus, & porositates ipsius, vt vapores ipsi non possint exire, & ideo faciunt pruritum maximus, qui tolluntur ab illa aqua tepida, quia laxat cutim: addatis quartam causam, vt scilicet roborentur ligamenta, quia calida valde aqua siccat ligamenta, & ipsa robusta reddita.

Notat tamen vnum ex Galeno r. de fracturis 38. & 40. quod aliquando nos deducit ad deligationem vsque in quartam & quintam diem, quod etiam se fecisse dicit Galenus, & ponit indicationes, seu conditiones, quæ hoc indicant: quarum prima est, si sit hyems, & aer frigidus, quia noctis ambiens frigidus est: præterea quia eo tempore non tam facile humores & articuli, & ideo producantur omnes actiones naturæ, vnde Hippocrates dicit, quod tempore hyemis expectandæ sint inflammationes vsque ad quartam diem, æstate autem vsque ad septimam tantum. Secunda conditio, si sit corpus durum, robustum & rusticum, quia corpora ista non tam facile patiuntur purgationes: non enim abundant tenuioribus humoribus. Tertia conditio est, si corpus sit assuetum quotidianæ ablutioni, vt antiquus mos erat: in his enim tertio die dissoluendum est, quia diutius ligationem non perferrent: si autem non sint assueta, in quintum produci possunt. Nostro autem tempore in omnibus viris ferme, vel robustis corporibus maxime, si sint in frigidiore aere, vel mediocri, soleo ego ad quartam, vel quintam etiam producere. Si autem sit æstas, mulier vel delicatum corpus, tertio die resoluo. Facta autem hac deligatione, aquæ affusione iterum inungendum membrum erit, deligandumque, vt supra: sed obseruandum est Hippocratis præceptum, vt si primaligatura non fuit dolorosa, vt supra vnum notat Celsus, vt fasciæ numero augeantur: Primæ enim erant duæ, & secundæ duæ: at in his casibus tres sint vltimæ fasciæ: & quamuis has non enumeret Hippocrates, attamen ipse augendas esse affirmat, de fract. 4. Notandum est tamen, quod non adsit inflammatio, quia tunc duæ tantum accipiantur, quarta die quiescat, quinta resoluitur, vt supra, religeturque vt supra, & fasciæ sint quatuor extimæ. At notandum, quod Hippocrates vult, quod in eodem consistamus numero, Galenus autem interpres huius loci dicit, quod consistendum est, si adsit quid inflammationis: sed si non adsit ex toto inflammatio, quatuor erunt exteriores, & ita sex erunt numero fasciæ. Si autem quid doloris adsit, & inflammatio in septimam diem vsq; bis vti, quartam dimitemus, & iis tribus vna agemus: sexta quiescat, septima religetur: & quia septima dies est primus terminus inflammationis, in hac in primo religabimus atque affundemus, & inungemus vt supra, sed fortioribus agemus medicamentis, quæ glutinent & roborent chordas, & ligamenta laxata, quibus prius vrebamur ratione inflammationis, quare adstringens & siccas imponemus medicamentum, quorum varia proponuntur ab autoribus: ego tamē aliqua tantum proponam, inter quæ primū est illud, quod lib. 2. de comp. med. per gen. c. 8. proponitur medicamentum moschionis dictum, & optimum est, aliud est lib. 5. de comp. medic. per gen. cap. 5. Emplastrum Icesii dictum, quod à me non describitur, quia à vobis ipsis ibi potest inspicere: noceat tamen, quod in eo inuenietis terram ampelicitidis, quam inuenietis apud illos, qui vendunt colores, vocaturque terra nigra, & est bituminosa, & vera terra ampelitis.

Notandum est etiam, quod cum non habetis bitumen iudaicum in medicamentis, loco huius ponere non debetis pisaphaltum, vt faciunt aliqui, quia nimis acre est, & suo aucti odore cognoscitur, sed loco eius ponatis hanc terram, loco autem aluminis scissilis ponatis alumen rochar combustum: loco chalcitidis vitriolum semitostum: & ceratum barbarum mea quidem sententia poterit cum his omnibus conferri. Quarto & vltimo sacrum est præstantissimum, ex his itaque imponatis aliquod septima die. Quod si cauciores esse vultis, cum septima dies sit terminus primus futuræ inflammationis, transeat vsq; ad no-

*In quibus
casibus pro-
trahenda sit
deligatio in-
quinta.*

*Notandum
circa Em-
plastrum Icesii
dictum.
Terra am-
pelitis.*

nam, in qua facta solutione fasciarum, abluto membro per aquam affusam calidam medicamentum immutabimus, & eodem modo ligabitis, vt supra, inter quæ medicamenta primum erat vniens, & consolidans solutiones in ligamentis, & articulis factas: solidandæ enim & vniendæ sunt partes solutæ: hoc autem varium est, vt diximus, vel enim erat moschionis vel leceii, vel barbarum, vel sacrum, quæ tamen dura nõ sunt imponenda, sed cerato aliquo dissoluta, vt myrrino vel rosaceo. Proportio autem talis sit, vt ad vnā Emplastri partem addantur duæ vel tres cerati, prout duriora, vel molliora erunt corpora, post inunctiones etiam ligabitis, vt supra.

Quatuor autem apponetis fascias exteriores contrarias, quæ deuoluetis, vt membrum in eodem seruetur loco, vnde in mollioribus corporibus capietis partem vnā emplastri vel cerati, in durioribus non duas tantum cerati, sed aduertendum, quod cum hoc apponetis, prius tamen fricabitis optime membra, quia vt dicit Hippocrates primo de articulis tertio, articuli sunt fricandi, quia frictio laxat & indurat: laxat mollis frictio, indurat autem maxima, quare maxime fricandus est articulus, non tamen vt doleat. Post hoc præterea mouendus est articulus, antea autem immobilem seruabitis articulum, nunc autem leui motu mouendus est: hoc enim modo, si quis est humor collectus, eliditur, & ad latera truditur, nec ligare poterit articulum. Præterea motu hoc incalcescit articulus, quo materia illa discuti potest, quia dissoluetis primum, postea inungetis, tertio fricabitis, quarto mouebitis, post deligabitis fasciis, vt dictum est: arctior autem fiat deligatio, non tamen sit dolorosa.

*Termini
consolidati-
onis articu-
lorum.*

Nunc autem noscendum est, quousque consolidandus sit articulus, quia ab hoc die vsque ad consolidationem non est soluendus: vnde termini huius sunt ponendi: & in hoc video tres gradus articulorum: primo enim sunt faciliores articuli luxati, secundo mediocres, tertio, qui sunt maximi momenti, & difficiles ad luxationem: tres itaque pariter sunt termini, primus est decimusquartus, secundus vigesimus, tertius autem quadregesimus dies, vnde dicit Hippocrates 4. de art. 64. vel 65. digitorum articuli decimūquartum diem habent, pro termino suæ integritatis, & consolidationis: quare a septima vel nona die vsq; ad hunc terminum quatuor dierum non dissoluetis.

Secundus autem terminus constituitur 2. de fract. 11. articuli ossium pedis præter eum, quo iungitur pes cum tibia, viginti dierum enim spatio ei adiungitur, & consolidan-

*Terminus
consolidati-
onis, à quo
bus competi-
atur.*

Tertius terminus est quadregesimus dies, terminus scilicet consolidationis articulorum magni momenti, vt manus cum cubito, humeri, coxæ & pedis cum tibia: Hi enim ad quadregesimum diem ascendant, vt secundo de fracturis: 5. textu & 58. habetur, vbi vult Hippocrates, quod articulus tibie cum pede quadraginta dierum spatio restitatur, quod etiam vult Paulus. Sic de genu & coxa quoque est dicendum: in his enim non est soluendum vsque ad quadregesimum diem, nisi aliqua superueniant, quæ impediunt, vt si adesset pruritus maximus, qui solet aliquando succedere: debetis enim hoc scire, quod hoc perpetuum non est post nonam, vt in primis illis diebus ex primo de fracturis quadregesimo primo, quia in illo principio plurimæ humiditates continentur in illo membro siue articulo, quæ fluentes faciunt pruritum, quæ humiditates post nonam non ad sunt, vnde post nonam non fit pruritus, vt plurimum: Si tamen adest, non est producenda deligatio vsque ad propositum terminum, sed tertia quaque die est deligandum, in hoc autem, vt supra dictum est, conficiemus, dissoluendo scilicet, affundendo,

*Plussculum
sub fasciis
laxentium
signa.*

mouendo, inungendo & deligando. Secunda conditio est, quia quandoq; suboriuntur vlcuscula, quæ quandoque scimus per signa, vt per humiditates, quas videmus collectas in fasciis: hæc autem si sunt, vel suspicemur adesse, fasciæ sunt soluendæ, & inungenda seu medicanda vlcera, & iterum deligandum. Tertia conditio est, si timemus, ne nimis cito crescat porus, vel callus osseus, quia sunt aliqui articuli, qui semper bene se habent, & non adest inflammatio, & nihilominus conerescent per se optime: aliqui vero sunt contra, in quibus materia, quæ conerescent facit callum, vt in cubito: testis est Celsus libro octauo, capite vigesimo secundo, & Hippocrates tertio de fracturis sexagesimo tertio. In hoc autem casu, cum materia adest, quam timemus, ne crescat, religetur articulus: in hac autem religatione non est postea persistendum aut permitendum vsque in proprium terminum, sed sæpius monet Celsus aperire, & aqua copiosissima tepida perfundere, vt tertia quaque die, vt resoluatur materia illa. Nec hoc satis est, sed monet, vt oleo cũ sale vel nitro mixto fricemus articulum, inungamus & fricemus: sic enim attenuatur materia illa, & ad cutem trahitur. Hoc facta sacrum emplastrum imponatis dissolutum chamomelino cerato, vel myrrino, vel masticino. cum peruenerit dictus terminus, ex sententia Hippo-

Hippocratis, & omnium aliorum aperienda est deligatio, abluendus locus mediocri aqua non multa, vt potius aliquid trahat ad locum, & laxetur quam discutatur: & ratio est, quia in his deligationibus membrorum internis solent attenuari, & demutari membra subsequenti diebus, licet in principio videantur intumescere. Vnde si quaerat quis, an opus sit, vt membrum nutriatur maxime per se, dico, quod non est necessarium; vt praecipitur alimentum copiosum, & faciat tumorem: Ideo iterum deligabitur fasciis laxioribus, quae impediunt praecipitem transitum alimenti, non ita tamen, vt impediunt operationes; tertia die religabimus, & paucioribus fasciis vsque ad aliam tertiam diem, in qua penitus sunt abicienda, & satis frictionibus moderatis vtendum, reuocandumq; membrum ad conseruata munia, sensim tamen hoc est faciendum, & haec de simplici luxatione curanda cum praeservatione ab inflammatione dicta sunt.

De Luxatione cum inflammatione vel ante vel post restitutionem.

CAP. VIII.

Accidit multoties, vt in luxatione reperiatur etiam inflammatio, & etiam antequam Medicus manum apponere possit luxationi restituendae, vel post restitutionem intumescat articulus, & partes circumpositae, fluoreq; succedat. Si inflammatio succedat ante restitutionem, duae sunt indicationes, altera luxationis, & altera inflammationis. Sed quia magis vrget inflammatio, illi prius est attendendum: nam si prius rentaretur restitutio, procul dubio sequeretur conuulsio vel gangraena, & inde mors: causa autem, quia succedat conuulsione in extensione existente inflammatione, docetur a Galeno, quia muscoli tenduntur ab inflammatione: ideo si tentatur restitutio, duplex fit extensio, & ex restitutione, & ex inflammatione, & sic fiet conuulsio, quam non poterit aeger sustinere. Primo itaque attendendum est inflammationi, ad quod primum requiritur, vt optime colloceamus partem affectam, in situ, scilicet non doloroso, vel suspendemus eodem modo, & ea arte, vt dolor vitemus, vel subsidatur aliquid parti affectae, quod accipiat irrigationes, vt corium vel plumaceolum seu quid simile, quod partem commodè sustinere possit.

Statim deinde secabitur vena lenita tamen prius aluo, etiam si non adsit plenitudo, modo vires consentiant, & zitas. Secta vena, si corpus purgatione indigeat, purgabitur & potissimum si sit in parte dolorosa, & maximi momenti, & si adsint cetera. Notandum tamen est, quod quamuis caeleo conuulso Hippocrates medicamentum purgans in principio exhibebat, tamen Galenus aliquid attenuans potius exhiberi vult, vnde secunda & tertia die aliquid ex oxymelite vel melle rosato, vel decocto attenuante debetis exhibere. Post medicamentum purgans, si tamen adsit aliquid, quod illud requiratur, quia aliter ego maxime abhorreo ab hoc, quia motum maximum facit in corpore & dolores. His ita constitutis habetis rationem victus attenuantem ratione paucitatis cibi solis forbitionibus, vt ille qui constat ex alica vel pitana. Postea his recte constitutis, & ceteris non naturalibus bene dispositis, medicamentum apponendum est parti, quoderit ex aqua & oleo, hydrocleon scilicet & partibus affectis apponatur. Hac enim ratione aqua calenti dolor mitigabitur, & alicuae materiae discutientur, & laxabuntur partes: Oleo autem rosato adstringentur partes, & roborabuntur: per succidas lanas etiam mitigabitur dolor, & adstringetur locus, & inflammatio prohibetur, & hister vel quater in die vtamini, vel puro etiam potestis vti oleo communi, vel rosaceo cum lanis illis succidis. Alius chysteribus laxa & aperta seruabitur. Interea dum cepit inflammatio cessare, si humores collecti duriore sunt, dum hoc fit, impedire debemus, ne indurentur, sed sensim discutiantur materiam. Monet autem Auicenna & Albucasis, vt tunc in declinatione inflammationis inungamus partes loco eorum, quae dicta sunt, decocto ex maluis & althea, fenugreco, & seminibus lini cum oleo communi dulci, vel oleo amygd. dul. & hoc infundamus inflammationi ipsi. Praeterea debemus vti aliqua frictione, quia agitare non possumus locum, hac enim discutimus materias illas. Post haec nobis imponendum est super locum affectum emolliens, & discutiens medicamentum, quale est illud, quod est descriptum lib. 8. de compos. med. sec. loc. cap. 5. sub nomine malagmatis, & aliud etiam eodem capite descriptum, quod Nilei malagma dicitur, quoniam haec praestantissima sunt medicamenta in declinatione inflammatione: nam ceram, oleum, ammoniacum, crocum & acerum continet, quibus nil praestantius. Haec autem cerato dissoluetis, vt chamomelino, mastichino vel picato, & hoc apponetis vel plenio, vel alii, vel vti potestis aliis, quae in officinis habentur, vt quod dicitur oxyrocceum Nicolai, quod emollit, discutit, & vim habet attrahentem ex alto, vt si quales in profundo, illa adducat ad eum, & discutiat. Hoc etiam dissolu-

De praesentia inflammationis ante restitutionem.

Pena sedis, Purgatio.

De vitiis, De vitiis, De vitiis.

Malagma, Malagma, Malagma.

Oxyrocceum, Nicolai, quod emollit, discutit, & vim habet attrahentem ex alto.

Si inflammatio succedat post resolutionem

tur cum cerato aliquo; & optimum est, si utamini declinantibus inflammationibus, pessimum tamen est in aliis luxationibus & fracturis, quo tamen semper utuntur isti mali re-
stitutores tanquam braccia communi. Superata autem inflammatione, extendatis mem-
brum, & reponatis articulum, quod eodem fiet modo, ut dictum est in simplici. Si autem
succedat inflammatio iam restituto membro: quod fit crebro, tunc ratione extensionis
violente, tum aliorum, hic statim dissoluenda est deligatio, & membrum liberandum a de-
ligatione, etiam si sit tancum secunda dies vel prima, & ut laxior fiat deligatio, perfundatur,
posteaquam deligationem dissolueritis, membrum ipsum copiosa aqua, & oleo præsertim
rosato tepidissimo, donec iuuamen ex hoc persentiat æger, & cerato dicto post illinitur,
postea laxum ligetur membrum, & paucioribus fasciis. Præterea affundetis fascias hy-
drocele rosato: Tertio frequentius dissoluetis, & affundetis hydrocele: in hoc enim non
excedetis tertiam vel quintam: etiam si hoc quotidie fieret, non esset nocuum. Celsus
monet imponi sanam succidam, ex aceto usque ad quintum diem, quia mitigat, roborat, re-
pellit, & inflammationem prohibet: & hoc potissimum, si corpus sit robustum, & potest
vim ex aceto perferte: tunc enim hoc maxime laudo, & præsertim in principio inflam-
mationis: at si illa non adsint, & simul in principio inflammationis, & corpus sit molle,
non laudo.

Ceratum cyprinum cum nitro.

Transacta quinta, Celsus imponit ceratum cytrinum factum cum nitro, nitrum im-
ponens, quia transacta quinta sumus in declinatione: hoc enim discit humores: sed ego
hydroceleum affundo solum usque ad declinationem in imbecillioribus, post quam quidem
Celsi medicamento uti possumus, sed etiam regula Hippocratis simplici aqua purissima,
copiosa prius infusa, & frictionibus, & ut moueamus membrum, ut supra dictum est: po-
teritis etiam oleo cum sale, vel nitro uti. Ablata inflammatione utamini illa ratione dicta in
simplici luxatione.

De luxatione cum osse erumpente extra cutim.

CAP. IX.

Quid curari debeat his affectionibus

Si luxatur articulus cum fractura ossis agendum est aliquid: sed quoniam hoc magis
spectare videtur ad tractationem de fracturis, ideo tunc de fracturis agam, de hac specie
luxationis optime pertractabo. Si autem cum luxatione os detradatur extra cutim, affe-
ctus est letalis, & maioris periculi, si curetur ac restituatur, quam si non curetur. Si e-
nim non curemus eum, ut videtur, si in cubito promineat os cubiti extra cutim, peri-
culum est, ne superveniente inflammatione fiat conuulsio, & mors sequatur: non tamen
semper fit; aliquando tamen succedit, imo & frequentius, ut 4. de artic. 28. & 29. Secun-
do, si non restituatur, aderit turpido semper ipsius membri: istæ tamen luxationes ra-
re sunt. Tertio solet relinqui in parte affecta vlcus insanabile. Quarto si cicatrix obdu-
catur, ita mollis est, ut leui de causa excidat, & remouet vlcus, & sic varia incommoda suc-
cedunt, si non restituantur articuli. Si autem restituantur, dicit Hippocrates 4. de artic.
16. 17. & 18. & Galenus cum eo, & Paulus libro septimo, quod maior pars moritur, quia
in his adest vehementissima conuulsio, quandoque in ipsa restitutione, ad quam sequi-
tur mors, vel saltem succedit gangræna membrum: hæc autem quamvis ita se habeant,
attamen auctores distinguunt inter articulos, quia licet in omnibus adsit difficultas, non
tamen eodem modo succedit omnibus, quoniam aliqui non sunt maximi momenti, quia
non habent nervos magnos, nec magna vasa, & ideo non sunt valde difficiles, ut sunt illæ di-
gitorum. Illi autem, qui habent magnas venas, & arterias, & ligamenta, semper habent
periculum & difficultatem. Hac diuisione facta proponitur articulus huiusmodi luxa-
tus, si non sit momenti maximi restituatur, quia Hippocrates restituit articulos pedis, &
manus etiam. Addit Celsus, quod hæc intelligimus quo ad ossa prima & secunda manus,
non autem quo ad tertia, prædicendum est tamen periculum & conuulsio, non tamen
etiam necessaria. In reliquis omnibus articulis, caute ad restitutionem, ut in carpo, cubito,
humero, talo, genu & femore. Dicit autem aliquis, quod Celsus libro octavo capite ter-
tio dicit, quod aliqui restituti sunt, quin imo Paulus libro sexto capite penultimo dicit,
quod si præsto possumus adesse ante inflammationem, debemus tentare restitutionem,
& in omnibus aliis: quia si post restitutionem fiat conuulsio, iterum debemus luxare, dom-
modo hoc commode fieri potest, quia si incommode fiat, non debet tentari hæc restit-
utio: sed quia raro euenit, quod non accidat conuulsio in his, quia conuelluntur chordæ,
ideo ego in uno ex Hipp. ut non tentemus restitutionem in illis, nisi urgeamur ab astanti-
bus, qui cum dixerimus illis, non posse ægrum unquam in futurum uti membro illo, vol-
unt

lunt membrum restitui, tunc restitutus cum prædictione, ut monet Paulus & Celsus, quoniam hoc modo Medicus non videtur ignorare curationem, sed maxime callere praxin & methodum. In his autem, quos non restituerimus naturaliter, attamen collocabimus sine extensione & deligatione membrum, ea ratione, ut cubans non sentiat dolorem, ut dicit Celsus, semper tamen eodem modo collocanda est pars, ut immobilis maneat, coriumque habeat suppositum ad suscipiendas rigationes. Facto hoc veniamus ad medicamenta indicata ab istis scopis, quorum primus est mitigatio doloris, & conuulsionis prohibitio pro secundo scopo: primo itaque ceratum spicatum est imponendum atque tepidum, ut ait Hippocrates 4. de artic. 6. quandoquidem frigus in his affectibus conuulsionem prouocat. 10 Ceratum autem picatum simplex imponitur, quia ut dicit Gal. 3. de fract. 3. mitigat dolores, pus mouet & concoquit. Modus autem imponendi, est per splenium madidum, vnde non admodum frigido, neque etiam nimis calido.

*Non restitui
si quomodo
collocandi*

*De Luxatione cum detestione ossis, quia ulcerata vel vulnerata sit caro
& partium circumpositarum tractatio.*

CAP. X.

Succedit luxatio cum vulnere carnis ossi superpositæ, quando scilicet luxatur os, & strangit partes & ligamenta, ita ut os ipsum detegatur: & est morbus compositus in mutatione litus ossis, & vlcere, ratione cuius detegitur os ipsum: quod genus affectus, ut supra dicebamus, periculosum est, si restitatur, & etiam si non restitatur: si enim restituitur, maximum est conuulsionis periculum & gangræne, ad quam mors succedit: si vero non restitatur articulus, sitque alicuius momenti affectus, periculum est etiam mortis, ut dicit Hippocrates 4. de artic. 28. & 29. vel insanabile redditur vlcus, & si vlcus ipsum obducatur cicatrice, ita letis acque tenuis est cicatrix, ut leuiter ac minima quaque de causa, iterum rumpatur, vltcrius adest semper membri turpitudine; ideo diligenter requirit Medicos. Cum itaque tanta sit difficultas, obseruandum est, quod non omnes articuli detecti sunt vnus generis, sed scriptores normam dant, dicuntque quod aliqui articuli sunt visceribus magnis propinqui, & venas & arterias habent coniunctas, 10 & sic sunt periculosi, nam in inguine, cubito & humero, si luxaretur articulus cum detestione ossis, ut ait Galenus, Celsus, Hippocrates, & omnes alii, est magis periculosa luxatio, quam aliz longinquiores, ut digitorum pedis & manus.

*Qui articuli
restituendi
sunt & qui
non.*

Hac itaque stante diuisione proponitur articulus luxatus, cum detestione ossis, quod tamen non promineat, sed tantum detegatur. Haliabbas dicit, quod si tales articuli sint digitorum manus, & Celsus addit etiam pedum, possunt restitui, sed cum prædictione & præfatione, quod periculosus sit affectus, quia scilicet possit succedere conuulsio. In aliis autem articulis circa manus, cubitum, humerum, & genu monet Hippocrates desistendum esse ab horum restitutione, licet Celsus libro octauo capite trigesimo aliquos dicat fuisse restitutos, & etiam Paulus monet, ut restituantur, sed dicit, quod si ante inflammationem adsumus, restituiamus audacter, quia postea succedat conuulsio, vel quid aliud momenti, iterum luxare possumus, & omnia cessabunt, quod si non facile speremus luxationem futuram, desistamus. Sed ego semper dico desistendum esse a restitutione horum articularum, vel ante vel post inflammationem. Sed quid debemus agere? Circa totum corpus versari debemus per capita vniuersalia siue communia. Sed quo ad locum affectum, omnem extensionem & deligationem omitemus, etsi Hippocrates dicat, quod in aliquibus conueniat quandoque deligatio, aliquando tamen cum non ponat rationem, & raro ex hoc sanari contingat, ideo non deligabitis, sed in lecto maneat æger cubans ita, ut dolore non sentiat, corium parti affectæ supponatur, ob 10 irrigationes humorum infundendorum, vel saltem loco huius membraneas chartas. Hoc facto proponitur scopus, ut curemus luxationem & vlcus, sed primo periculum conuulsionis & inflammationis est tollendum, & vlcus tunc negligendum, & luxatio, vnde Hippocrates semper habuit oculos intentos, ut impediretur & inflammatio & conuulsio: quare medicamenta sint lenientia, concoquentia & adstringentia: vnde primo ponetis ceratum picatum tepidum super vlcus, & ratio est ex 1. de artic. 21. quia calidum nimis attrahit, frigidum vero conuulsionem prouocat.

*Quando in
terum luxa
re conueni
at.*

*Sententia
propria.*

Cur autem non imponamus illud commune album, Galenus monet reddens causam 3. de fracturis 3. quia in cerato picato adest oleum & cera, quæ concoquunt & leniunt, quoniam pix concoquit, & siccat, quæ omnia quam optime conueniunt in hoc casu. Ceratum autem tepidum est imponendum super splenium vinosum, ut inde

inflammatio prohibeatur: vinum enim austerum repellit, & adstringit, vt dicit Galenus 4. de artic. nigrum autem sit, sed non mordicans, non admodum calidum nec frigidum, dicit Hippocrates, quia calidum attraheret, & inflammationem faceret, frigidum autem conuulsionem pareret. Terto hoc medicamento vlcere, habenda est postea ratio partium circumpositarum, ne inflammentur: hinc Hippocrates duo respicit, primo ne fiat humor; sed quia fieri non potest, quin aliquid effluerit, illud discutit, ponens medicamentum, quod digerat moderate, siccet, repellat, atque refrigeret, & ideo capit ipse folia tusilaginis, & betæ, & coquit in vino austero ad dimidium coctionis illorum, & hæc ponit in partibus illis; sed quia Hippocrates addit hæc verba, *vel quid simile*, ideo querendum est, quid loco huius possit apponi, viridia capit folia, quia tunc siccant, & digerunt moderate, sicca magis sunt acris ex lib. de simpl. medicam. facult. cap. propt. quia viridia habent humiditatem sibi coniunctam: folia betarum etiam nitrosam habent facultatem, viridia sed sicca nimis hoc faciunt, vino autem vitur austero, vt frigidum, & repellens faciat medicamentum, semicocta autem imponit primo ob commoditatem medicamenti, ne conficiat emplastrum: semicocta enim sunt tractabiliora: quia si plene cocta sint, sunt contunden- da, & faciendum emplastrum: secundo quia vt non ex tota substantia sua illam amittat, quia cocta vim tantum terrestrem, & facultatem illam acciperent, & vim vini adstringen- tem, ideo semicocta sumit, vel alia loco illorum, vt sunt brassicæ folia semicocta cum vino austero conuenienti, folia etiam hederæ, vel folia vitium albarum, vel nigratum eodem modo coctarum. Aliquando ego facio emplastrum ex iis, farinamque hordeaceam ad- dens, mali citonii, carnes palustremque lenticulam, quam coquo cum vino austero, & impono, vel supra picatum illud ceratum; succidam lanam, vino austero madentem pono.

Sed quoniam quandoque non potui habere ceratum picatum, nec folia illa, ideo ad alia deueni laudata ab Hippocrate, qui dicit, quod supra vlcus aliquod medicamen- tum, quod ponitur eruentis vulneribus, ponamus, quorum infinita habemus in Gal. lib. 2. de compositione medicamentorum per gen. & à Paulo Aetio, & aliis, quæ etiam alias à me dictæ fuere. Sed notandum, quod in vsu horum medicamentorum aliqua præcepta sunt obseruanda, & potissimum quatuor: vnde quo ad primum præceptum aduertendum est, quod cum ista medicamenta sint siccantia, oportet, vt non multum siccant, ne contrahant partes, & conuulsionem inde faciant: ideo in hoc casu non conuenit illud dictum medicamentum, quamuis eruentis vulneribus conueniat, vt dicit Galenus 4. de artic. 26. & Hipp. 3. de fract. 23.

Secundum præceptum, vt medicamentum hoc diu perduret, & non facile dissoluatur, quare gummata habeat, atque metallica robusta recipiat & resinas, vt vis illorum diu duret, quia quotidie non est aperiendus & detegendus locus. Tertium præceptum proponitur ab Hippocrate 3. de fract. 23. vt cum nutriantur irrigatione, nam sciendum est aliqua reperiri medicamenta, quæ si apposita sint vulneribus, irrigataque sint, & postea diluentur, hæc alia non sunt bona, vt ea quæ abluantur ab irrigatione. Quartum præceptum est, vt sint consistentia molli, nec dura medicamenta imponentur: vnde inter hæc diuinum est illud medicamentum à Galeno barbarum dictum: sed quoniam durum est, emolliatur aliquo cerato molli, vel myrtino, vel rosaceo, vel simplici oleo. Quare statim collocato ægro vino imbutum linteolum medicamento obductum imponentis: circa autem partes sanas lanis succidis solis vino austero imbutis vtimini: Succidis autem ego vtorex Hipp. 4. de artic. 24. cuius rei causam Galenus etiam reddit, quoniam in lana succida primo est corpus lanæ, deinde est humiditas illa, quæ dicitur cæsyphus, constans duabus qualitatibus, adstringente scilicet & digerente, & etiam calida, vt dicit Galenus, & vt ego etiam dixi in tractatu simplicium medicamentorum, in quo est maxima difficultas, quia primo videtur adesse contradictio: præterea mendacium deprehendo, quoniam lib. 6. de fac. med. nihil reperio, bene quandoque loquitur de hac, sed nihil dicit de hoc: præterea in loco proprio in 8. cap. vlt. totum oppositum dicit, & in vndeimo capite de lanis loquens nihil dicit. Contradictio autem hæc est, quoniam lib. 7. de compositione medicamentorum sec. gen. cap. 4. inter emollientia enumerat cæsyphum, quod scil. facultatem habeat calefacientem, & exiccantem moderate. Præterea in eodem ponit cæsyphum inter emollientia primi ordinis: præterea lib. 14. de meth. med. cap. 7. vbi docet modum conficiendi medicamenta variis ad inflammationes musculorum ponit hoc inter illa, quæ concoquunt & simul adstringunt. Præterea lib. de simp. med. fac. loquens de cæsypho dicit, quod hoc habet vim concoquentem, butyri scil. calefacientem & moderate siccantem. Paulus præterea, & Aetius, & omnes qualitates illas attribuunt, sed hic 4. de artic. dicit constare ad- stringen-

Partium
circumposi-
tarum tra-
ctum.

Præcepta
circa appli-
cationem me-
dicamentorum.

Lana succi-
dis qualitas.

Difficultas
de cæsypho
an conco-
quens.

stringenti facultate: si autem hoc est, non potest concoquere, nec butyri vites habere, non tamen scio, quomodo potest tolli & solui hæc contradictio, nam reuera maxima est, hoc vnum tamen ego dicerem, quod non adstringit, sed concoquit & laxat, nec ratione inflammationis hunc accipit Hippo. sed ratione conuulsionis: præterea ponitur vinum austerrum ad strictionem, & quod hoc sit verum, videatis generationem cæsyphi, hæc enim nihil aliud est quam pinguis euaporatio & pinguedo ipsa ouium, ideo habet vires pinguis ouis, hæc autem laxat, mollit, concoquit, non autem adstringit, vnde cum Galen. tot in locis iam dictis dico eas habere vites, non autem adstringentem, sed dicit quis, quod habet puluerem commixtum, vnde adstringere potest; sed dico, quod modus conficiendi huius nos docet hoc esse falsum, quia lauatur lana, & terræ pars descendit: imo Dioscorides docet adhiberi matrinam aquam, vt infra trahatur puluis, & pinguedo sola supernatet. Sed si quis replicabit, quod Dioscorides docet instillare cæsypum, cum confectum est, an leuiter adstringat, ego respondeo vetum fatens, quod nescio, quid per adstrictionem ipse intelligat, quia etiam in sequenti capite dicit, quod pinguedo hircina adstringit, vnde reprehenditur à Galeno, quia adstringentem vim pro siccante posuit, vnde non est fidendum codici illi, qui dicit in cæsypo adesse vim adstringentem, nec dicendum est, quod velit dicere cæsypum adstringere, quia postea addit, quod emollit, quod facere non potest, si adstringit.

Præterea dicit quis, cæsypus laudatur in defluuio pilorum & palpebrarum: ergo est adstringens: dicatis quod facit ad causam, quæ proponitur à Dioscoride, vbi dicit quod cæsypus valet ad pilorum generationem, cum genæ sunt scabrosæ & oppilantur, ciliotum defluuio opitularur, quia scilicet cutis tunc est exsiccata & obtutata ita, vt excidant piluli, vnde cæsypus cum humida sit, potest laxare & fuligines emittere: vnde colligo etiam ego, cæsypum esse laxantem & concoquentem, vnde potest remittere conuulsionem. Addit ipse postea vinum, vt repellens fiat medicamentum simul etiam, quate repellens & concoquens erit medicamentum. Lana itaque succida in vino austero madafacta, ponatur, quia partim leniens est & partim adstringens medicamentum: & his vtendum est æstatis tempore secundum Hippocratem: hyeme vero loco vini ceneleo vtetur: nam præter lanas succidas magis mitigatorium medicamentum requiritur, ideo ex Hippocrate oleo etiam est irrigandus locus: sed aduertendum, quod hic plura obseruanda sunt: quorum primum est, vt lanæ eoque irrigentur, donec incipiat exiccare vel incallescere, tunc enim iterum sunt irrigandæ. Secundo calidiores quandoque fiant irrigationes, & hoc agendo per irrigationem cum oleo & vino vel vino solo.

Capita autem distinguenda materiam hanc proponit Galenus varia, & primo, si aer sit frigidus, irrigatio sit calida; si autem calidus, sit frigida. Secundo si æger est adulescens, frigidis; si senex, calidis vtetur. Tercio si sit regio calida, frigida fiat irrigatio; si autem frigida, calida. Quarto si temperatura calida & secca sit, frigida sit irrigatio; si autem frigida, fiat calida. Præterea consuetudo multum facit ad hoc, vt si quis frigidus vsus sit aere vel aquis etiam frigidis, frigida conueniet irrigatio; contra vero, si calida. Alternis diebus mutabimus medicamenta, mouebimusque omnia deterfo vlcere, & hoc vsque ad septimum vel nonum diem.

Interdum autem communia capita sunt obseruanda. Vnde quo ad victum Hippocrates 3. de fract. 12. in omnibus fracturis cum vulnere victu vtitur admodum tenui, vnde in luxatione hæc multo peticulosiori etiam, quam sint illa, vtetur tenuiore, vt etiam Celsus inquit libro octauo, capite 30. vnde solæ sorbitiones ex hordeo vel pancasso. Sed vnum notat Hippocrat. 3. de fractur. 49. dicens obseruandum esse, ne etiam victus hæc noceat, quia si quis vellet hæc ratione victus in picrocholo vi credens conferre, maxime nocebit faciens bilem: vnde non est sola exhibenda hæc sorbitio, vel aqua sola cocta vtendū, sed aliquid addendum, ne remaneat in hypochondriis: nam ibi manens, causat vt bilis maxime effrenet ac inflammationem faciat, & de hoc habetis Galenum 3. de ratione vict. in morb. acut. 40. vnde exhibeatis, vt dicit Hippocrates oxymel, si picrocholo auxiliemini, hoc enim est medicamentum, quod fit ex melle & aceto simul coctis; vel capiat is fauos mellis coquendo cum aceto, dicebat etiam quod potest vi oxymelle & opomelle, in quo admiscendo vnum monet Galenus, vti. non sit valde acidum, sed dulce; vnde si habeamus oxyfacherū & oxymel in officinis, hæc possunt misceri. Ego tamen in corporibus biliosis hoc non vtor, sed potius ipsum euitando acetosum adhibeo in talibus affectibus & corporibus, sic. n. neruos non petit vel admisceris aliquid aquæ, quod ad penetrationē facit. Tēpus huius victus duplex describitur ratione febris & inflammationis: vnde si febris cesserit, Hipp. 7. pponit diæ, & sic si inflammatio declinet. Postea procedem⁹ ad victū mediocrē, vt sunt olera & pisces saxatiles & alia quæ humectent atq; refrigerent.

Vena sciss.

Si autem quarta die succedat febris hæc longa erit, & tunc victus præscribitur vsq; ad quadragesimum diem, vel donec duret febris: & hæc de victu. Curatio autem est facienda statim per sectam venam post medicamentorum applicationem. Nam si ex Galeno 4. de rat. vict. in morb. acut. in simplici luxatione secatur vena, multo magis in hac sectio est facienda, licet Hippocrates nihil dicat. Celsus enim hoc monet lib. 8. cap. 17. & 30. Itaque si consentiant vires & ætas, venam secabimus; si autem non consentiant, euacuabimus, vt dicit Hippocr. 3. de fract. 48. qui exhibet veratrum, sed vetatri mollioris potionem eodem die, quo fit repositio in fracturis. Sed quoniam ibi Galenus in dubio ponit, quid per molliorem veratrum intelligat, & se id penitus ignorare fateatur, ad aliud deueniemus, vt est cassia cum confectioe hamech, vel electuarium rosatum, vel diaprunum vel aliud oportunitatem ad curationem & euacuationem humorum calidorum. Ego autem habeo hoc peculiare, vt secem venam primo lenita aluo. De motu & quiete pater quod omni moda esse debet. De ambiente mediocriter se habent: Venus fugiatur, & alui excrementa clysteribus altero die sunt cienda & euacuanda, & hæc vsque ad nonam, in qua dicit Paulus, quod tentanda sit restitutio cum præfatione. Ego tamen non consentio cum Paulo, sed cum Celfo & Hippocrate, qui monent, vt ad eam solam sanitatem, quæ potest haberi in hoc casu procedamus & attendamus, ideo neque post nonam est imponendus atq; restituendus articulus, sed vel consistemus in eodem medicamento vel mutabimus: & hoc fiet secundum Celsum, plagulas potentes aridas, super quas aliquod medicamentum ponatur non vntuosum, siccans & reptimens; quare vel ponatis idem barbarum vel plagulas aridas; nec etiam partes sanas irritabitis, sed loco irrigationum super vicus & plagulas illas aridas diapalma in vino austero coctum ponemus, & hoc vsq; ad finem vtemur, id tamen aduertendo, an os squamam sit emissurum, nec ne: nam si squamari debet, alia agenda sunt. Hoc autem primo cognoscetur, quia turgēt os, secundo quia non est reclusus, tertio quia labia separantur, quarto quia egreditur quantitas puris. Vtitur autem Hippocrates voce quadam; *τὸ γόρ σφίς*, per quod dicit Galenus in comm. quod intelligat nescio quid iudicium, quod habemus ex parte, quod os expulsionē tenet, & egri in intimis partibus nescio quid sentiunt, quo intelligunt separationem aliquam tentari: cum hoc itaque adeat, & etiam labia turgent, tunc sciendum est squamā emittere tentare naturam, & tunc cephalica sunt imponenda, quæ constan ex iride, peucedano, aristolochia rotunda, fati-
*Medicamē-
ta ad squa-
mationem.*

De curatione luxationis articuli cum prominētia ossis. CAP. XI.

*Terminus
cessus ossis
prominētia.*

Si os non solum detectum sit, sed etiam promineat, plura sunt obseruanda pro eius resti-
 scuratione, primum enim obseruandum est, an hoc os possit restitui, secundo an multum
 extet & possit deradi sine læsione neruorum partium; tertio an aggrauet illas partes &
 pungat, quarto an possit à natura separari cito: nam dicit Hippocrates 1. de fract. 44. quod
 aliqua ossa cito, aliqua veto tarde recedunt: tarde enim recedunt ossa magna & dura; contra
 vero cito separantur mollia & parua. Quis autem sit terminus vtriusq;, recedens, incertum
 est: nam dicit Hippocrates aliquando 40. esse diem, aliquando 60. aliquando 80,
 quo egreditur os.

*Os quando
sit exciden-
dum & per
qua.*

Hoc stante, si os ita detectum ac prominens sit, quod possit sine periculo secari, sit-
 que pungens, ac tale, vt à natura tarde separari possit, excitatur scalpris excisoriis duob. ad-
 uersis politis, in alioq; adacto fiat, vt cadat os ipsum, & vsq; ad carnem est excidendum, vel
 hoc fiat scerra, vt dicit Galenus in 4. de artic. 35. in hac enim actione nullum est periculum,
 nisi hæc succedant; ad quæ maxime est aduertendum: primo si dum secamus os, æger
 in deliquium animi cadat, tunc enim maximum est vitæ periculum: Quare dum
 vultis agere, eo modo collocetis ægrum, ne videat actionem, quam Medicus ipse te-
 neat. Secundo si superueniet 40. die febris: nam ex deliquio animi torpescunt ita partes,
 vt cōuulsio sequatur; ad febrem vero sequitur inflammatio & inde mors. Quare primo in-
 commodum per positionem ægri commodam occurremus, febris autem per bonam victus
 rationem & venæ sectionem. Supra vicus barbarum vel sicca linimenta ponemus, postea
 cum irrigationibus & solis illis supradictis vsq; ad septimam vtemur vel nonam, & deinde
 alia curandi ratione iam supradicta, & hæc de maioribus articulis luxatis cum osse detecto
 vel prominente. Succedunt parui articuli luxati vel pedis vel manus: hi enim quandoque
 luxantur, & cūsum rumpunt, & ossa dereguntur. Er hic consentiunt omnes cum Hippoc.
 4. de artic. 3. restituendus esse prima aut secunda die: Paulus etiam & Celsus hoc volunt,
 sed

*Excisorem
impeden-
tia.**Luxatio per
ruptum arti-
culum.*

sed cum præfatione faciendum; cum Hippocrates dicat, quia periculosa est conditio: Tercia autem vel quarta die nequaquam restituemus, sed potius ultra septimam, octaua scilicet vel nona restitui debet. Addit tamen Hippocrates, quod si ante decimam diem restituantur, solent recte colligi hi articuli. Restituto articulo super vlcus barbarum ponemus vel aliud eiusmodi, vel aliquod cephalicum medicamentum, hæcque sunt dicenda, vrbreuissimis me expediam, pro quibus vos legatis Galenum lib. 2. de compos. med. per gen. à cap. 16. vsque ad 20. ibi enim & leulora & robustiora tradit medicamenta cum ex mente propria, nam aliorum. In hoc itaque etiam circa articulum vel barbarum vel aliud ex dictis applicabitis, obuolueris fasciis, ut in simplici luxatione, nec vlla est differentia: Eadem enim est applicatio fasciarum & eodem modo & iisdem splenis. Notandum tamen est, quod in simplici luxatione magis stringendum est, in hac autem laxiores sunt fasciæ & frequentior loci apertio: nam tenuis dies non est prætereundus. In reliquis eadem est curatio. Sed quoniam quandoque & sæpe superuenire solent conuulsiones, in quibus casibus hæsitant Medici, sciendum est, quod dicit Hippocrates in 4. de artic. 3. 4. quod statim articulus luxandus est iterum, copiosamque aquam vel oleum tepidum superfundendum loco affecto. Sed hoc sat non est; nam etiam totum corpus calefaciendum est ita, ut etiam sudor excutatur, & omnes articuli calefiant, quia omnes consensunt inter se. Si autem vos cautiore esse vultis, inungatis partes principes neruorum medicamento aliquo ad conuulsionem faciente, unde illud oleum, quod balsamum dicitur à Mesue, vel ol. liliorum alb. cum aromaticis. vel cinnum cum aromaticis optima sunt, his inungendo partem detectam, axillas, linguina & totam spinam ac nucham: nam his conuulsio auferetur. Hac ablata reliqua sunt apponenda iam dicta in maioribus membris luxatis cum osse detecto vel prominente.

Si autem succedat inflammatio, ut solet quandoque superuenire, post restitutionem, Hippocrates iubet esse bono animo, quia os decedet, & aliud ultra non erit, quare nihil est agendum, nisi frequenter locum inuises; reliqua omnia debito modo erunt facienda, bonas vietas instituentes, bonaque euacuatio facienda. Si autem superueniat gangræna, hoc est maximi momenti. Solet autem superuenire vel culpa Medici vel alia ratione quæ succedit & luxatis cum vlcere & etiam sine vlcere, ut dicit Hippocr. 4. de artic. text. 31. vbi dicit: Superuenire vel ratione sanguinis extravenati & concreti, vel ratione deligationis nimis strictæ & à medicamento nimis siccante & adstringente; præterea ob ingentem inflammationem: quæ ob difficilem restitutionem vel ob summum dolorem causatur: addatis quia solent fieri conuulsiones vehementes, quæ gangrænam faciunt. Cum itaque adest gangræna, reuocanda est in memoriam curatio gangrænæ & splaceli, quæ primo consistit in victu siccante & attenuante: secundo secetur vena, tertio in loco huius etiam pharmacum exhibeamus, quarto ut veniamus ad recta aliarum rerum non naturalium institutionem. Veniamus modo ad locum affectum, quoniam integram curationem tradere volo, cum sit gangræna maximi momenti. Primo itaque scarificabitur locus profundis scarificationibus in parte incipienti, postea locum lauabimus aliqua decoctione, ut ex lupinis ex lolio & ex orobis addito oxymelle vel ægyptiaco vel aceto & sale: vel fiat emplastrum ex farina lupinorum, lolii & orobis. Præterea potestis adde hæc supra dicta trosciscos illos putrefactionem impediētes. Postea ad causticum deveniendum est: non tamen in principio venietis. Si autem totum membrum corruptatur, nec impediri possit gangræna, recentiores & autor introductorii monent, ut in confinio partis sanæ & corruptæ ad æctolaque secemus, postea curemus cum succo porri ad sistendum sanguinem, vel calcanium ipsū ponamus, & os etiam ipsū secundum dicunt. Hippocrates tamen monet aliter, gladiolo scilicet omnes partes corruptas auferendas, cauendumque esse à sanis, quia causat dolorem, unde deliquium animi maximum succedit facile, & inde est mors. Si autem totum membrum sit auferendum, secundum est membrum ipsū circa articulum, ut si luxato osse in genu gangræna succedat, emoritur tibia & pes, non est secandum membrum hoc circa articulum, nec in parte superiore, licet aliquid sit corruptum: quia os esset secandum, & tempus nimium requiretur, ideo carnem tantum secabimus: si quid autem superest carnis corruptæ, siccantia illi applicabimus & vremus postea totum, quod superest. Curationis autem scopus in bona positione membri collocatur, quæ est, ut pars inferior eleuata sit parum, ut fluxio sanguinis vitetur, dum optime purgetur vlcus & caro bona; postea in declinatione est etiam membrum locandum, deinde apponenda illa, quæ conueniunt in gangræna, dum sanatur, vel etiam quæ cephalica sunt. Sed aduertendum est, quod amputata aliqua parte symptomata & incommoda aliqua succedere solent post sanitatem, & primo sanguinis eruptiones per aliquas partes, ut per nares vel in-

testina vel petipneumonia vel pleuritis accidunt: quia sanguis genitus ab epate non tam consumitur vt solebat. Quare tunc monemus ægrum, vt minus comedat, & vacuantibus medicamentis quandoq; vtatur per aliquot annos, vel singulo vere secetur vena, exerceatur corpus, lauetur, fricetur sæpe: vitimo lauactis vtatur aquarum digerentium & bituminosarum nitrosarumque.

De callositate superueniente luxati articulis & impediēte motum & quomodo eas tollenda. C A P. XII.

Solet vnum frequenter accidere, & maximi momenti, quod vt plurimum euenit, cum ¹⁰ malis restauratores medentur luxationibus istis: hi enim ita male tractant luxationes istas, vt callus superueniat. De hoc itaque callo tractans, quo vel restitutus sit articulus, vel non sit restitutus, atamen impeditur actio & motus articuli illius, dico quod callus ista auferendus est.

Callus quomodo.

Hic autem callus duorum potest esse generum, vel scil. lapidosus vel durus: Lapidus ille est & dicitur, quia ita durus est, vt lapidosam naturam & materiam acquirat: Durum vero illum ego voco, qui quidem durus est, non tamen ita durus, vt lapidosus. Et isti duo calli solent crescere in omnibus articulis male tractatis, & præcipue circa cubitum: vnde in hoc maxima est habenda cura, cum potissimum sæpissime & in pluribus accidat: hoc autem testatur Hippocr. 3. de fract. 63. Articulus etiam in genu & in pede solet hoc pati, reliqui autem articuli solent & possunt quandoque idem pati, sed non ita facile, quia carnosiores sunt. Si itaque adsit hic callus, primo cognoscendus est, an durus sit vel mitior, an scil. lapidosus sit, vel durus simpliciter. Signa durissimi ac lapidosi sunt primo, vt conspiciatur, articulus hic tenuissimus & siccissimus erit: Secundo moueri non potest apposita manu medici, magna etiam addita violentia: tertio si adsit diuturnitas temporis, quo luxatus sit articulus. Quattro si sint apposita medicamenta confiantia & maxime astringentia, vrex aceto, albo oui, sanguine draconis & similia, significant adesse callum.

Lapidosi calli signa.

Signa duris simpliciter.

Mollior autem callus vel durus simpliciter cognoscitur à diuturnitate temporis, nam hic recens erit affectus; dum enim antiquatur, fit lapidosus. Secundo quamuis non adsit motus voluntarius, tamen si Medicus manus suas apponit vel genu nitatur mouere, motu aliquo mouetur & flectitur. Tercio aderit tumor aliquis in parte durus quidem, non tamen offusus: Quattro si medicamenta idonea arque conuenientia fuerint apposita, qualia supra dicta sunt.

Lapidosi ut est sumenda curatio.

Cum itaq; distinxerimus inter hos, durum callum curare non suis solliciti, per durum hic intelligendo lapidosum, quia nihil fiet: vna enim est ipsius curatio arque sola, sed ita periculosa, vt ego nunquam voluerim tentare, licet Celsus moneat tentandam esse audacter; & hæc est, vt detegatur locus duobus locis oppositis, & topus scalpris educatur, postea curetur locus modo conuenienti: nunquam tamen ego hanc tentavi nec tentabo, neque etiam credo, quod topus ille educeretur, partemque illam carne posse repleri & cicatrice obduci; quare meo iudicio non est eius curatio tentanda, quoniam non succedet. Si itaque callus sit simpliciter durus, hic curationem admittet, & quandoq; digeritur & aufertur ita vt articuli proprium motum acquirant. Quo itaque ad curationem, primo euacuabitur corpus optima vietus ratione instituta: secabitur vena si sit plenitudo; si non sit, euacuabitur per pharmaca. Præterea reliquis rebus non naturalibus institutis recte, ad localia veniendum est.

Callus curationem admittens.

Localia.

In hac autem tractatione loci duo proponuntur scopi, primo vt emolliamus, quod durum est, & contractum relaxemus, secundo vt digeramus materiam facientem topum. Cum itaq; durus sit, primo ad emollientia veniendum est. Si articulus itaque durus est, ratione calli medicamentum liquidum, quo irriteretur articulus, parabitur relaxans & emolliens: hoc autem triplex mihi proponitur, quorum primum & simplex est oleum ipsum ⁵⁰ maturum, quod perfundatur pars illa, vel in oleo ipso articulus bis vel semel in die per mediam horam collocetur; si autem hoc vti volueris, fiat sic

Emollientia.

Recip. capit. verdecis num. j. fol. malu. arriplic. & rad. altheæ ana ʒ. ij. nucleor. pin. ʒ. iij. bulliant in magna quantitate aque ad coctionem capitis, coletur hocque calido foueatur locus; vel vapore huius elato foueatur articulus callosus, vel hoc decoctum præpara, vt Recip. rad. alth. malu. ana m. iij. sem. lini, fenugr. nucl. pin. an. ʒ. ij. rad. cucum. ʒ. iij. brioniz, an. ʒ. ij. a. aque q. s. misce: Et bulliant, coquanturq; vsq; ad consumptionem tertie partis, & coletur, & hoc vtemini: Accipiaris itaq; vel primum vel hoc secundum, vel oleo puro maturoque vtamini, quoniam optima erunt omnia. Facto hoc balneo ad frictiones venia-

Præparatio.

venimus; nam maxime digerit frictio, manibus autem inunctis mollior fiat frictio, quæ tamen sic diuturna per tertiam horæ partem. Inunctio autem, qua manus inungenda veniunt, talis sit: Recip. ol. amygd. dulc. pingued. anser. rec. an. ʒ. s. sal. alb. nitri an. ʒj. ducantur in mortario diligentissime, & ipso inungantur manus, & deinde fricetur manibus ipsis inunctis locus. Facta frictione imponemus medicamentum aliquod ex his, quæ dicta sunt imponenda esse in sine inflammationis luxationi superuenientis, quod educat ex alio; vñ illud, quod dicitur Nilei malagma vel illud, quod dicitur oxycroceum. Aduertendum est tamen, quod aliquid est addendum, vt mucilaginis altheæ vel scœnugræci, vel pinguedinis anseris vel gallinæ vel humanæ recentis, quæ habeant vim laxantem: vel etiam hoc vtremini. Recip. mucllag. alth. scœnogr. sem. lini an. ʒj. pingu. anser. recent. gallin. ol. amygd. dulc. an. ʒ. s. olei resolutorii ʒj. ammon. præpar. ityracis pinguis an. ʒj. cer. citr. q. s. coquantur hæc ad mellis consistentiam. Post hæc tribus vel quatuor diebus emolliendum iterumq; digerendum, & iterum ad emollitionem & ad discissionem veniendum: Quare post hanc primam emolliitionem ad fumum aceti veniens vnde Gal. lib. 14. de meth. medend. cap. 5. monet, vt accipiamus lapidem pyritidem, & ipsam ignitū faciamus, & postea aceto perfundamus, in quo macerata sit portio ammoniaci, vt non solum attenuet & siccet, sed etiam emolliat: ab hoc enim vapor attollitur, quo fumigetur locus affectus accedit tamen, vt lapis hic non habeatur, & tunc loco huius accipiendus est lapis molaris, vt dicit Galen. quia scopus ipsius est, vt lapis habeat vim attenuantē & discutientem: & hæc sunt in pyritide lapide. quod si neq; hic adsit, alium capiemus durum, sic facile desiliat, in lapidemque dissecetur ab aceto & igne: inter hos est præstantissimus molaris lapis, suffusa parte eius fumo per tertiam partem horæ, quoniam omnes illas, quæ conueniunt, facultates habet. Attentione facta apponemus medicamenta primo ex furfore & oxymellite, quod est leuius, & ego quotidie suffitu illo vtor: medicamentū hoc singulo quodque tertio die renouans, & iterum ad resolutentia, sed valentiora deuenio, & primo vtor illo suffitu, postea accipio ammoniacum aceto dissolutum & ityracis pinguis portione, & facio medicamentum, qd impono loco affecto, & ipso tribus vel quatuor dieb. vtor: postea iterū mollientibus dictis, deinde ad validissima discutientia accedo, inter quæ vtor primo eodem suffitu, postea emplastrum potius porolyticum dictum, quasi dissolvens callos secundum hanc formam. Recip. caric. pingu. lib. 1. stercor. columb. lib. s. oxymel. q. s. misce & in mortario mundo fiat vnguentum bonæ consistentiæ, & pone calidum super locum, vel vtor loco huius medicamento illo Gal. descripto in lib. 8. de simpl. med. fac. ex caseo vetustissimo modo hoc. Recip. casei vetustiss. macerati vel cocti in iure carnis porc. solit. vel farciminis porci, salit. & caric. pingu. an. lib. s. oxymel. q. s. m. fiat medicamentum robustissimum. Si autem vultis, potestis addere portiunculam pinguedinis resudantis ex carne suilla salita, ex ossibus seil illius, quo ego vtor tribus vel quatuor diebus, si quid reliquitur, ad eadem emollientia reuertor, postea iterum ad hoc.

Si autem hoc non superatur, ad sacram anchoram deueniemus, quod est luxum metallicum in agro montis ferrati, in quo balneum est & litum quod ex testimonio multarum, qui eo vsi sunt & scriptorum etiam auctoritate multum valet in hoc casu. Nos autem habemus aliud præstantissimum in hoc agro Patavino Sancti Petri luxum dictum, quo adhuc præstantius illud S. Bartholomæi, quod ita efficax est, vt si non prosit, neque proficere potest, sciatis immedicabilem esse affectum. Notandum est tamen vnum inter cetera, vt in his medicamentis, vt semper æger, si sit restitutus articulus, illum sic fiat breuibus motibus non dolorosis, sed quantum fieri potest validis, hoc enim fit, vt callosa materia, si qua est, elidatur & digeratur. Quod si nūc sit restitutus articulus, post emolliitionem restituentus est.

De articulo ex sua sede cadente post restitutionem. CAP. XIII.

Accidit quādoq; articuli ex sua sede cadāt, cadentes restituantur, restituti curentur, & curati suo loco maneant, & sic æger omnia sua possit agere munia. Euenit etiā quādoq; vt cadant, & si restituantur, non tamen in sua sede maneant, sed recidant & recidant luxationes dicuntur spontaneæ, & sunt curari difficiles, licet etiā non possint facile restitui, & ipsi ægri hoc ex se facere possunt. Vnde restituntur, sed difficultas adest maxima in eorum conseruatione. Solet autem hoc tribus euenire modis, primo præcedente quāda violenta luxatione, vt in humero non bene restituto nec bene siccato. Solet. n. articulus hic reciditare, & similiter in aliis violentis luxationib. & præcipue circa humerū hoc accidit teste Hipp. de artic. 2. Solet hoc etiam accidere ratione tumoris in eo oborti, ita vt non

possit articulus in sua sede contineri, cuius rei testis est Gal. 6. aph. 39. & 60. nempe quotiescunque ad articulum femoris cadit aliquis humor, ita facile luxatur, ut sponte cadat, & licet facile postea restituatur, non tamen permanet: quare his tribus de causis solet accidere, primo scilicet à violenta luxatione non bene restituta & curata, secundo ab inflammatione & tumore oborto: tertio ab efforminatione ligamentorum sine aliqua illarum causarum oborto. Hic vnica est curatio ab Hippocr. 1. de artic. à text. 41. vsque ad 48. proposita & hæc est curatio per vitionem facta, possumus quidem multa tentare atque infinita medicamenta siccantia & roborantia in medium ferre, sed non est vera curatio. Quare primo circa communia capita administrabitis, postea ad vitionem venietis, & hoc tuto ageritis: hoc autem fit ratione causæ, quæ est primo elongatio articulorum siue potius ligamentorum. Secundo efformatio illorum & mollities, quæ est causa elongationis. Quare duo sunt agenda, vt scilicet mollities auferatur & humiditas etiam illa faciens mollitiem, postea contrahamus ligamenta illa elongata, & hoc facere potest ipsa vitiō. Nam hæc primo absumet partes illas per escharam, cauum facit vlcus, quod postea obductū cicatrice breuius facit partes illas: per vitionem enim calefacimus, siccamus & humores digerimus.

Præcepta ab Hippocrate
Præcepta ab Hippocrate
Præcepta ab Hippocrate
Præterea euacuamus magis illas per vlcus inductū. Sed aduertendū est, quod dicit Hipp. quod ignis inimicus sit nervis, quare vt caput hoc diligenter tractetur, præcepta quædam sunt obseruanda. Primo vt vitetur locus, in quem cadit os præcise, non autem partes alie circa articulum, vt verbi gratia humeri articulus cadit in alam, axilla est vrenda, femoris caput cadit ad anteriora, anteriora sunt vrenda, quia mollities consistit in parte, ad quam cadit os, vnde Hippocr. reprehendit illos, qui in humero superiora & inferiora vrunt, hoc enim facit, vt facilius cadat. Secundo obseruemus in vrendo omnes partes circumpositas, quia ibi continentur nervi, ligamenta, venæ, arteriæ & glandulæ, quæ partes si vrantur, ignis inimicus est ipsis, quia conuulsio ab his fiet, quæ est immedicabilis. Tercio faciendæ est vitiō ferramentis facientibus crustas non admodum magnas. Tribus autem modis crustæ magnæ aut parvæ fiunt: primo si ferramentum sit magnam vel paruum, quare ferramenta parvæ eligenda sunt: secundo magnæ fiunt escharæ, si nimis sint rotunda ferramenta, quia citò non possunt penetrare & multum vrunt, ideo acutis vtendum est ferramentis: Tercio vt fiat citra penetratiō ferramenti tamen non multum candentis, quia hoc æque cito penetrabit, & non faciet magnam escharam: quarto post restitutionem articulus sit in suo loco, & quiescat post escharā & etiam post dies multos, quia si post vitionem luxetur iterum, non poterit amplius curari. Modus autem vrendi traditur 1. de artic. à text. 41. vsque ad 48. & à Paulo lib. 6. cap. 36. & 42.

De elongatione articuli & eius curatione. CAP. XIV.

Curatio.
Super sunt duæ affectiones in luxationibus, quarum prima est cum articulus elongatur, & hæc elongatio est duplex, vna scilicet si apponendo manus articulo os ab offe separatum tangitur; altera cum longitudo siue elongatio videtur etiam solo visu & facile manibus possumus eam adigere ad suum compar os, vbi si luxatum non esset; ideo in his fit, vt nunquam solitarie incedant, si sit circa genu vel pedes, quia laxa sunt ligamenta, vnde luxatur articulus ita, vt firmari non possit, & isti facile luxantur, & ea luxatione, quæ recidivam patitur.

Curatio huius est secundum Auicennam (nam solus ipse de hac meminit) vt constipemus, vniamus & robaremus calefacientes tamen hanc partem. Medicamentum opportunum non est simplex aliquod, quod omnia illa possit facere, quare faciendum est vnum compositum, vnde constipantia capietis & roborantia & calefacientia, vnde pro figidis constipantibus galli vrendum est malicoris, citrinis, hypocistide, cupresso, myrto: admiscebitis autē calefacientia & siccantia habentia vim roborandi nervos, inter quæ primo est castoreum, costus officinarū, muscus roborū præstantissimus est & præcipue ex lalice, baccæ lauri & cedri, pix omnis liquida & etiam sicca, bitumen iudaicū siccum pissasphaltum: ad datis metallica, squamas omnes, quæcunque illæ sint, alumen vstum, calceum vstum. Aduertendum tamen, quod hæc metallica in pauca debent esse quantitate, & his varie mixtis emplastica facietis medicamenta, vel capiatis sacrum dictum in officinis, quod optimum est, vel sacrum cum barbaro mixtum; vel emplastrum ex pelle arietina pro crepatis quod astringit validissime: si autem non succedat, vteris, sed cutanea sit ex vitiō & ita variis vitionibus cūtim illam exuretis.

De distorsione puerorum in utero vel post educationem facta per nutrices. CAP. XV.

Vltimus affectus ad luxationes pertinens est, ille qui puerulise est *Ad quos v. l. distorsio di-*
cta distorsio, de qua tractat Hipp. i. de artic. i. nam distorquentur articuli, vnde fiunt
homines vel manci vel valgi, si in crure fiat distorsio. Istæ autem, distorsiones dupliciter
fiunt, per luxationem scilicet & de hac non loquimur, quia pertinet ad luxationem de qua
supra: vel sine luxatione, & de hac loquimur, quæ est & fit in pueris, præcipue dum sunt
in utero, quibus accidit, vt male collocentur illorum partes in utero. Quandoque etiam
nutrices, dum ebrizæ sunt, male tractant pueros vel fasciis vel alia ratione. Crebra autem
fiunt ab obstetricibus incaute puerorum artus tractantibus, dum educuntur ex utero. De
hac itaque distorsione vel in utero facta vel post educationem loquemur. Vnde primo si
fiat circa pedem, obseruauit ego, quod si vix admonita sit mater, solis fasciis corrigat distor-
siones istas: in alijs autem membris factæ facile etiam succedunt, pedes vero non ita facile
succeedunt, quare si quis non potest à matre dirigi, curandus est, quod cum corpora ista sint
nimis sensim & sensim membrum restituere ad suum locum, & hoc non est faciendum vni-
ca vice vel duabus vel tribus sed pluribus. Secundo non simus contenti os restituere &
reuocare in suam sedem, & vt iuste ad aliud erigatur, sed oportet illum distorquere in a-
liam oppositam partem quia si talis ad suum habitum reduceretur, iterum distorquere-
tur, quia cum prius sit breue, alterum illud ligamentum est elongandum, vnde opposi-
tum hoc fiet, si ad oppositam distorqueamus partem. Tertio est vt obuoluamus diligen-
ter cum lintis & validis cum vinculis. Sed aduertendum est, quod cum corpora ista sint
mollia, si arcte stringantur, sicari possunt fierique intertrigines, & exira mala symptomata:
vnde præceptum est Hippocratis, quod si hac strictione fieri non potest, id multitudine fas-
ciarum fiat, quia hoc modo sine strictione partis pars illa stringetur, & in loco continebi-
tur, nec fiet dolor aut materiz attractio. Quartum est, vt sicetur moderate articulus cum
medicamento opportuno. Vltimo post restitutionem habeamus calciamenta apta, quæ
possint conseruare in proprio loco. Primo itaque restitutio tentetur, vt dictum est, secundo
medicamentum applicetur siccans & conseruans: Hoc enim dicit Hippocr. fiet, si in ad-
ultis picarum accipiemus, in pueris vero siccantius applicabimus, sed non solemus resti-
tuere in adultis, Tertio fascias applicabimus, vt in simplici luxatione; quarto splenia, vt
etiam in simplici luxatione apponemus & eodem modo illita, quinto ponetis tertiam,
quartam & quintam fasciam; sed post quartam ponetis laminas ex plumbo vel corio, quia
fasciæ & splenia non sunt satis ad continendum articulum in suo loco: vnde Hippocrates
in pede ponit laminam sub planta ex plumbo vel corio duro & sic in manu obuoluen-
do super fasciam sæpe. Quia autem partes illæ sunt extendendæ ad exteriora, quia distortum
est ad interiora, fascia vna illis omnibus est ad denda, quæ trahat ad superiora, vt si ligemus
fasciam digito minimo, quæ ligabitur dimidio auricularis multis ligamentis seu deuoluti-
onibus. Si contra sit pars externa quæ cadat, digitum magnum ligabitis, quo tunc & circa
dimidium cruris ligabitis, vt supra hoc modo quiescat puer. Post tres aut quatuor dies ablu-
atur aqua cum sale singulo quoque tertio die, hoc faciens per 40. & vsque ad quadragesi-
mum diem, vbi nihil aliud est agendum, nisi aliquod genus calciamenti inueniatur, quod
possit membrum in suo loco continere. Antiqui habebant genus quoddam calciamenti,
quod defendebat à luto, & optimum est. In superioribus autem alijs partibus si-
milibus vtetur. & hæc de luxationibus satis dicta sunt, sequitur
tractatio de fracturis.

F I N I S *Tractatus tertii.*

GABRIELIS FALLOPPII MV- TINENSIS, MEDICI AC PHILOSO- PHI PRÆCLARISSIMI DE FRACTVRIS, Tomi II. Tractatus IIII.

De Fractura natura, speciebus, causis, signis & curatione. CAP. I.



ICEBAM in initio huius tractationis, quodnam fecit ut vnum esset animal integrum ex vno genere venoso & arterioso & conspirantibus nervis, quæ ab vno principio ducunt ortum, sic ut vnum fiat animal, pariterque ob id vnum os facere debuit, quo hæc machina vna constitueretur & consisteret. Verum quoniam instabat motus progressionis ad agenda negotia necessaria, ideo diuisit ossa per articulos, & hæc ratione certis in locis illa ligauit, ut munia conuenientia peragerent, & hi sunt articuli, in quibus ita ligantur ossa ipsa, ut vnum os fieri videretur, & hæc ossa hæc rumpantur, affici præter naturam dicuntur animalia ipsa: quia tunc sustentari partes non possunt, & uti affectio articulorum ad chirurgum pertinebat, ita etiam hæc pertinet ac similiter est ossium soluta unitas & nos ob id de his agere debemus & tractare decreuimus, sed breuiter ob temporis angustiam & caloris molestiam. Primo autem sciendum est, quod solutio ista continui in ossibus est multiplex: quædam enim connexum simul & substantiam amittunt, quædam tantum solutionem & annexum; vnde altera simplex erit & altera composita cum absumptione substantiæ ossis, ut cum eroditur substantia ipsa, quæ ob id etiam dicitur erosio, sed de hac non loquimur, ad vlcera enim attinet. Quandoque à gladio aufertur substantia ossis diciturque excisio: & neque de hac loqui volo, quoniam ad vulnera pertinet. De illa itaque tantum verba faciens, quæ simplex est solutio ossis dico, quod etiam hæc est multiplex, nec de his omnibus est nobis tractandum, quoniam inter simplices fractiones vna repetitur thlasma dicta, quæ sensui non patet, alia autem quæ recentioribus Medicis ignota fuit, quamuis Hippocrates eam agnouerit, nos tamen neque de hac tractabimus. Alia autem est fractura simplex ab Hippocrate proposita, quæ est, cum dissoluitur ossium continuïtas gladio, vel alio secante instrumento, remanetque sedes, vocaturque ab Hippocrate sedes, nos vero decisionem vocamus, sed de hac etiam non loquimur. Tertia & vltima est, quæ frangere solet os ab Hippocrate vocata *vel rupta* & à Galeno *εμψυον* lib. 6. de meth. med. cap. 5. vbi dicit, quod duplex est huius nominis genus, vulgare scilicet & medium, quorum nos mentionem faciemus, non tamen loquemur de illa, quæ in omnibus partibus contingere potest, quia de capitis fracturis in tractatu de vulneribus verba facimus. Frangitur itaque os, non eodem tamen modo; nam etsi vna sit fractura, non tamen omnia eodem modo succedunt, nam aliquando per longum franguntur & rima fit per longum ut in dentibus fieri solet, & hæc fractura est talis, ut partes non separentur inuicem ut sua operatione non priuentur: dens enim quamuis hoc modo scissus sit, mandit, & similiter os cruris, quod si non sit directum, non potest à Medico cognosci, quare non est, ut laboris in tradenda vobis huius curatione fracturæ, nisi sit in osse detecto, in quo si quid puris generetur, id detergere & educere debemus. de hac itaque neque est dicendum. Quandoque per transversum franguntur ossa, quæ impediunt actionem naturalem & vocatur caulidoni, quia assimilatur rei, quæ ut plurimum accidit in caulibus plantarum. Catagma vero dicitur à Medicis, credo, quod memores etiam sitis, cum haberis cucumerem recentem, qui si flectatis, frangitur, quia autem hoc modo franguntur ossa, ideo cucurbitalem nominant antiqui. Præterea raphani tenuiores radices, si flectantur, franguntur per transversum; ideo si talis in osse fiat fractio vel fractura raphanida vocatur, licet Galenus lib. 6. de meth. med. cap. 5. velit, quod ita dictæ sint, quia inæquales sunt, sed non refert. Vltimo accidit, ut os frangatur hoc modo per transversum, sed ita, ut fiant plurima frustula minuta, & hæc frequens est fractura & *εσπρησθη*, hoc est farinalis dicitur, quia uti grana rumpuntur à mola, ita os in hac à frangente frangitur. & hæc simul est alia superiori vobis proponitur à me curanda, de his itaque duabus vltimis tantum verba faciam, uti frequentioribus.

Exsilio ossi multiplex.

Rima.

Caulidoni.

Cucurbitalem.

Farinalis.

Causa.

Istius autem vtriusque causæ certæ sunt & extrinsecæ omnes, videlicet omne corpus durum, violentum, graue ac contundens partes osseas vel casu hoc accidat vel alio modo, non

non refertur ideo non multa sunt dicenda. Dux sunt species: altera simplex, altera vero com-
posita cum alio morbo. Componuntur autem atque coniunguntur primo cum inflammatione, secundo cum ulcere, tertio cum prominentia ossium, quarto cum convulsione, quinto cum gangræna, sexto cum luxatione, ultimo vero solet secum complicari mala restitutio, de his autem veluti primo veniamus ad simplicem fracturam. Signa, quibus
hanc cognoscimus, sumemus à causis violentis, à casu vel gravitate contundentis corporis, ut quis doleat circa brachium & iam contusum fuerit à baculo, vel ceciderit; hoc
primum fracturæ est signum: secundum signum habetur à relatione ægri vel altantium, quod scilicet dum cecidit, maximum senserit æger strepitum vel altantes. Tertium signum est demonstrativum fracturæ, & est casus & fere perditio motus brachii vel mem-
brum fracti, nam statim fracto os cecidit membrum illud, dum modo geminum non sit os, nec utrumque sit fractum, quia in tibia sæpe unum os frangitur, nec tamen ob id cadit hoc
membrum. Quartum signum erit à manu Medici imposita sumptum: dum enim arripit manu propria Medicus ossium capita, sentit ipsa ossa duplicata & inter se inveniuntur
ac crepantia, signum est fractionis. Quinto si non percipit illam duplicationem manu arripiens, sentit saltem manum apponens strepitum, & eum. Sexto, si non adit crepitatio, nec cetera signa, supponat manum Medicus transverso membro, & ita comprimat manum, si fractum est os, inceduabitur membrum illud, si extollat membrum supposita manu loco affecto. Ultimo Medicus, si circumquaque ducat membrum, si fractum erit os, ad
hanc partem fiet strepitus & crepitatio, & ad illam dolor ingentissimus. Si autem contingat fractura cum aliis affectibus, propria signa aderunt illarum affectionum, quare ad illa recurretis alias à nobis locis propriis proposita. Veniamus itaque ad earum curationem.

Primo autem curabimus affectum hunc, si scopo indicato ab eodem affectu satisfaciemus, hic autem est solutio, ergo vniendum est: sed quoniam duplex est coalitus siue unio, primus est primæ indicationis, vel ut rectius dicam, primæ inuentionis, quæ est, quando partes sua substantia colligantur, secundus vero coalitus est, quando quidem colligantur partes & coniunguntur simul, sed aliquo calloso corpore medio crescente, quod ipsas partes liget simul: priori modo siue scopo satisfacere non possumus, quia nimis sunt
acida ossa ipsa, nec humiditatem habent, quæ colligari possint, siue quæ facere possint ad calli ipsius generationem, & præcipue si loquamur de ossibus adultorum, nam ex mente Gal. lib. 1. meth. cap. 5. non est dubium, quod puerorum ossa primo modo colligari possunt: quia humiditatem habent talem, quæ potest inseruire generationi calli, & ipsa mollia sunt, ut colligari possint, & tempus, quo possunt in ipsis ossa colligari, est usque ad decimum-
quactum annum. Et quidem dubium non est, quod iunguntur ossa in pueris, ut carnes inter se, ut ego pluries vidi in pluribus ossibus puerorum, quæ similiter colligantur, cum tamen prius natura fuerint dissoluta. Quare in pueris per primam intentionem colligare possumus, in adultis vero per secundam. Hoc autem probat Galenus in 1. de fract. 51. inquit, si capiamus ossa brutorum, quæ fracta fuerint, atque deinde colligata sint, & callus abradatur, in profundo os inter se distans inuenitur.

Ego autem quid dicam circa hæc non habeo, quoniam quandoque vidi ossa fracta ex animalibus ipsis, nec tamen potui hoc, quod Galenus dicit, observare: Quinimo verum est, quod in humanis ossibus oppositum inueni, quia abrafo callo simul coniuncta in-
terius etiam ossa ipsa reperi. Ratio etiam hoc postulat; quia si callo obducantur, callus ille nihil aliud est, quæ substantia ossea emanans ex interioribus partibus: unde si concrescit in exterioribus, magis etiam in interioribus concrescere debet & non in exterioribus tantum, ut Galenus vult.

Præcipuus itaque scopus est, ut iungantur ossa illa puerorum per primam intentionem: præterea etiam per secundam, ut magis circum circa ligentur: adultorum autem ossa per
secundam intentionem, id est, per callum supercrescentem: nam si mollia sint, ossa per simplicem coniunctionem iungi possunt, & postea per secundam etiam iungi debent, ut magis firmentur. Si autem sint dura, per secundam intentionem coniungantur, hic itaque erit primus scopus.

Aduertendum tamen est, quod hoc fieri non potest, nisi partes simul iunctæ conseruantur ac ligentur: nam ut plurimum ossa fracta separantur inuicem, & altera eorum pars superatrahitur, & altera infra; vel altera super alteram fertur: ideo nunquam bene curantur, nisi recte collocentur & componantur; hinc autem insurgit secundus scopus, ut
scilicet dirigantur ossa & pars, quæ prius respondebat alteri, etiam nunc respondeat, quæ scopus.

actio *adipere* dicitur. Ad aliud aduertendum est, quod cum franguntur ossa, ita franguntur, ut illorum superficies non sint æquales: non enim ita franguntur, ut si secaretur os, sed inæqualiter franguntur, ita ut eorum superficies in loco fracturæ inæquales sint, & habeant uti squamas prominentes, quæ impediunt, ne os in suam naturalem sedem protendi ac adaptari possit, & hoc fit, quia franguntur illæ, & faciunt duo impedimenta, quorum primum est, quia fractæ vel cadunt intra partes ossis fracti, & impediunt adaptationem, vel si extra cadant, efficiunt, ut inæqualiter callus concresecat. Obseruandum est itaque, ne illa frangantur: hoc autem fiet, si extendamus maxime & diducamus ossa inter se: non enim inter se hoc modo illiduntur & franguntur.

*Tertius sit-
pon.*

Tertius insurgit scopus, & est ut partes illæ ossæ extendantur in hoc autem est primum agendum, & quod primum indicatur, quare proponatur humerus fractus circa mediam regionem; si aduocetur Medicus ad curationem, statim cognita fractura extendat illas partes, & quomodo sit facienda extensio iam audiuitis in luxationibus ante inflammationem, vel post, non autem dum adest inflammatio, & hoc memoriz mandate, pro quo faciundo audiistis, quod opus est quandoque organis, quandoque manibus, quandoque vero palæstrico modo procedendum est, vel Medico in ipsa extensione. Dictum est præterea, ut extendamus quam rectissime teste Hippocrate 1. de fract. 1. præterea aderat quantitas obseruanda, quæ est quousque partes fractæ sint inter se distinctæ, nec una pars aliâ tangat: Cætera autem ex eo etiam loco sunt petenda.

Facta extensione ad secundum scopum veniemus, ut altera pars ossis cum ossæ iungatur, in quo negotio peragendo vobis anatomen præcipue ossi & aliarum etiam partium commendo, quoniam sine anatome impossibile est bonam fieri extensionem, ita ut partes anteriores cum posterioribus, & anteriores cum anterioribus, atque posteriores cum posterioribus partibus iungantur.

Hæc autem conformatio non calcaneis, non pugnis, neque alio extremo modo fieri debet, sed solis manibus & iis etiam blandientibus. Posito ossæ ad suam sedem, dantur præter dictas duæ nouæ indicationes, prima ut conseruemus os in sua sede & directione; secunda, ut prohibeatur inflammatio & hoc tempore inflammationis, quæ est usque septimam vel nonam. Pariter conseruabuntur opportuna deligatione sicut & figura.

Inflammatio autem per illa tria capita communia, quæ in articulis luxatis tradita sunt, arcebitur, videlicet primo per deligationem, secundo per medicamentum proprium, tertio per collocationem conuenientem. Medicamentum autem erit illud ceratum rosatum, vel de cerussa vel linimentum simplex, quo fracturam invngemus, & primam fasciam ter circa fracturam ducemus, & ad superiora veniemus, secundum super loco affecto & primo ad infra, postea vero sursum ducimus. Posito medicamento hoc & duabus his fasciis, quæ sint eodem modo, ut in articulis dictum est, eadem splenia eodemque modo iuncta, & eadem quantitate imponemus. Tertiam postea addemus fasciam, quæ sursum incipiat & finiat deorsum. Postea addemus quartam, quæ contrario modo, vel loco ducta feratur, & deorsum incipiat, sursumque finiat, ductusque earum sit contrarius, quia tantum continet: priores autem sint similes contrariæ fracturæ.

*Collocatio
membris fra-
ctis.*

His factis ad collocationem veniemus, sed obseruantes præceptum Hippocratis 1. de fract. 62. ut facta extensione & compositione ossium inter se ligatis, sed non post ipsam extensionem, sed dum adhuc extensum membrum tenemus; nec prius remittamus, quam deligauerimus, si fieri potest, post ossa ligabitis iuncta ea figura, quæ tanta cum diligentia est facta, posita etiam tertia in articulis fascia, ut superiora membra directa, inferiora vero flexa locentur & pendeant molliter, iaceantque sine dolore superiora ad collum, inferiora ad lectum maneant. Sed notandum, quod non eadem sunt locationes in luxatis & fractis, loquendo de partibus inferioribus; quia in superioribus eadem est locatio, non autem in inferioribus. Quia si frangatur crus, ut habetur 2. de fract. 64. quibusdam canalibus utebantur antiqui, in quibus collocabant membra illa, & in his fidebant admodum Medici, ut ibi dicit Hippocr. Mihi tamen dubium facit hoc, quoniam ab his iuuentur, non tamen conducit, ut illi putant & asserunt. Laudat tamen Hippocrates hoc, quia in his molliter & optime collocatur crus: nam prius insertitur aliquo molli, ut lana vel gossypio, præterea inieruit ad motum: nam moueri debet æger, nec sine detrimento potest moueri, si hoc non ut imini instrumentum. Galenus autem eo in loco & lib. 8. meth. c. 5. dicit, quod recentiores inuenere aliud instrumentum ad collocandum crus & restituendum membrum, quod dicit vocari glossocomion machinarium, quod describitur lib. nono meth. cap. 5. & 1. de fract. text. 64. imo habemus etiam imaginem depictam, & etiam librum de machinamentis Oribasii; hoc itaque recentiores aliqui utebantur, dicit Galenus.

*Instrumen-
ta antiquo-
rum pro lo-
candis mem-
bris.*

Addit autem lib. 6. Meth. aliam capsulam, quæ non est mechanica, sed est longa, & habet latera, quæ aperiuntur & dimouentur, habetque tabellam in capite, & hoc etiam habet commodum, quia aperiiri & claudi potest, vt opportunum est. Ex his tribus instrumentis non vtitur primo, quia primo requirit multum tempus, quo fiat, & oporteret multos canales habere, quibus nunc vteretur hoc ille æger, ille autem illo, quare cessit vsus horum, licet bonus sit.

Non vtitur etiam glosiocomlo, quia, licet sit bonum ad restaurandum, tamen non est commodum, vt admittatur in lecto ab ægro, ideo factum est, vt licet vsus fuerit tempore Galeni, tamen dimissus sit, & vtitur illo canali quadrato, tertio loco posito, ac dicto à Galeno, videlicet capsula, quæ est quadrata, in qua collocamus lanam vel stipulam, in qua erus ponitur: in hac sunt latera, quæ possunt moueri, & tabulam etiam illam habet in fine mobilem, siue in eius extremitate. Præterea ad sunt ligamenta, quibus portari potest, in qua obseruandum est secundum Hippocratem 3. de offic. med. 18. aliqua & primo, quod non sit nimis breuis, quia non solum cruris patte fracta, sed totum etiam crus est continendum. Secundo quod non sit nimis lata vel angusta, quia angusta intertrigines facit & vlcera. lata vero causat, vt in ea labatur erus, ita vt contineri firmum non possit. Tertio quod latera sint bonis fibulis coniuncta. Quarto robur ipsius capsulæ obseruari debet, iuxta tamen commoditatem ægotantis: vnde non sint nimis ponderosæ tabulæ, nec admodum etiã debiles. Si enim ita construatur hæc capsula, optima erit, quæ glosiocomion non mechanicum dicitur, vel glosiocomion simplex: hoc itaque modo locabimus membrum, & ipso ita locato eadem faciemus, quæ in luxatis vsque ad septimam, & sic etiam, vt in luxatis ligabimus, secunda vero vice atctius, sic etiam in hac, & adhuc arctius in tertia.

De victu: idem erit victus, qui proponebatur in luxationibus.

Sed de medicamento purgante, de sectione venæ, & cæteris eadem erunt, vt in luxatione dictum est, vnde quia ratione communia capita tractanda sunt in hoc affectu, iam patuit, cum de luxatione tractabamus, quæ quidem ratio eadem est penitus, vsque ad septimam vel nonam diem, & vndecimam: nam eousque tertia quoque die dissoluendum est, & aqua calida perfundendum, religandum, & partes optime colloquendæ. Sed cur dixi, ego vsque ad septimam vel nonam diem, vel vndecimam? quia Hippocrates in aliquot hac ratione vtitur vsque ad septimam, in aliquot vsque ad nonam, & in aliquot vsque ad vndecimam, duplici de causa, & ratione, vel sc. ratione inflammationis, vel ratione extenuationis membri.

Primo quidem ratione inflammationis, quia post hoc tempus, quod est inflammationis ferulæ sunt imponendæ, vt dicitur, quæ non sunt imponendæ tempore inflammationis.

Secunda ratio est, quia ferulæ non possunt apponi, nisi membrum sit extenuatum, quod non fit æqualiter in omnibus membris: nam aliqua septima die, aliqua nona, aliqua vero vndecima extenuantur: quare vsque ad extenuationem membri hoc modo procedemus, septem dierum spatium digiti extenuantur, humerus nouem, tibia vero & femur nisi spatio vndecim, vt habetur 2. de fract. cum ergo perueniemus ad septimam, vel nonam, vel vndecimum diem, sciendum est, quod tunc semper incipit callus fieri durus, & ligatæ partes fractas.

De callo osseo, & eius natura, & quibus scopis absoluitur curatio.

CAP. II.

¹⁰ Vid autem sit callus iste, dicit Galenus lib. 6. meth. 5. & 1. de fracturis 40. quod nil aliud est, quam excrementum quoddam abundans in nutritione ossium: quale ergo erit alimentum ossium, talis etiam erit callus ipsorum: at cum crassissimum sit alimentum ac frigidum ossium, talis etiam erit ipse callus, vnde quandoque refudat extra cutem, & fascias inficiet, sanguisque apparet crassus, hoc expressum à partibus intimis ossis feruet, & concrescit, vt lac in caseum, rimæque ipsius ossis, siue fracturæ ligantur, circumquaque nunc ab ipso callo modo iam dicto super crescit. Dum autem concrescit callus, hæc obseruanda sunt, primo ossium directio, debemus enim septima, vel nona, vel vndecima die ablueræ partem, abluta vero considerare, an directio requisita ad sit, nã quandoque nō adest, nec hoc curam prius scite, nisi hoc tēpote, quo videmus, an distet os ab osse, & apramus, si recte cōpo-

fitum non sit, tunc enim & commodè potest cognosci & curari, ut dicit Hippocrates, quia tenues sunt, ut cutis musculi, & primò obseruanda est directio partis, postea deligationes & ferulæ addendæ, de quibus dicemus inferius, secundo obseruari debet, an adsit materia pro callo, quæ non adesset, si vereremur eadem ratione victus.

*Si materia
calli esset.*

*Si materia
apta ad calli
generatio-
nem.*

Ad callum enim generandum tria requiruntur, primo quantitas materiæ opportuna, secundo qualitas eadem materiæ opportuna, tertio facultas generans callum. Si autem eadem erit, quæ prius, victus ratio, non àderit materia, conueniens vel qualitate, vel quantitate, quia victus ille est subuulgatis, qui constat herbis, ex quibus nutrimentum fieri non potest, quo excrementum tale fiat ad generationem calli aptum. Præterea aquosum generat nutrimentum: ita ad calli generationem crassum requiritur, & viscidum & tenax, quare talia sunt exhibenda, quæ ad generationem sint apta: hæc autem erunt, ut habemus 1. de fract. loco dicto, ea omnia, quæ sunt boni succi, solidi, & quæ multum alunt, quæ enim faciunt friabile alimentum, licet sit crassum, non sunt bona, ut carnes salitæ, teste Galeno lib. 6. meth. ideo sint carnes bovinæ solitæ veruecinæ, & ex auibz magnis, ideo aliqui exhibent articulos ex animalibus, & pedes, tenax enim generant alimentum & crassum, exhibent etiam vinum præstantissimum, potens & austerum prius aqua dilutum, post etiam meracius assumptum, caseus salinus non conuenit, sed recens: in his autem exhibendis seruabitis ex Galeno temperaturam, ætatem, victus rationem, tempestatem & regionem.

*Si multum
callositas ge-
nerandum.*

Tertio Medicus aduertat, an multum callum velit concrefcere vel parum: nam aliqua ossa magnum requirunt callum, aliqua paruum, cuius ratione plenior, vel tenuior victus est instituendus: quia si multus callus requiratur, nostrum erit, ut septima die, vel nona, vel vnde decima statim abluatur locus, donec intumuerit, nec ultra: hæc enim ablutio et trahemus alimentum ad locum affectum, postea vero attrahentia & calefacientia medicamenta, ac etiam concoquentia sunt apponenda secundum Galenum, quare ceratum picatum imponatur, vel tetrapharmacum basilicum dictum, vel accipiat diachylon dictum emplastrum cum tetrapharmaco. Si autem paruum gigni velis callum, noueris quæ situm partis, præcipue in paruo esse fracto, in quo magnus callus derurat partem, in hoc septima vel 9. vel 11. abluatur membrum diu aqua calida, donec rubrum fiat & intumeat, ac etiam desideat, sic enim rarefcit cutis, & materia attracta etiam euaporabit. Secundo im-
ponemus medicamentum, quod discutiatur & licet er, & hoc erit illud medicamentum, quod factum emplastrum dicitur, lisdique vnguentum, vel aliquid ex illis medicamentis resoluentibus, quæ dicta sunt in curatione topi ligantis articulum.

*Si calli me-
diocri re-
quiritur.*

Verum quoniam raro euenit, quod Medicus velit vel paruum, vel multum callum, sed ut plurimum mediocrem volumus callum, hoc itaque fiet, si abluerimus mediocriter, postea imponatur medicamentum, habens vim congelandi callum, vniendi, & moderate siccandi, hoc quæ à Galeno explicante dicitur bene mon, ex illis scilicet, quæ cruentis vulneribus imponuntur, inter quæ principatum tenet barbarum emplastrum cum cerato rosato dissolutum. Quamuis autem de immutando medicamento Hippocrates non meminerit, imò ex ipso colligatur, quod eodem cerato vitur, tamè cum ratio hoc nobis proponat, licet Hippocrates non dicat, inoneo ego, ut muretur, quare primo abluatur locus, siccetur deinde, barbarum cum cerato rosato dissolutum ponatur, prima secundaque fasci-
a, ut dictum est, supra deligetur, post secundam barbaro eodem imbuta splenia imponatur, cui tertia addatur fascia, ut supra, quarta etiam addatur postea: si autem volueritis sequi Celsum, poteritis etiam quintam & sextam addere, licet ego tribus, ut plurimum fuerim contentus. Hoc facto adstringendum est membrum, hæc enim non continent membrum ita, ut æqualiter moueri non possit: hoc autem fiet secundum antiquos per appositionem ferularum.

De ferulis, tabellis, vinctulis & dissolutione fracturarum.

C A P. III.

Ferula.

Tabella.

A Ntiqui maxime ferulis uti solebant capientes ferulas ipsas, quas diuidebant in duas vel tres partes, medullam auferebant, & imponebant, & hoc quia lenes erant cum ratione corticis, quem lenem habent, tum etiam quia sunt extenuata, ideo possunt partibus etiam gracilibus aptari, vnde septima, vel nona, vel vnde decima die, has parti affectæ ponebant. Sed quoniam hæc non concrefcunt vbiq, ut etiam apud nos non adsunt, sed tantum in calidioribus regionibus, quare nos alia vitimur materia. Recentiores enim quibusdam tabellis, & tegulis ligneis vtuntur loco ferularum, optimo cum successu: si quæ tamen est oppor-

opportuna materia, illa est ex abiete vel masculo vel femina. Tempus autem est vel septima vel 9. vel 11. die autoritate omnium barbarorum Medicorum, licet Paulus libro sexto, cap. 63. dicat, quod statim quidam has apponebant post primam deligationem, attamen errabant. In his autem apponendis sunt aliqua obseruanda. Primo vt numerus is sit, vt *Numerum* tor apponantur, quot possint totum membrum amplexari, sed tali dispositione & ordine, vt vna non tangat aliam, sed inter eas digiti spatium intercedat. Secundo sit carum longitudo vt fasciarum, videlicet quod occupent tantum spatium illud, quod a fasciis occupatur & amplectitur, praterquam in partibus vbi prominent articuli aliqui, quo in loco abscindantur, quia comprimunt, erodunt, inflammant, gangrenamque causare possunt. Tercio nec iisdem sint tenuitatis, quia in parte, in quam declinauerit os fractum, oportet vt sint tibi *Longitudinem* bulze istae crassiores. Quarto si delicatum sit corpus, nudae non imponantur, sed vestitae lana vel stappa. Vltimo ligentur propriis vinculis laxioribus prima vice, non autem fasciis, & hoc ordine, vt primo ligentur in superiori parte, secundo in inferiori, tertio vero supra fracturam ligati debent, ne validior fiat constrictio supra ipsam & dolor, quare iam colligamus, septima vel 9. vel 11. religabimus, abluemus, fascias & splenia apponemus & arcte stringemus, ferulas apponantur, non ita tunc deligentur, & hic quiescat vsque ad perfectam sanationem, cuius terminus hic est. Hippocrates dicit 2. de fract. 65. 68. quod iuguli *Crassitatem* os viginti diebus solidetur. Paulus vero libro sexto, cap. 64. hunc terminum sequuntur, dicit ipse, digiti & manus & pedum, quia eodem tempore sanantur. Hoc modo, si etiam innet se nil vrget deligare, quiescat aeger, a tamen Medicus de tertio in tertium ipsum visitabit & laxas fetulas constringet, non autem religabit, circa partem autem fractam magis stringetur. Cum autem tempus debitum hoc modo praecesserit, ferulae auferendae sunt & fasciae, postea vero aquam calidam affundemus, vt nutriatur callus, qui iam factus est: nam attrahere debet nutrimentum, & abluemus vsque quo intumescat nec pertransibimus. Postea iterum ligabimus laxius, non tamen tot fasciis, sed paucioribus & ferulas abiciemus: Tertia autem die post hanc iterum abluemus, & vnica fascia vtemur vel nulla.

Notate tamen, quod quandoque aeger non potest quiescere a septima vsque ad perfectam sanationem, quia aliqua impediunt, quae potissimum sunt tria, vt etiam in luxationibus diximus: primo est pruritus, qui si sit maximus, locum dissoluatur, abluaturque *Quibus de causis cogitur Medicus diffinire ante sanationem* vt in luxationibus dictum est. Secundo solet oriri vlcus ratione vaporum aut sordium vel alia ratione, unde quando suspicamus a deesse vlcus, locum aperimus & aqua abluemus & cetera, quae in luxatione dicta sunt, faciemus.

Tercio suspicio esse potest non bene compositarum partium, vel quia adsit dolor, vel quia non recta videtur esse extensio & collocatio membri, & tunc non est expectandus ille terminus, sed aperiendum flectendumque & parte incuruata duplicata tegula est apponenda: vel etiam quandoque supponatis plumaceolos, & comprimatis ad oppositam partem, vt dirigatur.

Vltimo si adest suspicio ne tantus coalescat callus, quanto opus est, tunc aperiendum est, & si copiosior fiat callus, aqua copiosa affundemus calida, & medicamentum opportunum supra dictum apponemus: si minor, dissoluemus & medicamentum supradictum applicemus.

De vlcere superueniente fracturae, & de ossis detractione & ablatione.

CAP. IV.

Si fracturae adiungatur inflammatio vel tumor aliquis partium extremitatum, omnia agenda sunt dicta in inflammatione luxatis superueniente. Si autem vlcus accidat fracturae, si os aperto corio & laxatis musculis, quae dicitur fractura, cum vlcere & osse detecto non autem denudato. Duplex enim est fractura, videlicet cum vlcere cum osse detecto & cum osse denudato, cum scilicet os extat extra partem: in hac itaque cum nudatum est os, non tamen prominet, quid agendum sit Hippocrates 7. de fract. 1. proponit recensens curationem aliorum, a quibus primo vlcus, secundo fractura curatur. sed damnatur a quibusdam. Vera autem curatio est, quia habemus primo os detectum & postea fractum. Celsus dicit considerandum esse, an os sit recessurum nec ne, id est, quod diuturnitate temporis aliqua portio ossis sit abscissa. Secundo considerandum est an magnum vel paruum sit os abscissurum. haec enim variantur & variantes curationem etiam variant: nam si paruum sit os & recessurum, curandum est vti si non

esset recessurū: Si vero magnum sit os, vel est non recessurū, vel est recessurū: Si magnum & recessurū vno modo, si non recessurū, alio modo curabimus: sed 1. cōsideremus os paruum, si sit os paruum, vel recessurū, vel non, non refert Hippocrates, docet ac monet, vt primo extendamus, vt in simplici fractura, 2. componamus: 3. si quæ adfuit parua frustula, auferamus, 4. dicit Paulus, vt conseruemus locum futuris, vt in lib. 6. cap. 107. Ego vero non cōsentio cum ipso, quia Hippocrates proponit duo, primo vt vniamus, secundo, si quæ sunt carunculæ contusæ, illæ macerentur & separentur. Cōsentio autem, quando sit ratioe conglutinationis, quæ & hic ex Hippocrate requiritur.

Notandum tamen est, vt dicit Hippocrates, ne locus hiet, & sic etiā Galenus dicit, vt coniungamus, non tamen cōsuamus. Hoc factō ceratū aliquod ex illis, quæ cruentis vulneribus conueniunt. Hippocrates ponit picatū seu splenium duplicatū, vel tetrapharmacū, vt interpretatur Paulus: vel itaq; barbarum vel picatū imponemus, vt fiat concoctio, & pus, & bona frictio, vt dicit ipse. Præterea vt carnes contusæ remanerentur & separantur: post impositionem autem medicamentū supra splenia positi deligabimus, & splenia ponemus, vt in simplici fractura. Soluimus de tertio in tertium diem, affundemus aquam, vt in simplici, vsque ad septimam, vel nonam, vel vndecimam, & cætera agemus, vt in luxatō quæ detecto osse curandō. Differt autem hæc curatio a fractura simplici, quoniam laxioribus vtimur fasciis: præterea frequentius aperimus: semper enim tertio die est aperiendum, nec vnquam pertranseundum: in septima vel nona vel vndecima non ponemus ferulas, vt in simplici ponebamus, dicit Hippocrates, donec sit sanatus vlcus, vel non ponemus in parte, in qua sit vlcus, sed ad partes tantum oppositas: Quare nunc laxioribus vtetur tegulis in partibus sanis tantum.

Post hæc eadem agemus, quæ in fractura simplici. Si autem interea incrudescat vlcus, & fractura minetur emissionem squamarum, quod sciemus, quia turget vlcus, de quo dictum est supra, & copia puris magna egreditur, præterea etiam maior maximus educitur: quate cum hæc videbimus, vt in 8 vel 20 vel alio die, non est timendum, dicit Hippocrates, sed procedendum eadem ratione. Sed quia squamam egredi vult, sæpius aperiendum est, vt de tertio in tertium vel de quarto in quartum: præterea laxior adhuc erit deligatio; in reliquis vero eadem erit curatio. Sanato vlcere neq; ligato osse poterimus addere ferulas & barbarum & reliqua, vt supra dictum est.

Si autem magnum os sit recessurū vt in humero fracto, cognoscimus recessurū esse ex Hippocrate, quia illa pars ossis est denudata a periostio & facta arida, quare cum videbitis os aridum, vel quarto vel quinto die recessurū esse dicetis. Tunc primo trahemus, componemus, medicamentum apponemus: & hoc est, vt tertio de fracturis dicit Hippocrates, picatū vel ene mon aliquod applicabimus; vt tetrapharmacū vel barbarum. Hoc factō non deligabimus vsupra, sed ascia, quæ est genus deligationis Hippocratis 2. de offici. medic. 2. vtetur pro deligatione. Et ibi miror de Galeno, qui ita diligens est in omnibus: hic tamen nihil dicit, cum maxima sit difficultas. De deligatione autem loquitur Hippocrates loco citato. & 2. de articulis: non tamen aliquid dicit Galenus, nec Celsus nec Paulus. Quare dico ego, vsū fuisse aliis deligationib; hac ratione ab Hippocrate dimissis, quia cum frequenter in uisendus sit affectus & os sit magnum, quod non recedit a 40. ad 60. diem, maxima fiet afflictio ægrotantis, si quotidie fasciæ tot & inuolucra sint auferenda, vnde membrum sit ita crebro tollendum & mouendum, maximo cum periculo, ne dilabatur a collocatione os fractū: hac ergo ratione motus Hippocrates illam rationem ligandi alioquin bonam omisit, vnde postea modum deligationis inuenit sine agitatione aut suspensione membri, quæ deligatio dicitur ascia. Ascia est instrumentum fabri lignarii, quod Zappetta vulgo dicitur, in eius acie vltima latum, prope autem manubrium angustum: cum ergo nos hac figura deligamus, talis deligatio dicitur ascia. Potest autem hoc modo fascia duobus capitibus ligare, & etiam vno capite solo: vnde cū volumus vno capite deligare, fiat hoc modo, vno ductu, fascia ducatur oblique, ita vt vno in loco sese interseret ac superequiter, sed hoc modo non vtitur Hippocrates, sed multa splenia accipit, quibus vice fasciarum vtitur, quatum longitudo est tanta, vt possint ligare partem vna vice cum dimidia: his pluribus fasciā nos facere vult Hippocrates: ista splenia hoc modo apponenda, vt scil. partem vnus splenii mediam circa partem affectam inferiorem ponamus, aliam sutsum hoc splenio trahamus, ibiq; duobus suis capitibus interscabit & finiet. Hoc factō addemus aliud splenium, postea tertium & quartum, & tot apponemus, donec ad partem illam, ad quam etiam fascia ascendebat. His spleniis apposis deueniemus; postea abis spleniis a loco simili infra descendemus, & hoc modo de tertio in tertium, abiq; suspensione & agitatione membri aperire poterimus. Hæc autem po-

nerunt continere optime, vtq; fascia, quia interfecant sese & inuicem comprimunt & optime continent. Sed ego quandoq; hac non vtebar, qui difficilis erat horum vsus: sed dum curatur affectum crus & arget in deligationibus continuis maxime cruciaretur, fascias pertransuersum secui, & sic sectas collegi partes illas fasciarum, quæ splenia affirmabant, vnde casu hoc mihi indicatū vidi, ita vt postea his vsus sum maximo cum successu. Splenia autē ista ætate vino austero madesacio hyeme veto vino austero & oleo tepido; in prima applicatione seu collocaione corium durum & solidum supponatur, vt irrigationes suscipere possit. Recello osse & sanato vlcere ferulas apponere poterimus & medicamentum superadditum. Si autem os carnem excedat & promineat, vel ex casu ab alto, vel contractis semusculis ex hoc, quod protrusum est os extra suam sedem, primo considerandum est, an sine conuulsione possit restitui vel non; vnde si potest restitui, sine conuulsione periculo restituemus, aliter non. Cognoscetur hoc primo ex magna denudatione, vt si in femore sit magna denudatio ossis per spatium quatuor digitotum, nimis magna erit denudatio; secundo si aderit principium tumotis vel inflammationis: tertio si carnes duræ sint & contractæ, non tentetis restitutionem, quia periculum maximum est, ne conuulsio succedat. Sin contra non magna sit denudatio, nec adsit inflammatio, sed laxitas partium, reponatis primo extendendo, postea componatis, si extensio non fiat per manus. Hippocrates autem adiuvat illam extensionem per vectem à Paulo descriptum lib. 6. cap. 107. quod instrumentum à Celso volfella dicitur lib. 8. cap. 6: & est ad figuram vectis factū, vnde sit magnitudo eius vt pali de fetro dodrantis, sit curuū in vna parte, quæ impellat in sua sede os ipsum. Facta extensione, repositiq; osse obseruandum est, an recessurum sit; at si statim facta erit actio, non recedet, si vero non statim potest recedere: vnde si non est recessurum, tetracharmacum vel barbarū imponetis, deligabitis, laxius tamen, & fascias dictas ponetis; si autem recessurum sit, ratione ea vtamini supra dicta, acriaq; deligatione. Tempus restitutionis est prima, 1. vel 3. dies: postea non restituemus vsque ad septimam, 9. vel 11. Si conuulsio post restitutionem accidat, è loco iretū protrudatur. Si autem casu non possit restitui, quia adsit inflammatio vel conuulsio, eadem agemus, quæ sunt dicta in luxato osse atque prominente, & ponemus folia illa betarum vel tussilaginis & alia dicta faciemus, vt si poterit secati cum ferra vel scalptis elici, hoc faciemus: postea quantum poterimus, deficeo demus, deligabimus aptabimuseq; vt supra dictū est. cætera faciemus itidē. Hippocr. autem vnum obseruat, quod dum secatur os, artus fiant breuiiores. Celsus tentat, an testituere possit, & dicit vt ponamus inter os & os lignum molle & sensim à minori ad maiore cuncum faciamus vt fiat magnum spatium inter os & os; vnde succrescet callo in spatio illo os cum osse ligatur. Hoc autem ego non tentauī, nec credo succedere: vnde ego dico, vt cum Hippocrate sinamus, vt decurtatum sit: & omnia hæc agenda sunt circa fracturas, in quibus si male concresecat callus, omnes monent, vt si durus sit callus, iterū frangat, quod neq; ego sum vnquam expectus. Si autem intorti concresecunt artus, callus quonondum iuduruerit, potest corrigi eo modo, quo supra dictum est. Si minus copiosus callus succrescit, vel nimis paruos, facile erit, vt supra, agendum.

Si autem cum fractura adsit luxatio vel alix affectiones, sunt modis propriis curandi curadz. In hoc autem aliqui vnum affectum post alium curant; sed male agunt; vtique enim simul & semel sunt curandi, vt colligitur ex lib. Hippocratis. Et hæc deluxationibus & fracturis in laudem Dei opt Maximi dicta sufficiant.

GABRIELIS FALLOPPII MV- TINENSIS MEDICI AC PHILOSO- PHI CLARISSIMI TRACTATVS V. TO.

mi II. De partibus similaribus.

De difficultate tractationis, hominis substantia & corporis compositione.

CAP. I.

RLVIIVS de causis similarium partium tractatio difficilis est, cum quia ver-
satur circa penetrabilia naturæ, cum quia diuersi sunt autores inter se de iis tra-
ctantes: non enim semper concordēs sunt Arabes, non Gal. neq. Aristot. Vati-
æ namq. sunt in ipsis cōtradictiones. Præterea adeſt timor vobis ſatis facien-
di: ſententiam tamen meam libere dicam, quoties conuigetit illam in medi-
um afferre.

*Hominis
ſubſtantia
multiplex
eſt.*

Quare primum dico corpus humanum non vnica ſubſtantia conſtatū eſſe ex Ariſt.
lib. 2. de partib. animal. c. 1. quia non vnica eſt corporis humani actio, ſed plures: ego plu-
res debent eſſe partes. Quare cum videamus plures motus ſenſationeſq. & alias actiones
multas & diuerſas, ideo dicendum eſt, nō ex vna, ſed ex pluribus conſtare ſubſtantiaſ cor-
pus noſtrum. Præterea videmus in ſingulis partibus hominis plures ac diuerſas actiones
& motus, quia nunc quieſcit pars, nunc mouetur, nunc mollis eſt, nunc aſpera, nunc ex-
tenſa, nunc cōtracta, vt exempli gratia, in manu patet: Ergo manus ſubſtantia, non vna,
ſed multiplex eſt.

*Ex quorū
partibus cō-
ſtat corpus.
Ariſtoteleſ
opine de
corporis cō-
poſitione.*

Præterea ex Galeno & Ariſtotele actiones aliquas ex partibus manare videmus,
quarum cauſam non videmus: ergo aliquid laret in profundo, quod eſt cauſa harum acti-
onum: quare corpus humanum non eſt vniforme, ſed diuerſis formis præditum, diuerſiſ-
quē ſubſtantiaſ. At videamus, quorū ſint vel eſſe poſſint hæc ſubſtantiaſ. Galenus in lib. de
tremore dicit, quod partes corporis humani ſint tres ex Hippocrate 6. Epid. part. 8. aph. 8.
quarum prima ſunt corpora continentia, ſecunda corpora conſentia, tertio corpora impe-
tus facientia, per continentia corpora intelligens partes ſolidas, per conſentia humores,
& per impetum facientia ſpiritus omnes, quod etiam explicauit Ariſtoteles lib. 2. de part.
an. cap. 1. alio tamen hoc inueſtigans ordine, cum proponat tantum partes ſenſu cognitæ,
quia itaque ſpiritus ſenſu cognosci non poſſunt, ſed ratione potius: videmus vapores ali-
quos, inter quos & ſpiritus diſtinguere ſenſus non poteſt, ideo de hiſ non loquens Ariſto-
teles dicit, quod in viuētibus animalibus varia eſt cōpoſitio, & huiusmodi cōpoſitio-
nes primo ſunt ex iſtis Elementis, quoniam dantur viuētia, quæ ex cōpoſitione tantū
Elementorum conſtant, vt ſunt plantæ & animalia per putredinem genita, an vero hæc
prima mixta imperfecta viuētia, quæ mouentur aut ſtant, ſiant ex elementis putis, aut ca-
ſtigatis, vel potentiis tantum, altioris eſt ſcientiæ, & adhuc ſub iudice liſt.

Secunda cōpoſitio eſt illa, quæ ſit ex iſtis mixtis, ex quibus ſit cōpoſitio partium
ſimilarium animalium, & præcipue hominis, quæ eſt perfectiſſima: nam ex hiſ animalibus
& plantis ſunt partes ſimplices animalium perfectorum.

Gal. op.

Tertia cōpoſitio eſt, quæ ſit ex partibus ſimilaribus, & facit artus, vt manus, caput,
& omnia alia inembra cum brutorum tum hominis. Quare duæ ſunt partes corporis hu-
mani: primæ enim ſunt partes ſimilares ſimplices, ſecundæ ſunt diſſimilares ac cōpoſi-
tæ: vnde corpus humanum in duas partes diuiditur, & hæc eadem diuiſione Galenus c. 4.
lib. 1. de placit. Hipp. & Platon. proceſſit autoritate Ariſtotelis motus, ac diſſert aliquan-
tiſper ab Ariſtotele, quia Ariſt. non ponit differentiam inter partes ſimilares hominis, &
brutorum, quia reuera idem ſunt, ac differunt tantum ſecundum magis & minus, quæ uō
variant ſpeciem, mihiſtamen magis placeat diuiſio Ariſtotelis, quoniam etiam oppoſitum
ſieri poſſit, quam dicat Galenus, quia reperiuntur bruta deuorantia homines, & homines
non deuorantes bruta.

*Diſcrimen
inter Gal.
& Ariſt.
Cōtradi-
ctio Gal.*

Sed notandum eſt, quod partes ſimilares ex cibis ſecundum Ariſtotelem ſunt: at
Galenus inquit, quod conſiſtunt ex Elementis, & ramen prius cum Ariſtotele conſentit:
ergo videtur, quod ſit cōtradictio: Sed ſoluitur, quia ſi modum cōpoſitionis conſide-
remus, omnes partes ſimilares ex cibis ſunt: at ſi reſoluamus partes in ſua principia, tunc
ſieri

ieri videtur ex elementis, quia partes similes si resoluantur, non in cibos, sed in Elementa resoluuntur, quare fiunt ex plantis animalibusque, quia ex his animalia aluntur. si autem resoluantur, in Elementa resoluuntur, quare nulla est contradictio in Galen. colligitur ergo corpus humanum constare ex partibus instrumentalibus, quae fiunt ex similibus, quae rursus fiunt ex cibis, & dicuntur simplices partes ac similes, quae primo componunt corpus: aliae vero partes sunt compositae, quae ex istis constant, dicunturque dissimiles atque compositae & etiam organicae vel organa, quia omnes artus sunt organa, manus vero est organum organorum. Plato autem ex Galeno lib. 1. de nat. hum. vocabat similes partes primo genitas, posteriores vero organicas vel dissimiles. Cum ergo institutum nostrum sit tantum de primis agere, circa ipsas primo proponam nomina quibus vocatae sunt ab omnibus, secundo proponam eorum naturam, tertio usum multiplicem, quarto numerum difficultates tollendo contingentes circa numerum ipsarum: vltimo ad enumerationem vniuersi usque, deueniam & naturam usumque eius proponam. Quamuis autem tractatio haec summa sit, tamen ad anatomicum spectat, & ideo pro dissectione corporis humani in anatomicae hae a me tradentur, quoniam ex sensu hoc est cognoscendum, non autem ex ratione.

*Nomina partium simi-
larum &
organarum
varia.*

*Considera-
da in tra-
ctatione par-
tium simi-
larium &
ordo remen-
dus.*

Primum ergo quo ad nomina Galenus appellat has partes ex Aristotele similes lo-
co cit. Et lib. 4. meteor. Galenus vero lib. 2. de elem. cap. 1. & multis aliis in locis. Tertio di-
cuntur partes primae corporis humani secundum sensum, quare ratione reperiemus etiam
spiritus inter has partes connumerari ex Hippocrate etiam, sed quoniam sensu hoc modo
non cognoscuntur, ideo lib. 1. de elem. cap. 2. has vocat Galenus primas partes secundum
sensum. Quarto vocantur simplices partes corporis ex lib. 8. de placit. cap. 4. & alibi: & ab
Aristot. loc. citatis, non quia simplices sint, sed quia ad sensum earum compositio non pa-
ret, nec differentia, ut patet in osse alisque partibus. Praeterea quia ex his fiunt partes compo-
sita ac organica. Quinto dicuntur haec partes elementares vel elementa corporis ex lib. 6.
de san. tuend. cap. 1. & 6. capite libri de partibus artis medicae, si liber ille est Galeni. Dicun-
tur autem elementares, quoniam ex illis constat corpus humanum. vltimo dicuntur soli-
dae partes ex libro illo Gal. denominato de Placit. Hippocraticis vbiq. Et haec sunt omnia
nomina, quibus donantur haec partes.

Nomina.

De natura, Definitione & usu partium similarium cum solutione difficultatum.

C A P. II.

QVo ad naturam partium similarium lib. 8. de plac. Hipp. cap. 4. dicit Galenus similes
partes illas esse, quae habent omnes partes inter se ac toti similes, ita ut si diuidantur
partes hae, omnia earum sint sibi inuicem similia, siue omnis earum pars sit omnino toti si-
milis, ut si os magnum frangatur in plura frustula, ea sint inter se & toti etiam ossi similia.
Hoc autem certius explicauit Auicennas sen. 4. lib. 1. doct. 3. cap. 1. vbi dicit partes simila-
res sunt illae, quarum quaelibet pars seorsum sumpta nomine & definitione cum toto com-
municat, ita ut quaelibet carnis pars caro dicatur, & sit eiusdem naturae, coloris &c. Quo
ad usum autem cum tot sint istae partes, primus earum usus proponitur ab Aristotele lib. 2.
de part. anim. cap. 1. ut inserviant sensibus, quoniam sine his non fieret sensus: quoniam si
omnia composita essent, non daretur sensus ab aliis distinctus. exempli gratia, videatis ocu-
lum, cuius primum instrumentum est crystallinus humor: nisi enim similis hic esset, non
fieret eiusmodi visio, non tamen partes similes esse adeo simplices ut compositionem e-
lementorum effugiant, sed dico simplices, quo ad sensum ut contraria percipiant, requirunt
compositionem ex elementis, tamen habent vnam, & vni formem substantiam: requi-
runt ad sensum & usum. Secundus usus est, quia ex his partibus constant organicae partes
variae. Tertius usus est ex Galeno lib. art. med. cap. 9. ut organa habeant regimen ex se nec
aliunde defluat, scil. ut munia naturalia obire possint, sine aliorum auxilio: nam actiones vo-
luntariae aliunde fluunt, scil. a cerebro, quia partes igitur similes habent ex se insitam
vim naturalem, per has conseruantur nutriunturque partes organicae. Sed est difficultas cir-
ca hoc, quam postea proponam. Quartus usus ex Aristotele est, ut sint haec partes simplices
alimentum aliarum partium scil. organicarum, & hoc verum est in via Aristotelis, quia ipse
ponit humores inter partes simplices: verum est etiam in via Medicorum, cum ponant
pinguedinem ac medullam inter partes simplices, ex quib. quandoque fit nutritio ipsa. Quintus
usus est, ut sint veluti excrementa, sed quoniam hic usus levis est, ideo remanet tantum qua-
tuor usus iam enumerati. Dicebam autem circa tertium usum esse difficultatem, cum Gra-
leus dicat partes similes habere regimen ex se; sed contrarium dicit in libr. de placitis

*Definitio est
Galenus.
Ex Anticu-
da.
Vnus partium
similarium
multiplex.*

*2.
3.
4.*

*5.
An partes si-
miles ha-
beant vni-
formem
naturalem ex
se parte an 6.
ex se.*

expresse, vbi testatur hepar esse fontem facultatis naturalis, & ab ipso partibus aliis omnibus communicari, & hoc est dogma Gal. à cæteris Medicis omnibus receptum: ergo partes similes non habent hanc vim sibi annexam. & Galenus sibi ipsi contradicit. & hoc exagitaui viros doctissimos ac multos, & res difficilior facta est. nam Aristoteles libro secundo, de anima sepe dicit facultatem sentientem continere nutritiuam ac naturalem. Secundo sequitur, quod si fluat ab aliis partibus vis sensitiva, ergo etiam ista naturalis, ergo sequeretur quod amputata manus etiam posset viuere & nutrirī, si à se haberet hanc vim. Tercio addatur ratio validior: Nam ipsa partium resolutio vel paralyſis fit ex obstructione venarum vel arteriarum: Ergo non habent hoc principium internum.

*Namque
prostantes
ab aliis fa-
cultatibus ha-
bere.*

Addatis similitudinem, quoniam videmus partes minoris momenti vim ad totum corpus transmittere, vt testes sunt: Ergo multo magis hepar hoc faciet, quoniam testes faciunt animal animosum robustumque: at si amputentur testes, fit effeminatum, vt patet in capis & castratis. Si igitur de quo minus videtur inesse & inest, ergo etiam de quo magis: sed testes, qui sunt minoris momenti ad totum corpus vim transmittunt, ergo magis transmittit et hepar maioris momenti. At aliqui venerunt in hanc sententiam, vt vim naturalem in duas partes diuiserint, in facultatem scilicet quæ sibi ipsi simile generat, vt cum caro carnem generat, & hæc est partibus similaribus insita, de qua Galenus locutus est; alia vero facultas est naturalis consistens in quatuor operationibus, quæ sunt attractio, retentio, concoctio & expulsio. atque de hac locutus est Galenus, quod ab hepate transmittatur. Sed isti decipiuntur, quia si caro ratione hepatis attraheret, ergo eodem modo attraheret, quo etiam hepar, quia non est dissimilis hæc attractio neque similes, quia hepar trahit chylum, non autem sanguinem: Ergo neque partes similes sanguinem attrahent, & plura inconmoda sequentur hac concessa opinione. Sed vna est ac eadem facultas ab hepate transmissa, nam hepar trahit ratione similitudinis substantiæ, patet istæ etiam partes eodem modo agunt, quo hepar, forma enim est, quæ attrahit, concoquit & expellit: Ergo forma cum sit in omni parte, hoc necessario agit nec ipsa aliunde deriuatur.

*Solutio que
videntur re-
sponderet.*

*si par carnis
si attrahat.*

*Adhuc
duo sunt.
Partes na-
turales que
vires a-
gent.*

*Spiritus na-
turalis que
desit in
quo tempo-
re.
Fons spiri-
tus natura-
lis*

*Solutio pro-
pria de re-
conciliatio.*

Sed notandum est ex doctissimo Actuarius, non autem ex indocto illo & empirico Zacharia, in libr. de affectibus spiritus animalis habetur, quod partes naturales agunt propria forma ac cum instrumento quod dicitur spiritus animalis: nam hoc instrumento per propriam formam attrahunt, concoquunt & expellunt. & hic spiritus est immediatum instrumentum vis naturalis, & hic spiritus, dicit Actuarius, originem ducit vna cum forma ipsius particulæ, & ex eadem materia eodemque tempore fit, & Galenus etiam ipsum spiritum naturalem concedit hepateque huius fontem esse dicit. Hic tamen spiritus dissipatur ac resoluitur, ideo natura fecit fontem, vbi hic generetur in copia, id est hepar, in quo generatur alimentum totius & spiritus iste naturalis, qui ad totum corpus transmissus ac partes omnes actiones illas facit: nam ex Galeno in libro de formatione sortus ex femine plura sunt membra, vt ossa, nerui, &c. & postea addita carne fit epas: cor & cerebrum & spiritus iste naturalis simul cum partibus generatur & ante generationem hepatis ex humido radicali: quare spiritus hic ab hepate non procedit, cum sit cum parte genitus ante hepar. Sed hoc stante dico veram esse sententiam vtramque, scilicet quod partes similes regimen insitum habeant & subministrant sibi postea restitutiones spirituum ac nutrimenti, & ita conciliantur loca ista & rationes facile dissipantur adductæ. Prima enim dissoluitur, quia Aristoteles noluit vim naturalem contineri in sensitiva, vt pars in toto: nec species in genere, sed, voluit quod omnis pars sentiens etiam nutria, & ideo vana est prima ratio. Secunda vero corrui vt falsa, quia pars nutritur, si habeat nutrimentum & spiritum ac calorem naturalem, hoc autem non fit, quia non fit ibi forma, sed quia deest nutrimentum & calor. Ad tertiam dico, quod vinculo atque obstructione prohibetur alimenti & spiritus transmissio. Ad quartam, quod testes nihil agant, & ideo similitudo nulla sit, quoniam testes agunt, quoties auferuntur siccando corpus, at hepar addendo agit: quare similitudo & leuis & clauda est: at si auferamus testes, corpus redundat excrementis humidis, vnde sunt animalia effeminatiora, quare, &c. Quo itaque ad primam rationem siue argumentum de facultate sensitiva: quod continetur nutritiva in sensitiva respondeatis, quod hoc ideo fit, quoniam nulla pars sentiens vi naturali priuata est & ideo videtur nutritiva in sensitiva contineri hoc pacto. sed ossa nutriuntur, non tamen sentiunt, quare non omnino naturalis vis in sensitiva continetur, imo differentes sunt facultates.

Secundum argumentum erat de manu reſecta, quod nutritur quidem, si haberet instrumentum agens, scil. spiritum viuacem ac calorem naturalem: at hoc non potest fieri: secund-

secundo non adest materia proportionata nutrimento & propterea non fit nutritio. Tertiū argumentum erat de interceptis valis vinculis vel relectis. Respondeo quod ideo non fit nutritio, quia interceptis materia nutrimenti & fluxus spirituum ab epate, nec tamen dicendum est, quod vis insita non sit in manu & eius partibus: ideo cum instrumentum interceptum, & materia, non est mirum, si nutritio cessat. Quartum argumentum fuit de minori ad maius ex reffibus, qui aliquid facere videntur in corpore. Ergo magis hepar. dico quod testes aliqui agere videantur, non autem quod agant, sed quia diminuunt euadantque excrementa corporis humida, & si secentur, animalia sunt effeminata propter humiditates non attractas.

De numero Partium Similarium ex Aristotele, Galeno Auicenna, Cardano, Fernelo, Fuchio & aliis probantibus compositionem non esse de natura instrumenti.

C. A. P. III.

Quo autem ad numerationem istarum partium, sciendum est difficilem esse earum numerationem propter variam scripturam sententiam & inconstantiam. primo enim Aristoteles lib. 1. de partib. anim. c. 1. duas classes harum partium facit, primam mollium ac humidarum, alteram solidarum. inter molles autē partes primo enumerat ipse sanguinem, secundo ichorem, 3. humiditatem tenentem omnium humorum, tertio adipem, quarto sebum, quinto medullam, sexto generatam. cuiuslibet autem adiungit bilem, quæ prætermissa est. Gaza, deinde addit lac, vltimo vero carnem: hæc enim simplices sunt molles & humide. Secundæ autem classis quatuor sunt, ossa, spinæ, nerui & venæ. at lib. 4. meteor. cap. 10. addit cures, viscera, pilos, fibras & similia, lib. vero 1. de part. animal. addit etiam cartilagineas, membranas, vngues & cornua. Has ergo nos partes in quatuor classes distribuamus, quarum prima sit ex iis illis primo enumeratis, secundum genus sit mollium, quæ sunt pinguedo, medulla, caro & viscera, tertia classis sit neruus, vena, curis, membrana, vesica & fibra: quarta autem classis sit durissimarum, vt ossa, cartilagineas, pili, vngues, cornua, penne & similia.

Auerroes autem 1. collect. capit. 2. & 13. has partes connumeratis ponit ossa, musculos, chordas, nervos & alia, præterea phlegma, humorem melancholicum, spiritus, bilem & alia multa, quæ non addit Aristoteles. Auicennas veto fen. 1. libro primo, doct. 5. capitulo primo diligenter quidem partes has enumerat, sed tantum has ponit: primo ossa, secundo cartilagineam, tertio neruum, quarto chordam, quinto ligamenta, sexto arterias, septimo venas, octauo panniculos omnes, nono addit carnem, & ita nouem tantum facit partes ex quibus sunt organa. Galenus vero varius est, & nullo in loco omnes enumerat. nam libro nono Meth. capitulo vltimo dicit tres tantum esse partes similes, quarum primæ sunt illæ, quæ habent substantiam fibrosam, secundo quæ habent substantiam membranoseam, tertio quæ habent substantiam carnosam. non tamen est credendum, Galenum has omnes partes omisisse aut non enumerasse quoniam libro octauo de placit. capite tertio addit etiam ossa & cartilagineas, libro autem 1. de natur. humor. in præfatione addit pinguedinem & ligamenta, vt septem sint. Præterea libro secundo de element. capite primo & in libro de differ. morb. capite tertio addit venam & arteriam. Item in libro de inæquali intemperie addit duo, tendines scilicet & vngues, vt & in libro arr. medic. cutim & nervos. Sed notandum est, quod in codicē latino nerui prætermittuntur, cum tamen sint in græco: præterea in libro primo de temperamen. capit. nono, & libro de art. med. pilos addit. Opus ergo est, vt constituamus nos certum numerum iudicium asserentes de scriptoribus istis & etiam circa discordias eorum discurramus. Ego itaque sum huius sententiæ, quod omnes primarij autores isti non sibi contradicant, vt aliqui ad iudicant. omitto tamen Auerroem, quem credo tunc fuisse ebrium, quia proponit multos sculos a nullo alio propositos & spiritus, qui insensibiles sunt, quare aberrauit in hoc Auerroes cum alias fuerit doctissimus. At Aristoteles exactissime enumerauit partes omnes simplices animalium perfectiorum, & sibi constat in suis principiis. Aristoteles enim proponens compositionem animalium dicebat primo vegetabilia componi ex elementis, secundo partes simplices ex illis componi, ex quibus tandem partes organicas. quare hoc est optima exquisitaque doctrina, & hoc Aristoteles ratione materie & compositionis inuestigabat, verum aliquis dubitare posset, cum quandoque & ipse Aristoteles videtur inconstans, quoniam interdum omnes enumerat, quandoque autem aliquas omittit: nam libro quarto meteor. capit. 10. dicit tantum partes enumerat, non autem molles, sed siccitas non est dubitandum, quoniam ille nihil prætermisit nam hoc fecit, vt dicunt omnes, quia

ad dictas referri possunt aliz partes & secundum variam compositionem dicendi: nam loquens de partibus animalium, quæ terræ referuntur proponit duras tantum, ac in fine eius libri enumerat etiam partes molles, vt est sanguis, bilis, lac, genitura, &c. quare verissima est eius diuisio.

Iudicium de Galeno.

Cur Galenus humores non ponat inter partes similes.

De Galeno autem non est dubitandum, quin omnia rectissime enumerauit, non tamen vno in loco, sed variis, quia sibi Hippocratem sumpsit imitandum. Quare tres tantum corporis partes constituit, continentia, contenta & impetum facientia & ideo de istis Galenus sparsim tractat & ipsas enumerat, non tamen enumerat humores inter partes simplices, primo quia locum certum sortiti sunt, secundo quia corpus humanum non conformant vt partes similes faciunt & omnis conformatio à partibus similibus fit, sed quia humores non conformant, sed ab aliis terminantur & non sunt nisi materia partium aliarum, ideo eos (humores) prætermisit Galenus, spiritus autem quia sunt insensibiles.

Differentia inter Arch. & Galen. de compositione corporis.

Iudicium de Auicenna.

Contradictio à Galeno.

In libro autem de differentiis morborum capite tertio, constituit has compositiones in corpore humano primo ponens elementa partes primas, partes secundas & totum corpus, elementa sunt humores, ex quibus fiunt partes primæ corporis, ex quibus postea prima & secunda omniaque organa fiunt & ex his demum atq; tandem totum corpus ipsum resultat: & Galenus ab inferioribus incipit & non vt Aristoteles, quoniam Galenus Medicus est & quasi Medicus Philosophum non proficitur propterea elementa vocauit humores, vnde sequitur, quod etiam Galenus has partes recte connumerat. Auicenna etiam bene fecit, nec accusandi sunt auctores: Possem enim ego accipere mihi ynam normam rectam & ad hanc omnes alias taxare, sed hoc non est pium, propterea dico, quod neque Auicenna errauit, omisit enim partes aliquas, quæ sunt veluti ascititiæ ac instrumenta nec corpus constituunt, vt sunt pili, cornua, &c. quare tantum necessarias enumerat partes & sub nomine panniculi omnia talis generis intelligit: Omisit præterea humorem crystallinum ac vitreum, quia sunt destinata vni organo & communes non sunt materiæ totius corporis, quare omnes isti auctores optime enumerarunt. Verum ego dimissa Aristotelis enumeratione & etiam Auicennæ illam Galeni accipiam, circa quam magnæ sunt contradictiones, at cum semper de his eodem modo non loquatur quoniam ex simplicibus organicæ ac compositæ componuntur, quas tamen Galenus videtur confundere, quare proponamus nos hanc difficultatem maximam ab omnibus visam.

Primo itaque Galenus aperte in lib. de cib. bon. & mal. suc. capite quarto dicit, nervos partes esse compositas ex fibris. lib. autem 8. de placit. cap. 5. & lib. 8. de vñ. partiū. dicit nervos ex triplici substantia consistere ac constare, videlicet ex cerebro, dura ac molli membrana & capite nono, art. med. dicit nervos esse instrumenta cerebro inferuentia, ergo necessario sunt partes compositæ & lib. 1. Meth. c. 6. dicit nervos esse instrumenta corporis, ac idem etiam deligamentis confirmat, quæ constare dicit ex fibris & tamen ipsas proposuit inter simplices. Præterea 1. de motu musculorum dicit ligamenta & nervos constituere chordam, ergo sunt pars maxime composita, & tamē Galenus dicit chordam simplicem esse partem. Præterea in lib. an sangu. natura in arter. continetur cap. 4. dicit cutim compositam esse ex nervis, venis & arteriis, ergo non est simplex pars sed composita ac dissimularis. Item in libro de inæq. intemp. capite secundo, vult arteriam & venam esse compositam ex fibris & membranis, & cap. 9. art. med. vult esse partes instrumentales cordis & hepatis, quare maxima est contradictio in verbis Galeni; nam libro. 1. meth. cap. 6. appellat has partes simplices & in lib. de differ. morb. cap. 3. & 4. instrumenta: at in capite tertio enumerat venas, arterias & nervos inter partes simplices & in capite quarto, vult esse instrumenta prima: nam quatuor sunt genera instrumentorum: primum genus est simplicius, vt venæ, secundum minus simplex, vt musculus: tertium adhuc minus, vt oculus & digitus: quartum adhuc minus, vt totum caput & tota manus, & inter prima instrumenta enumerat venas, arterias & nervos. Ergo partes istæ compositæ sunt, ergo maxima inconstantia.

Quæritur de nervis instrumentis.

Solutio ex Cardano. Quis opinor de partibus variis sit solutio.

Possemus etiam addere alias partes, circa quas est difficultas, at tamen quia refugium est ad peritonæum, ideo dimitto atque proposui tantum difficultates solui, quibus solutis apparebit omnium difficultatum contingentium circa hoc solutio. Hieronymus Cardanus primo vidit hanc difficultatē & pro solutione inquit, quod partes variis modis componuntur, quatuor vna prima ac vera compositio est, quando partes componuntur ex partibus variis substantia forma ac actione, vt est caput, in quo forma membrarum diuersa est ab humorum forma. Secunda species est in qua partes variant substantia & forma,

forma, non autem actione, quia conspirant in eandem actionem, ut est oculi compositio : in hac enim secunda compositione partes variant substantia & forma, non autem actione, quia, ut dictum est, in vnam actionem conspirant. Tertium genus compositionis est quando aliqua pars est similis substantia ac forma, dissimilis autem in actione, ut sunt venæ & arteriæ, quæ ex iisdem constant, tamen actiones diuersas edunt. Quarta compositio est cum partes ex partibus componuntur eisdem substantia, forma & actione, ut sunt nervi, qui componuntur ex fibris in eandem actionem conspirantibus. Quinta compositio est, cum partes componuntur ex elementis vel veris, ut sunt aer, aqua, terra & ignis : ut lanologicis, id est, quatuor humoribus. Iam ad rem nostram cum compositio habeat latitudinem & vna ad alteram relata simplex videatur, hinc est quod ad vnam respiciens Galenus has partes vocauit simplices, ad aliam vero respiciens dixit compositas, ut patet in omnibus istis partibus inducendo, quia simplices sunt quo ad primum & secundum genus compositionis, licet quo ad tertium, quartum & quintum sint compositæ, & tales dicantur, ideo Galenus non est accusandus, hæc Cardanus. Sed hæc eius solutio mihi non placet, quia cum dicimus has partes esse simplices, similes ac elementa, hoc ideo fit, quia diuiso corpore humano, cum ad has deuenimus non amplius procedimus nec diuidimus: quod si vltra progrediamur, partes hæ non essent elementa, sed elementata, quare vanum est dicere, quod partes hæ simplices sint, quia non componantur ex substantiis diuersis, sed quia non possunt diuidi in alias, nisi corrumpantur. Alii dicunt, quod vocauit Galenus has partes quandoque simplices, quandoque compositas, nec tamen errauit, quia partes instrumentales consistunt in figura, ideo partes hæ quo ad figuram sunt instrumentales, at patium simularium natura consistit in substantia, quæ si considerentur sic, sunt simplices, & hoc probatur ex Aristotele in principio libri 2. de anima exemplo de securi, cuius figura tantum agit & dicitur quod securis est per figuram securis, quæ figura si auferatur, non est amplius securis, & hæc opinio fuit doctissimi Ferneli, qui addit ex Aristotele lib. 2. de part. anim. cap. 1. ubi dicit, viscera composita esse, quia constant ex simili substantia & figura; at substantia non est de natura organi sed tantum figura; ergo tota vis organi consistit in figura, & idem dico de omnibus his partibus, quod ratione figuræ sint instrumenta, ac ratione substantiæ similes sunt. Sed falsum esse dico, quod natura instrumenti consistat tantum in figura: nam Galenus libro 1. method. capite 6. dicit membranas oculi habere figuram & esse partem siue particulas & tamen non esse instrumenta, ideo opinio illa in eo quidem iudicio falsa est ac solutio vana, nec autoritas illa prima libri 2. de anima aliquid facit, nam, dubium est inter expositorum an figura sit forma & nolunt asserere figuram illam esse veram formam, sed vim quandam ex partibus illis resultantem. Præterea dico, quod etiam concessio figuram in artificialibus esse naturam instrumenti, tamen hoc negarem in naturalibus. Ad aliud vero libro secundo, de partibus animalium capitulo primo addatis aliud, quia inquit Aristoteles, quod constant ex multiplici ac varia figura, quia etiam partes simplices figuram habent, ex quibus multiplicibus figuris ac substantiis constant compositæ, & vena non habet multiplicem figuram, sed vnam, tantum, & chorda eodem modo se habet ac reliquæ partes omnes.

Alii vero volentes soluere ut Fuchsius & Syluius, Fuchsius quidem in method. & in libro de differ. morb. Syluius vero in 6. de compos. med. dixerunt quod datur duplex compositio, vna, quæ reuera est compositio & hoc modo partes istæ simplices sunt compositæ in sua natura, quia reuera ex aliis constant; alia est compositio, quæ spectat ad sensum, & hoc modo partes istæ simplices sunt & dicuntur, quia reuera ad sensum non apparentur partium compositio, & sic per ipsos tollitur hæc difficultas, quia partes istæ compositæ sunt in sua natura, simplices vero ad sensum. Ego autem vellem vt excepta eute ostenderent mihi vnam partem similem, quia etiam ad sensum cognoscetur compositio & diducto nervo videbimus fibras, patiter tunicas in arteria, ergo falsa est ista solutio. Secundo dicunt pro tollenda contradictione inter organum & partem organicam ponendam esse distinctionem: vnde dicit Fuchsius, quod aliud sit organon, aliud pars organica, vnde cum dixit Gal. has partes esse organicas, non tamen dixit esse organicas, quia partes in simplicibus diuidantur & organicas. Sed solutio hæc nulla est, quia debebat assignare locum, in quo definiret partem organicam, sicuti locum ostendit, ubi definit organum: sed Galenus idem per organon & partem organicam intelligit ut patet c. 3. & 4. libri de differ. morb. ergo remanet adhuc difficultas in suo robore.

Vt ergo per Galeni principia tollatur difficultas & contradictio hæc, primum constituendum est illud, quod Gal. per partem similem semper intellexit illam partem, cuius

*Aut expro-
pria instru-
tia.*

omnes partes inter se & cum toto similes sint. Notandum etiam est ex libr. 8. de placit. cap. 4. quod simplex pars vocatur à Galeno similis, non quia simplex sit, nam constat ex elementis ac quatuor humoribus, & hoc nouit Galenus dubio procul. Dicit autem simplices esse duplici de causa; prima, quoniam hæ partes non continentur ex partibus secundum sensum existentibus, diuersis ac dissimilibus. Secundo appellat partes simplices, quia ex illis componuntur partes organicæ corporis humani. Hoc constituto tertium constituitur, quid sit organon & instrumentum ex Galeno: nam non omnis pars habens figuram est organica contra Fernelium alioquin doctissimum, quod ex Galeno & Aristotele comprobatur fuit, non enim consistit in multitudine essentia partis organice, sed legatis Gal. lib. 1. meth. c. 6. ubi dicit, instrumentum appello partem illam, quæ animalis perfectam edere possit actionem: nec differt organum ab organica parte, & per integram siue perfectam actionem Galenus intelligit eam totalem perfectamque actionem, quæ ab una parte sit alia non concurrente, quia humor crystallinus solus visionem non facit, sed totus oculus totam visionem efficit & per se non concurrente alia parte; hæc natura est instrumenti, quam cum obseruo non inuenio in natura eius contineri aliquam compositionem, unde etiam pars simplicissima si ederet actionem perfectam ex se non concurrente alia, esset organica. Cum ergo organum in compositione non consistat, quod probatur etiam ex Aristotele lib. 2. de anim. à princip. ubi inquit illa organa esse, quæ sunt omni ratione simplicia, unde colligitur organa quædam esse simplicia, ut sunt organa plantarum, quæ simplicissima sunt quo ad sensum tantum, ut sunt folia plantarum, quæ regunt, pariter tegumenta seminum. Ad-
datis Aristotelem lib. 2. de partib. anim. cap. 1. ubi enumerans organa inquit consistere mul-
tiplici substantia ac varia figura: & tamen dicuntur esse simplicissima & composita dici tantum ratione variz figuræ aliarum partium, cum tamen substantia una sit. Hoc ergo posito aliqui possent dicere aduertens, quod variat Aristoteles à seipso in eodem capite, ubi enumerat organa hæc, & vult organa hæc dissimilata esse & composita. Addamus auctoritatem Galeni libro primo de differt. morb. c. 3, & 4. qui videtur accipere pro eodem partem dissimilarem & organicam, ubi inquit organa dici composita & instrumentaria corpora, quæ constant ex simplicibus & similibus: Ergo sequitur quod compositio est de natura organi. Ad auctoritatem Aristotelis ego respondo cum dixi Aristotelem per dissimilitatem duo intelligere: & eam, quæ est ratione substantiæ, quomodo similes sunt, vel ratione compositionis ex simplicibus habentibus varias figuras. & sic viscera dicuntur componi ex vnica substantia ac dissimilibus figuris. & hoc modo dissimilitudines dicuntur, & hæc est Aristotelis sententia in illo capite & vera est hæc solutio.

*Partes simi-
lares pos-
sunt esse or-
ganica.*

Ad Galenum autem dico, quod hæc ratione videtur accepisse pro eodem partem organicam & compositam, & hæc ratione actionem facturam à partibus compositis tantum: ut plurimum enim actiones organicæ istæ perfectæ à compositis sunt: ideo hac ratione pro eodem videtur accepisse organum & compositum, & hoc innuit ex modo loquendi, quia inquit ad compositum necessario sequitur organum, non tamen oppositum, scilicet, quod omnis pars organica composita sit. Ex his ergo colligo organum non continere multipliciter substantiæ, neque repugnat organo esse simplex, & hoc non aliter probo, cum ad sensum pateat. Confirmatur, quia neque repugnat naturæ partium
similariū habere conditionem partium instrumentalium, quia excepto vnico omnes aliæ
conditiones, quæ sunt in compositis partibus & organis, sunt etiam in similibus: nam
etiam partes similes composiæ sunt & quantæ & figuræ sunt siue instrumentalitæ, quia
terminatæ sunt à termino proprio: & idem dico de situ ac aliis conditionibus.

*Solutio con-
tradictionis
inter organa
et simi-
lata.*

Hoc stante, dico Galenum dixisse bene, dum inquit partes illas esse organa & partes
similares, quia licet organa sint, tamen possunt habere substantiam similem atque actionem
edere perfectam. Sed dicet aliquis, probo venam non esse partem similem, quia quælibet
pars venæ non est vena, ut si capiatur frustum venæ, non est vena neque habet defini-
tionem eius: sed, domini, laboramus in æqui uoco, quia si quis imaginetur totam ceram
orbis esse in hac schola & fiat canal, tunc si accipiamus partem ceræ & dicamus, pars
quælibet ceræ est cera accipiendo ceram pro canali, non valet consequentia, at accipi-
endo pro totali ac pura essentia ceræ erit cera. Pariter si sic dicamus quælibet pars venæ
est vena accipiendo venam pro receptaculo sanguinis, non valet argumentum: at si pro
substantia ac natura venæ accipiatur, sic valebit: sed vena quandoque pro parte or-
ganica accipitur, ut scilicet continet sanguinem, talemque actionem facit, & quando-
que pro substantia pura venæ. & Galenus quando dixit venam esse frigidam & sic-
cam, loquebatur de substantia venosa; quando vero dicebat sanguinem deferre,
ad totum, intelligebat de organo. Et hoc stante dico, quod quælibet pars venæ est vena capi-
endo

Instantia.

Solutio.

*Vena do-
plex acci-
piatur.*

piendo substantiam venosam: non est autem verum capiendo venam pro organo. Sed dicit quis, ergo errat Galenus, quia videtur & quivocis & debebat cap. 3. loqui de substantia venosa: sed non erravit Galenus, quia securus est antiquos, quos maxime veneratus est: & ideo cum illi sic venam dupliciter acceperint, nec tamen nomine distinxerint, ideo etiam Galenus sic vocavit, & hoc comprobatur exemplo in definitione morbi, ubi ipsum dixit non dispositionem sed passionem ex autoritate antiquorum. viderat tamen ipse Aristotelem vocasse substantiam partium similarium sub nomine venarum, pariter ut organa eodem modo, ergo non erravit sequens antiquos.

Superest autem scrupulus alter, cur non idem fecit in omnibus aliis partibus, ut in carne, pro exemplo, quia licet caro & reliquæ partes habeant usum, non tamen habent actionem perfectam ut dicit Galenus libro decimosextimo de vl. part. unde inscripsit libros illos de usu partium, non autem de actionibus, quia non omnes agunt perfectam actionem. pariter patet, quod hæ partes compositæ sunt & simplices nec contradicit sibi Galenus in hoc, quia ex dissectione hæc contradictio dirimitur, & Galenus per simplices partes eas intelligit, quæ non constant ex dissimilibus substantiis, in quas ultimas resoluitur corpus humanum, nec ultra datur progressio, & sic istæ partes dicuntur simplices, quia cum ad has ventum fuerit in resolutione corporis humani, non amplius progredi possumus. Sed nervum dixit compositum ex fibris non tanquam ex dissimilibus substantiis, quia fibræ non differunt natura à nervo, sed tantum situ: sed quia nervus dissimilis est in fibras sicut etiam lignum distinguitur in fibras. hoc autem non tollit substantiæ similitudinem aut simplicitatem, quia libro quarto meteor. omne compositum ex elementis necessario habet meatus vel ordinatos vel inordinatos ut sunt ossa & dura pura: si ordinati sunt meatus, diuiduntur partes istis prædictæ, quomodo cumque, quare nervus etsi compositus sit ex fibris, id est, diuidi possit in fibras, non tamen ex illis constat, ut dissimilibus partibus. & hoc idem dicatis de aliis partibus.

Sed quod nervus constet ex cerebro ac duabus membranis, non facit ad contradictionem, quia etiam componuntur partes istæ ex elementis, non tamen tollitur, quin sint simplices, quia triplex est compositio, ut vidistis, & omnes hæ compositiones non sunt eiusdem generis, sed duæ primæ sunt mixtionem, reliquæ autem compositiones & non mixtionem, quia partes apparent, quare dico, quod nervus est simplex pars constans ex partibus similibus, non autem dissimilibus, compositione, quæ non mixtio sit ac vnio sed compositio: hæc mixtio est vera, quia non apparet compositio ad sensum, nec componentia discernuntur. Idem autem dicatur de compositione chordæ, quia composita est quidem per veram mixtionem ex pluribus, tamen simplex est quo ad sensum. Idem dicatur etiam de cute, quæ ex quinque constat partibus, & possunt hæ partes eius inuicem separari, & Galenus se declarat libro primo de anatom. administr. & inquit, quod quandoque cutis capiatur communiter pro totius corporis tegumento, ut est illud, quod excoriatur & dicitur corium vel pellis, & hoc modo aggregata est ex istis: sed Galenus cum dixit esse simplicem, intelligit eam pro vera parte, quæ est sub cuticula & dicitur vera cutis, & est sine fibris & simplicissima omnium partium: cum vero dixit compositam esse, locutus est de primo modo dicta. Cum autem adhuc dixerimus quid sit pars similis, quæ eius forma, quomodo differat ab aliis partibus, & quis eius sit usus, & etiam enumeratæ sint partes istæ, iam ad singulares descendamus à solidioribus ineipientes.

De Ossibus quo ad eorum naturam, materiam, nutrimentum, causam, formam, usum, definitionem atq. passionem,

CAP. III.

Inter solidas partes corporis humani, imo & cuiuscunque corporis pars solidior omnibus dicitur os ipsum, cuius natura explicanda erit cum per omnes eius causas, tum per usum, videndum postea erit, quot differentiæ ac passionem ossium. & in his capitibus omnis speculatio ossis continetur & adest. Geminam autem materiam ossis reperio apud scriptores: altera est materia generationis, secunda vero est materia, ex qua aluntur ac restituntur continue ossa, cum continue absumantur à motu, & requirebatur materia ex qua os augeretur.

De prima ergo materia videndum est, quænam sit. hanc autem explicat Aristoteles lib. 2. de gener. animal. capit. 4. prope finem, ubi dicit seminalis materię duas esse partes, tenuiorem ex qua nobiles partes constant, ut caro alique partes, quæ sensibus famulantur,

Solutio ad contradictionem inter simplex & compositum.

Quomodo nervus sit compositus.

Nervus quomodo ex cerebro & duabus membranis compositus.

Chorda quomodo composita sit. Cuius quomodo sit composita.

Materia ossis duplex.

Materia ossis: materialis & spiritualis.

Polis sententia de materia ossis.

alia vero pars est veluti excrementum huius ac crassamentum, ex qua sunt ossa, scilicet ex spermatico crassamento. Quod autem hoc sit verum, patet ex lib. 4. meteor. cap. 10. ubi dicit, ossa sequi terram, ergo os ex parte feminis terrestri sit: quam sententiam sequitur etiam Polibus in lib. de genitura, ubi dicit ossa fieri ex parte feminis dura, neque est, ut hic disputemus quid per semen intelligamus, an scilicet semen mulieris, an sanguinem: cui est quod materia illa crassa feminis generet ossa, & hoc etiam probat Galenus & Plato, tamen aliquid est addendum ex Hippocrate in libro de carne ubi dicit, feminis partem crassam & pinguiem esse materiam ossis: nam nisi hoc excrementum etiam pingue esset, non posset ex eo fieri os, quod probatur ex diuisione; nam hæc materia aut est terrestris adusta vel cum frigidityte & siccitate, vel cum humiditate acra: vel cum materia humida atque aqua, ab exulto autem nulla potest fieri generatio ex omnibus philosophis, ex terra enim & igne nihil potest fieri, neque etiam ex terreo simplici generatio fieri potest, ergo nec secundo modo, neque ex terreo cum humiditate aqua, quia nunc fit materia viscida & tenax ex qua nervi sunt & ligamenta, quæ non sunt ossa, ergo hæc materia non est apta ad generationem ossis. Ergo de necessitate est acreum humidum ac terreum, quod est pingue: Quare verum est quod materia ossis est terreum pingue, non autem materia exulta ab omnibus expoliata humiditate. Cur autem natura ex hac potius quàm ex viscida materia ossa fecerit, dico hoc factum esse, ut ossa essent leuia & mobilia, quod videmus in animalibus ossibus.

Cui natura ex materia acra & terreo fecerit ossa.

Materia nutritiva duplex.

Nutritionis autem materia duplex est, altera remota, alia proxima ex 3. de fac. nat. cap. 15. & ex lib. 6. meth. & ex 1. de partibus animal. cap. 6. & lib. 2. de gener. anim. cap. 4. quibus in locis omnes probant hanc materiam, quæ est sanguis crassior ac terrestrior: materia autem proxima proponitur à Galeno tantum non autem à philosophis neque ab Auerrohoe, & est medulla contenta in ossibus, & Aristoteles hoc non asserit, sed potius dicit medullam esse excrementum, quam nutrimentum ossium. Quod etiam confirmat Auerrohes 1. colle. 3. & hinc oritur maxima dissensio inter Medicos & Peripateticos: sed quoniam mos est philosophis probare suam sententiam, primo ipsam probant, quia medulla est excrementum, ergo non est nutrimentum, quoniam nutrimentum est simile parti, ac excrementum contrarium est: probant autem esse excrementum primo à similitudine, quia omnia excrementa habent suas cavitates, in quibus colliguntur, ut patet in vrina, fecce, felle, ergo & medulla cum cavitatem hanc habeat, est excrementum, & reliqua omnia nutrimenta sunt in substantia partium, non autem in cavitatibus distincta, ut patet in carne & reliquis partibus, ergo cavitates illæ sunt receptacula excrementi & non nutrimenti, quia nutrimentum est in substantia partis. Probant præterea hæc ratione, quia omnia animalia excrementosa & frigida, medulla copiosissima abundant ut animalia longissimi somni; ergo medulla est excrementum ossis, sicut vrina est excrementum renum, quia habet meatus ad renes manifestos, unde excrenatur: ergo à pari idem de medulla dici potest, quia inuicem ac manifestam habet cavitatem. Probant secunda ratio non esse alimentum, nam alimentum propinquo natura est, ut facile sit transitus de alimento propinquo ad partem, cum alimentum remotum aliquam habeat contrarietatem, ut patet in alimento propinquo nervi, quod est sanguis crassior factus ac picuicior: sic etiam medulla debet esse similior ossi quàm sanguis, quia est nutrimentum remotum: nam medulla est calida & humida ex lib. 2. de partibus animal. cap. 2. & 3. ergo non est similis ossi, ergo non potest esse nutrimentum. Tercio probant hoc argumento, nam hoc dato, sequeretur, quod quo magis fieret nutritio, magis de hoc reperiretur nutrimento, ac eodem tempore, quo maxime augentur ossa, non est medulla, vel si quæ adest, parua ac pauca adest. Ergo non est nutrimentum, quia tunc nutritio fieret sine nutrimento propinquo: in animalibus enim parvis copiosius requiritur nutrimentum hoc, quia tunc crescunt animalia maximeque resoluuntur, & tamen non adest medulla, ergo illa non est nutrimentum, quia tunc in pueris est in ossibus crassamentum sanguineum non autem medulla. At si quis diceret hæc est medulla imperfecta, refutentur isti, quod hoc est, quia ossa ex sanguine constant, & quia pueri sunt excrementosi, ideo medulla ista non est ita bene concocta in pueris: Ex his itaque colligere possumus medullam esse excrementum & ita concludunt Peripatetici.

An medulla sit excrementum ossis vel nutrimentum. Opus philosophorum, quod sit excrementum.

Opinio Medicorum & talis sit, unde primum itaque ego nego assumptum, quod medulla sit excrementum & ad probationem dico, quod plurima excrementa in cavitatibus continentur, non tamen in cavitatibus intimis partium: hoc enim nunquam reperietur in aliqua parte, nam vesica fellea non est in substantia hepatis, & vesica urinaria est extra renes, feces etiam sunt excrementa ventriculi, atramentum continentur in intestinis, non autem in cavitatibus ventriculi, quare non valet similitudo. Præterea cum dicunt animalia excrementosa abundare medulla, hoc non est ratio

Ego vero cum Medicis sum, partes Gal. tueri debeo, præsertim cum mea sententia talis sit, unde primum confutabo sententiam Aristotelis & solam hæc tria argumenta. Ad primum itaque ego nego assumptum, quod medulla sit excrementum & ad probationem dico, quod plurima excrementa in cavitatibus continentur, non tamen in cavitatibus intimis partium: hoc enim nunquam reperietur in aliqua parte, nam vesica fellea non est in substantia hepatis, & vesica urinaria est extra renes, feces etiam sunt excrementa ventriculi, atramentum continentur in intestinis, non autem in cavitatibus ventriculi, quare non valet similitudo. Præterea cum dicunt animalia excrementosa abundare medulla, hoc non est ratio

one excrementorum, sed quia frigidiora sunt, nec viget in eis calor robustus: at animalia calidiora medullam non habent, ut leones sunt, qui non habent medullam: Sed ego respondeo, hoc esse mendacium maximum, nam in leonibus nostris, ego sum testis, quod disse-
 10 culentum ossa leonis Florentie & inveni medullam. Nec valet consequentia quod animalia abundant excrementis, ergo medulla, nam excrementa faciunt calorem imbecilem, qui generat medullam: at cum imbecillis sit, non potest medullam in os convertere, & moueor ad hoc, ut non credam medullam esse excrementum, quoniam nullum habet meritum, quod extra mittatur, ut habent omnia reliqua excrementa. Galenus autem in
 20 fragmento commentii in Timæum text. 1. docet, quosdam dixisse semen à spinali medulla descendere, quod falsum est. Alia ratio erat peripateticorum, quod medulla hæc non continetur in substantia ossis, sed isti sunt mali anatomici, quia fere in omnibus ossibus medulla est in substantia ossis: nam in magnis ossibus adest cavitatis distincta, in qua est medulla, at in reliquis omnibus medulla est in substantia, nec cavitatis distincta est, & ad hoc agendum est coacta natura, quia sequestrauit nutrimentum ab ossibus, ne nimis auergerentur
 30 fierent magis dura ac nimis fortia. Secundum erat argumentum, quod si medulla esset nutrimentum proximum, esset magis simile ossi quam sanguis: dico autem ego hanc materiam medullæ esse terrestrem. ac requiri præuias alterationes quæ à calore necessario fiunt, & ideo in ea imprimatur in ea vestigium aliquod caloris, tamen postea euanesceat calor in generatione ossis ex medulla, & medulla illa est sanguis elaboratus: & ideo calida est dicta & humida ab Aristotele, quoniam habet multum aerem in se, tamen tercia est & facile elabitur aerem & restat terreum, quod in os conuertitur. Vltimum argumentum erat de medulla puerorum; sed dico illam esse medullam non autem sanguinem concretum: & hoc videre poteritis domi, dum comeditis carnem paruorum animalium, quoniam illa medulla est rubra non autem sanguis & copiosa est in animalibus paruis, minima vero in adultioribus: Ergo si medulla esset excrementum, in senibus adesset in maxima copia, cum calor imbecillis sit, quod tamen falsum est, atque in minima copia in animalibus iunioribus, cuius tamen oppositum videmus ad sensum, & etiam animalia in principio sui ortus sapiunt generationem eorum & sanguinem, omniaque sapiunt sanguinem: Ergo non mirum, si medulla cruenta illa sit. Me-
 40 dulla itaque non est excrementum, quia necessario tandem vel semen esset excrementum medullæ, vel ex medulla ossa corrumperebantur. Præterea in medulla habemus partes calidas & partes terreas, ex quibus fit ossium nutritio euapotato calido, & periculum faciat, exuratis medullam & superponatis caminum, videbitis maximam fuliginem atque maiorem ex libra 1. medullæ, quam ex viginti lignorum & isti atramenta-
 50 ri fuliginem nigram colligere ex istis pinguedinibus solent, quoniam in maiori copia ipsam colligunt.

Medulla etiam in principio generationis rubra est, quoniam sapit sanguinem, ex quo factus est puer: sed concessio, quod sanguis sit necessatio nutrimentum cuius loco succedit medulla, & ipsa erit nutrimentum, quæ ab his dicitur excrementum. & hucusque vidimus confutationem opinionis Aristotelis. Pro Medicis est ista ratio ex libro tertio de fac.
 60 na. capitulo 15. omnia quæ nutriuntur, nutriuntur ex simili, quo stante reperio hoc non posse dici de primis cibis, quia nulla est similitudo inter carnem & os, vnum enim calidum est, & alterum frigidum: Quare aliud genus alimenti inueniendum est, quod simile sit & proximum, ergo requiritur præparatio materię ad hoc ut similis fiat, quare respondeo quod cibus atteritur & fit chylus, ex chilo sanguis, ex sanguine caro: caro igitur fit ex proprio ac immediato alimento simillimo. Cognosce igitur in medulla duas esse partes, æream & terrestrem; ærea facile accenditur & euaporat, & relinquitur pars terreæ, alba, crassa: & hæc est ossi ipsi simillima & sanguis melancholicus talis non est:
 70 hæc ratione colligitur partem terrestrem & dealbatam esse nutrimentum proximum ossium.

Secundo video omnes partes habere proprium alimentum, caro nutritur ex sanguine, nulla est pars carnea qua puncta non fluat sanguis: idem dicimus de membranis & neruorum omnium corporum substantia; omnes enim concedunt in neruis esse mucum quendam eorum nutrimentum proximum; & hoc peripatetici. Galenus vero vult mucum istum neruis membranis obductum esse, quare neque ossa alimento propinquo sunt desituenda, præcipue cum inter sanguinē & ossa multæ necessario intercedunt mutationes
 80 & alterationes: Ergo si inter sanguinē ac neruū datur corpus mediū, multo magis inter sanguinem & os, talis autem materia nulla est alia quam medulla. Tertio habeo autoritatem diuini senis, qui dicit ex parte terrestri seminis & pingui fieri ossa in generatione: si ex

Cur natura
sequestra-
uerit nutri-
mentum ab
ossibus.

Omnia nutri-
untur ex si-
mili.

Medulla
duas habet
partes.

Omnis pars
habet nutri-
mentū pro-
prium.

Causa efficiens ossium.

tali materia constant ossa, ergo ex eadem nutriuntur, sanguis autē melancholicus talis non est, sed medulla pars est terrestris & pinguis, ergo ex eadem nutriuntur, & sic erit medulla ipsa nutrimentum proximum ossium. Ego ita que peristo in hac sententia cum Hippocrate & Galeno, quare proximum alimentum sit medulla in ossibus, & hæc de materia. Causa autem efficiens ossium proponitur à Polibo in lib. de genitura, qui dicit quod in semine est spiritus ossa substantia, quæ incalescit, & hic calor agitur format omnes partes actus ac calore utitur.

Plato etiam hanc causam efficientem in Timæo ostendens dicit Deum terram puram ac sinceram leuēq; accepisse ac perforasse, & ibi imposuisse medullam, postea succendit magnum ignem ac siccauit bis aut ter infundendo in aquam & iterum ignendo. hæc similitudo sumpta est à fabris ferrariis, ex quo colligimus materiam ossis esse terram pinguem, causam vero efficientem esse calorem ipsum, & ossa cum maxime exiccata sunt ab humido dissolui non possunt, nec à calore eliquari, de quo calore loquens Hippocrates dixit esse ætherium, immortalem & diuinum in lib. de carnibus, per quod calidi spiritum intelligimus, an vero animā intelligat, difficultas est extra propoſitū nostrum, quare ipsam relinquens dico quod causa efficiens erit spiritus ipse calidus. Aristot. vero lib. 2. de gener. animal. c. 4. appellat calorem instrumentum causam efficientem, quare non est aliud extrinsecum, sed spiritus in semine contentus calidus per se & actus ac calore celesti. Verum Galenus lib. 1. de fac. nat. c. 6. dicit causam efficientem ossium esse spiritum ac vaporem calidum aut ex se aut ex alio, ergo hæc non conueniunt, quia facultas est vis resultans ex commixtione ex lib. 1. de prælag. ex puls. c. 4. ubi vult temperiem esse substantiam partis, quare est contradictio. Sed in hoc domini concordare possumus, quia facultas consistit in temperie & substantia eius est commixtio. verum omnium actionum instrumentum immediatum est spiritus & est corpus innatum ex illo temperamento proprio ex humiditate propria illius substantiæ, quare idem est instrumentum huius facultatis, scilicet calor ac spiritus innatus bene ergo dixerunt omnes isti. Colligamus igitur causam efficientem ossium esse spiritum & facultatem resultantem ex temperie. Quo vero ad formam ossium, hæc verbis explicare nescio, uti etiam non possumus in multis aliis rebus, ut in homine, cuius forma est anima, tamen ultra progredientes nihil scimus præter reuelata nobis à Deo opt. Max. pluraque sunt corpora, quorum ignoramus formam, idem de ossibus. Sed si ab usu proprietatem aliquam accipiamus & dicamus formam, forma erit robur quoddam partium cum similitudine, neque vltimus vobis id explicare scio, & hoc ingenue fateor. Finis autem ossium & usus ab Aristotele proponitur, ut molles partes sustententur, nec collabantur. Secundus usus est tutela partium nobiliorum ac principalium ex lib. 1. de vi. part. c. 10. & lib. 2. de part. animal. c. 4. Tertius usus est ad commodum motum peragendum: nam animalia ossa non habentia, nec aliquid loco ossium, difficillime progrediuntur, ut vermes, ex lib. 1. de vi. part. c. 12. præterea Aristoteles lib. 2. de partib. anim. cap. 8. dicebat ossa esse facta propter sensum tactus, sed quomodo? quia non habent sensum, sed feruiunt sensui, quoniam caro facta est ad sensum tactus, & cum comprimi non possit, nisi ab aliquo sustentaretur, ideo adiuncta sunt ossa & inseruiunt tactui. Addatis conformationem & figuracionem omnium corporum: tota enim animalium conformatio & figuratio consistit ex ossibus, nam ablato aliquo osse, statim deuasatur figura ac conformatio, non sic autem ablata carne vel vena & aliis partibus. Ex his itaque colligatis talem esse ossis definitionem: os est particula similis corporis animalis ex pingui terreo à calore genita, duritie & robore suo omnibus partibus corporis mollibus inseruiens, vel pro tutela vel pro sensu aut conformatione aut motu. Hæc autem ossa substantia habet passiones aliquas naturales, aliquas vero aduentitias quæ aduentitiae sunt passiones destruentes illas naturales. Prima ergo proprietas naturalis est durities pinguis, quæ amissa dicitur os aridum, & exemplum est si os deradatur visu percipietis duritiem pinguem veluti seuum concretum & durum, neq; vllum aliud verius est exemplum. Secunda passio naturalis est albedo, tertia privatio sensus, nam exceptis dentibus, de quibus est difficultas, omnia alia ossa sensu priuantur. Quarto ossa habent meatus varios & varios anfractus vel latebras, neque vnum os reperietis sine horum aliquo. Quinto addatis crustam quandā cartilaginosam in partibus extremis, quibus coniunguntur. Et Aristoteles lib. 2. de part. animal. cap. 9. hoc confirmat ut etiam Galenus libr. 11. de vi. part. cap. 18. Vltima passio est, ut exceptis dentibus, omnia ossa membrana quadam periosium dicta vestiantur, exceptis tamen partibus illis, in quibus adest cartilago, quæ passiones naturales, si disturbentur, faciunt passiones non naturales, & hæc de ossibus dicta sufficiant & quoniam ossibus similes admodum sunt cartilagines, ideo de his capite sequenti erit agendum.

Forma ossium est ignota de anima multis. Certe non pro forma ossium. Finis ossium vari.

Ossis definitio.

Passiones ossium.

De cartilagine quo ad eius passiones, loca propria, materiam, causam efficientem formam & usum. CAP. V.

Post ossa succedit ratione similitudinis cartilago enumerata inter substantias similes, ut habetur in lib. 3. de histor. animal. capit. 2. & aliis in locis. Qua autem causata dicantur, non constat. Hæc autem pars ex libro 7. de vs. part. capitul. 3. & ex libro primo & 2. de temperam. est omnium partium præter os vnum siccissima & durissima: differt enim ab osse tantum ratione siccitatis & duricie ex libr. 3. de histor. animal. capite 8. & ex 33. sect. problemat. 18. ex quibus locis habemus aridissimam hanc esse omnium partem præter os ipsum. Notandum est autem quomodo Galenus dixerit hanc partem esse sicciorē omnium membrorum & eorum cute præter os. nam vngues, cornua & pennæ sunt aridiores cartilagine, ac cartilago durissima est omnium cute contentorum præter os. Cartilago corpus candidum est, durum minus quam os & gustui suae in vitulis. Cartilago autem est in infinitis corporis particulis, in omnibus articulis circa thoracem: & fere nullum est organum sine cartilagine, quoniam etiam oculus habet cartilaginem in extremitate palpebræ: de hac ergo quæramus causam & primo materiam. de hac Aristoteles libro secundode part. animal. capit. 9. dicebat esse eandem materiam, quæ est ossium, scilicet crassamentum feminis & pars excrementosa, crassa & terrestris. Differt autem cartilago ab osse tantum secundum magis & minus non quod eadem non sit substantia, sed quia cartilago illud habet admixtum, quod est in osse secretum, scilicet medullam, ideo cartilago mollior est, & talis est differentia & causa materialis ex Aristotele. quod his rationibus probari potest, quia natura necessario has partes molliores effecit, quia proprium cartilaginum est, ut sint solidæ semper: cum autem vellet hanc solidam efficere, coacta fuit medullam dispartiri per omnes ac singulas partes ipsius. Alia ratio est, quia videmus infinitas cartilagine transmutari in ossa. si corpus enim humanum respiciatis atque conspiciendo consideratis, aperte videbitis vsque ad primum annum ossa non esse ossa sed cartilagine, processuque temporis fieri ossa. Præterea in quadrupedibus omnia ossa thoracis sunt cartilagine, non autem ossa, dimitto quod plurimi habent cartilagine gutturis conuersas in ossa & isti sunt graciles, vocemque habent sonoram & crassam, quare possumus colligere, quod eadem sit substantia ac materia ossis & cartilaginis & differant tantum secundum maiorem minoremque siccitatem: at nos cum proposuerimus sequi Medicos, non possumus sentire cum Aristotele: & moueor hac ratione præcipue: nam in semine excrementoso vnum exustum terreum adest, ex quo nihil fit: secundum excrementum frigidum est ac siccum, ex quo nullum animal fit, vnde relinquebatur, quod daretur terreum aqueum & terreum aereum & pingue. Supponebam autem ex quarto hoc excremento fieri ossa rationibus dictis. Præterea omnia tenacia ex terreo aqueo & viscoso sunt, & cartilagine sunt huius generis. duplicantur enim ac non franguntur, quia ex tenaci materia consistunt. Si ergo cartilagine ex terreo pingui essent, ergo non possent duplicari sed disrumperentur: Galenus enim libro secundo de admini. anatom. dicit materiam cartilaginum esse tenuem ac viscidam, non tamen adeo viscidam ac tenuem ut materia ligamentorum, nec credo differentiam tantum consistere secundum magis & minus & secundum admixtionem pinguedinis, quia si pinguedo esset cōcreta, frangerentur facillime cartilagine ipsæ ut patet in omni pingui cōcreto, ut est sebum. Me mouet & alia ratio: nam istud contentum aut est excrementum ut dicit Aristoteles, vel ut alimentum: non ut excrementum, quoniam excrementum adeo non potest superare partem, ut mutet speciem eius, & tamen videmus ob hanc pinguedinē differre cartilaginem ab osse, ergo specifica differentia erit excrementum. Præterea hoc excrementum tandē opus esset ut excerneretur, & hoc nunquā apparet, neque continetur tantum excrementum, quoniam quæro ab Aristotele, quando dicit medullam esse excrementum, intelligarne alimenti vel materie generationis: profecto alimenti, quia hæc medulla non adest nisi post generationem: si ergo medulla est alimentum, ergo non erit in cartilagine cum generatur, ergo non reperitur in cartilaginis generatione, & sic non habebimus generationem in principio generationis, sed ossa, quod est absurdum. Neque continetur pingue hoc in carne ut nutrimentum, quoniam medulla hæc si sit nutrimentum ossis & cartilaginis, non videtur iustum, ut nutrimentum immutet os in cartilaginem, quare moueor ut dicam, cartilaginis ossisq; non eandem esse materiam sed terream, aqueam ac tenacem.

Ad rationes vero pro Aristotele allatas respondendum est, quod ad primam dicatis quod Aristoteles quandoque negligens fuit, & nisi talis fuisset, nimia fuisset hominū superbia. Si enim obseruasset animalia ac pisces cartilagineos, vidisset caviates in cartilaginib;

*Passiones
Loca cartila-
ginum.*

*Opinio Ari-
stotelis de
natura & m-
teriam. Differt
a m-
teriam os &
cartilagi-
nem.*

*Cur natura
medullam
in cartila-
ginem dis-
partit præter
ea non
sunt huius
Causa ve-
ro siccitas &
ex Arist.
Opinio Ari-
stotelis de
propria.*

*Materia
cartilagi-
nis.*

*Ad rationes
Aristotelis.*

*Aristoteles
quandocumque
sunt negligi-
genti.*

*Cartilagi-
nes habent
etiam cavi-
tates.*

*Quomodo
cartilagine
vertantur
quandocumque
in ossa.*

*Lignum pos-
tum in aqua
petrificante
quomodo
vertatur in
lapidem.*

vt in ossibus in illisq; pinguedines. & hoc clarum est. Præterea multa ossicula habent hanc medullam in substantia, vt cartilagine, nec tamen cartilagine sunt, sed ossa, non tamen habent cavitates: similiter ossa capitis talia sunt. Ad aliam rationem de ossibus ex cartilaginibus confectis solebam alias dicere, quod duplex est cartilago, altera cartilago in generatione dura existens, quæ in os mutatur, altera cartilago est, quæ semper talis est. Aristoteles autem de prima locutus est, nos autem de secunda intelligimus. At data hac responsione Aristoteles consequetur intentum, quare reliquum est, vt dicamus cartilagine differe specie ab ossibus, sed aliquæ conuertuntur in ossa, verum per concoctionem. exemplum do, si lignum in aquis petrificanti. infundatur, in lapidem mutabitur; pariter corallum lignum est & fit lapis. Præterea allago detto Rompageano prope Senam omnes iunci enascuntur iunci & fiunt lapides, & ego habeo domi de istis iuncis, quorum dimidium est lignum, reliquum vero lapis. Aristoteles autem huius rationem dicit, quia lignum putrescens amittit propriam humiditatem, & necessario forbet humiditatem lapideam ex aquis & fit lapis. Et hoc comprobatur, quia si cappares salitos in aqua maceratis, aqua fit salita, cappares vero in spidi: ita etiam fit de lignis putrificatis & de corallo aliisque similibus, quia hoc idem fit in cartilaginibus, quamvis cartilagine constent ex substantia dissimili ossibus, tamen ex concoctione sepe attrahunt alimentum ossium & tandem sensim ex alimento in ossa mutantur. probò autem hoc ex similitudine pulchra, quia Aristoteles non dicit vquam eandem esse materiam chordarum & ossium, tamen chordæ in ossa mutantur, hoc autem cognosceris in perdicibus ac coturnicibus. Iuniores enim pedum chordas neteas habent, senes autem osseas: nec tamen dicendum est, quod chordæ ex iisdem constent, ex quibus os pariter nec consequentia Aristotelis concludit, quod eadem sit materia cartilagine ac ossis, quare ego concludo cartilaginem differe specie ab osse, ex aliq; procul dubio constare materia.

*Chordæ per-
ditiæ & ca
sursum
mutantur
in ossa.*

*Immediata
materia.*

*Causa effi-
cient carti-
laginis.*

Forma.

Vfus.

*Quid carti-
lagis.*

v. Vfus.

Eadem est causa efficiens cartilaginis atq; ossis. Instrumentum proximum est spiritus ille complantatus vel calor innatus. Immediata autem materia nutrimenti proponitur in libro 3. de natur. fac. & est mucus quidam positus circa cartilaginem, quod respicietis in omnibus articulis, in quibus hoc alimentum immediatum circa cartilagine continetur, neq; positum est hoc nutrimentum in cavitare aliqua, vt hoc sit & nutrimentum & lubricamentum ad motum seruans & ex attritione ista, quæ in motu fit, perficitur atq; concoquitur, & hac ratione potius extra quam intra existit. Causa vero efficiens est facultas cartilaginifica formatrix, existens in semine, quæ vtique spiritu innato.

Forma autem non ita patet. sed dicamus esse duritiem illam tenacem similitatem, esse proprietatem circumscribentem formam & flexibilitatem illam: os autem flexibile non est, at ligamentum durum non est, quare ex hac lenta tenacitate differt cartilago ab aliis.

Vfus cartilaginis certus ac præcipuus est, vt cartilago subiret omnia munia duri corporis ac flexibilis, ad quod os aptum non est, quia durum nimis; neq; netuæ partes, quia nimis molles & ad hunc vsum omnes cartilaginum vsum redduntur, hæc itaque crit definitio. Cartilago est pars similis corporis animalis ex viscido retreo seminali a calore genita, sua lenta duritie corpori seruans: addidi autem vocem illam seminalis, vt sciretis, hæc partem esse spermaticeam, quia caro & pinguedo spermaticeæ non sunt partes. talis itaque sit cartilaginis definitio. Ad cuius vsum deueniendo dico, quod primus (vsum) ex libro 2. de part. animal. cap. 9. & Aulic. lib. 1. fen. 1. doct. 1. cap. 1. quem consuit Galenus lib. 1. de v. part. cap. 5. & 12. eiusdem ca. 16. & iterum lib. 14. cap. 2. est, quod cum ossa coniungenda sint in extremitatibus, & timendus sit strepitus maximus impediens auditum & ossium attritionem: natura ergo vt homo siue animal eodem modo incederet sine attritione ac strepitu, accepit cartilaginem, atq; ossa ea illiniuit ad hoc incommodum & maximum quidem cultandum.

Secundus vsum ex locis dictis est, quia natura volebat partes aliquas prominentes formare: ex osse ergo aut aliquo duro formandæ erant. sed non ex osse, quia facile rumpentur, ergo ex cartilagine confecit, quod indicatur ex naribus & auribus, quas possumus comprimere & non frangere, semperque apertæ manent. Addit Auicenna tertium vsum, cum natura posuisset partes molles supra ossa, cumque quandoque super illis esset decumbendum, tunc excitatus fuisset dolor, quod incommodum cultandum erat ex oppositione huius fulcimenti ac cartilaginis, quia fleuntur, vt apparet in fine costarum mendosarum, quare ne fieret in decubitu pectus, has apposuit natura cartilagine. Quartus vsum est, quia natura facere nunquam consuevit solum ab excremento ad excrementum, ideo cum vellet coniungere chordas cum ossibus, hoc fecit per medium cartilaginis, & in plurimis in-

fectio-

fectionibus ob id hæc cartilago inuenitur. Quintus vsus est, quia quandoque natura vult collocare musculos in loco vbi non debent esse ossa; ideo apposuit loco ossium cartilaginem, vt patet in musculis insertis in palpebris, quæ substantia cartilaginosa dicitur *Tapis*, cuius etiam alius vsus & est sextus annectitur, vt pili scilicet semper manent recti in supercilijs, quia infixi pili in corpore duro semper exerti manent, vt exemplo pater pali in terra dura infixi.

Septimus vsus est, vt natura haberet, vnde faceret opercula, ne quid transeat in cavitatem aperendam, qui vsus patet in faucibus, ne cibus in pulmones laberetur.

Octauus vsus est cum natura vult copulare ossa duo simul, nec tamen vult esse vnum, vt in maxilla inferiori, quæ, cum nascitur homo, diuisa est, ac in temporis processu fit vnum os, quod natura ligat cartilagineo corpore, vt facit in osse pubis, quia inter os dextrum & sinistrum posuit cartilaginem. Addatis nonum vsus, qui est vocis formatio: nulla enim pars melior est ad vocem formandam, quam cartilago, ac ad omnem vocem proferendam: si enim ossa aspera artetia formata fuisset, vox semper etiam fuisset rigida. Addatis vsus decimum, vt scilicet natura expletet articulos cavitates, quod videbitis considerando genu viuæ ex genu sceleti, in hoc enim desunt duo cartilaginee lunares vocatæ positi in viuo replentes cavitates. Et tot vsus cartilaginis in corpore humano, qui tamen reducuntur ad illum positum in definitione ipsius cartilaginis.

Affectus autem cartilaginis pauci sunt ex lib. 3. de hist. animal. cap. 8. vbi dicit Philo-
sophus, quod in quadrupedibus cartilaginee sint integre, ac in piscibus habent foramina. *Passio naturalis;*
Secunda passio naturalis est, quod sensu destituta sint cartilaginee ex lib. 12. de vsu part. cap. 3. & ex libro tertio de histor. animal. cap. 8. Tertia passio est, quod si cartilaginee vicerentur, difficillime sanantur, veritas imò est, quod difficilior sanantur quam ossa. Quarta passio additur à Galeno ex Hippocrate quod, si frangantur aut minuantur, non amplius restantur, quod etiam erat in ossibus; Hippocrates enim 2. de artic. 37. appellat fracturas viceræ cartilaginum, vt in ossibus: sed cartilago miscetur cum substantia nervosa & dicitur corpus nervi cartilaginosa ex lib. 2. de administr. anat. cap. 12. & hæc substantia est dura, non tamen vt cartilago. Et hæc de cartilagine sint satis, si per vos ipsos addideritis passiones non naturales ipsius appositæ.

De Pinguedine, eius passionibus, materia, causa efficiencie, natura, vsu, definitione & speciebus. C A P. VI.

Ræperio apud scriptores mentionem factam de axungia, adipe, pinguedine, seu atque
medulla, quæ omnia nomina pinguedinem significant vel corpus vnitum aliqua vero
istorum nomina particulares species significant; tamen omnes hæc pinguedines in vnum
conspirant, de quo agendum est à nobis in communi. Quo ad eius naturam dicimus, quod
communis reuera est & in pluribus partibus mixta reperitur: similis etiam proponitur ex
libro primo de gener. animal. capitu. 19. quoniam minima eius pars talis dicitur & est, &
semper requiritur, vt mollis sit cū natura sua consistat, quotiescunq; est in animali adhuc
viuente; ideo immutato ordine ab eius affectionibus incipiamus. Pinguedo itaque est
candidissima, & ex libr. 16. de vsu part. cap. 2. nullo sensu prædita; nullus enim verus
impressus est in pinguedinem, quoniam sentire non debuit. Tales autem sunt notæ huius
partis peculiare ex Aristotele, primo vt sit excrementum partium corporis humani,
id est, inter partes naturam excrementi sapientes; quæ tamen conditio nostris Medi-
cis non placet, nam ipsam non ponunt inter excrementa, quia dupliciter hoc intelligere
possumus, vel scilicet quod homo etiam sine pinguedine existens non mutet speciem & vi-
uat, vel qui sit substantia contraria ac corpori inimica, sed quomocunque intelliga-
mus. Aristotelis sententiam, reuera mihi non placet. Nam si intelligamus excrementum
esse primo modo pinguedinem, illud idem etiam dicendum esset de carne, quoniam
& caro decrevit augereturque, ergo penes hoc esset excrementum; sed dico partem
esse necessariam, sine qua homo non potest viuere, nec animal; potest quidem sine
multa pinguedine viuere, tamen à multa impeditur etiam, quod probò ex omento: Sunt
enim quædam instrumenta ita sibi ascribentia pinguedinem, vt sine pinguedine consi-
stere nequeant, vt est omentum: omentum enim tale est per pinguedinem. Præterea
vt probaui, cum hæc materia sit nutrimentum immediatum ossium; ergo si necessa-
ria sunt ossa, necessaria quoque est medulla; non tamen credatis Aristotelem motum
fuisse ad hoc sine rationibus: nihil enim dixit sine forti ratione: vnde mouetur ipse

*Partia non
mana.*

*Pinguedi-
nis natura
est commu-
ni.*

*Passioes
naturales.*

*An pingue-
do sit excre-
mentum.*

*Opinio Me-
dicorum est
propria.*

*Omentum
tale est per
pinguedinem.*

*Ratio
pro
de
vile.*

hac primaratione ex libro secundo, de part. animal. cap. 5 & 6. quia vidit analogiam maximam pinguedinis cum excremento, vno enim aucto alterum diminuit & e contra: Ergo pinguedo eiusdem naturæ cum illo excremento, quod est semen. Animalia enim multum pingua parum seminis habent, atque habent multum seminis, nihil fere habent pinguedinis, quod patet in castratis, ergo pinguedo est excrementum. Mouebatur præterea alia ratione, quia animalia omnia obesa sterilia sunt, ergo pinguedo pars est inutilis ac excrementosa, & hoc probatur ex sect. 5. aph. 36. vbi dicit Hippocrates mulieres obesæ esse steriles. Tertio mouebatur alia ratione quia scilicet videbat animalia pingua ex pinguedine suffocari, ut patet in pluribus auibus. Addit quarto & vltimo, quia animalia pingua ab omnibus habentur pro excrementosis, obeuntque sua munera pigre ac ignauiter.

*Responsio
ad rationes
Aristotelis.*

Et hæc sunt Aristotelis rationes, quæ tamen non demonstrant, & ideo possumus hæc argumenta vitare. Nam quamvis videatur proportio aliqua inter semen & pinguedinem etiam concessio hoc, quod ex eadem materia constet pinguedo & semen, quod tamen falsum est, quia semen constat ex materia eadem qua caro, nec tamen caro excrementum est, ut semen. Animalia vero coeuntia macrescunt propter calorem excitatum resoluente corpus, & in his non tantum deficit pinguedo, verum etiam caro & partes musculosæ, ut sæpe videmus, quare nulla est ratio & negatur consequentia concedendo quod materia pinguedinis deficit ex calore excitato resolvente. Quando vero dicit Aristoteles pingua animalia non esse apta ad prolem, hoc perpetuum non est: quia ex Aristotele animalia corrupta ex prægnatione pinguescunt, ut patet in pecudibus, ac bobus, vnde in Hæturia interficiant, bubulas prægnantes, quia tunc habent copiosum & fere infinitum sebum, & tamen non corrumpitur fetus ex pinguedine. Verum cum dicit Aristot. obesæ mulieres steriles esse, legatis aphorismum & inuenietis, quod hoc sit ratione omenti, quod auctum comprimit vterum descendendo ad vterum, vsque ut refrigeret quodammodo, quoniam nerueum est, non autem hoc fit à pinguedine: nisi enim omentum cresceret & comprimeret vterum, non fierent steriles.

*Cur obesæ
mulieres steriles
sint.*

Sed concessio etiam, quod mulieres pingues steriles sint, non tamen ex hoc inferendum est, quod pinguedo sit excrementum: Quia sterilitatis causæ sunt plures, inter quas est laxitas vteri, vnde semen in eo contineri non potest nec foueri neque formari, non tamen hoc fit, quia pinguedo sit excrementum, sed propter molliorem laxitatemque partis siue partium. Præterea concedo, quod animalia aliqua ex pinguedine suffocentur, hoc tamen non fit à pinguedine sed à sanguine etiam, ut patet in athletis, qui quandoque suffocantur, nec tamen sanguis est excrementum: Et si dicitur, sanguis abundans sit excrementum, à pari dicam pinguedinem nimis auctam ac præter naturam esse excrementum, non tamen naturalem, ut dicit Aristoteles. Deratione vero illa quod animalia torpida sunt, dico quod & aliqua pingua agilia sunt, ac illa torpida tamen erant antequam pinguescerent: nam ex ignauia ac pigritia fit pinguedo, non autem e contra.

*Materia
pinguedinis.*

Materia autem, ex qua pinguedo fiat proponitur ab autore incerto in libro de anat. viuorum, vbi dicit, quod in semine non habemus materiam pinguedinis, vnde colligitur, pinguedinem non esse spermaticam, vnde post formationem partium spermaticarum fit medulla ex libro secundo, de partib. animal. cap. 5. & 6. Materia autem pinguedinis est sanguis bene concoctus: nisi enim bene concoquatur sanguis, non fiet pinguedo ex lib. 3. de partib. animal. cap. 9. & lib. 1. de gener. animal. cap. 18. & 19. At si quis desideret materiam proximiorē, videat Galenum in lib. 16. de v. part. capite secundo, vbi dicit oleosam partem sanguinis esse materiam immediatam pinguedinis. & est hæc illa optima concoctio & Auicennas hanc vocat aquositatē vinctuosam fen. 1. lib. 1. doct. 5.

*An pinguedo
fit ex aquositate
vinctuosa.*

capite primo, ex qua fit pinguedo per optimam concoctionem: Nec dubitetis, quia cum ossa nutrantur pingui, immediate, cum terrestria sint, reuocetis in memoriam, quod ossa medullæ duæ sint partes, aerea scilicet & terra, & dominium est aeræ, vnde tota substantia aerea videtur: credo me hoc probasse, cum de metallis gerem, & potissimum agendo de argento viuo, quia ex centum partibus nonaginta nouem sunt terræ, centesima pars est aeræ, & tamen illa sola pars aeræ dat toti fluxibilitatem, quod fit à forma propria. Idem dico de pingui, in quo multa substantia gubernatur, à parte aeræ: hoc patet per dissolutionem ex fuligine: nam exurendo, si terra sit bene mixta, non facit cineres, sed fuliginem & maxima apparet fuligo ex pinguedine exusta, & hæc pars aeræ dissoluitur ab ossæ & co-coquitur, nutriturque ex parte terræ: quare non faciat vobis difficultatem aliquam, hanc substantiam esse terrestrem ac humidam, quia in omni pingui est

est maxima copia terræ, dominata tamen ab aere: & sic habetis difficultatis ipsius resolutionem.

Causa efficiens pinguedinis ab omnibus Medicis eadem statuitur: & est frigiditas partium. Cum enim pars hæc oleaginosa transmittitur ad extra venas à partibus frigidis congelatur. At difficultas nobis accidere posset, quia si hoc esset, ergo in omni parte frigida esset pinguedo, attamen in capite non est pinguedo. Præterea partes calidæ nullam habent pinguedinem; at circa cor adest pinguedo, & tamen cor est fons caloris, & adest pinguedo circa cordis basin. Dico, ut etiam alias dixi, quod idem accidit in calore humano, quod in lumine solis: Omnes enim species sine lumine communi non recipiuntur: at illud lumen non impedit nec corrumpit luminosum, quoniam potius perfecti-
um est idem dico de calore naturali, qui non corrumpit partes aliquas, sed perficit earum actiones: cum ergo calor cordis sit veluti istud lumen, sit pinguedo, quia in basi ad-
sunt partes frigide, ut ligamenta & arteriæ & venæ & ita pinguedo non generatur à calore actuali cordis, sed à frigore proprio partium illarum, qui à corde non corrumpitur sed perficitur. De cerebro verò dico, quod natura nihil pinguedinis genuit in cerebro, quia inutilis erat circa illam partem. at in reliquis partibus, in quibus necessaria est, generata sit pinguedo, non est ergo generata pinguedo in cerebro, quia frustra fuisset. Quare pinguedo generatur à frigiditate partium spermaticarum, quæ ipsa indigebant, sed ad-
datis, quod etiam requiritur siccitas condescere faciens hanc substantiam oleaginosa-
m ac humidum pingue. Dicamus itaque quod idem accidit in calore naturali, quod acci-
dit in lumine, quod est causa ut species sentiantur, nec est impedimentum sed illuminat medium, nec contrarium est visui, licet colores aliqui luminis contrarii sint, tamen ex lu-
mine non dissipantur sed perficiuntur. quoniam hoc commune est in natura ut faciat ad
perfectiorem. Idem dico de calore naturali in actu, qui habet aliquas proprias tempera-
turas existentes in partibus omnibus, at in aliquibus istarum partium sunt temperies con-
trariæ, at ex hoc calore non destruuntur, sed perficiuntur: quare calor in actu corruptivus
non est, sed perfectivus omnium actionum licet contrariarum. Quare circa cor cum adsint
partes frigide & sicce, ex illis fit ipsa pinguedo.

Atoritur difficultas de natura pinguedinis, & dubitatio est antiqua ex lib. 2. de simpl.
med. fac. cap. 26. & Curtius hoc disputabat in anatom. supra Montanum, dum loquitur
de pinguedine omenti, circa quam ponit primo autoritatem Aristotelis libro secundo de
part. animal. cap. 6. & lib. 3. de part. animal. cap. 9. & Galeni in libro de element. ubi habe-
tur, pinguedinem calidam & humidam esse. Postea Galenus libro primo de temperam.
capit. ult. & lib. 2. de temperam. cap. 3. dicit esse frigidam & humidam. Avicenna vero
sen. 1. cantic. dicit pinguedinem esse frigidam; quare maxima est difficultas. Auerroes
etiam 2. collect. capitulo secundo dicit esse frigidam & humidam: at 5. collect. 26. dicit es-
se calidam; quare varii sunt auctores varia dicentes. Sed, domini, veritas est hæc, quod
pinguedo calida est & humida, neque debet esse dubium. Respondēbat autem Curtius
& inepte ex 5. collect. 24. quando Aristoteles, Galenus & Auerroes dicebant pingue-
dinem esse calidam, eos loqui de pinguedine eliquata, quando vero frigidam dixe-
runt, de concreta verba fecisse. Unde ego deploro miseriam illorum, qui ex sugge-
ssu docent, inter quos fuit Curtius & Montanus. Dico ego hanc solutionem illo in-
dignam esse, neque credo eius fuisse; nam etiam ferrum eliquatum calidum est & hu-
midum, at concretum est frigidum & siccum; & plumbum etiam. Sed dicebat Ar-
istoteles, quod illa, quæ plurimum habent aeris, in se concretescere non possunt, nisi
acrilie in aquam mutentur, & sic possint congelascere, quia aer nunquam congelabitur,
& inde hæc solutio non potest elici, neque facit ad rem, quoniam non loquimur de liqua-
ta aut fluente sed de naturali pinguedine. Loca autem, quæ ibi citat, sunt falsa, ut est locus
de temperamentis & Avicenna dicit esse calidam non frigidam. At Auerroes est con-
trarius sibi ipsi, quare ipsum dimittamus suis interpretibus, quoniam reconciliare ipsum
nequeo, ut verum fatear. Sed dico ex Aristotele pinguedinem esse calidam & humidam;
& etiam ex Galeño libro secundo de simpl. med. fac. cap. 19. & 20. ubi hoc ex professo do-
cet: Ex loco illo etiam rationes elicere poteritis, in super etiam ex sensu patet eam calidam
& humidam esse; nam si tangamus ipsam, humectat, nec tamen fluit: præterea calida est,
quoniam est elaborata ab igne. Insuper exuperat in ea aliquod elementum calidum. Quin
etiā calida & humida est relata ad partes corporis, quoniam calefacit & humectat: Calida
est etiam quia levis albaque est ex libro 11. de simpl. med. fac. capit. de pingued. ubi dicit
quod calida sit relata ad corpus humanum & etiam humida, quoniam ipsum calefacit &
humectat.

Effectus pinguedinis dicitur.

Effectus siue usus huius pinguedinis est, vt conseruet mollitiem integram partium solidarum; humectando enim conseruat hæc pinguedo neruos, arterias & venas & reliquas partes: quare finis communis pinguedinis est humectatio. Præterea est alimentum ossium omniumq; particularum in defectu sanguinis ex inedia malæq; nutritione. Alter vsus est, vt foueat calorem naturalem & illum exhalare non permittat.

Pinguedo quid sit.

Definitio autem pinguedinis est quod sit communis ac similis pars corporis animalis ex oleosa sanguinis, non autem spermatis parte à frigido & sicco partium spermaticarum facta, vt naturalem partium similitudinem substantiam conseruet.

Species pinguedinis.

Quibus autem in locis reperiatur nunc dicam. Species sunt innumera, quare vna dicitur adeps & est pinguedo mollis à Græcis vero *πικρα*, quæ nomina nunquā Aristoteles confundit, sed bene nostri Medici confundunt. Sed notandum est ex lib. 3. de hist. animal. cap. 12. quod adeps non conrescit nec adiposa iura, ac hoc videtur falsum, quoniā adeps suillus & gallinæus conrescit; vnde ego semper opinatus sum, q. loquatur per collationem non autē simpliciter, quoniam loquitur etiā de seuo, quoniam adeps non conrescit adeo vt seū, quod facillime conrescit, difficilime vero eliquatur. Secunda species est seuum, quod difficile eliquatur facile vero conrescit facileq; frangitur. Tertia species est, siue dicta medulla est quæ semper est in ossibus. Sed notandū est, quod duplex est medulla, alia vera existēs in ossibus, alia vero spinalis, quæ est medulla æquiuoce, & est substantia ipsiusmet cerebri, à qua proueniunt nerui plurimi. & hæc de pinguedine dicta sufficiant.

Duplex medulla.

De carne, utpote de eius nominibus speciebus, definitione, generatione in vulneribus, de causa eius efficiente, temperie, facultatibus, qualitatibus, usu, sensu, differentiis atque passionibus. C A P. VII.

Caro nomen.

Vt recte de carne agere possimus, primum tollenda est vocis ambiguitas: caro enim à nostris dicta à Græcis dicitur *κρέας* siue *μῆξ*, lib. autem 10. meth. med. ca. 11. alibi quoque reperietis carnem dici substantiam contentam in visceribus, quæ dicitur etiā *σάρξ* & Erasistrato. Cum enim sanguis extra venas exit, conrescit & in hanc carnem conuertitur & est veluti succi transmissio, sed de hac non loquimur. Est alia caro, de qua loquitur Galenus sæpe, & est substantia glandulosa, quæ quandoq; alba est, quandoq; rubra de qua etiā absolute loqui nolumus, quoniā etsi simplex sit, non tamen cōmune est elementum nostri corporis, sed propria glandularum caro est, vt illa viscerum. Tertia caro est neruo rubicundior, quæ solet esse circa fibras vteri, ventriculi, intestinorum & vesicæ vrinariæ, & hæc à Galeno habetur lib. 2. de temperam. cap. 3. de qua etiā non agemus, cum non sit communissimum elementum corporis. Quarto addatis aliam carnem à Galeno propositam loc. cit. etiā est substantia contenta inter fibras membranarum, venarum atq; arteriarum: nam inter fibram & fibram cadit caro, venæ arterięque dicta, quæ crescit atque minuitur. Hac autem in re ego quidem hæsito, cum videam Galeni auctoritatem maximā, tamen sensu ignoro penitus carnē hanc, nec eam potius sensu nec etiā ratione inuenire nam in vena nulla est pars, quæ fibra non sit. Præterea in nulla caliditate consumente corpus vidi venas adeo rarefactas, vt ichores egressi sint. Si ergo in fibris mediis esset hæc caro, consumpta ipse sanguis egrederetur, q. tamen nō fit, quare hoc à diuino nostro præceptore constitutum non est, neque ab Hippocrate nec à nobis cognoscitur. Quinto addatis carnem aliam ex lib. 2. de loc. affect. cap. 2. quæ vulgo dicitur caro, & est tota pars rubida existens in musculis, de qua etiā non loquimur, quia composita est non autē simplex, nec elementum. Vitima caro est illa, de qua loquimur & est simplex ab alijsq; partibus immixta & est pars mixta cum febris neruosis musculorum. Loquimur ergo de parte illa separata ab alijs non quidem actu, sed ratione: nullibi enim ipsa sola per se reperitur: & hoc videtur ridiculum, quod velim ego agere de carne illa, quæ nullibi reperitur simplex, quæ est elementum corporis, & reuera non possem vobis eam ostendere, sciat is tamen, quod ista caro, quamuis in generatione prima semper mixta sit, tamē reperitur in corpore humano quandoq; simplex & apparere ad sensum, quando scilicet ea opus habet natura & particulæ læsæ vt restituantur, statim enim tunc natura subministrat carnem, quam nos scimus esse veram carnem, quia scimus eandem carnem esse cum carne fibrarum, & habere eundem usum, & ex eadem materia fieri atq; causa efficiente, ex quib. fit caro mixta alijs partibus, habet etiā eundem usum, figuram, calorem &c. Ergo est eiusdem speciei. His addit autoritas Galeni lib. 3. meth. med. cap. 5. vbi dicit in visceribus gigni eandem penitus carnem in substantia cum carne vulnerata: quare certo possumus carnem istā cognoscere simplicem, quæ communissimum est elementum, ac nulla est in corpore pars, quæ carne non

Caro reperitur in vena & in visceribus.

Caro simplex & simpliciter an reperitur.

indigeat. Est enim caro veluti municipium omnium partium similarium siue simplicium. verum Galenus dicit, quod non reperiatur per se ac separatum, & hoc intelligit in corpore sano existens; sed in vulneribus ac vlcibus ostendi potest. Præterea de elemento corporis agēdo cum Conciliatore possum dicere in differentia quarta, quod hæc caro reperiatur alicubi vt in præputio & gingiuis exterioribus, quare caro hæc sensibilis etiā potest diciam videamus quid sit. Autor libri definitionum medicarum dicit carnē concretum esse sanguinem, humidam & calidam mollitiem corpori exhibentem; quæ definitio carni conuenit, & etiā pinguedini; quare non est vera definitio carnis ipsius tantū, nam pinguedo etiā mollitiem facit, quare alia inuestiganda est definitio.

*Quid caro
secundum
auctōrē de
definitionum
medicina-
rum.*

Auicennas fen. i. lib. i. doct. 5. ca. i. dicit, quod caro sit locorum vacuorum impletio, quæ in corporum medio consistunt, & ipsorum fortitudo, qua sustentantur, & hæc definitio quidem est huic nostræ carni communis & carni etiā viscerum, venarum omniumq; glandium, quare neque hæc est perfecta definitio nostræ carnis, quoniam hæc nostra non semper est robur partium ipsarum, vt est caro viscerum ipsorum, cum itaque sit definitio communis his omnibus, alia est inuestiganda.

Primum igitur si Galenum legatis lib. i. de simpl. med. fac. & Aristotele lib. 3. de hist. animal. cap. 2. habebitis esse carnem in omnibus sanguineis quorum elementum est commune vniuerso corpori non assignatum alicui particulæ. quāvis enim in generatione hoc non videatur facere, quia videtur collocata circa mīsculos, tamen si casualiquæ partes detegantur, statim natura apponit refarciq; carnem loco deperditi. Præterea ex Aristotele li. 2. de part. anim. cap. i. & 2. colligetur carnem hanc esse substantiam similem, cuius definitio cuiuslibet parti totius competit, humida etiā est substantia. Apud Galenum etiā habetis hanc carnem ex sanguine crasso factam esse ac replentem corporis cavitates, ex quibus omnibus colligenda est definitio vera carnis à nulloq; data: quæ hæc est. Caro est pars mollis, similis toti corpori communis ex sanguine crassiore, cui assimilatur, facta, vt omnibus aliis particulis ad varios vsus inferuiat. In hac enim definitione habetis carnē hanc descriptam totam.

Ex Galeni.

Ex Aristotele.

Vera & propria definitio carnis.

Proposita autem vera ac perfecta carnis definitione, videamus quænam vera sit eius materia, an scilicet sanguis an aliud. Primum sciendum est, in carne duplicem esse materiam, cum duplici tempore fiat; primo quidem in generatione, scilicet in vtero ipso, quæ post ortum gignitur, augeturque vt patet sentiri. Præterea vulnerantur partes, quæ hac carne refarciuntur: quare duplex est carnis generatio; in vtero & extra vterum. Aristoteles lib. 2. de generat. animal. capitu. 4. & Auicennas fen. i. libro primo doct. 5. capitu. 1. dicunt, quod materia, ex qua caro fit in vtero est syncera materia sanguinea: addit Auicennas, quod hæc crassior sit non autem tenuior. Galenus vero libro primo de sem. capitu. 8. & 2. dicit ex duplici sanguine carnem fieri, ex sanguine crassiore venarum & ipsarum artiarum. libro quarto etiā de vs. part. cap. 15. hoc confirmat, quare materia carnis est sanguinis menstrui pars crassior cum venarum tum etiā artiarum; ex quibus vnum colligatis notandum, quod scilicet menstruum non est ita malus humor ac corruptus vt dicunt alii, qui, sed est excrementum bonum atque vtile; Caro enim ex syncero sanguine fit secundum Aristotelem; non ergo ex corrupto humore; quare sanguis menstruus non est adeo malus, mala autem symptomata sunt quandoque ratione eius retentionis, non autem malignitatis, quoniam conculcatur in venis vteri & putrescit, facitque mala illa symptomata; vnde illæ foeminae, quæ facile purgantur, non ita patiuntur, imo nihil. Sed corpora etiā cacochyma habent mala menstrua, quoniam natura abutitur euacuatione illa, euacuatque plurimos humores peccantes; & si mulier prægnans sit, natura non transmittit ad vterum excrementa, sed vt plurimum per vomitum euicit ipsa, quia singulis mensibus non purgantur, nec natura potest per eam viam expellere; Quod si fluant excrementa hæc ad vterum, foetum corrumpunt aut segregantur à foetu; non enim ex illo ipse nutriti potest.

Notandum de sanguinis menstruo.

Post generationem autem carnis materia ex Galen. lib. 3. meth. cap. 3. est bonus, purus concoctusque sanguis optime in venis atque arteriis contentus, ex qua materia locis citatis & in libro primo de sem. capitu. 11. & 13. hoc fit. Quod si caro patiatur solutionem continui, agglutinatur, quia caro secta facile generatur repleturq; cavitates, quoniam abundat in corpore materia ipsa carnis, quod non accidit in aliis partibus; non enim adest adeo copiosa materia in corpore. Falsum enim est neruum ac os non restitui quin non adest materia: nisi enim materia adestet, non fieret nutritio, nec auctio ipsa; sed non adest materia ita copiosa aliarum partium vt est ipsius carnis: requiritur enim copiosa materia. Quare duplex est materia dicta carnis, vt expositum est. De efficiente autem causa

Carnis generationem Galenus.

*Difficultas
de causa ef-
ficacis car-
nis.*

carnis difficultas est. Aristoteles enim libro secundo de gen. animal. ca. 4. inquit esse ipsam frigiditatem, & rationem reddēs dicit quia dissolvitur à caliditate: & hoc est axioma, quod id. quod eliquatur à calore, conerescit à frigore, quod etiam confirmat Hippocrates in lib. de nat. pueri, dum dicit, quod descendente sanguine ex utero fit caro ipsa sanguine congelato atq; inersata à frigore, quare cum Aristotele concludit Hippocrates, ut etiam in lib. de carnibus dicens, quod frigidum cōstituit ac contegit carnem. Addatis Galenum in lib. de semine & lib. 3. meth. med. capit. 3. & alibi velle partes spermatikas fridas & frigidas non spermatikas primo gigni & gignere etiam ipsas carnem; causa autem est facultas existens in semine. Consensit ergo cum Hippocrate, deinde vult Galenus à venis veri transmitti sanguinē ad venas scetus, à quo sanguine viscerū substantia pignatur & caro; tūc ego quæro an hoc fiat ab utero, & certe quod non, nec etiā sit hoc à facultate sanguinis, quare oportet q. fiat à partib. spermatikas genitis, quæ frigidæ sunt; ergo à frigiditate fit caro. Præterea Gal. lib. 3. meth. med. cap. 3. loquens de carne substituenda in vlcibus dicit Medicum non posse substituere medicamentis carnē, quia hoc est opus nature, atque opus est nature subiectorum corporum, quibus substituenda caro est. Ergo &c. præterea lib. 1. de sem. c. 11. dicebat quod omnes partes corporis habent vim gignendi carnem, ergo &c. At si quis negaret assumptū Aristotelis, quod erat quicquid eliquatur à calido id conerescere à frigido & cōuersio. ego possum tueri Aristotelem dupliciter. primo etiam si sit falsum assumptum, tamen vera erit conclusio, secundo possum probare carnē eliquari ab igne, quare primo concedamus falsum esse assumptū & dicamus, quod illę propositiones habent limitationem, & esse vere sententias in homogeneis aqueis & aeris, id est, quod cōerescit à frigore, liquatur à calido, & quod liquatur à calido, conerescat à frigido. amplius valent etiam in heterogeneis, dummodo valida fuerit mixtio: at in heterogeneis confusis & non bene mixtis non valet illa cōuersio, quia per congelationē à frigore sunt geminæ concretiones; altera per compressionem & est vera concretio, quoniam omnis humiditas mutat substantiam & nihil recedit & nihil diminuitur, sed ex intermixta fit tantum terminata, veluti in cera patet & terebinthina; altera vero fit concretio per expressionem, ita vt immutatur quantitas in concretionē per expressionem partium tenuiorum: prima conuersio fit in bene mixtis, secunda concretio fit in confusis & non bene mixtis.

*Rationes,
quod caro
fit à frigi-
ditate.*

*Animæ A-
ristotelis.*

*Concretio
per conge-
lationē fit
duplex.*

*Melichæ
quæ
modo fiat.*

*Caro liqua-
tur à calido
interno im-
merso.*

*Caro colla-
ta non est caro.*

*Rationes
quod calida
caro sit causa
efficientis car-
nis.*

*Carnis tam-
perit.*

Hoc stante dico quod corpora concreta per expressionem non eliquantur à calido, sed quæ concreta sunt per compressionem, veluti pinguedo, glacies & similia, cuius rei propono vobis exemplum, sanguis qui educitur ex venis & exponitur frigori, statim conerescit per expressionem. nam videbitis, quod tota aquosa substantia secernitur, tamē iste sanguis non liquatur à calido, imo magis induratur. idem apparet in oxygalachæ & melichæ Galeni, quæ fit per frigidum, cuius modus cōficiendi habetur apud Constantinū Cæsarem lib. 10. accipiebat enim ollam nouam plenam aceto acerrimo, ita vt olla imberet acetum, postea imponebat lac exponereque æri frigido & lac conerescit; idem dico de luto concreto, sicut etiam apparet in marmore Tiburtino, qui quidē conerescit à frigido, tamē non eliquatur ab igne, quare cū caro fiat à sanguine, in quo est materia heterogenea male mixta, potest cōerescere à frigido, licet nō liquetur à calido. Secundo dicamus carnē liquari à calore interno immenso, & nemo de hoc dubitat. Exemplo enim ad sunt fluxus hepatici, in quibus videbitis Epatis substantiam carnosam liquari, addamus in marasmo & hectica nonne manifeste eliquatur à calido pter naturā internot pinguedoq; à nimio labore exhalat p vaporē & dissolvitur: non ergo pateat, non est dubitandum q. caro consumitur p eliquationē vt etiam patet in exterioribus, quoniam si accipiaris carnē macerissimam & apponatis igni, procul dubio egreditur materia eliquata ex vi caloris, quæ materia nō est, nisi substantia carnea. Sed notandū est, q. caro cocta nō est caro, sed sunt fibræ, quibus alligatur aliqua caro, bene quidē remanent quædam partes, vnde rubræ factæ apparet. ergo clarū est carnē à calido eliquari. His itaq; rationibus colligitur frigiditatem esse causam efficientē carnis, at in oppositū est autoritas libri de anat. viuorum, vbi dicit autor ille, q. causa efficiens sit caliditas & siccitas: Auicennas etiam fen. 1. lib. 1. doct. 5. cap. 1. dicit, quod caro ex sanguine gignitur spisso, qui à caliditate provenit. Galenus vero in lib. art. med. ca. 9. dicebat quod inter partes, quæ principium habent, vnde à seipsis regantur, connumeratur caro; Ergo cum sit calida à calore gignitur caro, aliter non haberet principium, vnde se tueretur. Quod si demus, id est, carnē in gignere, tunc de necessitate dicendum est, quod non vna sit in specie caro genita à carne cum carne genita ab ossē, quod tamen falsissimum est, vt pateat habere eandem figuram, eundemque colorem; ergo &c. Vnde dicendum est, quod caro gignitur à caliditate. His dictis colligamus, quod conerescit à caliditate: & ita addamus, q. cum à calore naturali omnia fient in animali, quæ faciunt ad conseruationem & ad

& ad generationē, ergo &c. Ergo paradoxū videtur dicere, q. caro gignatur à frigore, præ-
 cipue cū caro gignat carnē suā temperatā, quæ quidē calida & humida est. In oppositū
 vero si obseruamus, quod os facit, quicquid facit suā temperatā & faciat carnem. Vnde
 admodum difficilis videtur hæc res, pro cuius solutione cum ergo obseruo carnīs speciem
 existentē in materia sanguinea, nā nihil aliud est, quā concretus sanguis, quæ caro habet
 caliditatem in se & humiditatem relatā ad temperatā cutim. Quando ergo debet fieri ca-
 ro à carne ex sanguine opus est ad hoc, vt sanguis patiat & paulatim alteretur à calidita-
 te & humiditate carnīs, donec sanguis conuertatur in carnē: at non potest fieri, vt sanguis
 fiat calidus ab ista carne, quoniā sanguis est calidior ipsa carne, quare cū caro sit minus ca-
 lida & humida, nō video carnem posse alterare sanguinē ad calidū & humidū, quoniā,
 vt dixi, sanguis est calidior atq; magis humidus ipsa carne: nihil n. calidius est ipso sanguine
 in corpore exceptis spiritib. Sed spiritus non componunt corpus. Præterea Galenus in lib.
 de fem. c. 8. dicit cor esse calidissimū, quia continet calidissimum sanguinē & lib. 1. de tem-
 per. inquit, quod partes exangues frigidæ sint. Præterea inquit eodē loco sanguis est hu-
 midior carne: Si ergo sanguis debet fieri caro, non potest fieri calidus & humidus à carne,
 ergo non potest fieri caro, tamē omnes restantur carnem gignere carnē sua facultate, quæ
 est sua temperies, dicebamq; quod quamuis caro relata ad temperatā partē sit calida &
 humida, tamen relata ad sanguinem esse frigidā & siccam, nam vt generetur caro, oportet
 vrā sanguine ablata sit nimia caliditas & humiditas: ergo à suo cōtrario: istud autē non po-
 test fieri nisi à frigidityte, & siccitate, ratione qua caro agit in sanguinē ipsumq; vertit in suā
 substantiam, remittendo caliditatē & humiditatē elus, & sic cō crescit paulatim sanguis &
 fit caro ab ipso frigore, vnde venio in hanc sententiam, quod frigiditas faciat carnem sal-
 tem relata ad caliditatem sanguinis, namq; omnia ea, quæ sunt minus calida remittunt ca-
 lidissimas res ratione frigiditatis: Ergo caro dum agit in sanguinem agit sua frigidityte, ita
 ossa possunt gignere carnem, quia omnia relata ad sanguinem dicuntur frigida. Sed est di-
 bitatio circa hoc: nam omne agens ad aliquid agit ex propria natura, non videtur ergo ra-
 tionale, quod ossa & reliquæ spermaticæ partes attrahant sanguinem pro generatione car-
 nis, sed proprium nutrimentū deberent attrahere ac quid simile efficere non autem car-
 nem ipsam, aut dicendū est materiam cum cognitione agere quorum vtrūq; absurdū vi-
 detur: sed dices nō posse fieri, quod cū os debeat agere propter se, si debet ab ossib. gigni ali-
 quid, opus est vt gignat ex designata materia, ac materia ossium est medulla: idem dico de
 nervo. At si attrahunt ossa pinguedinem non facient carnem sed ossa, tamē videmus con-
 trarium, quod os facit carnem: Quare notandum est quod omnes partes, dum aut tene-
 tur se aut se ipsas restituunt, primo attrahunt materiam proportionatam: at cum illa nō ad-
 sit, attrahunt partem minus remotam, quæ, cum nō n. addit, attrahunt remotissimam, sicut
 solent medicamentum attrahit primo humorem sibi familiarem, postea alterū remotiō-
 rem, tertio alimentalem humorem remotissimum, sicut etiam manifeste patet in plantis
 exsiccatīs, quia in defectu alimenti boni attrahunt salsuginē & humores malos ita quando
 formatur fœtus sit q. determinatus numerus dierū ad generationē complendam non exi-
 stente materia proportionali, malos suos attrahit. In ossib. autē ad sunt intercaedines in
 quib. non adest caro, opus est ergo, cū ossa non habent partē seminālē, vt attrahant sangui-
 nē, quia magis copiosus est. hinc est, quod ossa gignunt carnē ad sui conseruationem, ideo
 trahunt sanguinem, quia non adest materia magis sibi proportionalis, ideo valet, quod ista
 caro licet non gignatur ex materia peculiari partium frigidarum, non possit gigni ex san-
 guine, quia agunt propter sui conseruationē. Intelligatis tamē, quod frigiditas efficit carnē
 simul et siccitate, quare cū sanguis materia carnīs sit, qui frigidior sicciorq; sit, quare sequi
 turnihil agere posse in sanguinē, nisi sit illo calidus; nulla autē pars est calidior ipso, quare
 si caro in sanguinem agit, per contrarias qualitates, scilicet frigiditatē & siccitatem ager.
 Quamuis igitur caro per exuperantiam calida & humida sit respectu cutis temperatæ, a-
 git tamen in sanguinem se calidiorem ratione partium frigidarum & siccarum, quas in
 se habet & sic sanguinem concrefcere facit. Præterea os generat carnem propria frigidi-
 tate ac siccitate, quare caro à siccitate & frigidityte fit: aliqua autem caro solidior est, vt
 quæ fit ab ossē frigidiori, alia vero laxior facta à carne, quia nō est adeo frigida vt os, nec ita
 comprimit. Caro igitur & os respectu sanguinis frigidæ sunt partes: veni igitur in hanc
 sententiam, quod causa efficiens carnīs sit frigiditas, sed sunt rationes Auicennæ in oppo-
 situm quia calore ac siccitate fiat caro.

Dico autem, quod si Auicennas intellexit de calore communi in actu existente
 dico quod sumus concordēs in hoc & in siccitate, & hæc est causa communis & remo-
 ta, quæ generat omnia & illustrat omnes facultates particulares vt virtutem ossificam

An caro pos-
 sit alterare
 sanguinem
 ad calidum
 & humidum.

An caro cal-
 idior carne.

Dubitatio:
 an os possit
 facere car-
 nem.

An os pos-
 sit facere car-
 nem.

An os pos-
 sit facere car-
 nem.

Solutio ra-
 tionum in
 oppositum.

& alias. Si autem Auicennas intellexit de caliditate per exuperantiam atque propinqua, non possem ipsum defendere: ad rationem autem illam, quod à carne fiat caro & ab officiis, ergo à contrariis causis fiat idem: respondeo, quod caro & os relata ad materiam alterandam, non sunt contraria, sed similia atque frigida, & ratione frigiditatis agunt in sanguinem, licet caro & os relata ad cutem contrariam sortiantur naturam. Ad aliam autem rationem, quod sequeretur carnem non habere regimen ac principium insitum, quod est contra Galenum, quia si caro à frigido sit, non poterit carnem generare, nec se tueri: caro ergo habet principium insitum, licet fiat à frigido: & frigida ac licca est si referatur ad sanguinem, quæ infrigidat, comprimât & inspissat. Solutio ergo patet. Caro enim non differt à sanguine nisi per eliquationem & concretionem vel potius inspissationem factam à calore ipso naturali. Ad ultimam rationem, quod omnia sunt à calore naturali insito, dixi, quod multe sint causæ, aliquæ communes, aliæ singulares, calor ille in actu causa est communis, & de hoc non est dubium, quod præest omnibus facultatibus corporis, tamen hæc causa sola non concurret, sed etiam virtus carnis consistens in frigiditate & siccitate relata ad materiam. Ex his ergo colligamus, quod caro à frigore exprimente fit, non autem comprimente, secundo audiuitis quomodo caro à calore eliquetur: his ergo habitis alia inuestiganda sunt de carne. Vnde quo ad facultatem & temperaturam, cum caro sit sanguinea & mollis & calida & humida, si referatur ad cutem, quæ temperata est ex Gal. lib. 1. de element. secundum Hippocratem: caro tamen relata ad sanguinem, deficit à caliditate illa & humiditate, ac per exuperantiam calida est & humida, ut etiam dicit Galenus lib. 1. de temperam.

Carnis temperatura.

Carnis facultas non habetur à seipso.

Quid sit anima à tota substantia.

Verum vis carnis & facultas alteratrix corporis humani ex ipsis autoribus non habetur: nam præter pauca dicta à Galeno in lib. 11. de simpl. med. fac. cap. 1. nihil habeo quid dicam, antiqui enim locuti sunt de carnibus ut alimentis: & locuti sunt antiqui de carnibus, alteratis vel vitis aut alteri præparatis, vnde ex his non possumus colligere vim carnis.

Vit sunt etiam antiqui carnis agentibus à tota substantia, id est, ab insita natura quæ sub temperatura non potest explicari, quamvis ab ipsa fiat, ut cum dicimus carnem hepatis pastinacæ contra venena agere sua natura, virtus hæc ex temperatura fit, non tamen possumus aut scimus eam proprio ac manifesto nomine appellare. Videntur multi epatis lupi carne ad sistendum fluxum hepaticum, quod auxilium agit à tota substantia: non habeo igitur ab istis quid referam de facultatibus carnis: vidi tamen carnes omnium animalium præter carnem suis habere vim calefaciendi & siccandi, & habeo exemplum in acrochordonibus & verrucis, in quibus impono carnem vaccinam & eliquatur. Præterea dolor quandoque sedatur à carnibus cum calore actuali. Præterea caro canina maxime detergit, aut quia nitrosa sit vel acida: sed acida non est, ergo nitrosa. Obseruavi etiam quod si coquam gallum verusum, firius nitrosum & calidum, ita ut soluat ventrem & exobstruat: vnde in gallo habemus partes spermaticas frigidas carnosasque: calidas, in quibus calefit ius. Caro autem humana debet dici temperata, quia non alterat corpus humanum, licet sit calida & humida respectu cutis: quare talis est facultas carnis.

Grado talitatis carnis temperatur.

Vfus carnis.

Care sensum habet exquisitum quam alia partes.

De gradu nihil potest dici à me. non enim ad tantam experientiam deuenire potui: scio enim dari gradus inter animalia, licet eos non cognoscam: hoc vnum scio, quod omnium animalium carnes præter piscium calidiores sunt & sicciores præter carnes suis: circa vsum autem Aristoteles dicebat quod caro genita sit, ut sensibus inseruiat recipiendo species tangibiles in seipsam ex lib. 2. de part. animal. ca. 3. Caro enim tacta statim sensum mouet. Sciatis autem reuera alia membra non habere sensum tactus exquisitum, ut caro & habens carnem: nam tacto nervi fit quidem dolor, sed nervi non cognoscunt quid tangant, an durum sit an molle. Idem fit in chorda & cute & ideo nunquam fit vera sensatio tactus nisi ibi sit caro: & ideo natura cuti subiecit panniculum carnosum, & vna cum Aristotele confentio, quod sine carne non fiat vera tactus sensatio. Licet enim herui doleant, non tamen exquisite sentiunt. Sed tamen non est credendum in carne esse vim sensicam: nam ex lib. 1. de vl. part. quælibet pars sentiens habet vim sensitiuam à cerebro: caro tamen præcipua pars est instrumenti sentientis tactum. Aristoteles etiam lib. 2. de partib. animal. cap. 5. dicit, quod sensatio fit in corde, à quo emanat vis sensitiua ad carnem & ita dentes habent imperfectum sensum, quia carne carent. Cognoscunt enim frigiditatem tantum & caliditatem, quia habent instrumentum asserens facultatem sensitiuam, non tamen carnem.

Secundus vsus ex Auicenna est ut expleat cavitates partium earum, quæ primæ in generatione fuere & in visceribus in quibus caro parenchyma dicitur, quæ replet cavitates illas. Tertius vsus potissimus ex lib. 12. de vl. part. habetur. Caro enim genita est inter fibras musculi.

musculorum, ne ipsæ fibræ lacerentur & rumpantur: addit enim molliorem aliquam & compaginat: & ideo caro intestinis & ventriculo etiam donata est & yniuersaliter omnis pars mota motu locati (voluntario tamē) habet carnem in se, exceptis arteriis, quarum motus citra voluntatem fit.

Alium etiam vsum habet caro ob motum voluntarium, vt muscoli possint se mouere: nisi enim esset caro, musculi non possent se mouere: nam etsi nervos mixtos habeant deficiente carne facultas non vigeret nec posset facere motum: nam eadem est facultas sensus & motus, differens tamen per magis & minus. Facultas ergo missa ad cutim & membranas affert sensum non autem motum, quia caro deficit in illis. at in musculis cum sit caro valida & multus calor fouet spiritum & facultatem & ad motum excitat, quod non fit in partibus carne destitutis & priuatis. Quintus vsus est, vt sic caro pennula & inuolucrum omnium partium & ista communis vestis omnium partium, quod quidem patet in vulneribus omnibus. Differunt autem hæc carnes ex multis, aliquæ ex coloribus ipsi. Præterea ex Aristotele libro secundo de part. animal. capite sexto carnes aliquæ molles sunt, aliæ duræ, & istæ vel comparantur inter genera animalium, vt caro leonis durior est carne bouis vel in eadem specie, vt caro mulieris laxior est carne viri: vel in eodem subiecto, nam caro cordis durior est quam caro hepatis.

Differentia carnis.

Passiones carnis duplices sunt, propria autem vna est ex lib. 3. de histor. animal. capi. 16. quod caro dissoluitur vndequeque, & hæc habebat etiam pinguedo, diuiditur per longum & omni caret fibrarum ductu. Sed ibi deinde subdit, quod quando aboletur, diuiditur in fibras atque venas, quare hoc videtur cum prioribus pugnare, tamen Aristoteles id non vult vt sonant verba, sed q. cum in febribus sit carnis consumptio, apparent venæ & fibræ, quæ à neruis fiunt. Secundo caro ipsa multa vasa obruit, pauca ipsa vasa dilatat. Tercio caro ipsa facile restituitur ac regeneratur: quarto facillime agglutinatur caro ipsa & statim veluti cera agglutinatur simul iuncta, quod propriū est carnis ipsius post septimum annum. Patitur etiam alterationes varias secundum qualitates ipsas omnes: sed hæc satis sunt de carne.

Passiones.

De Neruo, eius natura, materia, artu, specie, facultatibus, vso & passionibus. C A P. VIII.

TRactaturi de nervis proponamus sententiā Galeni in lib. 1. de ossibus, neruum non vnam explicare sententiam sed multiplicem: primo enim nervus nuncupatur ille, qui voluntarius dicitur, secundo illud, in quod desinit musculus vniuersusq. Tercio omne illud, quo conglutinantur ossa, & ligamentum appellatur. Hæc autem tria genera nervosa inter se differunt ratione quadā specifica. & ideo de his agentibus primo de voluntariis nervis agemus, deinde de chordis, tertio de ligamentis. Dicitur autem voluntarius nervus, vt lib. 1. de motu musculor. cap. 1. eo quod cum nervo flectimus omnes partes & com. l. in 6. epid. rex. 2. ab Hippocrate dicitur, qui sunt illi, qui tendūt musculos, videamus modo quid. Habemus ex Aristotele lib. 3. de histor. animal. c. 1. & etiam lib. 2. de part. animal. c. 1. & Gal. li. 1. meth. med. c. 1. quod nervus sit communis & similis pars & q. sit sicca & solida & addit Gal. lib. 1. de plac. c. 1. oblongam esse partem, teretem albam atque factam vt subministret facultati sentienti. Ex his itaq. colligimus neruum esse partem exanguem, lentam ac similem communemq. omnibus animalibus ad sensum perficiendum institutam. Quo ad materiam antiquiores vario modo sunt de ipso locuti, alii enim composuerunt tanquam ex substantia visibili, alii tanquam ex qua &c. Primo de substantia visibili sententia fuit Pythagoræ vt refert Gal. lib. 1. de placit. c. 6. qui volebat esse materiam arterialem sensum & sensum diuisam atq. exiccatā, quæ opinio quam sit erronea credo vobis planum esse ex anatomicis. Alia opinio fuit Erasistrati, vt habetur lib. 3. de placit. c. 3. qui opinabatur quod membranae cerebri conuerterentur in nervos, sed cum vt testatur Galenus, penetraret eū huius sententia, non est vt ipsum confutet. Tertia opinio est Galeni lib. 8. de vs. part. c. 6. q. substantia sit alba, mollis, alia solida, alia adhuc durior: prima mollior est substantia penitus cerebri & medullæ spinalis, ideo dicit, quod à cerebro & spinali medulla suboriuntur propagines, quæ sunt substantia nervorum. Secundo cum cerebrum substantia tenui membranosâ vestiatur, ista membrana inseritur cum nervo. tertio membrana dura pariter vestit nervos, ex qua sententia si talis esset, qualis est à me dicta, sequeretur, quod mendax esset Galenus: nam si feceremus neruum, reperiremus esse similem substantiam, totā fibrosam, totam lentam & albam excepto nervo visorio qui tamen est quid mixtum. Secundo falsum esset si connumeraretur inter partes similes, quia pars mollis nō reciperet eandē definitionē & nomen nervi cum parte dura: Quare opus est, vt intelligamus, quod nervosa substan-

Nervus quæ duplex.

Ordo trienn du.

Quid sit ner uum.

Materia neruorum.

tia sit mixta ex substantia quadam; quæ in similitudine cõrrespondeat tribus illis substantiis, nam in nervo est illa substantia, quæ cõrrespondet tribus illis substantiis. At dices quod negare videar ex cõrebro non oriri neruũ, quod est contra omnes Medicos; dico quod quando auctores dicunt, oriri hanc partem ab illa, veluti si dicamus venam cautam dissipari in parvulas venas, propter hoc venam cautam non est materia tot vênularum; sed intelligendum est esse principium omnium venarum, quæ sunt eiusem penitus substantiæ. ita spinalis medulla coniungitur cum tot neruis, id est, præbet originem & principium omnibus neruorum propaginibus, quare quæ sit materia, Hippocrates responderit in lib. de carnib. & Galen. in lib. de sem. quod fiant ex parte seminis glutinosa & frigida, quæ à calore multo sit passa, non tamen exulta, nõ autem dicemus fieri ex sanguine menstruo, quamuis lib. 2. de generat. animal. cap. 4. dicat Aristoteles fieri ex parte excrementosa sanguinis, quia opus esset, vt requireretur aliquod refrigerans tanquam causa efficiens, sed Galenus dicit lib. 1. de sem. quod pars lenta & viscida seminis sit materia neruorum. Si quis vero dicat, quod lib. 1. de facinat. c. 3. dicat Galenus, quod os, venæ, arteriæ & nervi fiant ex sanguine reuera, respondeo tripliciter, primo, quod loquatur ad hominem quãdo dicit fieri ex sanguine, id est, de mente Erasistrati. Secundo respondeo ex ipso Galeno 1. com. de nat. hum. vbi dicit Hippocrates solum sanguinem esse hominem, Galenus dicit reuera id esse verum, quia quamuis plurimæ partes sint ex semine, tamen quia videmus opus esse, vt tot partes similes gignantur ex semine, quod in parva est copia, ideo dicendum est crescere sicut semina in terrâ, quæ statim incipiunt ali, ita semen in vtero accipit augmentum à sanguine, ex quò postea semine aucto generantur partes omnes similes; quare primariâ materiam neruorum esse semen dico. Tertio dico, quod Galenus dixerit fieri hominem ex sanguine, quia semen fit ex sanguine: verum multo magis placet prima responsio, quia reuera loquitur ad hominem, quia volebat disputare contra Erasistratum, quod causa efficiens partium esset interna: vt autem hoc probaret, assumit exemplum siue pro exemplo neruũ fieri ex sanguine, ne noua suborta fuisset quæstio, atque vt ex dogmate eorum propostum probaret. Remota ergo materia est sanguis, proxima verò & immediata est pars seminis crassior & frigidiore. Aliam cognoscimus materiam neruorum, dum cresunt, quæ est quidam humor lentus, vt Galenus lib. 2. de fac. nat. dicit, quid quidem continetur in substantia ipsa neruosa & est immediatũ nutrimentum neruorum: & quamuis Aristoteles aperte hoc non ponat, tamen lib. 3. de histor. animal. c. 5. videtur hanc opinionem proponere tanquam receptam apud omnes.

*Substantia
de materia
neruorum.*

*Materia
continens ner-
uorum.*

*Causa effi-
ciens neruo-
rum.*

*Duplex spe-
cies neruo-
rum.*

*Facultas
neruorum.*

Vfus.

*Instrumen-
tum facul-
tatis anima-
lis.*

*Quomodo
instructum
sint facul-
tates anima-
lis per
res per se
ipsas.*

Causa autem efficiens quæritur quæ sit, in qua re non est dissensio, calorem nimirũ esse, quem Galenus dicebat esse facultatem neruificam resulantem ex temperatura illa & ægit medio calore siccante materiam illam viscidam seminis, cuius nervi tales sunt facultates. Sed aduertendum, quod duplex est species neruorum; alter enim est nervus mollior, alter durior: molles sunt frigidi & humidi per exuperantiam; duri vero sunt re frigidi & sicci comparati ad partem temperatam. Sed facultas medica quæ est? nihil dicere antiqui tamen si volumus pendere diligenter, certum est, quod habent vim siccantem: de refrigeratione autem dubium est, quia multa sunt animalia, quæ sunt calidiora ipso homine; nervi quidem animalium homine frigidiorum procul dubio refrigerant. sed hæc leuia sunt. Vfus autem est inagni momenti, nam ex lib. 2. de partib. animal. cap. 4. habetur, quod facti sint ad deferendum sensum ad vniuersas partes. Sed modus qualis est? Galen. lib. 1. de sympt. caus. & lib. 8. de placit. supponit, quod nervus habeat eam substantiam proportionatam tribus illis diëtiis corporibus. vult enim quod habeat poros proprios, & sint repleti spiritu quodam, qui dicitur animalis, quem tuetur substantia nervi, & ipse spiritus est immediatum instrumentum facultatis animalis, quæ excitatur in ipsis spiritibus & transmittitur immediate & in instanti vsq; ad extremas partes, sed istam transmissionem interpretemur modo Aristotelis, id est, excitatione, quia fit in instanti sicut excitatur lumen in diaphano corpore. Ex hoc colligitur hanc facultatem non esse perpetuam in nervis, sicut species non est semper in luminoso corpore; sed perpetuo continetur spiritus: nam si non contineretur, daretur medium tempus inter voluntatem & executionem. Pariter si spiritus & facultas deberent transfundi; & hinc oritur maxima quæstio, an l. simul cõ facultate transmittantur spiritus, quam ego nunc bona fronte præteribo. legatis pro ea Cardanum in romo secundo quæstionum medicinalium contradicentium. Quare nervi sunt constituti ob sensum præcipue tactus, qui sensus fit excitata facultate à cerebro ad partes, excitatur autem, quia in nervis continetur spiritus, qui sunt apti recipere talem facultatem, qui spiritus non transfunduntur, vt dixi, ne intercederet tempus, neque de nouo gignantur eadem ratione, sed continuo ibi sunt spiritus, aut perpetuo sensum ac sensum manantes à cerebro,

tebro, aut quia in ipsis gignantur perpetuo, non refert. Cavitates autem neruorum sunt *Omne car-*
 insensibiles, quia ea soliditate præditi sunt, ut poros habeant, quia nullum est corpus mix- *pus mixtum*
 tum, quod non habeat poros: nam si debet transmitti alimentum, de necessitate dantur isti *habere po-*
 meatus, non autem continentur in fistulosis meatibus apparentibus, ut Galen. lib. 15. de v. s. *ros.*
 part. cap. 1. & lib. de sem. cap. 5. dicit, quamuis postea ipse in lib. de placit. & in libr. de oculis
 & in libro de loc. affect. testetur neruos visorios esse perforatos, tamen in hoc excitata est
 summa questio inter anatomicos & Galenicos: & reuera anatome & sensus non indicat
 istas cavitates, adeest tamen dissimilitudo substantiæ. Exit enim quædam substantia lactea
 & spongiosa: vnde ego non solum credo verum esse quod dicit Galenus; sed quod insint
 10 meatus ac laxitates maiores, quam in aliis neruis, sed quod sint perforati, non dico, quia re-
 uera canales non adsunt veluti venarum & arteriarum, sed bene dicit Galenus, si per me-
 atus maiores intellexit minus latentes, quam in aliis. Ac si dices, quatione transfundun-
 tur ad oculos & non ad alias partes? credo quod visio non fiat, quia spiritus subito trans-
 fundantur ad oculos, sed quia transfunditur facultas quæ copiosa est, quia transfundun-
 tur copiosi spiritus etiam quod non fiat visio. & hoc colligere possumus, quia pupilla dila-
 tatur, quando altera cõtrahitur etiam quod sit suffusio in oculo: requiritur autem tam co-
 piofa spirituum transfusio, quia in visione plurimi disperduntur. Secundus vsus est, ut fa-
 ciant ad motum tanquam prima instrumenta, quia nos mouemus digitos; immediata ve-
 to instrumenta motus sunt chorde, & ut musculi moueantur, sunt spiritus in causa: vis au-
 tem ista est eadem facultas transmissa & recepta in ipsis spiritibus, & talis facultas commu-
 nicatur secundum Aristotelem in lib. 3. de hist. animal. cap. 5. & lib. 3. de part. animal. cap. 1.
 4. a corde, quia in corde sunt aliquot nerui, qui sunt principia istorum neruorum. In oppo-
 situm autem est tota schola medica & anatomicorum, & ego sentio deceptos omnes esse
 Aristotelicos in cognoscendo rem ipsam, quia omnes nerui à medulla spinali originem
 ducunt aut à cerebro: merito ergo inde accipiunt istam facultatem. At quomodo fiat
 motus, non ita explicatur ab autoribus; omnes enim volunt, quod musculi se ipsos mo-
 ueant & contrahant suas chorde, sed quomodo, difficillimum est scire. Ego vero sentio,
 quod per facultatem transmissam ad musculos illuminantem spiritus animales, qui sunt in
 neruis, fiat quædam agitatio spirituum, vnde agitentur quidam vapores calidi commixti
 30 cum carne musculorum, quia vaporibus agitis & concitatis de necessitate moueant sese
 tales musculi, quasi fiat in ipsis quidam æstus, itaque calore turgeat ipse musculus, vnde con-
 trahat suas chorde, vnde omnes musculi habent carnem.

Tertius vsus, ut ipsi nerui percipiant propria damna, non enim solum constituuntur
 ad recipienda obiecta excrementa, sed ut etiam percipiant intrinsecam noxam, veluti putre-
 dines & grauitates: scio autem hunc posse referri ad primum usum, tamè quia hoc nõ est ob-
 iectum extrinsecum, ideo hoc modo distinximus. *3. Vsum.*

Habent nerui suas passiones, quatum prima est illa, de qua Aristoteles lib. 3. de histo-
 animal. ca. 5. ut semper secundum longitudinem sint diuisibiles, quia omnes sunt per lon-
 gitudinem dispositi. Addit Galenus lib. 1. de mot. muscul. cap. 2. & lib. 1. de sem. capitulo quarto
 40 quod etiam in membranas & tenuissimas fibras diuidi potest, quod tamen fere idem est.
 Addatis quod hæc substantia duritiæ prædita est, inter se vero differunt secundum magis
 & minus respectu carnis & pinguedinis. Addatis quod est compactum & solidum cor-
 pus quamuis habeat meatus. Præterea addatis, quod exangues penitus sunt, vnde appel-
 labant isti cutem neruum sanguineum, quia habet capillamenta venarum plurima, tamen
 notandum est, quod circa primas vertebrae cervicis sunt aliquot capita fibrosa, quæ videtur
 carnes callosæ, tamen sunt substantiæ neruosæ, ista autem corpora quandoque ru-
 bra sunt, & hoc credo prouenire ratione alicuius commixtionis cum sanguine, quem
 sanguinem neque compressione neque alio modo exprimere possumus. Quinto quod
 sunt ductiles, quamuis sint sicci ex libro 2. de gener. animal. capitulo quarto ubi dicit esse
 50 gratia alicuius, id est, & partes ipsæ, quæ debent flecti, possint flecti sine noxa neruorum ip-
 sotum.

Sexto perpetuo habent hanc figuram, ut tetetes sint & veluti orbiculares; septimo
 quod habent exquisitissimum sensum, id est, quod exquisitissime dolent & percipiunt no-
 xam, tamen non exquisite sentiunt, quia non potestis respondere de qualitatibus sensibi-
 libus; quia non sunt vera instrumenta sensus tactus: cutis enim extrinseca exquisitius
 sentit. Vltimo si inciduntur, non coalescunt ac si comminuantur, non restituuntur
 exceptis puerulis ante septimum annum. & raro hoc fit: an vero hoc sit ve-
 rum, inferius dicemus in tractatione de li-
 gamentis.

De Ligamentis, vapore de eius nominibus, definitione, materia generationis & materia nutritionis, forma, causa efficiens, temperatura, facultate, vsu, passionibus & dubitationum solutione. CAP. IX.

Nomen.

Ligamenta sunt secundum genus netuorum, & teste Galeno lib. 13. de vs. part. cap. 5. ab Hippocrate ligamentum vocatur *αὐτῆκος*, quandoque vero ab Aristotele lib. 3. de hist. animal. cap. quinto, vocatur nervus, & à Galeo lib. 13. de vs. part. capite primo, dicitur nervus colligans. Sciendum tamen est, quod talis substantia ligamenti, quamvis per se vna sit & simplex, tamen aliquando habet admixtam cartilagineam, de qua tractatum est, vnde componitur quoddam corpus quasi mixtum, quod in lib. 2. de administr. anat. cap. 10. à Galeno non solum dicitur nervus cartilagineus, sed etiam appellatur ligamentum nervi cartilagineum, ac lib. 1. de temper. appellatur à Galeno *σύνθετος αὐτῆκος*, id est, nervosum ligamentum. Duo ergo sunt genera ligamentorum, primum verum & syncerum est ligamentum, de quo nos modo tractamus; de secundo vero, id est, de composito non agemus, sed de primo ac simplici tantum, videamus ergo, quid sit istud primum ligamentum.

An ligamentum habeat sensum.

Primo in natura ligamenti positum est, ut pars lentissima & tenax; præterea exanguis omnino est & sine sensu, & quamvis Vescalius præceptor meus & alii etiam aliquid prædicta esse sensu videantur sentire; tamen sciatis, quod reuera non habent sensum; membranule enim quædam sunt illæ nervosæ, quæ dolent; præterea sunt instituta, ut omnes corporis partes colligent, tam duras scilicet quam molles. Quare ligamentum est tenax pars, lenta similisque, experta sensus & exanguis à natura facta ad colligandas omnes partes corporis duras simul & molles, quæ duris hæere debent, & hæc est definitio ligamenti. Exanguis est ut lib. 1. de vs. part. cap. 17. Quod autem nullum habeat sensum, patet experimento: pariter nullum motum per se habet, ut à Galeno habetur lib. 1. de vs. part. cap. 17. quia ligamenta nascuntur ab ossibus & cartilaginibus atque in eadem desinunt, quæ sensu priuata sunt. Ergo &c. Secundo qui non oriuntur ligamenta ab aliquo principio sensus & motus; tertio, quia non habent transmissa instrumenta sensus ut lib. 1. de vs. part. cap. 2. habetur; ubi dicit, quod nullus nervus transmittitur ad ipsum ligamentum à cerebro vel à spinali medulla, videamus modo causas ligamentorum.

Quæ sit materia ligamenti duplex.

Materia ligamenti duplex est: materia, ex qua constat, seminalis est, eadem fere penitus, quæ est netuorum: Et primo de materia seminali sciatis, à materia nervuorum differre tantum secundum magis & minus: quicquid enim est in semine lentum & tenax, est materia ligamentorum ex lib. 1. de sem. cap. 10. ex eadem enim materia seminis terrefcit in natura sicut sanguinem & facit medullam: ex materia autem lenta & tenacissima fiunt periostia circa ossa & ligamenta; ex materia vero terresti & atida, quæ restat, fiunt ossa. Materia vero, quæ augentur & nutriuntur ligamenta, proponitur à Galeno lib. 3. de fac. nat. capite ultimo. & est mucus quidam lentus, qui semper apparet circa ligamenta ipsa. Forma autem ea est, quæ dicta est iam in definitione. Causa efficiens est calor ipse & facultas ligamentifica, eadem fere quæ netuorum, quæ resultat ex temperatura elementorum.

Temperatura.

Temperatura ligamenti est, ut frigidum & siccum sit; & frigidius & siccus est ipso nervo, minus tamen frigidum & siccum, si comparatur ad cartilagineum. Ideo Galenus lib. 1. de temper. cap. 9. & lib. 1. de vs. part. collocabat ligamenta inter nervos & cartilagineos alio vero loco inter chordas & cartilagineas ponebat, quod non refert: chorda enim fere eadem est, quod nervus, ligamentum autem id mixtum ponendum est inter ligamentum purum & cartilagineum ipsam. Facultas vero medica quamvis non proponatur ab autoribus, tamen dubium non est, quod refrigerent & siccant: & hoc verum est in omnibus animalibus, nisi dicamus, quod in animalibus calidioribus ligamenta non tantum refrigerent atque siccant: aliqua enim animalia calida sunt multum, sed ratione sanguinis & spiritus, non autem ratione ligamenti, quare hoc ligamentum ut ligamentum refrigerat & siccant.

Vsus.

Vsus autem plurimi sunt, quorum primus proponitur à Galeno, & est, ut liget simul ossa & cartilagineas, & omnia dura in corpore existentia, ut lib. 1. de vs. part. cap. 17. ac lib. 1. de sem. & de motu musculi. Etiam cartilagineas ossibus ligantur, ut patet in thorace. Præterea habent etiam usum alium ligamenta ex lib. 1. de administr. anat. ca. 2. ut scilicet sint propugnacula nervosorum partium, ut patet in ligamento existente in cavitate manus, quod format cavitate in & tueretur tendines digitorum. Tertius vsus est, ut ligamenta vestiant partes nervosas; nam ut videbitis in anatome, chordæ omnes, quæ diffunduntur per universum

sum corpus, habent tunicam extra ex ligamento ipso, atque vt plurimum ipsi muscoli habent hanc eandem tunicam ex ligamento ortam, vt Galenus lib. 1. de motu musc. cap. 1. asseruit. Quartus vsus est, vt distinguant inter musculos & musculos ne possint seipsos impedire in motibus contrariis, vt patet in brachio, in quo intercedit ligamentum inter radium & cubitum, vt distinguat musculos interiores ab exterioribus. Quintus vsus est, vt valide coniungant capita musculorum ipsi ossibus: coniuñctio enim illa valida fit ratione ligamentorum tenacissimorum ac lentissimorum. Sextus vsus est, vt subministrant fibras ipsis musculis, quia primo in musculis adest caro, secundo adfunt fibræ nervi voluntarii. Tercio fibræ ligamentorum, quæ quidem quasi reperiunt totam substantiam musculorum. Vltimus vsus est, vt natura per ligamenta refarciret & perficeret varias cavitates in ossibus vt os aliud possint in se recipere, verbigratia, in osse coxendicis adest cauitas, sed non perfecta: Ergo natura vrsita cauitas efficitur integra, expleuit multa copia ligamentosa, aliud exemplum habetis in genu, in quo sunt quædam corpora habentia naturam cartilaginis ac ligamenti, vt fieret repletio, &c.

Passiones autem sunt, vt primo ligamenta sint candidissima, quia pars est exanguis & sit ex femine solidaque est particula, nulloque canali prædita, licet aliquod ligamentum perforatum sit, tamen figura illa omni ligamento non competit, sensu etiam caret ligamentum. Causæ autem huius priuationis à me reddidit iam fuerunt omnes, quæ sunt, quia non habet instrumentum nec facultatem sentiendi. fecit autem ea natura, vt essent sine sensu: hoc autem fieri non debebat, vt possent percipere proprias noxas, cum possint pati inflammationes. Sed credo quod natura inspexit in illud, quod inspexit in formando osse. Si enim ossa sentirent, cum sint in continuo motu. Debebant enim plurimum defatigari; unde semper fuisset aliquatistis sensatio & hinc homo esset in continua lassitudine & dolore: idem dico de ligamento, ex quo motus plurimi violentissimi sunt in corpore, in quibus ligamenta laborant ac vehementer patiuntur; quæ si dolerent, nos cogeremur ab illis desistere; hæc ergo ratione facta sunt ligamenta sine sensu. Motus enim illi non corrumpunt ligamenta, sentiunt utique morbos, quia natura ligamenta vestiuit tenuissimis membranulis, quæ maximo sensu præditæ sunt, atque si ipsæ membranz diuellantur aut inflammentur, sentiunt. Præterea ductilia sunt ligamenta & hoc reuera mirum est, cum tenax sit & lentum corpus, vt possit diduci & contrahi. Addatis quod sunt diuisibilia in fibras rectas: & quamvis Gal. lib. 1. de plac. cap. 9. oppositum videatur dicere, quod ligamenta non ita facile diuidantur in fibras rectas, dicatis quod non ita facile sicut venæ, ac per fibras rectas intelligatis, id est, secundum positum articulorum. Vltima passio est quod resecta & comminuta ligamenta non restituntur ex lib. de constit. art. med. cap. 7. & lib. 3. art. med. cap. 93. & lib. 1. de fem. cap. 11. vbi addit rationem, quia deest materiam ex qua generantur ligamenta ac refarciuntur, quia diximus ligamentum generari ex semine; talis autem seminalis materia deest, ergo &c. quod tamen falsum videtur pluribus rationibus, & primum si ipsum ligamentum alicui & crescit, quia continuo aliqua pars materiz alteretur & supponatur in locum deperditæ partis, quod patet in pueris; quæro ego, an à materia proportionali? certum est, quod sic: Ergo materia ista in corpore reperitur: ergo poterit restitui ligamentum deperditum. Secundo facultas gignendi seminis adhuc in corpore perdurat, sicut patet in omnibus: si ergo quæro, à qua particula gignatur semen, non est dubium gigni à particula spermatica; testatur etiam Galenus in lib. 1. de fem. cap. 11. & 12. facultatem hanc esse in corpore, quare semen non deest ergo nec materia, ergo quæ ratione non potest restitui ligamentum resectum; ergo patet restitui ligamenta. Tercio si venæ possunt restitui; ergo & ligamenta: antecedens patet ex lib. 1. de fem. cap. 13. & lib. 14. meth. med. cap. 16. vbi dicit atque testatur Galenus se vidisse in vulneribus exulceratas venas & arterias, quas restitutas etiam vidit eiusdem penitus speciei. Ergo si venæ restituntur, cum dubium non sit venas ex femine fieri, vel proportionali si ergo semen & materia adest pro venis restituendis, cur non adesse etiam pro ligamentis? Ergo ratio diuersitatis assignanda est, quoniam ligamenta sunt maxime necessaria & ad nobiliorem usum. Quæro nos videmus, quod franguntur ossa & restituntur, restaturque Galenus restitui ex materia simillima ossi quæ dicitur topus osseus, qui cum sit fere eiusdem naturæ cum osse, quæro ex qua materia? sine dubio aut ex femine aut ex aliqua materia proportionali femini, & adest materia ista, ergo deberet quoque adesse pro restituendo ligamento, præsertim cum ligamenta oriuntur ab ossibus & desinant in os, sicutque ex materia viscida ipsius ossis: Ergo ex eadem aluntur. Præterea nisi ligamenta possent restitui & refarci, vani essent multi libri Medicorum, qui reliquerunt infinita medicamenta composita ad ligamenta comminura confutata sciencia: quare ratio & experientia indicat ligamenta refarci. His itaque rationibus potest improbari

sententia Galeni; ramen dum postea diligenter pensito eius sententiam, video esse veram, nam reuera ligamenta non restituntur, cur autem non restituantur opus est, vt diligenter consideremus, & ad hoc indagandum pensitemus modum generationis eorum; primo enim requiritur materia, secundo causa efficiens, ita tamē vt habeant duas conditiones: primo vt sint simul iuncta, id est, materia & efficiens: secunda conditio necessaria est, vt ea in vtroque adsit intensio, quæ necessaria est, aliter non fieret bona coctio & bona passio: materia autem si nimis pauca aut nimis copiosa fuerit, nihil fiet. Idem dico de causa efficiente, quæ debilis esse non debet, nec nimis fortis. Requiritur ergo materia proportionata & efficiens: & in hoc consistit solutio difficultatis Galeni ex lib. 1. de sem. capitu. 13. nam quamuis in corpore reperiatur & adsit materia seminalis, ramen non tanta est, quanta requiritur: pariter de efficiente dico, quod adest facultas gignendi semen in hoc subiecto vel illo, concedamus, sed non tanta adest, quanta requiritur, si continuatur ligamentum vt possit restitui: materia enim sufficiens non est, alicur tamen ligamentum, sed longiori spatio; nam antequam aggregetur tanta copia materiz, vt possit restitui pars deperdita, sequitur aut vt pars restituenda corumpatur, aut natura repleat ipsa carne cum cito nō possit repleri similissima materia. At si quis dicat, quod male faceret natura, quæ impedit suas actiones, & sic natura ipsa demens esset; dico quod bene agit natura, ne partes corumpantur, & dico quod replet carne, quia cognoscit tardam aliter fore restitutionem, quod tamen non est dicendum in carnis partibus, quia copiosa est materia & ideo restituntur. Si quis autem replicet, quod restituitur vena & os, dico quod restituitur vena, quia in vena adest materia & efficiens copiosa. secundo in vena parum materiz requiritur, quia sunt tenues: præterea semper turgent sanguine pituitoso, qui facillime potest commutari & conuerri in materiam proportionalem ipsi semini. Amplius copiosam habent facultatem subministratam: nam per venas hepar subministrat facultatem omnibus partibus: sed ligamenta sunt dura neque viget in ipsis tanta facultas. Nam cum Galenus referret causam istius non refarciendæ materiz, referebat causam in causam efficientem. Nam in vtero duplex facultas, videlicet facultas formans ligamenta & facultas vteri fouens primam: at extra vterum & in adultis non adest facultas ab vtero: propria autem facultas ligamentorum communis est, at in venis licet non adsit vteri facultas, altera ramen est copiosissima, ergo refarci possunt. De osse autem notandum est, quod os directum atque deperditum non amplius restituitur, neque dubitetis, adest quidem materia proportionalis in osse ad os generandum, sed facultas efficiens deest, vnde notandum est, quod si os fuerit detectum, non restituitur poro osseo sed carne, quia in hoc casu debilitata est facultas efficiens, vnde ne corumpatur natura refarcit & tegit os refrigeratum carne: quare os detectum habet vim gignendi carnem, non autem os aut callum. Os autem tectum & fractum cum facultatem debilem non habeat, potest callum generare, quoniam tunc non refrigeratur, sed conseruatur facultas & existente etiam materia restituitur pars. Er hinc est, quod si frangatur os capitis, restituitur, quia tegitur ipsa cute. Quare dico quod tota difficultas in hoc consistit, quod adsit tanta copia materiz & tanta vigeat facultas, quæ requiritur: & ex his potestis soluere omnia argumenta.

Quare ad primum dicatis, quod pars augetur, potestque restitui, si adsit materia, quanta requiritur in tam breui temporis spatio: & ita dico quod adest materia, sed non quanta requiritur & ita ad omnia alia argumenta, & si aderit, non aderit tanto breui spatio. Ad illud de medicamentis dicatis, quod si ligamenta non essent ita conuersa, vt possent consui & tegi ab ipsa cute, credo quod possent agglutinari. Sed non libenter Medici consunt ipsa ligamenta propter membranulas vestientes ligamenta dolentes: vidit tamen ego aliquando restituta ligamenta, quia contingit tunc, vt cutis esset super indurata & inde facultas debilitata non fuerit: tor sunt passionibus ligamenti. Et hæc de ligamentis.

De chorda, videlicet de eius nominibus, definitione, materia, differentiis, nutrimento, ortu, temperie, usu, sensu, passionibus & opinionibus autorum.

CAP. X.

*Tanda quot
singula.*

TEndines vel tēdones ita ab interpretibus aurorū Græcorum appellatos chordas à nostris dictos esse cōstat. Tēdones autē dicuntur à tēdo, quia his intēdim⁹ & extēdim⁹ articulos

tendulos & musculos. Sed notandum est ex Vesalio, quod tendines etiam significant quosdam musculos, qui collocantur in posteriori ceruice qui dicuntur tendones, quia sunt facti ad similitudinem tendinum. Amplius lib. 1. de art. text. 50. & 52. appellantur ab Hippoc. tendines quædam partes carnosæ efformantes cauitatem in axillis, quare per tendinem & chordam hæc tria intelligimus, ne vox hæc difficultatem faciat. Ista chorda etiam nomine nerui appellatur ex Gal. lib. 1. de vs. part. cap. 17. & lib. de ossib. dicitur etiam *chorda*, id est, enervatio, vel deneruatio, vt apud Galenum lib. 1. de vs. part. capit. 16. & libro primo de mot. muscul. capitulo primo. Dicuntur autem chordæ enervationes, quia musculus solet semper finire in eiusmodi chordas, quasi sint consumptio ipsius musculi, videamus ergo quid sit ista chorda & ex qua materia & ex quo efficiente fiat & reliqua.

Natura huius partis in his consistit, quod sit similis pars & communis, quæ ad sensum non patet aliqua substantiæ dissimilitudo, atque exanguis est & candida, & cum sit pars ipsius musculi, habet vt semper hæreat musculo; nam nunquam erit chorda sine musculo, quia non potest esse pars sine toto. Præcipue autem factæ sunt ad motum, dicamus ergo chordam similem communemque & exanguem esse partem, lentam, albam à musculis perpetuo exortam ad motum musculorum à natura institutam; & hæc est chordæ definitio. Huius autem omnes partes maxime patent, quod sit exanguis & communis & similis, patet. Quod autem oriatur à musculo, non est dubium: & quamuis hoc sit verum, quod nulla sit chorda, quæ non oriatur à musculo, tamen multi sunt musculi, qui in fine non habent chordas, vt musculi buccarum oculorumque aliqui, & musculi sunt, licet imperfecti. Adnotandum est, quod Galen. lib. 1. de vs. part. cap. 15 dicit, quod omnes musculi hoc habent commune, vt definant in chordas: at oppositum dixit lib. 1. de mot. muscul. capit. 3, pro cuius contradictionis solutione mihi videtur sic dicendum, quod vt plurimum musculi inseruntur in ossa ad articulos mouendos & tales habent chordam: ideo Galenus ad hoc in lib. 11. de vs. part. respiciens dixit omnes habere musculos hoc cõmune vt habeant chordas, musculi vero, qui non habeant chordas, pauci sunt, & non sunt instituti, vt moueant ossa, ac videntur mouere aliquod, quod primo ad motum institutum non est: animal enim progressiuum dicitur, quia mouet ossa, non genas, & ideo musculi mouentes ossa, veri videntur musculi, quare nulla est contradictio. Quod si institus, quod etiam ex illis qui mouent ossa, aliqui non habeant chordas, veluti quintus mouens femur, & in coxa sunt, qui non habent chordas: sciatis autem non esse tres aut quatuor musculos, qui non habeant chordas inter mille musculos: non tamen ob id communis sententia euellenda est, quoniam vt plurimum sic est. Quare Galenus de primis musculis ossa mouentibus intelligens verum dixit, quando autem in li. de motu musculorum dicit, non omnes musculos chordam habere, loquitur de omnibus musculis confuse.

Succedit materia, in qua non est laborandum, cum ex Gal. lib. 1. de motu muscul. ego supponam constare ex neruo & ligamento, namque hanc proponit sententiam, quod in principio musculi addit ligamentum, cuius copiosissimæ fibræ disseminantur per substantiam musculi, & in medio musculo fibræ istæ dilatantur & ibi oriatur caro: pariter quoque in musculo oriuntur partes nervosæ, & quod fibræ nerui disseminantur in infinitas fibras & deueniant ad chordas cum fibris ligamenti, vbi ita conglutinentur, vt faciæ vnum corpus simile, quod chorda dicitur, in qua chorda duo proponit Galenus, vnū quod chorda maior est crassiorque neruo, qui deuenit ad musculum, quia in chorda adsunt etiam fibræ ligamenti, vt talis sit proportio, vt vna sit pars nerui, & sex ligamenti partes, aliquando sunt decem partes ligamenti & quandoque plures & vna tantum pars nerui. Alterum proponit Galenus, quod quamuis chorda constet ex neruo & ligamento, non tamen est crassior & maior ligamento existente in capite musculi: non enim totum absumitur ligamentum in chordam, quare sequitur, quod materia chordæ sit eadem quæ erat neruorum & ligamentorum; namque non debetis credere, quod prius gignantur ligamenta & nerui, postea chorda, sed eodē instanti & eodē tempore pariterque nutritur & crescit eodem alimento cum neruo & ligamento. Sed aduertendum est quod Vesalius litem maximam habet cum Gal. de ortu chordæ, nam vult, quod chorda suboriat a ligamento tantum, vt patet lib. 1. cap. 2. & probat hoc variis argumentis contra Galenum. quorum primū hoc est: Omnis chorda nascitur à musculo, non omnis musculus habet neruum, quoniam multi sunt musculi, qui non habent neruos & definunt in chordas: Ergo non omnis chorda habebit neruum, cum oriatur à musculo: quod autem sint musculi sine neruis proponitur exemplum musculi quadrati prope carpum circa vlnam & radium.

Secundum argumentum eius est, quia si nos accipiamus chordas & elixemus vt elixemus etiā ligamenta, nulla penitus apparet differentia, ita vt eadem videatur esse substantia;

Ergo chorda purum est ligamentum: at si quæras cur eas coquo? dico quia per coctionem dissilipat compositio & sic magis indicatur materia ex qua constat ipsa compositio: cum ergo per concoctionem non appareat nisi substantia ligamenti ergo &c. Tercio addit: si accipio chordam coctam & eam comparo nervo, nulla similitudo apparet, quia in nervo est laxitas, mollitudoque leniorque, & fibræ apparent aliquæ, quia in nervo est laxitas aliaque multa, quæ in chorda non sunt. Quarto, si volumus certo videre, chordam carere nervo patet, quia falsa est illa ratio, qua possumus probare, chordam constare ex nervo, quia sentiunt, cum ligamentum non sentiat, dicit Vesalius, quod sint capita musculorum, quæ habent etiam ex Galeno substantiâ tantum ligamenti, & habent sensum exquisitum, & nullum habent nervum, quare & chordæ sentiunt absque nervo.

Opinio propria, quod chorda sit compressa ex nervis & ligamento.

Sed hæc sententia Vesalii, pace eius dixerim, tanti viri mihi non placet, quia reuera chordæ habent admixtum nervum, atque eredo chordam compositam esse ex nervo ac ligamento: nam habent sensum, & sensum etiâ habent maiorem & exactiorem, quam alia pars corporis excepta cute ac nervo, quod patet in vulneribus: Si enim comprimamus chordas, adest sensus exquisitissimus cum ergo tantus sit sensus in chorda, non potest esse tantus sensus per consensum, ut adest sensus per consensum in capitibus musculorum. Quando enim separatur cutis à subiectis partibus per abscessum maximum, tunc nervuli immediati & subiecti iam sunt corrupti & dissipati, unde cutis non habet nervos, tamen si pungatur, habet sensum, hoc autem non provenit nisi per consensum, quia colligata est aliis partibus, non tamen exquisite sentit, ut antea. Idem patet si conspiciatis in vulnere magno, in quo succreuerit multa caro, tangaris carnem hanc, sensus erit obtusus, quæro quomodo sentiat. Sentit quidem per consensum, quia levis quædam facultas communicatur, unde leviter sentit. Idem dico de capitibus musculorum: habent enim sensum obtusum, cuius signum est, quod læsa vel compressa non faciunt eas magnas convulsiones, quas facit chorda, quare in chordis non adest sensus obtusus & per consensum sed per præsentiam nervi. Addatis secundo quia video substantiam chordarum molliorem esse, quam sit substantia ligamenti apparentis in substantia musculi, quare chorda etiam cocta mollior est ligamento ipso, neque vlla humiditas apparet ad sensum nec caro, sed pars aliqua mollis admixta est scilicet nervus: si enim chorda est purum ligamentum, non est dubium, quod eodem modo deberet apparere mollis. Tercio nisi in chorda esset substantia nervi, puncta chorda non fieret convulsio, nam puncto ligamento non fit convulsio in uniuerso corpore, quia non adest consensus cum genere nervoso, & tamen chorda trahit in consensum uniuersum genus nervosum, hoc non potest fieri, nisi substantia nervosa sit in ipsis chordis ultra ligamentum. Quarto si nos videamus puncturam in musculo temporali, puncturaque sit in chorda, statim succedit convulsio opposui musculi: & omnes dicunt causam esse, quia convelluntur nervi, ac dicerem ego, si chordæ non habent nervos, quomodo ergo ad chordam concurrir nervus. Ultimo si chorda non haberet admixtum & non omnis musculus haberet nervum, dico quod non fieret motus: nam si in musculo non esset nervus, quomodo fieret motus? dicit Vesalius, quia adest caro: motus enim in musculo fit propter carnem, quia sua qualitate calida statim communicata facultate fit zestus & agitatio, unde sequitur motus, tamen immediatum instrumentum motus caro non est, & falsum est, quod omne earens carne non moueatur: nam multa mouentur in corpore, quæ non habent carnem, ut sunt arteriæ, licet non moueantur motu voluntario: nam si caro est instrumentum motus, secundum quam positionem fiet motus? non per longum, neque per transversum, sed vndequeque diuisibilis est: ergo nullo modo fieret motus: hoc autem non facit ligamentum. Ergo sequitur, ut de necessitate in omni musculo requiratur nervus: & hoc indicant nervi recurrentes, qui oriuntur à sexto pari, qui ab inferioribus partibus ascendunt & perueniunt ad ceruicem & thoracem. Inquit omnes etiam Vesalius esse istos nervos, ut possint terrahere deorsum musculi faucium ipsam gulam: Ergo ductus ipsorum morum sit per ductum nervorum, quare nervi in musculis necessarii sunt atque in chorda ipsa: Er hæc sunt rationes pro Galeno ac pro veritate ipsa.

Impositio Vesaliorum Galeni & Vesalii ascriptarum refutatio.

Relinquitur ut dissoluamus argumenta Vesalii, tamen ante quædam mouenda sunt, & primum quod Vesalius imponit Galeno, quod chorda constet ex dimidia parte nervi & ex dimidia parte ligamenti, quod probat Vesalius, quoniam Galenus dicit, & chordam contineri inter ligamentum & nervum tanquam medium, ergo constat ex utroque in æquali portione: sed hoc nunquam dixit Galenus, quod scilicet tantum sit nervi in chorda, quantum ligamenti, imo testatur paucissimam esse partem nervi & copiosissimam ligamenti & quandoque eius sex esse partes, quandoque decem, vnam vero tantum nervi: dixit quidem

quidem chordam mediam esse, quo ad temperaturam, non tamen exacte mediam: nam colores etiam medii dicuntur absque eo, quod contraria in eis sint æquis portionibus; quare Galenus id non est opinatus. Secundo imponit Vesalius, quod Galenus dicat lib. de motu musculorum, quod nervus antequam dispergatur per musculum complicatur cum fibris ligamentitamen nunquam vidi hoc in Galeno, & scio certe non reperiri in libro de motu muscul. quem citavit: eius enim dogmata non sunt contraria rationi sensuique, sed alteri tantum quandoque, at dicere nervum coniungi cum ligamento antequam dispergatur per musculos, repugnat sensui & rationi: ligamentum enim disseminatum est per musculum. Tercio imponit, quod dicat chordam esse maiorem capite musculi, quia habeat admixtam substantiam nervi, at in capite musculi est tantum ligamentum, in chorda vero est ligamentum & additur nervus, neque hoc dicit Galenus, quod ego meminim, neque legi, neque credo Galenum hoc inquam dixisse, quoniam quandoque habemus maxima capita musculorum & quandoque chordas tenuissimas, aliquando chordas crassissimas & capita musculorum tenuissima, & hoc quia non totum ligamentum diffunditur per musculum neque omnes fibræ pertingunt usque ad chordam, & hinc fit, quod chordæ plurimæ minores sint ligamenti ac capitibus musculorum, hoc tamen impositum est Galeno à Vesalio: neque est mirum, quod arguat Galenum Vesalius; quoniam hæc si dixisset Galenus, fuisset reprehendus, & reprehensio etiam in veritatem processit.

Quare ad argumenta Vesalii respondendum est, quorum primum erat, quod omnes musculi nervum non habent & proponebatur musculus quadratus in carpo: at dico exemplum fuisse falsum: nam ego testor nervum in eo musculo reperiri sicut ego vidi in anatome; videatis etiam Realdum Columbum, quia hoc idem testatur in sua anatome contra Vesalium; tamen hic musculus chordam non habet, quare etiam concessio, quod careat nervo, tamen caret chorda etiam: quare argumentum nullum est nullusque musculus est, qui careat nervo, sed opus est diligentia in reperiendis nervis parvis. Ad secundum dico, quod maxima inest similitudo inter chordam & ligamentum maioremque quam inter chordam & nervum, quoniam maxima pars est ligamenti in chorda, & minima adest pars nervi, quare magis ipsi assimilatur chorda, non tamen sequitur & nullo modo concedendum est nullum nervum commisceri.

Pariter ad 3. argumentum respondeatis paucam esse similitudinem propter mixtionem ligamenti in maxima copia & hæc componentia sensu inuestiganda non sunt in mixtis corporibus, quando bene facta est mixtio, ut est chorda ipsa optime mixta, sed in confusis sensus facit distinctionem.

Ad quartum argumentum de sensatione probabat nervos non venire ad musculos, quia musculi ipsis non indigent ad motum nec ad sensum, quia capita musculorum sentiunt & moventur sine nervis. Respondeo quod si daretur æqualis sensatio & æqualis motus capitibus musculorum & ipsis chordis, valeret argumentum, sed quia inæqualis est sensus, quoniam exquisitissimus adest sensus in chordis, in capitibus vero musculorum obtusus est: ideo non valet argumentum, quoniam in capitibus musculorum adest sensus per confusum & per propinquitatem: Ergo licet in capite non sit nervus, tamē debet esse in chorda, ut fiat sensus exquisitus. His ergo rationibus concludimus chordam constare ex nervo & ligamento & per consequens in utroque fieri ex parte seminis proportionali & nervi & ligamenti ipsis.

Succedit chordæ temperies, quæ non est dubium, quod est frigida & sicca, collata autem ipsam temperatam minus tamen frigida & sicca est, si comparetur ligamenti solidiorque est nervo & mollior ligamento, exceptis quibusdam chordis callosis factisque fere aut cartilagineis ob admixtionem alicuius portionis cartilagineæ aut factis ossibus ob nimium usum & laborem sicut apparet in auiibus senioribus quæ quidem habent chordas ossiles propter nimium usum & laborem: at iuniorum auium chordæ molles sunt, unde nos loquimur de chordis proprie dictis in propria natura ac veris.

Vfus autem chordarum præcipuus est, ut moveant, vel ossa vel cartilagineas vel alias partes motu voluntario, ut dicit Gal. lib. 1. de mot. muscul. & etiam experientia testatur. Notandum tamen est, quia inter chordam & os non est bona proportio: ideo natura servavit in extremis chordarum corpus cartilagineum ut esset veluti gluten ac medium quoddam, quo hæreret chorda ossi.

Secundus vsus ex lib. de vs. part. & lib. 1. de mot. muscul. est, quod chordæ colligant partes inferiores musculorum ipsis ossibus diligentissime.

Chordarum autem plurimæ sunt differentię à figura, situ consistentia & numero, quæ poterant à nobis per vosmetipsos diligenter inquiri.

*Contradi-
ctio in Ga-
leno de su-
sculda.*

Passiones chordarum variz sunt, & primo vt sint albæ & ita albæ vt videantur at-
gentes, & nihil pulchrius reperio in anatome quam chordas & humorem crystallinum.
Secundo habent duritiem & soliditatem, & admodum densæ sunt vt sint duriores & soli-
diores quam alia nervosa corpora excepto ligamento. Præterea in fibras rectas diuidun-
tur vt lib. 1. de vñ. part. cap. 4. Præterea vim habent contractionis & dilationis vt se contra-
hant. Præterea sensum habent non tamen exquisitissimum, si conferamus ad neruum &
cutim, respectu vero capitiū musculorū & aliarum partiū exquisitum sensum habet ex lib.
1. de mot. mufc. & alibi: Quia renotandum, quod lib. 3. de fac. alim. ca. 4. videtur di-
cere Galenus, quod sunt tendones quidam sensu expertes, quod quidem dictum destruit
prius, quod scilicet omnes chordæ habeant sensum & hoc exagitaui viros magnos eosque
decepit, quare opus est vt castigetis locum illum: nam Brassauolus deceptus est hoc
in loco: nam inquit in suo indice, quod chordæ aliquæ sint sine sensu, & citat locum
istum, tamen non est hæc mens ipsius Galeni: sed mens erat probare, quod circa partes
excarnes corporum reperitur quædam partes, quæ nervosæ dicuntur ob similitudi-
nem, & inter has partes connumerat ligamenta, quæ sunt sensus experta & quosdam
tendones ad differentiam eorum tendonum, qui non sunt in partibus excarnibus, ideo
dixit quosdam, quare illud de tendinibus non referendum ad expertia sensus eiusque
carentiam, sed intelligatis hoc modo quod corpora nervosa in partibus excarnibus re-
peruntur ita dicta ob similitudinem. Istæ autem partes nervosæ sunt ligamenta & qui-
dam tendones, non tamen dicendum est, quod chordæ aliquæ sint sine sensu, nam non
omnes chordæ sunt in partibus excarnibus, quare locum illum castigetis, disponatisque
verba hoc modo: Hæc autem sunt insensibilia ossium ligamenta & quædam in ipsis chor-
dæ: ita enim se habent verba græca, & sic tollitur contradictio.

Ultima passio chordarum est, quod comminutæ & dissolutæ non possunt restitui,
quod qua ratione fiat, superius probatum est, dum ageremus de ligamento: & hæc dicta
sufficiunt de chorda.

*De Membrana nominibus, natura, definitione, materia, causa efficiente, semperie,
usu & passione. C A P. X I.*

Nomina.

Inter partes similes connumeratur etiam membrana quæ dicitur à Græcis quod simili-
tudine assumpta à telis araneorum, quasi tela tenuissima: nostri autem latini membra-
nam nominarunt potius ab usu: Arabes barbarique panniculum vocant, & mea sententia
melius dixerunt, attamen nihil refert quomodo cunque vocemus.

Notandum est tamen, quod cum ex tali membrana fiant vestes plurimorum vaso-
rum, hinc quandoque alia fortitur nomina, aliquando enim à Gal. vocatur tunica, quan-
doque inuolucrum, interdum vero munimentum partium, quandoque operimentum
& interdum etiam meninx, nostri vero dicunt matrem cooperientē cerebrum, quare sub-
stantia hæc, de qua tractamus propria voce membrana vocatur vel panniculus, & ab usu
nunc hoc nunc illo nomine donatur, quo constituto admiror ego Galenum lib. 4. de usu
part. cap. 9. cum ab ipso proditum sit, quod ipse incusat quosdam qui volebant appella-
re membranam nisi substantiam quandam tenuem, crassam vero existentem vocabatur tu-
nicam non membranam, Galenus autem hos accusat, & nescio qua causa. Veritas enim
hæc est, quod membrana ratione suæ substantiæ & ratione suæ formationis proprie vo-
catur membrana, ratione autem usus potest tunica dici, quare merito vtriusque, usus scilicet
& formationis ipsi conuenit, vtrunque nomen veluti peritonæo ab usu conuenit no-
men tunicæ, ab essentia vero conuenit nomen membranæ, quare distinguit nomen,
ab usu assumptum & à substantia. Quare non video cur ij accusandi sint, nisi forte eos
accuset, quia nimis erant nominum obseruatores. Sed reuera multe tunicæ sunt, quæ ne-
queunt esse membranæ, vt tunicæ ventriculi atque interna vesicæ, sed omnis membra-
na potest esse tunica: sed reliqua de membrana cognoscamus: vnum præcipuum no-
tandum est. nam Galenus libro septimo, de anat. admin. capite secundo, facit mentio-
nem non solum membranæ sed corporis membranosi, ne ergo decipiamus, scitis corpus
membranofum esse distinctum: est enim vel ligamentum vel nervus expansus ad si-
militudinem membranæ: membranæ vero non sunt expansæ, vnde nos non loquimur de
corpore membranoso.

*Differentia
inter mem-
branam &
corpore mem-
branoso.*

*Membrana
natura &
definitio.*

Hæc autem membrana habet hanc naturā, vt primo sit pars similis & veluti alterum
commune corporis elementum, tenuitate, mollitie atque densitate telæ aranæ & similitudinem
factū ad custodiendas partes corporis humani. Addatis sensum exquisitū membranæ in-
esse.

esse dixi autem similem esse partem, quod patet: dixi esse alterum veluti Elementum corporis, quod colligitur ex Aristotele lib. 3. de hist. animal. cap. 2. & 17. & lib. 3. de part. animal. cap. 11. dicitur autem veluti elementum propter carnem: nam caro est primum elementum corporis, quia nulla pars reperitur sine carne: sed quia paucae sunt, quae non habeant membranas, ideo dicitur veluti alterum elementum, ut cutis habet cuticulam pariter ossa & membra. Secundum dicitur elementum, quia dum secamus partes corporis, tandem devenimus in membranas, quare dicitur alterum elementum simile, quod affirmat etiam Gal. lib. 5. de administ. anat. cap. 6. & libro 7. eiusdem cap. 2. ubi dicit non habere fibras, tanta est eius simplicitas, & enumerat succingentem membranam, peritonaeum, meninges ossiumque tunicas & tunicas musculorum & involucrium cordis & quasdam membranas in corpore, quas dicit non habere fibras, quod falsum apparet & repugnat sensui, quia in anatome & dissectione apparente fibrae, si disrumpamus texturam, tamen in libro quinto de v. part. capit. 11. dicebat quod non possit dissolui in fibras ipsa membrana, quam sententiam assumpsit ab Aristotele lib. 3. de hist. animal. capite decimo tertio, unde ego habeo contra Galenum usum primo & experientiam, quae indicat, quod omnes membranae possint dissolui in fibras: praeterea ipsum Galenum habeo in lib. 3. de fac. natural. cap. 15. ubi dicit membranas fieri ex multis fibris, quae & similes partes & simplices particulae vere sunt praeterea in lib. 1. de mot. musc. capit. 1. dicit membranas vestientes chordas consistere ex ligamento & nervo, quare videtur negare esse partem similem, unde in membrana fibre de necessitate continentur saltem in potentia si non in actu demonstrato. Quo stante nescio modum, quo dissoluam hanc contradictionem, nisi dicamus resolutionem ac dissolutionem fieri sensu visus absque separatione rei, ut per intellectum separo manum in digitos & volam & cutim &c. Quare nisi per resolutionem intelligat dissipationem visus tantum factam, ad quam similitudo apparet, nescio reuera quomodo intelligat: nam verum est, quod membranae dissoluuntur ac dissipantur in fibras. Praeterea tenues sunt membranae & densae dixi primo esse tenuem ex Gal. lib. 1. de plac. cap. 9. unde oritur difficultas cur Galenus inculcaverit eos, qui volebant appellare membranam, nisi substantiam tenuem, cum de essentia membranae sit tenuitas. Dixi etiam esse densam ex Gal. sect. 6. aphor. 51. quia ad omnes usus membranarum requiritur densitas ipsa. factae enim sunt, ut foueant calorem naturalem. Addatis quod membranae praedictae sunt sensu, quandoque enim appositae sunt ut partes sentiant: non legistis membranam viscerum additam esse, ut viscera proprias noxas apprehendant: si non legistis, videatis Galenum in lib. 16. de v. part. capi. 2. quoniam hoc ipse ibi testatur. Materia membranae ex Galeno lib. 1. de sem. cap. 10. Et in lib. de format. fetus capit. 2. colligitur. Est enim pars tenax & lenta ipsius seminis, & hanc materiam vocavit Hippocrates in libr. de carnib. materiam glutinosam, quae a calore expanditur & siccat.

Dubium ad membrana in fibras dissolvatur.

Contradictio Galeni.

Materia generatrix membranae.

Consequenter.

Materia generatrix membranae.

vsus.

Unde ab Hippocrate habemus causam efficientem, nimirum calorem siccantem & Aristot. lib. 3. de hist. an. cap. 13. hanc sententiam probat, ex qua siccitate postea colligitur nostri Medici, quod difficile agglutinantur & vestiuntur membranae propter siccitatem. Materia vero, ex qua aluntur, est idem mucus lentus ex ipso sanguine, ut dicit Gal. lib. 3. de fac. nat. cap. vlt. Temperies particulae huius proponitur a Galeno lib. 1. & 2. de temperam. quod frigida & sicca sit collata ad partem temperatam. minus tamen frigida & sicca est, quam sunt ligamenta.

Facta autem est membrana ad varios usus, quorum primus est, ut sit partium indumentum ex Gal. lib. 7. de placit. Maior enim pars membranarum ad hoc facta est, quod etiam testatur Aristoteles libro tertio de partib. animal. cap. 11. & libro tertio de hist. animal. cap. 13. quia nulla est pars quae habeat vestes a sua substantia distinctas, vti illud non fit a membrana. At dices tu, cur dixerim ego tunicam distinctam a propria substantia: hoc dico respectu intestinorum & ventriculi, tunicae enim illae constituunt substantiam illarum partium, nec diuisae sunt ab illarum substantia, nec haec tunicae dici possunt membranae. Secundus usus est ut ligent partes simul, nec tamen sunt ligamenta, quia ligamenta duras ligant partes simul & duris molles, sed membranae ligant partes molles inuicem. quod patet in visceribus ventris inferioris, quare ab usu ligamenta dicere possumus, tamen a substantia membranas dicimus. Sed notandum est cur natura non ita colligauit viscera ligamentis sed membranis istis, quia ligamenta facta sunt ad motus violentos, ideo dura fecit ipsa natura, unde etiam opus erat ut faceret natura ut essent sine sensu, hoc autem non erat agendum in visceribus, quae semper in eodem loco stare debebant: sed viscera voluit natura, ut non paterentur violentiam, ideo apposuit membranas sensu maximo praeditas, ut sentirentur laxio quolibet. Tertius usus est ut robustiora

reddant viscera ipsa. Quartus usus est, ut distinguat inter cauitates, vnter ventriculos cerebri, & inter cauitates thoracis.

Quintus usus est conseruatio caloris naturalis, ut scilicet calorem naturalem conseruent, quod patet in peritonæo. Sextus usus est ut simul colligent viscera membranz tanquam in sacco. exemplo sunt vt pleura & peritonum. Septimus est vt claudant meatus aliquos, vt meatus venæ cæuæ in ventriculo cordis dextro, ac venæ arteriole arterieque venosæ. Et tot sunt usus membranz, quibus addere potestis differentias. Differentiæ autem ipsarum sumuntur à mollitie, densitate &c. Passiones autem propositæ sunt in definitione ipsius membranz, quod scilicet sint molles, tenues & difficulter resarciuntur. Et hæc de membrana dicta sufficiant. Sequitur vt agamus de venis, circa quatum tractationem multum sunt difficultates discutiendæ & pulcherrima quidem est tractatio, ideo vos nunc attentos desidero.

*Differentia.
Passiones.*

De Venâ & primum de eius nominibus, substantia, natura, definitione, constructione, causa efficiendi & principio earum generationis cum rationibus Aristotelis & Peripateticorum CAP. XII.

Nomen.

*Vena & hystia
vna duplex.*

*Natura &
definitio
venerum.*

*Partes simi-
lares sunt
duorum or-
dinum.*

*Cur fibra
sæpius à na-
tura.*

*An caro sit
in Vena.*

Proponitur nunc pars illa, quæ vena dicitur, in qua cognoscimus primo substantiam talem, secundo eius formam ac figuram, sed nos præcipue loquimur de substantia, cuius ratione pars similis dicitur. Circa hanc autem notandum est, quod antiquissimi scriptores per venam non solum hanc intelligant, de qua loquimur, sed etiam arteriam, de quibus non loquimur, nostrum enim institutum est loqui de vena quæ tantum atque non pulsati, quæ vena dicitur ab omnibus græcis citra Galenum. Illa vero vena, quæ pulsati, dicitur arteria ab istis posterioribus, quare illa simpliciter dicitur vena, hæc autem vena pulsati. Ego autem venam simpliciter appellabo cum posterioribus Medicis omnibus. Præterea notandum, quod hæc vena duplicem habet substantiam ex Aristotele lib. 3. de hist. animal. capite quinto, ibi enim dicit Aristoteles, quod est membranosa & coriacea, neque hæc duo idem significant apud Aristotelem, quare vena habet duplicem substantiam, alteram tenuem membranam, quæ extra vestitur, de qua parte egimus in sermone superiorum: altera pars coriacea est, & est eius propria substantia, de qua nunc agemus diligenter. In hac autem videamus primo quid sit, quotque eius causæ, quare quo ad naturam dicimus vnam esse similem partem secundi ordinis triplici figura contextam, quæ canalis instar sanguinem crassorem ad nutriendum corpus continet: hæc est venæ definitio. Primo autem ex Aristotele lib. 3. de hist. animal. cap. 2. dico esse partem communem ac similem: nam hepar ex venis etiam formatur, multæque aliæ partes venam recipiunt in compositione: dixi similem, quia quælibet eius particula venosam habet substantiam nomenque ac definitionem, dixi autem secundi ordinis, quoniam dum obseruo partes has similes & communes reperio quasdam non habere actionem perfectam instrumentalem, ut est caro pinguedo, aliæque similes partes multæ, alias video partes habentes integras actiones, ut est vena, quæ est tanquam canalis deferens sanguinem ad partes omnes, pariter nervi & arteriæ facultates ac sanguinem & spiritus deferunt & sunt veluti instrumenta & habent actiones, ideo partes similes distinguo in similes primi ordinis & secundi ordinis. Partes autem primi ordinis sunt partes illæ, quæ actionem perfectam nullam habent: Secundi vero ordinis sunt vena, arteria & nervus. Hac ergo de causa dixi partem similem esse secundi ordinis: addidi venam triplici constare fibra, quæ sensum latent: tam si substantia hæc dissipetur, apparent fibræ, factæ autem sunt fibræ, vt vena haberet facultatem attrahendi, retinendi & expellendi. Rectæ enim fibræ trahunt, oblique autem retinent, at transuersæ expriment. Dubium autem non est a deesse has facultates naturales, an vero id fiat à fibræ, alias disputavi, quia in re non possum sentire eum Gal. sed alias in anatomico hoc explicabo. Dico ergo venas habere triplicem fibræ, vt possint ad omnem positionem extendi, vt multum sanguinem retineant ac possint contrahere ac lacerari aliquantulum sine disruptione tamen quod in commodum fuisset. Hæc ergo causa est cur vena triplici fibrarum genere prædita sit, tamen notandum est, quod quamvis Galenus in loc. cit. in lib. 1. de fac. natur. & lib. 10. Meth. med. aliisque locis citatis dum agerem de carne dicat, in substantia venarum carnem esse, non tamen credatis venam dissimilem esse, nam nec ratione nec sensu probare possumus huiusmodi carnem, licet Galenus id dicat: nam hæc substantia carnosa sensu non patet, nec rationibus eam inuestigare potui, quare supposito, quod vena fibrosam tantum habeat substantiam, nulla sit difficultas; neque faciat vobis difficultatem. Galenus in libro de inazq. intemper. ac in lib. de temperam. quod vena ex parte

parte membranosa constet ac fibris, id enim ex Aristotele assumptum est ac verissimum: *Prænotandum*
 nos enim tantum loquimur de parte coriacea seclusa parte membranosa. Componitur ergo vena ex fibris non apparentibus tamen ad sensum: addidi deinde, quod vena cōtineat sanguinem, veluti canalis, vt deferatur per omnes partes corporis. *Materia Venæ*
 Materia venæ ex Hippocrate in lib. de carnibus proponitur esse semen, tamē non quolibet seminis pars est materia venæ sed proportionalis, quæ ex lib. 2. de sem. cap. 3. alteratur à calore atque perforatur, vnde habemus etiam efficientem causam, quæ spiritus est & calor vltro citroque percurrens, qui perforat hoc corpus, vnde habemus calorem efficientē causam & instrumentum spiritum ipsum. Cum autem vena ex semine fiat non ex sanguine, ego quandoque
 10 miror Galenum in li. 6. de plac. c. 8. qui dixit venas habere principium ab epate, cum prius gignatur quam ipsum epas, quod sit ex sanguine ipsi subministrato, qui per venas petrat: Ergo mirum est, quomodo dicat venas oriri ab epate: non tamen consentio cum Aristotele, quod oriantur à corde: quare de principio venarum est instituenda quæstio, scilicet de parte aliqua corporis, quæ mereatur dici principium venarum.

Sed quoniam vna pars tripliciter dicitur principium alterius, primo modo in generatione, secundo in facultatis subministratione, tertio vero modo in vsu ac famulatio, primo modo dicimus radicationem principium esse plantarum, quoniā in primo gignitur, ad quam deinde aliz partes apponuntur, sed de hoc principio non disputamus, quoniā nulla est pars genita ante venas; venæ enim factæ sunt ante omnia viscera. Alterum principium
 20 est subministrans facultates, & de hoc dubium est an cor sit velepar, quod subministret vitam & nutrimentum venis. Tertium principium attinet ad vsu, & in hoc præcipue quæstio versatur, vtrum venæ scilicet cordi inseruiant velepari communicando sanguinem toti corpori. Quare quo ad principium generationis dico, epas non esse venarum
 30 ptincipium, quoniam venæ factæ sunt ante ierur, imo, ab omnibus concessum est nullum esse viscus, quod sit ante venas & possit esse generationis principium venarum, cui scilicet vt radici plantæ adnasci possint; quare hoc modo venæ non habent principium. Secundum principium est pars corporis subministrans facultatem venis, vt dubium non est venarum vitæ principium esse ipsum cor, quoniam concordant in hoc Philo-
 40 sophi ac Medici. Præterea venæ vegetant habentque facultates naturales, quibus se cōseruant, & hæc facultates ab epate procedunt, vt omnes Medici consentiunt, Aristoteles autem & Philosophi cor constituunt harum facultatum principium. de hoc ergo principio dissidium est inter ipsos. Tertium genus principii dicitur in partibus, cum nobilis pars substituitur subministrans facultatem partibus. Quærimus ergo cum venæ deferant sanguinem ac facultatem naturalem omnibus partibus, an seruiant cordi velepari? Medici proponunt epas, Aristotelici cor, de hoc ergo quæstio instituenda est atque distinctissime tractanda, non vt faciunt multi confundentes infinita argumēta ac problemata simul; in hac autem quæstione variæ fuere sententiæ non solum Aristotelis & Galeni, sed aliorū etiam. Quidam enim oculis proposuerunt pro principio harum facultatum, cum viderent hominem sine oculis semimortuū esse: autores huius sententiæ fuere Pelops præceptor Ga-
 45 leni & alii ex lib. 3. de histor. anim. c. 2. 3. & 4. vbi Aristoteles quæstionem hanc diffusè tractat: quod etiam habemus ex Gal. lib. 6. de plac. ca. 6. Aristoteles vero & Peripatetici cor posuerunt pro principio harum facultatum. Hippocrates autem & Galenus aliqui Medici hepato volunt. Alii vero videntes magnam difficultatē & sunt doctissimi viri & anatomici, inter quos anatomicos credo ego meliorem omnibus aliis fuisse Herophilum, neque vllum futurum esse tale anatomicum, qui tamen noluit tractare rem istam, quamvis falsum sit, vt aliqui asserunt, se hoc ignorasse; dicit autem ipse nolle rem hanc tractare, nec villo modo hoc nos posse perfecte assequi. Habemus ergo quatuor opiniones de ista materia enumeratas. Quare quo ad primam, non est quod multum laborem in ea confutanda, cum id optime fecerit Aristoteles lib. 3. de histor. animal. & de partib. animal. quod idō
 50 etiam fecit Galenus. Opinio autem Herophili mihi videtur timidi hominis nimis, quæ secum trahat incertam cognitionem rerum plurimarum. Quoniam autem video totam difficultatem esse inter Aristotelem & Galenum, ideo opinio Aristotelis examinanda venit. primo ergo rationes Aristotelis proponamus, quas enumerat libro tertio de hist. animal. capit. 3. & lib. 3. de partib. anim. capit. 4. vbi habetis plurima argumenta. prima autem ratio hæc est. Cor est principium caloris & sanguinis: venæ sunt instrumenta deferendi huius vtriusque. Ergo cor est principium venarum; per calorem autem intelligit facultatem, vt seipsum declarauit ipse: Facultas enim à calore resultat. Probat autem cor esse principium caloris & sanguinis multis in locis ac variis argumentis, quæ breuitatis gratia non sunt repetenda, sed hoc supponam. Hoc itaque supposito de necessitate sequitur,

quod aliqua pars in sanguineis animalibus detur nobilis, in qua resideat *fas* ultas princeps totum animal gubernans: hæc ergo pars aut erit illa, quæ primo oritur, sicut in primogenitis; quare quod prius oritur, est principium omnium partium, & hoc apparet in plantis etiam: vel pars illa erit, quæ erit magis necessaria & sine qua nec per momentum durare potest animal. Consentit igitur Galenus eum Aristotele, quod cor sit prima pars, quæ apparet inter carnosas; Ergo cor erit principium huius caloris & sanguinis: Secundo si nobilitatem consideremus, sine facultate cerebri homo potest esse & vivere: aufertur enim eius quantitas & vivit homo.

Præterea videmus hepar corruptum gignere aquam loco sanguinis: videmus contra cor nullam ferre lisionem, quin statim animal moriatur, quod tamen alia viscera patiuntur: quare commune est principium venarum ratione usus ac primogenituræ: ergo cor est principium venarum ac facultatum. Et hæc rationes satis sunt ad principatum cordis. Secunda ratio erit hæc, similitudo substantiæ debet usum indicare inter organum & illud, cuius est organum: nam organa similia principi parti illius potius instrumenta dicuntur quam dissimiliter. ac dubium non est, venas maius cum corde consortium habere, quam cum hepate: caro enim cordis durior est, hepatis autem mollior & flaccida, quare melius dicendum est, venas cordi quam epati famulari. Addatis tertiam rationem, omnium venarum vnum est constituendum principium, quoniam factæ sunt venæ ad servandum: pluritas enim principum mala est: vnum ergo principium statuatur. Cum ergo habeamus venam arterialem, arteriam venosam, & arteriam ac venam cauam & venam portæ, dicit Aristoteles arteria venosa ac vena arteriosa & arteria pulsans oriuntur ab ipso corde. Ergo cum tria venarum genera à corde oriuntur, dicendum est etiam alia duo genera ab eodem otiri.

Quarto venæ habent principium cor sanguinis materiæ ac facultatis, quoniam cor est verus fons sanguinis, venæ autem canales sunt & riui. In epate enim non videmus cavitatem nec fontem sanguinis, ut in corde. Sanguis enim epatis est in venis, at in corde extra venas in eius ventriculis, quare cor est fons sanguinis.

Quinta ratio est cum videamus venas partes esse alicuius visceris, non debemus dicere illud principium esse earum: nam venæ disseminatæ sunt per mesenterium & lienem, nec tamen inde oriuntur, sed rami venæ caux & portarum constituunt ipsum hepar: Ergo sunt eius partes, non autem instrumenta sunt, ac vena caua non ingreditur cor, sed altat ostio cordis tanquam famulus: quare venæ cordi inseruiunt non autem hepati. Addatis sextam rationem siue argumentum, minorum maiora sunt principia: propositio assumitur ab Aristotele & est verissima, quod in plantis maxime apparet. Dubium ergo non est, quod illud viscus habeat rationem principii in ipsis venis, quod maius est reliquis partibus, verbi gratia, radicatio est principium plantæ, quia maior & crassior, quare in tebus, ubi sunt partes maiores & minores, maior pars subit rationem principii. Cum ergo inter venas habeamus partes maximas, minores ac minimas: Ergo pars maior erit caudex atque principium, sed pars latissima venæ ac maxima hæret cordi & strictior est vena apud iecur quam cor, ergo cor principium erit omnium venarum. His sex rationibus, potissimum probant Peri-

*Philosophorum
cum causis
ab argumen-
to Medico-
rum.*

ripatetici cor esse principium venarum. Præterea dicunt, ut evitare possint argumenta Medicorum, quod cor principium est perfectiū, quia perficit sanguinem, quem conceditur fieri in hepate atque alterari, perfici tamen dicitur in corde, ubi perficitur omnino ac fit verus sanguis. Et Alexander cap. vii. libri sui de anima huius limitationis fuit autor, & Themistius in Paraphrasti libro de somno & vigilia cap. 17. & Aristoteles in libro de alimento quem non habemus quod ego sciam. Addere possumus auctoritates Hippocratis & Platonis. Hippocrates enim lib. de carnibus dicit cor ad caput cauiusimæ venæ positum esse: quare cum caput sit principium venæ: ergo & cor cum ad caput eius sit positum. Præterea Hippocrates dicit, cauiusima vena est prope cor, non debet autem esse prope hepar, sed prope cor. Ergo cor est principium venarum. Præterea Hippocrates in libro de anatome dicit venam magnam à corde ad epas venire. Plato vero in Timæo fol. 429. in textu Græco inquit, non legi, in textu Latino cor est principium venarum & sanguinis fons, qui distribuitur per totum corpus; quare sententia Aristotelis vera est; & hæc opinio est Aristotelis.

Et hæc sunt omnes rationes & auctoritates pro Aristotele & Peripateticis.

Derationibus Medicorum contra Aristotelem de principio venarum & responsionibus ad rationes Aristotelis & ad autoritates & de conclusione.

CAP. XIII.

CVM vena sit constituta instrumentum deferendi alimentum, & facultates, opus est, vt *Epileptum* seruiat alicui parti principi, vnde hanc facultatem accipiat. Omnes concedunt hoc: *Primaria* lis est in parte: aliis partes superiores capitis videntur: hi reprobantur ab Arist. & Gal. tota vis consistit in corde, & hepate. Arist. cor esse contendit, audiuitis eius rationes. Audiat *Secunda* is modo rationes, quibus Medici suam tueantur opinionem, & quamuis à Gal. leues afferantur plurimæ, aliquot tamen possunt stabiles adduci, vt demonstrationes quodammodo sunt. Prima autem est assumpta à similitudine, & est Gal. Nam, vt in arboribus caudex, & radices habent principium alimenti, & disseminantur in terra, vt alliciant alimentum, quod collectum in capillatione subministratur omnibus partibus, eadem apparent in venis, & hepate. nam nos videmus intestina, in quibus continetur chylus, quæ habent similitudinem soli, per quod radices disseminantur; & quod inde venæ attrahunt succum, & istæ venæ colliguntur, & faciunt vnā venam, quæ dicitur vena portarum, vnde iterum dissipantur venæ, & hoc est in hepate, vbi diffunditur plurimis capillamentis, vt sanguinem faciat, & det aliis, aliisque subministrer. ergo hepar est principium venarum, & vena hepatis instrumentum. hepar est vera, & perfecta sanguinis officina, ergo ab ipso pendet, vt propria instrumenta, omnes venæ, ergo hepar est principium venarum. Maiorem *Tertia* probo. si non esset hepar perfecta officina; sed immutans chylum non perfecte in sanguinem, sequeretur, quod in venis esset sanguis distinctus à sanguine contento in venis hepatis propriis. nam hic alteratur ab hepate, ille, qui ascendit per venam cauam habebit ortum à corde. At fecit animalia viua, mortua, quæuis: nunquam reperietis tantillam differentiam inter carnem hepatis, sanguinem hepatis, & diffusum per vniuersum corpus, ergo illa est natura eadem penitus sanguinis, eadem notæ, & eadem accidentia, ergo opifex erit hepar: è contra conferatis sanguinem spirituosum, qui procedit à corde, cum sanguine hepatis, videbitis differentiam inter eos, sicut inter album, & nigrum; cordis est spirituosus, & purpureus, hepatis niger, & crassus. Tertia ratio. Nos supponimus certum esse, quod omne, quod alterat, alteret alteratum in sui similitudinem: hoc non probamus. nerui. n. alcerant in mucum, os in materiam crassam, &c. videamus an sanguis proportionetur cordi, vel hepati: non est dubium, quod nec partes neruose cordis, nec hepatis venæ primo, & per se faciunt sanguinem, sed substantia mer, id est pars carnosæ. Hæc stante: alimentum sit sanguis: à corde, vel ab hepate? anima duertamus an sanguis assimiletur magis cordi, vel hepati tanta est similitudo sanguinis enim hepate, vt hepar, non caro, sed sanguis coneretur videatur, à corde toto coelo distat. caro pallefcit cordis, non nigrescit, vt sanguis. vnde Antiqui parenchyma, id est, transfusum succum id est sanguinem concretum vocant hepar, à similitudine igitur hæc colligitur hepar esse sanguinis officinam. Addamus in omni officina, in qua elaboratur materia aliqua, reperiuntur receptacula excrementorum, quæ resultant à materia elaboranda, dum præparatur, & alteratur materia: quodcumque nos reperiemus excrementa materiæ alicuius circa aliquem locum, ibi dicemus esse officinam: circa tontinam capillos videmus; circa officinam fabri ferrarii, ad est scoria ferri; & sic in omnibus officinis accidit. idem facit natura. si in corde perficitur sanguis, & cor est officina, ergo circa cor erit excrementum, & vas illud continentia. vnde necessarium est, vt, dum concoquitur alimentum, excrementum fiat. sed vos reperietis receptacula excrementorum circa hepar, non circa cor: ergo hepar est officina. videris sanificos istos: habent genus pectinis crassum, quod facit stuppam crassam, postea habent subtilius: sic dicunt Aristotelici, in corde non sit tanta stупpa, sed excrementum tenue. quæro vbi sunt receptacula istius excrementi tenuissimi? hoc non est, ergo, si expurgatur sanguis ab omni stупpa, & crassa, & tenui in inferiori ventre, sequitur, quod non modo primam, sed vltimam, & perfectam concoctionem recipiat à iocinore, & ibi ex toto expurgetur ab omni genere excrementi: ideo colligo hepar esse officinam sanguinis, ergo esse etiā principium venarum. Addatis, quod dicit Arist. venarum dandum principium concedo: ergo vnu concedo. videamus si venæ oriuntur à corde. & loquimur de vena quæta: quamuis. n. reliqua tria genera dicantur venæ, tamen venæ non sunt, non loquor de arteria: quia illa sapit cartilaginis naturā. Videamus an maior pars venarum colligeatur hepati an cordi: prima est vena vmbilicalis, quæ gignitur primo in fœtu. secunda est vena portarum. tertia est vena caua, istæ venæ à qua patet oriuntur: vmbilicalis nil penitus

habet commune cum corde, nec etiam secunda alia: sed conuascuntur hepate, & sunt veluti ipsius substantia. sed maior pars venarum oritur ex hepate, quia ex tribus geminæ ab ipso oriuntur. Tertia etiam vena, cum hæreat ipsi, non est negandum esse eius instrumentum. Addatis: si vena esset eorundem instrumentum, frustra ageret natura: quoniam fecisset aliquid partes ad vsum inutiles. sunt enim tres membranae, quæ trifidæ vocantur, quot sunt in quolibet animali, & sunt in dextro ventriculo cordis, & factæ sunt, ne sanguis egrediatur ad venas, ergo sanguis si transfunditur ad venas à corde, istæ tres membranae erunt inutiles; quia, si cor mittit sanguinem, ipsæ non claudunt cordis orificium. Natura posuit illas ad hoc, ne egrediatur sanguis. si istæ membranae funguntur munere suo, ergo cor sanguinem venis non communicat. dicent non impediunt, non faciunt munus suum. ergo sunt frustra, ergo natura aliquid agit frustra. Neutrum dicit Arist. ergo dicendum est quod venæ sunt posita ad hepar, & ab eo principium sumunt vos videbitis semper venas in hepate repletas esse, & nihil impedire, ut transfundantur ad partes. Addite si vena instrumentum cordis esset, de necessitate sequeretur, quod vena pulsaret. respondent, quia non habet materiam aptam ad pulsationem: pulsaret, at non habet alio modo respondent negando sequelam: nam aliæ venæ sunt à corde, & non pulsant, & à Gal. conceduntur. Ego dico quod omnes venæ ex Arist. sententia pulsant. vbi. d. quinetiā venæ omnes, & simul inter se pulsare solent; quia omnes à corde oriuntur. quæro cur pulsant arteriæ? quia oriuntur à corde, ergo omnes venæ, si à corde oriuntur, de necessitate pulsare debent. Dicent non adest materia oportuna. Ar. non proponit materiam pulsationis esse substantiam venæ; sed potius calorem, & feruorem, & ipse Ar. ponit venas esse calidas, & deferentes sanguinem. ad est causa efficiens (scilicet calor, canalis mollis, ergo distendi debet ut sitis: quare ergo non pulsant? quia non à corde. vera est Ar. sententia: venæ à corde venientes pulsant, at ista non pulsant, ergo non à corde. Addatis octauo, quæ (mea sententia) demonstratio est, si vena caua, quæ defert sanguinem pro nutritione, deferret à corde, necessarium esset, ut vena caua tota à corde diffunderetur per vniuersum animal sanguineum, hoc non fit, ergo sequitur, quod cor non est eius principium. Dicit Arist. non ne pars oritur à dextro ventriculo cordis? concedo in aliquibus animalibus, sed non in omnibus sanguineis. omne animal cor habet; omne habet sanguinem pro nutritione. Ego habeo pisces sanguineos, in quibus reperitur vena hæc amplissima, quæ habet proprium locum in hepate. & statim quum est supra hepar, diuiditur in tres ramos. (notate, quia hoc non est ab aliis adinaduersum) in duos laterales tendentes ad superiora, magnos; & in vnum paruum, qui petit cor, & ibi cõplet cursum suum. si ille est, quæ subministrat sanguinem vniuerso corpori, cur ergo non ascendit ad superiores partes corporis? ex hoc colligo, quod cor non potest esse principium venarum, nec sanguinis officina; loquor de venis veris, non de arteriis, sed in animali sanguineo, quatuor venæ cum corde habeant coniunctionem, hoc est pro eius nutritione; in hepate autem, ut ex eo ad vniuersum corpus deferant materiam. Ultimo: si vena caua esset a corde, vnde otietur in animalibus, in quibus non est, nisi vnus ventriculus? vena caua oritur a dextro ventriculo cordis, sed non omnibus animalibus est dexter ventriculus vnde ergo oritur? non a sinistro, quoniam inde oritur arteria, ut in piscibus, ergo non a corde. Ergo falsa est Arist. positio, & vera dicitur esse medicorum dicentiū ab hepate principium habere venas. Addo totam scholam anatomicam præter Vesaliū. qui nimis affectu flectam Peripateticam. Aristotelis enim temporibus imperfecta erat anatome, nondum enim erat ortus Herophilus, qui fuit lumen artis huius. Quare excepto Vesalio omnes alii anatomici cum Galeno consentiunt, & explicantes venam cauam exordiantur ab hepate. Contra vero in explicatione arteriæ a corde incipiunt. Ex his igitur colligatis verissimam esse Galeni sententiam, & notandum est, quod anatome hanc difficultatem non determinat, sed aliquid facit ad hoc dignoscendum. Ego autem inclino in opinionem medicam, non quia Medicus sum, sed quia ratio me mouet: nam anima nostra tres habet facultates, primo ut moueat, sentiat & intelligat, secundo ut vitam subministret. tertio ut partes nostri corporis foueat, nutriet augeat; aliæque munera obeat, video quæ in rationali anima hominis alias contineri ut trigonum in tetragulo. Quare cum tria viscera videam ac membra principia, & nullum reperio animal sanguineū sine his tribus. Cum ergo tres hæc partes principales sint, cerebrum, cor, heparque, & in quolibet animali repetantur necessarium, cogor ut distribuam tres has animæ potentias vnāquamque vni visceri. Inultum enim esset, omnes has facultates vni tantum attribuere. Nam etiam si anima tota sit in toto & tota in qualibet parte, non tamen tollitur, quin facultates in diuersis ac determinatis sint partibus. Anatome enim indicat motum & sensum esse ac fieri in cerebro: & qui negant hoc, negant sensum: suntque dementes omnes Peripatetici, qui hanc sententiam teneant, mihi parcent excellentia-

*Sententia ratio.**Septima ratio.**In lib. de resp. cap. 11.**Octava ratio demonstrativa.**Nona ratio.*

cellentissimi, viri: Sensus enim hoc indicat, quare non est, vt disputemus in hoc. Secunda autem facultas, quia viuimus, ascribitur cordi: Medicus nullus est adeo impius, qui hoc neget: si igitur hoc est verissimum, & cum relinquatur vltima facultas vegetatiua ignobilior, illa hepati ascribenda est. Cum igitur huius facultatis ac sanguinis distribuendi instrumenta sint venæ, ipsæ ab epate habent principium, quo stante non obstat illa multiplicitas principii: nam non potest dari vnum principium efficiens, nisi conseruans sit aut finis. Cui ergo hæc res facultates ratione differant saltem, quomodo poterunt habere principium vnum & idem ratione & esse atque actu dereminato? Cum igitur cordis substantia vnica sit, non potest esse causa efficiens tot facultatum adeo diuersarum: nam si omnes actus peruenientes à partib. animalium fiunt à facultate resultante ex mixtione & temperatura earum, necessum est, quod diuersa temperamēta sint, vt actus mouēdi, sentiendi ac viuendi diuersi sunt, ergo à differentib. facultatibus fiunt, ergo à variis temperaturis: Ergo in corde essent temperaturæ multæ ac diuersæ, quod absurdū est: quare ego ad hæc partibus Galeni Aristoteles præterea lib. 3. de partib. animal. capit. 7. dicit cor & hepar necessarias esse partes animalium, & dicit hepar alterare alimētum pro vniuerso corpore: Ex quo loco aliqui sunt, qui nimis addicti Aristoteli & Galeno venerunt in concilium vtriusque, & dixerunt hos consentire, quod sanguis fiat in epate, quamuis Aristoteles addat in corde perfici sanguinem ad vitam conseruandam non nutritionem, hoc legatis in tabula Zimaræ, vbi citat hanc sententiam & probat, quod nullo pacto possunt conciliari isti viri: cum ergo hoc ita sit, uehor ego partes Galeni tanquam veriores.

Ad rationes modo Aristotelis respondeamus. Quare ad primam negandum est, quod cor sit principium omnis sanguinis: concedendum est, quod sit principium caloris ex Galeno in lib. de format. fœtus cap. 3. Præterea falsum est, quod tota nostra generatio ex sanguine sit, nam est etiam ex spermate. Præterea assumit Aristoteles, quod cor sit principium primogenitum, quod quando concedit Gal quandoque negat & res ita se habet, vt oculus humanus hoc non possit assequi, quod membrum prius genitum sit: experitus hoc ego sum in pullo rum generatione, at nunquam potui videre, quod membrum prius genitum sit, an cor scilicet vel epas, credoque vtrumque viscus fieri in eodem instanti: de necessitate autem ac præstantia operis ipsius cordis concedendum est, non tamen hoc concludit præstantiorem esse actum cordis quam cerebri: nam per cerebrum animal est animal, at per cor animal viuit veluti planta: quare quo ad facultatem animalem præstantius est cerebrum, quare non valet, quod cor omnino præstantius sit, nam sine cerebro non erit animal, quare ratio prima nulla est. Ad secundam autem rationem dico, quod si loquar de substantia nervosa, æque similis est substantia nervosa hepatis atque cordis: substantia nervosa vtriusque visceris dissimilis est à venis, sed similitudo maior est inter substantiam hepatis & sanguinem quam cordis ipsius.

Ad tertium argumentum, quod omnibus venis dandum est principium vnum, primo dicendum est, quod si omnes venæ idem agunt, vnum habent principium: sed cum non vnum & idem agant munus venæ non necessario requirunt principium vnum, venæ enim pulsatiles afferunt vitam mouenturque, ac venæ quietæ non mouentur ac deferunt alium sanguinem.

Præterea differunt toto cælo venæ & arteriæ: venæ ergo omnes quietæ vnum habent actum & vnum principium, hepar scilicet, arteriæ autem illæ venę non sunt. Ad quartum dico, quod si in corde per se adesset dexter ventriculus & non per accidens, fortasse valeret argumentum: sed cum adsit per accidens, non valet argumentum, sed adest ventriculus dexter non ratione sui sed ratione pulmonis, patet hoc, nam animalia carentia pulmonibus, carent dextro ventriculo, at habentia pulmones habent dextrum ventriculum etiam, à quo perveniunt arterialem ipsi nutriuntur. Sinus autem isti quamuis in epate non sint, nihil refert: nam necessarii non sunt, imo fuissent incommodi: nam materia minutim concoquenda est, ideo natura fecit meatus angustos hepatis, ideo cavitās non adest, quia incommoda.

Ad quintum, supponit falsum quod venæ corn non ingrediantur: non enim hoc observarunt Peripatetici: nam circa basim cordis sunt venæ coronales, quę diffunduntur per cordis substantiam: sed infusæ sunt venæ disseminatæ per hepar, sed argumentum hoc Peripateticorum si valeret, concluderet etiam, quod arteriæ non essent instrumenta cordis, quoniam arteria magna duos ramos transmittit perforantes eius substantiam. Ad sextum quod maiora minorum sunt principia, domini, opus est vt sciatis, nos posse appellare partem proximam cordi maiorem propter apparentiam: quoniam dum transfunditur sanguis ex ventriculo repletur auricula & latior videtur vena ibi: sed si mēsuremus magnitudinem totam

ipſus venæ tantum, erit minor quam canalis factus prope renes & prope iecur, quare argumentum concludit tantum quo ad apparentiam, non autem quo ad rei eſſentiam & veritatem: his ergo rationibus diluerem ego argumenta Ariſtotelis.

*Reſponſio
ad autorem
libri.*

Autoritates autem Hippocratis ſuſpectæ ſunt Galenus enim non aſſerit librum illum eſſe Hippocratis. Præterea in lib. de carnibus, multa dicuntur, quæ repugnant dogmatibus Hippocratis. Præterea ſententia illa in lib. de anatome etiã ſuſpecta eſt: Galenus enim dicit in eo libro multas eſſe ſententias quæ non ſunt, Hippocratis. Ad autoritatem autem Platonis reſpondet Galenus lib. 6. de placit. cap. 8. & in libr. de format. foetus cap. 3. ubi inquit cor eſſe principium venarum, id eſt, arteriarum: nam Plato etiã venas arterias appellat, ſicut etiã fecit Hippocrates in lib. de vuln. c. 7. quod teſtatur ſcriptura Platonis, quoniam niam loquitur de ſanguine tenui ac imperu fluente. Hepar ergo principium venarum non eſt in generatione venarum: eæ enim ante epar genitæ, principium autem venarum vitæ eſt cor, ſenſus cerebrum, nutritionis epar: præterea venæ epari inferiunt tanquam domino.

Concluſio.

*Præterea
temperies.*

*Præterea
venarum
temperies.*

Quod ad temperiem venæ, Gal. lib. 1. de temper. cap. vltim. dicit venam frigidiorem ac ſiccioſiorem eſſe ipſa cute, minus tamen quam ligamentum aliarumque partes, quo temperamento vena ſeiſpſam regit.

Vſus patet in definitione, & erat quod inferuiret ſanguini deſcendendo & facultati, quamvis Ariſtoteles lib. 2. de gener. animal. capit. 4. videatur dicere venam factam eſſe propter ſenſum tactus, quare non eſt ad ſubminiſtrandum alimentum: tactus enim in homine exquiſitior eſt, quam alii ſenſus. Sed notandum eſt quod Ariſtoteles dixit venas factas eſſe ob tactum, & ſignificauit ob alimentum, quoniam caro verum inſtrumentum eſt tactus, quare vena ob alimentum facta tactui deſcruit, quoniam ex ſanguine fit caro: vena autem non ſicilis ſenſib. ſeruit, tamen ut dixi poſuiſſimus vſus venæ dictus eſt in definitione. Venarum autem variz differentiæ a ſubſtantia tenuiori & craſſiori, à ſitu, à magnitudine, à partibus, in quibus ſunt, à figuraq.

Paſſiones.

Paſſiones variz ſunt, quarum prima eſt, ut omnis vena ſit exanguis, ut lib. 1. de ſem. dicit Gal. loquor autem de ſubſtantia, non de cavitare, quia facta eſt ex ſemine & conſequenter alba eſt, ſed non ita alba ut neruorum ſubſtantia, quia cum continuo ſanguinem continet craſſiorem, inſicitur ipſius colore. Præterea ſecunda paſſio eſt, ut ſenſu ſit deſtituta, non enim vllam ſpeciem ſenſibilem cognoviſcit.

*Dubium an
venæ ſentiant.*

Sed notandum eſt, quoniam reperietis Galenum lib. 16. de vſ. part. capit. 1. numerare venas quasdam inter partes ſentientes & ſeiſpſas mouentes. Secundo Galenus in libr. de plenitud. cap. 4. dicit venas ſentire, aliter non perciperent grauitatem ac pondus plenitudinis ipſa. Tercio addatis rationem, ſi enim ſinatis pendere diu manus, deinde obſeruetur quid ſuccedat, quoniam percipietis quendam leuem dolorem circa venas externas, quia turgidæ erunt; ergo venæ ſentiant.

In oppoſitum autem ego dicebã venas carere ſenſu, ex Gal. lib. 16. de vſ. part. c. 12. quia dicebat cuiuſcunque partis corporis venæ & arteriæ ſunt ſenſus expertes: Ergo venæ non ſentiant. Secundo nos poſſumus eſſe teſtes, quotidie enim ligamus venas & arterias, & dum facimus excoriationes, inducimus dolorem, detecta vero vena nullus fit dolor. Pro ſolutione autem dico, quod eredo venas ſenſum non habere, quia ſenſum habentia aut ſunt connexa cum cerebro, & inde neceſſe eſt, ut habeant facultatem ſubminiſtratam, aut admixtos habeant neruos à cerebro vel à ſpinali medulla in venis aut è nullo modo hoc veriſicatur. Ergo venæ non ſentiant. Secundo quia ſi venæ ſentirent, quandoq. continet ſanguinem adeo acrem, ut eas mordicit ac erodat, tamè non ſentiant illam acridinẽ humorum. Tertia ratio, quæ me mouet, eſt, quoniam ſi non ſentiant ſolutionem continui, conſequenter non deberent ſentire ipſas qualitates.

*Ad autorem
partes Galeni.*

Ad Galeni vero autoritates in oppoſitum notandum eſt in libr. 6. de vſ. part. c. 1. cum tantum loqui de quibuſdam venis, quæ habent ſecum admixtos quosdam neruos, unde eas connumerat inter partes ſentientes: ſed per acciðens ſentiant, quia per colligantiam ſentiant, ſed non ſentiant per participationem, ſed quia coniunguntur neruis, ita ut ad iniuicem ſe tangant. Circa collum enim & femora reperietis venas cum neruo colligatas eſſe, & ideo ſentiant per acciðens. In libr. autem de plenitudine dico ſenſum in plenitudine eſſe grauitatis, qui ſenſus dico quod potius circa membranas eſt venarum, quam in earum (venarum) ſubſtantia: In plenitudine enim fit extenſio atque triſtis ſenſatio comprimendis corporis: at venæ non aggrauantur, non comprimuntur ſed extenduntur ac dilatantur, tamen non fit ſenſus niſi aggrauatiuſ ratione membrorum adiacentium, nulla tamen indicatur extenſio. Notandum tamen eſt, quod Galenus non curauit eo loco, an venæ ſentirent vel

vel membranz venarum, quia satis sibi erat eo loco explicare certum signum, quo possemus explicare multitudinem sanguinis & plenitudinem, cuius signum est, quod in eodem capite dicit, quod ossa non habent sensum, inferius tamen admittit quendam percipisse dolorem ossis, & hoc fecit, quia non refert, dummodo tristis illa sensatio sit signum, quod affectum sibi ipsum os respexit ergo ad certitudinem signi & non ad naturam rei.

Ad experientiam autem illam de pēdulis inanibus dicatis, quod ibi ad sint membranz & aliz partes, quz compressę percipiunt ristem illam sensationem, inter passiones etiam venarum connumeratis substantię tenuitatem, vnde possunt in quibusdam etatibus restitui, quia pauca materia requiritur ob earum tenuitatem. Hęc autem, quz diximus de vena, satis sunt. Sequitur vt de arteriis sermone faciamus, & exquisitum: pulchra enim & curiosa ac necessaria tamen est earum pertractatio.

De Arteriis quo ad earum nomina, naturam, definitionem, substantiam, materiam, causam efficientem & usum.

CAP. XIII.

Arteria vocatur à Græcis ex Philareto in lib. suo de puls. 4. quasi aerem contingens ac cōseruans: nō dicitur autem arteria à tirando aerem vt barbari nostri credidere & dicere. vox autem ista varias habet significationes, sed proprie significat instrumentū quoddam, quod est in faucibus quod est instrumentū durum, oblongum & cartilagineum, per quod aer descendit ad pulmones, & inquit Plato in Timæo, quod descendit per ipsum etiam potus, cuius opinio si fuerit multa: vnde orta est lis inter veteres philosophos de hoc & Chrysippus philosophus inuectus est contra Platonem vnde Plutarchus in 7. libr. question. conuiual. questionem doctam instituit de hoc, an potus scil. descendat per arteriam. Idem in libro de contrarietatibus Stoicorum aduersus Chrysippum, vbi Hippocratem ac poetas multos pro Platone citat, quod tamen non attinet ad propositum nostrum. vos autē legatis Galenum in lib. de vs. part. c. 12. & in lib. 7. de vs. part. cap. 6. quoniam nos de hac arteria non loquimur, quz dicitur à Galeno aspera arteria ad differentiam verę arterię ac simpliciter dictę.

Secundo notandum est, quod antiqui & præcipue Hippocrates appellabat nomine arterię omnes venas, vt in lib. de corde, vbi inquit, quod arteria aorta & arteria caua oriuntur à corde, altera à dextra parte, altera vero à sinistra: nulla tamen datur arteria caua à corde, nisi de vena caua intelligatur, de qua locuti sumus. Tertio notandum est, quod scriptores appellant arteriam eam substantiam, de qua nos loquimur, quz ab antiquioribus quadoque vena dicta est, vt apud Platonem in Timæo, & apud Arist. libr. 3. de histor. animal. cap. 4. & 5. & Hippocr. 6. epidem. sect. 6. text. 2. & in lib. de carnib. quibus in locis arteriam venam vocarunt. Aliquando etiam Aristoteles vocat hanc arteriam, quasi semper visibilis sit, vt libro tertio de histor. animal. ca. 3. vocatque sic, quia semper visibilis est, quia magis expansa est. Secundo Aristoteles lib. eod. 3. de histor. animal. cap. 4. appellat venam nervosam, per quam intelligatis semper hanc, de qua loquimur, quia dura est ac solida nequeque similis. Tertio addatis, quod appellat venam minorem, præcipue in 3. de part. animal. cap. 4. quia vocat venam cauam venam maiorem. Hippocrates etiam variis nominibus vsus est: aliquando enim eam appellat veto nomine arterię, vt 1. epid. sect. 4. & in lib. de carnib. & 7. epidem. pluribus in locis: in 6. Epid. sect. 5. text. 2. appellat venam calidioram arteriam istam. Tertio appellat in lib. de vulner. capit. venam vehementem arteriam istam de qua loquimur, nostri autem Arabes eam semper appellant venam pulsilem, quia pulsata & hæ sunt voces variz.

Natura huius substantię est, vt sit pars communis ac similis secundi ordinis in star tamalis à corde duens facultarem & sanguinem vitalem per vniuersum corpus, perpetuo agitata pulsu: nam continue mouetur. Et hæc est arterię definitio. si enim respiciamus ad partes, vera est communis pars, quia nulla est pars in corpore alicuius momenti, quz non sit prædita ipsi arteriis: est tamen communis & similis secundi ordinis, quoniam habet actionem integram, scil. delationē facultatis ac sanguinis vitalis ad vniuersum corpus: similis est etiam pars, neque credatis compositam esse ex carne & fibra vt libr. 1. de temp. cap. 3. dicit Galenus, quod in substantia sit caro, quod facit nos inferre, non esse similem partem: dixi & ingenue fateor, quod nō possum vlllo modo fatari huiusmodi carnem sensu auratione; neque reperio in arteria vllam substantiam à fibris distinctam, sicut dixi cum loquebar de carne, itaque dico similem esse & nullam habere substantiā distinctam à

Contradictio in Galeno de tunicis arteriarum.

fibris ipsis. Sed advertendum est, quod adest contradictio magna in Galeno, nam in libro septimo, de admin. anat. capite 5. ubi omnia elaborata conscripsit ac cum maxima diligentia, dicit, quod vnaquæque arteria constat ex duplici tunica. Deinde dicit, quod possit addi & tertia & quarta, quæ perpetuè non sunt ut duæ primæ, & inquit, quod externa est ita tenuis, ut est membrana alicuius tenuis venæ, interna vero est crassior in proportionem quintupla exteriori, ad idque quod exterior habeat fibras rectas & longas & aliquot obliquas, quate habet duplex genus fibratum: tunica vero interna habet tantum fibras transversas: tertia vero tunica, quam dicit esse similem telæ araneæ, dicitur, quod non reperitur: quarta vero exterior, quæ communis est omnibus vas, est illud commune involucrem omnium partium & viscerum, postea addit, quod in magnis animalibus reperitur aliquando tunica interna tenuis veluti aranea, reperiturque aliquando quarta tunica in ipsis: & ex hoc colligo, quod sit composita: respondeatis ad hoc, quod eadem est substantia tunicæ internæ, & externæ, vnde non sequitur, quod sit composita.

Contradictio in Galeno de fibris arteriarum.

Solutio.

Correctio in Galeno.

Ordo natus in tractatu de fibrarum partibus.

Substantia arteriarum qualis sit. Aristot. opinio contraria.

Opinio Hippocratis.

Quid autem facit difficultatem, est, si legatis cap. 11. lib. 3. de fac. nat. ubi habetur, quod arteriæ tunicas habent veluti ventriculus, & quod tunica interna arteriæ habet fibras longas & obliquas: exterior vero habet transversas, & hæc est contradictio maxima à nullo huc vsq. soluta, cum sit oppositum illius, quod diximus ex lib. 7. de adm. anat. c. 5. Sed sciendum est ex his autoritatibus priorem sententiam veram esse, sicut omnes anatomici fatentur, nec certe potui per me ipsum reperire solutionem huius nodi, nec ab aliis intelligere, vnde credo corruptum esse codicem à quodam homine auctore in lib. 3. de fac. nat. cum facilis fuerit mutatio: nam geminæ sunt voces græcæ similes, vna quarum significat incus, altera extra. Cum ergo videret quod Galenus assimilaret arteriæ ventriculo, qui intus habet longas fibras, extra vero transversas, dixit tunicas arteriæ assimilari tunicis ventriculi & fibras fibris: vnde ego vellem, ut eo loco, ubi legitis interna, legeretis externa, & ubi legitis externa, legeretis interna: neq. ob id tollitur similitudo arteriæ cum ventriculo, quia in hoc non querit similitudinem Galenus, quia cum ibi diceret facultatū instrumenta esse fibras & facultatem operari merito fibrarum, dicebat quociens in aliqua parte est gemina facultas, ibi de necessitate duo erunt genera fibratum, rectæ scilicet ad attrahendum, & transversæ ad expellendum: aut enim ista pars constat duabus tunicis, & tunc vnum genus fibratum collocatur in vna tunica, alterum genus in altera tunica veluti in ventriculo, at in parte vnius tunicæ, ut in velica tunc in eadem tunica ad sunt fibræ & rectæ & transversæ & ibi confunduntur ac miscentur utreeque fibræ. Si autem partes opus habeant facultate retentiua veluti vterus, præter illas duas tunc aderunt fibræ obliquæ, & illæ oblique disperguntur cum rectis & transversis, si fuerit pars vnius tunicæ, ut apparet in vena, sed si fuerit pars, quæ habeat duas tunicas, in vna erunt transversæ tantum, in altera longæ & obliquæ, & hunc modum & ordinem semper seruauit natura: & ibi proponit venam ubi sunt fibræ omnium generum, veluti in velica & in vtero, deinde dat exemplum partium earum, quæ habent duas tunicas, & proponit arteriam & ventriculum, ubi dicit, quænam modum sit in ventriculo, vna enim tunica habet fibras tantum transversas, altera vero [tunica] continet & rectas & obliquas, & in hoc consistit similitudo: hoc stante merito dicimus locum esse corruptum.

Hinc ergo colligitur arteriā esse similem, quamuis duas tunicas habeat, quæ eiusdem sunt substantiæ: Si veto quis querat, an hæc substantia sit neruea vel ossea, Aristoteles lib. 3. de histon. animal. capite quinto, & etiam tertio respondet esse substantiam neruosam, quia inquit in extremis partibus sunt solidæ: Galenus vero libro primo, de placibus cap. quinto, testatur Praxagoram substantiam hanc receperisse: sed hoc falsum est, quia nullus nervus est ita rigidus, qui renitens tactui sit: at arteriæ manent apertæ per se, nam considerent in semetipsas veluti nerui si essent ex nervo. Secundo videmus partes arteriarum esse cartilagineas imo osseas, veluti in senioribus animalibus & maioribus, quod indicat non esse substantiam neruosam, & possum ego testari me vidisse in quadam vetula omnes arterias sinistras osseas esse factas, quæ passim erant aneurisma.

Hippocrates autem in lib. de corde respondet arterias esse cartilagineas primo à colore, quoniam albæ sunt, secundo à similitudine inter substantiam epiglottidis, quæ est cartilaginea, & arteriam: tertio quia in se resiliunt, quarto quia videmus, quod in antiquioribus animalibus sunt cartilagineæ, sed cum substantia arteriæ tota fibrosa sit, non possum dicere eam cartilaginem esse. Galen. autem noster seipsum non explicat, sed Vesalius videtur inclinare, quod sit cartilaginosa. Ego autem cum videā plures & diuersas conditiones

varias

varique similes, credo esse substantiam mediam inter cartilagineam neruorum & mixtam esse cum substantia cartilaginea tum neruorum. Cum enim sit longa & possit produci, credo esse neruosam; quia vero tenens est, credo esse cartilagineam: credo itaque factam esse ex materia seminis, proportionata tum neruorum tum cartilagineae substantiae, dominante tamen materia cartilaginosa, & hinc sit ut facilius conuertatur in cartilagineum. Addebam quod arteria instar canalis infertur cordi: nam cauae sunt arteriae & perforatae à spiritibus percurrentibus, atque continent sanguinem spirituosum; ut Galenus libr. 16. de vs. part. cap. 13. & in lib. aduersus Erasistratum an sanguis in arteriis natura continetur, ubi hoc diffuse probat Galenus, qui quidem sanguis primo accipitur à sinistro cordis ventriculo ab arteriis, iisque adducitur ad omnes corporis partes. Sanguis autem ex vena in arteriam & e contra permeat & transit, & hoc indicat anatome atque exitus sanguinis ex vena & arteria, & etiam Galenus hoc dicit in libr. de vs. puls. capite quinto, & hinc merito aliqua pertractari debent de ipso pulsui siue pulsatione, quae percipitur in arteria, circa quam vos attentos cupio.

De Pulsu & quaecirca cum notatu digna sint. C A P. XV.

Cum autem arteria hoc habeat ut perpetuo pulsus agitur ex lib. septimo, de adm. anat. cap. 7. ubi ait, quod omne vas in corpore pulsans est arteria: Sciendum est per pulsum intelligi debere concitationem arteriae motu duplici & motu contrario. Nam non semper mouetur à centro ad circumferentiam, sed aliquando, & tunc dicitur arteria, quod habet partem unam pulsus. in pulsu ergo adest geminus motus, dilationis scilicet & constrictionis siue contractionis. Dilationem appellamus diastolen, contractionem vero systolen: & haec sunt partes pulsus non autem pulsus. Pulsus enim motus compositus est ex duobus motibus, quorum alter fit à centro ad circumferentiam, alter e contra. Sed cum omnes Medici habeant veluti constitutum, quod pulsus sit veluti passio arteriae, & quod moueatur motu contrario, fuerunt aliqui, qui negarunt duos esse motus, velud Archigenes: nam is motus, quo dilatur arteria dicebat ipse, non est motus, sed est recursio ad suum locum, quia per se semper aperta manet: vnde dicunt, quod pulsus non est nisi contractio; sed decipiuntur isti. Ergo dico quod à causa quadam & dilatur & contrahitur; nam si vultis videre, obseruate ipsum pulsus magnum & paruum: videbitis enim, quod in pulsu paruo persentietis dilationem paruam, in vehementi vero pulsu dilationem magnam. De necessitate ergo dicendum est, adesse aliquam causam dilationis, quae prius non erat. Sed isti respondent, quod tempore maioris dilationis adest maior durities arteriae & arteriam molliorem fuisse, cum paruam faciebat ac duriores factam, fecisse magnam dilationem. Sed quid dicent, quod in eodem instanti aliquando fit & magna & parua dilatare ratione passionum animi: hoc quidem non est referendum ad duritiem & molliem arteriarum. Secundo si huiusmodi arteria non dilaretur dilatione voluntaria, non egrederetur sanguis in ipsa dilatione, nam non egredietur nisi quando dilatur. Ad illam vero rationem, quae dicebant, quod in corporibus mortuis reperitur dilatata arteria, dicatis, quod verum est, quod dilatata apparet, sed parum dilatata, & non ex integro usque ad terminum, qui fit à facultate, quia potest vltius dilatare in viuis corporibus: ergo &c. Notandum est autem, quod inter hos duos motus datur quies quaedam media, quae comprobatur ab Arist. in lib. de motu, & isti omnes termini sunt recepti in praxi, & quia duo sunt motus contrarii in pulsu, de necessitate dantur gemini etiam quietes, an vero quietes sint sensibiles nec ne, & an possint impertiri partibus, satis difficilis est tractatio, quae ad doctrinam de pulsibus attinet. Quo ad usum autem istius agitationis, fuit quidam autor libri de spiritu, qui continetur in libris Aristotelis, qui dixit nullum usum esse huius motus, & nullum esse finem, sed esse quoddam accidentarium, quemadmodum cor mouetur, quia calidum est & nullum habet finem; sed hoc non est dicendum, quia natura nihil frustra facit, quare dilatur pulsus ob certum finem. Galenus autem lib. 4. de diff. puls. cap. 5. inquit factum esse ob tutelam infusi caloris innati, quia calor innatus opus est, ut conferretur primo per substitutionem caloris actualis, quoniam diminuitur: secundo per remotiones eius, quod potest ipsum corrumpere & esse impedimento, id est, quod posset calorem ita feruidum reddere, ut fiat calor praeter naturam: tertio ad addendo aliquid, quod contemperet calorem ipsum si quis addarat gradus praeter naturam. Primo autem agamus de primis duobus visibus. Galenus itaq; lib. 6. de vs. part. cap. 17. inquit, quod sunt in corpore quidam vapores exusti & fuliginosi, qui si continerentur, calor innatus feret igneus, vnde per contractionem arteriae in pulsu expelluntur istae fuligines, & sic conseruatur calor in

*Dubium an
ad hoc ful-
gines in ter-
pore.*

an hinc

*Plum dila-
tis.*

*Quomodo
aer attrahit
tur in arte-
riam.*

*Secundus
vltim dila-
tis.*

*Terriu-
sim pulsat.*

*Pulsuum
causa.*

*Ratione E-
rasistrati.*

an hinc

natus. Hic autem anatomici quidam irrident Galenum & Medicos, quia inquirunt quod non videant istas fulgines: sed opus est, ut cum crassius viris crasso modo loquamur: qui quidem si per fulgines intelligant fulgines veras caminorum, verum dicant: sed dicant quæso, non ne pili concreverunt & generantur per fuliginosos vapores, veluti fuligo concrevit circa caminum? Ergo per fuliginem intelligimus vaporem quem dam terrestrem calefactum, qui sine dubio cōcedendus est in corde, vbitantus calor fouetur per systolen. Altera tutela erat, ut cum continuo possit nimium feruere, necessum erat ut in cavitare cordis attraheretur aliquid, quod temperaret ex Galeno in libr. de vs. puls. cap. 4. & hoc est spiritus qui calorem temperat, & ut in libr. an. sanguis in arteria & c. capite octauo, dicit Galenus, per spiritum intelligens aerem, & propter hoc natura fecit diastolen. Sed quomodo iste aer attrahitur? legatis Galenum libr. tertio de fac. nat. cap. 13. vbi loquens de geminis generibus attractionis dicebat, quod vna fit attractio ratione similitudinis, veluti quando ferrum attrahitur à magnete: altera fit ratione vacui, veluti quando arteriz dilatantur & contrahuntur, ipse fulgines eliduntur: ita quando arteria dilatatur, maius fit spatium, & ne vacuum detur, ingreditur aer pariter in arterias: nam continuo pori nostri corporis sunt repleti aere frigidiore, & nisi hoc esset, nunquam actuarentur medicamenta applicita corpori humano, quod ego nunc non probō, cum alias dicendum sit, quia huius loci non esse videtur.

Ista autem dilatio alium habet vsum, ut scilicet etiam sanguinem attrahant arteriz, ut lib. 3. de fac. nat. cap. 14. nam cor dilatato ventriculo sinistro attrahit ex dextro ventriculo sanguinem tenuem, idem fit in arteriis, quæ attrahunt ratione vacui sanguinem spirituosum ab ipsius venis coniunctis. Videte ergo, quamuis hoc non dixerit Galenus, quod ab ipso colligi potest: nam inquit, illa, quæ attrahunt ratione vacui, prius attrahunt partem tenuiorem, postea crassiorem. Hoc ita stante, sequitur quod verum sit, quod dum contrahuntur, euacuantur fulgines & dum dilatantur, replentur aere ipso: quod est contra Archigenem, qui dicebat, quod sicuti per nares contractas aer attrahitur, & cum dilatantur, expellitur: ita fit in arteriis, ad hoc ego non respondeo, quia Galenus subtilissime respondet. Tertia ratio, quæ uemur calorem, erat, ne aliquando inclinaret à suo gradu, ne sit excessus in diminutione: unde ratione motus per attritionem ipsam & agitationem conseruatur ipse calor innatus: nam cor & arteriz dum mouentur, conseruant calorem suum in actu. At dices Galenus libro octauo, de placit. capite septimo, inquit, quod in corporibus animalium non fit calor natiuus & insitus per attritionem, veluti fit in lignis & in lapidibus similibusque. sed quod est ipse met calor, qui est causa ipsius motus. Dico quod calor, qui est in actu, est calor insitus, quia primo est in illis partibus à generatione, insitus autem est, quia primo cor factum est ex sanguine & semine calido actuali, & iste calor est causa motus, quare motus non est causa caloris, sed effectus: unde calor est causa istius motus, qui conseruat facultatem, quæ facit motum. Sed ego non dico, quod præcesserit motus ipsum calorem, sed quod vltimus istius motus est causa efficiens conseruans ipsum calorem: unde hoc modo motus est causa caloris ipsius & refert gratiam suo efficienti calori ipsum conseruando: hic ergo est tertius vltimus pulsus, & hinc est, quod cessante calore statim cessat motus, quia statim corrumpitur facultas: tamen cessante motu non statim corrumpitur calor, nisi aliquandiu remaneat, quoniam si longa esset quies, marcesceret. Verum cum ita se habeat, ut frustra non sit factus ille motus, quoniam vultis cognoscere causam huius motus, quæritur quænam sit ista facultas? Aliqui dixerunt hunc motum fieri per accensum, id est, ab aliqua causa distincta à substantia arteriarum: aliqui vero dixerunt & cor & arterias seipsas mouere atque habere causam in se: inter priores fuit Erasistratus, cuius opinio ponitur à Galeno libro quarto, de causa pulsus. capite secundo, nam volebat in corde esse veluti quasdam voragines calidas, quæ nunc absorberent, & nunc euomerent sanguinem in arterias, & ita colligebat, quod dum mouentur arteriz, moueantur per accensum, & dum cor contrahitur, arteriz dilatantur: dum vero cor dilatatur, arteriz concidunt reuocato sanguine ad cor, quod patet exemplo chirothecæ inflatæ. Sed ista opinio tantum valuit, ut nostris temporibus aliqui etiam credant hoc esse verum: unde afferunt aliquot rationes, primo ut Galenus libro septimo de anat. admin. capite octauo, si arteria mouetur, per se mouetur à principio voluntario vel naturali: non mouetur voluntarie, quia nullus vnquam hoc dixit à principio naturali insito, ergo aut ab elemento prædominante aut à facultate: non ab elemento, quia fieret tantum ad vnâ positionem, aliter duo essent ponenda elementa contraria prædominantia: ergo ab ipsa naturali facultate. Sed venæ sunt prædictæ naturali facultate non tamen agitantur isto motu, ergo neq. arteriz. Secundo videmus, quod in omni euacuatione

arteria concluduntur, ergo quia per accidens euacuantur, contrahuntur, & quia per accidens replentur, dilatantur: hoc patet in passionibus cordis, ubi statim resilit omnis sanguis ad cor: tunc enim reperimus sine dubio arterias contractas. Tertia ratio est in animalibus vniuersos de regamus arteriam, percipientibus quod pulsatur, si ligemus eam, pars inferior non pulsabit amplius, quia, inquit, ratione vinculi non amplius regurgitat sanguis & impeditur cursus sanguinis ad eam atque recursus. Quarto quia obseruabitur, quoties erit puncta arteria, quod sanguis quando dilatatur, exilit; quando vero contrahitur aut non exilit: si vix exilit, hoc enim non fit; nisi quia sanguis fluit & refluit: nonne à Galeno ponitur, quod contractio arteriarum ad expulsionem fuliginum facit: ergo signum est, quod dum materia dilatatur, impletur: dum euacuatur, constringitur. Quinto quia poete crediderunt, quod dilatio thoracis à spiritu ipso calido fiat: Ergo &c. Opinio itaque istorum vult, quod pulsus fiat per accidens, id est, habeat non intrinsecum sed extrinsecum principium.

At opinio in oppositum est Trusiani ex Aristotele in lib. de resp. cap. 11, ubi loquens Aristoteles de pulsu cordis inquit, quod fiat pulsatio in corde & in arteriis veluti fit in tumoribus dum maturantur: nam sanguis feruens crescit eliditurque in parietes minores & sic facit pulsationem, & inquit Aristoteles, eodem modo fit pulsatio in corde, nam semper transmittit alimentum calidum ad cor, quod alimentum calidum feruet, & crescens in modum extendit de cordis parietes, & hinc fit dilatio. Causa autem contractionis est eadem, quae in tumoribus, qui tunc contrahuntur & concluduntur: aut quia magna pars vaporosi humoris resoluta, aut quia ista materia per alterationem facta est crassior, unde conuersa est ad minorem copiam, unde tumor decreuit pariter, ita in corde cum humor ille fit spumosus, fit dilatio cordis, cum autem aliqua pars resoluitur, de necessitate cor concludit, & sic fit contractio, & talis est sententia Aristotelis eo in loco, & adducit aliquas rationes, quamuis aliqui interpretes hoc negent, veluti D. Thomas in eo libro: attamen ipse Aristoteles adducit rationes & disputat hoc. Idem videtur dicere Auerrhoes: tamen multi alii & omnes fere hanc sententiam Aristoteli attribuant. Sed quicquid sit, non refert: veniamus ad arteriam nostram. Dicunt ergo isti, quod arteria dilatatur, quia recipit ipsum sanguinem feruentem, contrahitur autem, quia recipit in se aerem frigidorem, qui refrigerat sanguinem, qui postea fit in minori copia, unde fit arteriae contractio, exemplum fit olla bulliens & feruens quae habeat spumam vsque ad superficiem, quae per sufflationem spirituum diminuitur iterumque ex feruore augetur: isti autem appellant remissionem istius feruoris humescentiam, quare per accidens fit iste pulsus. & pro hac opinione proponuntur illae omnes rationes, quae dictae sunt pro opinione Erasistrati.

Secunda secta tenet oppositum, quod scilicet per se & a proprio principio arteria moueatur. Quae autem sit causa contingens & immediata, non est facile ut explicemus, & magis difficile est, quia qui locuti sunt de hac causa, non sunt concordēs, & id colligatis à Galeno libro primo de caus. pul. cap. 1. aliqui enim voluerunt esse calorem innatum ipsius arteriae, hoc non potest dici, quia infinitae etiam aliae partes habent calorem innatum, & tamen non habent pulsus, sicut venae & multae aliae partes. Alii dixerunt esse tonum & tensionem, sed quoniam sit ista tensio non explicauit Galenus, quod tamen nego quia dubitatur quoniam causa fiat ista tensio. Alii dixerunt fieri à temperamento arteriarum: sed neque hoc est dicendum, quia frigidum & siccum est, quare non videtur consonum, ut tale temperamentum facere possit talem pulsus, & non videtur posse esse principium motus cum sit frigidum & siccum. Alii dixerunt esse spiritum vitalem contentum in arteria, sed cum videamus, quod affecto spiritu arteria non relinquit pulsus. Praeterea spiritu nihil pulsum pati, nam si ligemus arteriam, pars inferior non pulsatur, & tamen remanet spiritus & sanguis, spiritum enim habet quoniam non exhalauit. Alii dixerunt esse vniuersam structuram arteriarum & formationem: sed cum nos sciamus, quod est arteria tota quae mouetur, id est, totum illud constructum, si eadem structura moueretur, tunc idem esset & mouens & motum non solum definitione sed existentia & e conuerso, quod non est dicendum, quia agens & passum sunt contraria, ideo nec possunt simul esse: Ergo &c. patet hoc, quia structura est idem cum re constructa.

Quare cum Gal. videret hoc, dixit non est dubium, quod arteria mouetur, ergo aliqua adest causa efficiens, quae habeat facultatem, quae possit edere tale effectum: inquit Gal. ego ignoro substantiam istius causae efficientis, sed scio adeste facultatem in corpoream, quae talis substantia & causa efficiens edat talem effectum. & de hoc est dubium, an contineatur & sit in substantia & intra corpus arteriae vel extra. haec igitur est rei veritas, à Galeno

Rationes
opponendi
Genera.

maxime ventilata. videamus ergo rationes probantium hanc virtutem esse in arteria; prima illa est, si arteria per se non moueretur ab ista facultate, cum non moueatur ab elemento predominante neque voluntarie, sequeretur dari aliquod violentum perpetuum, quod est absurdum & est contra Aristotelem lib. 2. de coel. text. 18. quia donec sunt arterie, de necessitate mouentur. Secundo si arteria non moueret seipsam, sequeretur quod ista refrigerata posset se mouere: nam si refrigeretur arteria & repleatur ipso sanguine, quid impedit quin moueatur ac dilatetur? & euacuata quin concidat? tamen videmus, quod statim quando arteria percipit aerem frigidiorum & refrigeratur, amittit motum. at si vos iterum calefaciatis arteriam, iterum incipit pulsatio, ergo mouetur à facultate instanti. Tercio si arteria moueretur per accidens, sequeretur, quod à causa incerta & instanti fieret aliquod certum & determinatum, aliter à corruptibili fieret æternum quid. at ille pulsus est effectus certus & perpetuo constans, quia perpetuo constanti motu arterie mouentur, dum arterie natura seruat, at illa ebullitio & regurgitatio sanguinis est incerta & inconstans, nam in principio arterie aortæ est collocata triplex membrana, *arguenda dicta*, quæ habet suum principium à corde, cuius membranæ munus est, ne illud, quod continetur in arteriis, possit resiliire in cor, quia illæ membranæ claudunt orificium; unde fit, vt recurfus iste sanguinis sit incertus & inconstans, qui causa est systoles, quia impedimentum adest, tamen systole ipsa est certissima; Ergo arterie mouentur per facultatem in se ipsam. Quarto natura nihil frustra fecit. verum si arterie per accidens mouerentur, frustra natura fecisset tunicam internam, quæ est facta pro instrumento ipsius motus, quia habet fibras transuersas, per quas mouetur à centro ad circumferentiam, & è conuerso. sed notandum est, quod dico, quod tunica interna habet fibras omnes transuersas pro instrumento motus dilatationis ac contractionis: & quamuis postea ad motum sequitur expressio, tamen illæ fibræ primo non dantur ad expressionem, sed primo ad motum contra Galenum. Præterea notandum est, vt cognoscatis vsum fibrarum arteriarum, quod licet Galen. dicat fibras esse propter facultates, tamen ego dico, quod triplex est vsum omnium fibrarum, quæ sunt in corpore. Primus vsum est ratione motus, nam nunquam videbitis aliquam partem per se moueri motu locali vel secundum totum vel secundum partem, quæ fibras non habeat, & hoc est verum; dico autem vel secundum totum vel secundum partem, quia aliquæ partes mouet seipsas in seipsis, sed vna pars modo magis est prope centrum, modo vero non, & ita mouentur secundum totum sicuti ventriculus. at dices quod digiti mouentur sine fibris, dico quod musculi seipsos mouent, & digiti non mouentur à seipsis, musculi autem habent fibras; id etiam comprobatur Auerthoes in digressionem illa septimi Phisic. text. 10 ubi loquitur de attractione. Secundus vsum est, vt detur transitus alimenti vel alterius rei transmittendæ, siue sit humor siue sit facultas, siue vapor sit per vniuersum corpus & nunquam est pars corporis, per quam aliquid transmittatur, quæ non habeat per eandem viam fibras aut canale habear, de quibus canalibus non loquimur. requiritur enim ad transmissionem reductio meatuum & fibrarum atque ordo; exemplum sunt nervi, qui habent fibras, in quibus quia ad sunt meatus recti, ideo ad sunt necessario fibræ rectæ.

Fibræ arteriarum.

Vsum fibrarum arteriarum omnium corporis.

3.

Tertius vsum fibrarum est ratione texturæ: quando enim natura voluit formare partem aliquam, quæ posset vndique extendi per dimensiones, vt compositio esset valida ne disrumpere & laceraretur, fecit vt textura ista constaret omnibus generibus fibrarum. Dico ergo triplicem hunc esse vsum fibrarum, sed dicebat Galenus vsum fibrarum esse vt expellerent & attraherent, hoc verum est: sed verum non est vt aliquo modo aliqua fibra habeat vim in se retinendi, mihi parcat diuinus præceptor, sed attrahunt primo illo suo vsum, qui erat motus localis; quia istæ partes fibrosæ localiter per rectum mouentur, ideo attrahunt, & ob id fibras rectas dicimus attrahere, quia rectæ fibræ sunt causa motus per rectum: fibræ vero transuersæ habent vim expellendi suo motu veluti intestina, quia principaliter contrahuntur fibræ transuersæ, ideo expellunt quicquid in ipsis continetur. Quare fibræ ipsæ primo factæ sunt, vt partes seipsas possint mouere; secundario vero vt attrahant & expellant.

Partes à fibris motu tripliciter mouentur.

Addatis quod istæ partes, quæ mouentur ratione fibrarum, aut mouentur ratione voluntaria, aut naturaliter, aut medio modo: voluntarie mouentur musculi ratione fibrarum carnosarum, unde omnes partes quæ habent fibras carnosas, possunt voluntarie moueri; arterie autem seipsas mouent naturaliter, cuius motus causa sunt fibræ sine carne, quia sunt cartilagineæ & nervosæ. Aliæ vero medio modo se mouent, veluti intestina, ventriculus & vesica, in quibus non ita apparet motus voluntarius, sed est motus quidam mixtus; ideo istius partes non sunt neque absolute nervosæ, neque absolute carnosæ, sed constant

constant ex substantia nervosa admixta aliqua portione carnis, veluti sunt fibræ vesicæ, intestinorum & ventriculi. Cum ergo hoc sit constitutum, quod arteria moueatur, quia habet fibras transuersas, dico, quod essent frustra, nisi mouerent per se totam arteriam, quare mouent seipsas, quia fibræ mouent totam arteriam. Et hic est primus & præcipuus usus illarum fibrarum, & non attrahendi & expellendi, quando eadem tunica, eademque fibra faceret ad expulsionem comprimendo & ad attractionem dilatando. At dices, si rectæ essent fibræ arteriæ, an possent arteriæ se mouere, dico quod non, quia lacerarentur, quia non adesset aliquis connexus: idem de reliquis fibris, quæ sunt in altera tunica, dico quod non habet fibras rectas ad attractionem sicuti dixi de fibris internæ tunicæ, quia si attraherent, attraherent ratione similitudinis, ac rectæ fibræ existentes in secunda tunica non possunt trahere vlla vera tractione, licet id dicat Galenus. tamen admiro Galenum in hoc, ratio est, quia non possunt se mouere: non enim habet fibræ hæc substantiam carnosam mixtam, quare fibræ arteriæ non possunt attrahere, quia carnosæ non sunt, habent autem talem usum pro transmissione, vt eor possent transnudere suos spiritus per vniuersam arteriam, vsque ad finem arteriæ non per cauitatem sed per propriam substantiam: Ideo secunda tunica habet meatus rectos, vt reciperent influxum à corde. Hoc ita stante, quod tunica interna faciat ad motum, externa vero ad transmissionem facultatis, quæritur causa, cur tunica, quæ faciat ad motum, collocata fuerit interior, quæ vero facit ad receptionem, collocata fuerit exterior, quoniam oppositum videtur ratio dicere, & sic fecit natura in ventriculo. Domini, in hoc admiro certe naturam, illud non fecit natura in arteria, quia commodum non fuisset: nam cum facultas ista transmittatur à corde, transfundaturque per fibras rectas, demus, quod ista tunica sit interior, & tunica transuersarum fibrarum facta ad motum esset extrinseca, quoties tunica transuersarum fibrarum contraheretur, ita ligaret internam tunicam deferentem facultatem, quæ fibras habet rectas, vnde facultas periret & clauderetur meatus, & ita nec moueri posset arteriæ pars inferior, vnde natura hoc modo, vt dixi, collocauit tunicas suis fibris. Cum ergo in arteria ipsa sit instrumentum motus, ergo arteria mouet seipsam, valet ergo quarta ratio.

Quinta ratio est. Si arteriæ non haberent hoc principium in se, sed mouerentur ab influente sanguine, necessum esset, vt partes arteriales mouerentur secundum ordinem, id est, vt vna post alteram moueretur & moueretur in tempore, quia vna pars prius quam altera reciperet sanguinem specificantem: sanguis enim non potest transire in instanti vsque ad vngues, tamen omnes philosophi & Medici inquirunt, quod vno & eodem tempore omnes pulsant & extenduntur. Sexta ratio sit, si fieret ab ebullitione sanguinis contecti sequeretur, cum ebullitio sit causa immediata huius motus, quod in maiori ebullitione esset maior eleuatio & e contra: at consequens falsum est, quod in maximis ebullitionibus sit maior dilatio, sicut patet in febribus pestilentibus, vbi adest ingens ardor linguae sitisque intolerabilis, ac maxima est ebullitio, tamen dilatio arteriarum est maxime parua, ergo non sit pulsus ab ebullitione sanguinis.

Septima ratio sit ex Galeni libro septimo de adm. anat. capite sedecimo, si etiam accipiamus ac detegamus arteriam ac ligemus & infra deligationem scindamus per longum, imponam usque fistulam, quæ lateat in ipsa, deinde auferamus vinculum, & ligemus arteriam supra fistulam ne exeat, non est dubium, quod per fistulam mediâ recurreret sanguis per canalem fistulæ: Ergo si à sanguine fluente fieret pulsatio, ergo per partes inferiores ab ipsa fistula deberent pulsare, & tamen non pulsant, ergo non sit à sanguine ipsa extensio.

Octauo addatis, quod si ab ebullitione fieret talis dilatio, sequeretur quod aut nunquam fieret systole, aut saltem nunquam fieret in calido aere. Suppono enim quod diastole fiat à sanguinis feruore, ergo semper extensa arteria manebit, quia sanguis bulliens non refrigerabitur vnquam, ergo nunquam concidet arteria: nec potes dicere aerem attrahit sanguinem refrigerare, quia aer attrahitur ratione vacui, quod non conceditur ab ebulliente sanguine, quia non dabitur vacuum, vt ingrediatur aer in illa extensione, cum semper eadem maneat moles sanguinis: ergo &c. Vel saltem sequeretur, quod in hypocausto vel in aere calido arteria non parieret systolen, non fiet contractio, quia etiam si attraheretur aer calidus, non refrigeraret sanguinem, quod non apparet: ergo &c.

Nono si sanguis transmissus faceret pulsus, sequeretur, quod venæ deberent pulsare: nam in anatome viuorum colligimus, quod quando contrahitur dexter ventriculus cordis, regurgitat multus sanguis in auriculam venæ cavae, & quando dilatur, multus

An arteria
fibarent
fibræ re-
ctæ, moueri
possent.

Centus Gal-
enorum

Cur interna
tunica arte-
riarum &c
transmittit
faciat ad
motum, ex-
terna vero
ad receptio-
nem.

sanguis regurgitat in cor, ergo venæ deberent pulsare: sed non pulsant venæ: Ergo &c. Isti respondent, quod non pulsant, quia venæ substantia est inepta ad motum: At contra hoc sic argui: vel est inepta ad motum per accidens vel per se: si per accidens, hoc est falsissimum, quoniam est mollissima, imo effluente sanguine concidit: Ergo non est inepta ad motum per accidens, ergo erit inepta ad motum per se, quod negabat: Ergo arteria est apta ad motum per se, ergo habet in se causam motus.

Ultimo nisi moueretur ex se ac à virtute intima, sequeretur aut quod nunquam foret systole, aut quod isti duo motus contrarii fierent à duabus causis: nā demus, quod transfluente sanguine dilaretur arteria, ergo contrahatur arteria recurrēte sanguine, quia sua substantia rigida est & semper aperta manet; ergo systole non fiet: sed fit: ergo ab aliqua virtute infusa.

De responsionibus ad rationes in oppositum per Erasistratum & Trusianum traditæ. CAP. XVI.

AD rationes autem istorum, scilicet Erasistrati & Trusiani respondeamus: Prima erat, quod non erat voluntarius nec naturalis ab elemento prædominante: dico ergo quod fit à virtute naturali vitali, distincta tamen à virtute simplici naturæ aliquare venæ: ideo non pulsant. Ad secundam de timoribus verum est quod in affectionibus animi concidit pulsus, dico tamen sanguinem causam non esse motus istius, sed quod recurrētē sanguine tunc currunt etiam spiritus, quibus recurrentibus, qui sunt instrumenta, cadit facultas, quia privatur proprio instrumento. Ad tertiam dico, quod vinculum est in causa ut partes inferiores non pulseat, non quia desit sanguis, quoniam adest sanguis salubris, & apertæ & videbunt eum; sed causa est, quia per vinculum constringitur exterior tunica & impeditur transfluxus virtutis ipsius. Ad ultimum de sanguine egrediente sciatis, quod sanguis semper exit, tamen dum dilatatur, vehementius exit & salit, quia vulnus magis dilatat: Exit autem sanguis per saltum propter motum arteriæ, qui impedit continuum motum, cum vero contrahitur arteria, egreditur in minori copia, quia partes vulneris magis uniuntur. Impeditur ipsa systole, ut continuus non sit fluxus, quare dilatatio non est causa ipsius saltus, quoniam ipsa systole; quinimo per dilatationē fluere sanguis per continuum ductum. Ex his ergo colligamus sanguinem non esse causam pulsus: Sed notandum est, quod Medici in hac concordēs non sunt: aliqui enim volunt hanc facultatem intimam, ut Praxagoras & Philotimus, ut refert Gal. lib. 6. de placit. cap. 7. & lib. 4. de differ. puls. cap. 10. qui volebant esse connatam ipsi arteriæ, ipsamque in illo agere: Nam dicunt, quod arteriæ pulsant, antequam cor sit confectum vel ipsum hepar & hoc non est, nisi à semine, quod quidem pulsant, ut Hippocrates ait lib. de nat. pueri, spiritus enim fuliginosus & calidus coniungitur in semine & ipsa contractione attrahitur aer frigidior. Secundo ex anatomie probant isti, quia si detegamus arteriam in vivo animali, statim refrigerata amittit motum, & hoc patet in ipsis membranis cerebri, quæ pulsant ratione arteriarum, si aliquantisper refrigerentur, amplius non pulsant; ergo est quid insitum arteriæ quod faciat motum. Tertio si arteria non haberet hanc facultatem insitam, sequeretur, quod partes prope cor validius pulsarent, quam remotiores partes: nam illæ prius recipiunt facultatem transmissam à corde: nam omnes anatomici dicunt, quod nervi propinqui cerebro habent exquisitiorem sensum, quam propinqui ipsi medullæ spinali; & hoc non est, nisi quia sunt propinquiorens ipsi membro, à quo fluit ipsa facultas. Quarto sequeretur, quod partes sinistræ corporis validius pulsarent, quā arteriæ partis dextræ, quia facilior est communicatio ipsius facultatis à sinistro corde, quod tamen est falsum, Ergo non à corde habent facultatem hanc. Ultimo, si nos accipiamus vivum animal & amputemus partem alicuius membri, videbimus, quod pars illa palpitat, & etiam pulsat, ergo non à facultate transmissa, quia iam resecta est: & in arteriis hoc est ingenitum & aliquod non est transmissum. Galenus tamen hoc non vult, nec Herophilus nec Hippocrates, sed quod facultas redundet ab ipso corde. Nam si hos videmus, quod ad varium motum cordis variatur motus arteriarum: nam formicante corde formicans est arteria, languido existente corde, languida existit arteria, signum est quod cor communicat pulsus suum arteriis; Ergo una & eadē causa facit ambas pulsationes; ergo vel in corde ponenda est, vel in arteriis, vel in utroque: sed non in utroque, quia substantia arteriarum visibilis toto celo distincta est à substantia cordis: Ergo potentia hæc & facultas, si conformitatem habet cum uno, differt ab alio, ergo non potest esse in utroque. ergo vel in corde vel in arteriis tantum: non in arteriis tantum, quia consonum non videtur, quod ab arteriis facultas hæc cordi communicetur: ergo necessario

Dubium an facultas motrix à corde emanet in arterias. Praxagora & Philotimus.

Quæstio: Si potest, Galenus & Herophilus.

factio dicendum est facultatem esse insitam in corde & in forma cordis, communicetur autem à corde per spiritus. Præterea si nullum aliud esset signum, ad hoc esset illud assumptum in tunicis, quod tunica vna est interna & habet fibras motus, pariter exterior habet meatus rectos, per quos transfundenda est facultas, aliter nullus esset vsus illarum fibrarum, quia fibræ illæ rectæ non faciunt ad contractionem & dilationem, neque faciunt ad stabilem texturam, quoniam etiam aliæ adessent, & nullus alius datur vsus; ergo faciunt ob transmissionem aliquam: quæro quid sit illud, quod transmittitur? si non est facultas ista, nihil aliud potest transmitti: ergo &c. Tercio si facultas hæc in arteriis esset insita & ingenita, & non aliud emanans, sequeretur, quod in arteriis inflammatis deberet variare pulsus in frequentia etiam, non solum in magnitudine, quia huiusmodi facultas, si est insita, insita est in forma arteriæ, quæ est ipsa temperatura: at in inflammationibus temperatura patitur, ergo & facultas, vnde minor fiet pulsus & rarior, sed hoc non fit in inflammatione; Ergo arteria habet facultatem hanc à corde.

Quarto si arteriam vinculo intercipiamus, pars inferior non pulsât, quia facultas & spiritus non possunt ad eam transmitti: Ergo si haberet insitam facultatem vinculum, non impediret pulsationem.

Quinto nullum argumentum aliud est, quod magis probet, quam argumentum de fistula Galenica: imposita fistula si non ligetur arteria, pulsans inferiores partes, licet partes tæxiæ à fistula non pulsent: sed si ligetis ac comprimatis tunicam externam, partes inferiores amplius non pulsabunt: ergo &c.

Dicimus ergo quod arteria per se mouetur & non per accidens neque ad motum alterius sed per se, ratione alicuius facultatis insitæ in ipsis arteriis, non tamen connatæ sed transfluentis aliunde, sicut diximus, quod museulus mouet seipsum assumpta aliunde facultate ipsa videlicet à cerebro: hæc ergo fuit mens Hippocratis, Galeni & Herophili: & huius etiam sententiæ videtur esse Aristoteles, loc. cit. quando inquit, quod venæ pulsant, quia à corde est vis: licet aliter videatur dicere, ut isti hunc traxere.

Superest ut soluamus argumenta Praxagoræ & Philotimi, quorum primū erat, quod arteriæ pulsant, antequam sit cor, ex semine pulsante, dum retinet spiritum fuliginosum & attrahit aerem frigidiores, ergo non ab eo habent hanc vim: dico quod cōcedo, quod arteria pulset antequam sit cor, sed pulsât per facultatem communicatam ab arteriis veri atque corii & secundinæ, quæ coniunguntur cū arteriis foris. De pulsatione autem seminis non est ut simus solliciti, quoniam auctoritas illa Hippocratis certe hoc non concludit, nec possumus vere, quod semē pulset, sed demus nos quod pulset, ego quæro, quod pariter venæ & ossa non pulsant, quæro ego rationē diuersitatis, quare etiā partes aliæ factæ ex semine non pulsant: argumentum ergo nullum est.

Secundum erat argumentum, si detegamus arteriam, statim amittit motum, ergo habet facultatem insitam, dico quod idem dico de corde, in quo si non esset calor, non moueretur, non, quod fiat motus à calore, sed à facultate: sed requiritur calor actualis in corde ut conseruetur, idem est dicendum etiam in arteria, quia per calorem redditur corpus arteriæ aptum ad recipiendam facultatem, sicut per lumen corpus lucidum recipit species ipsas, & ideo cum facultas dependeat à corde sicut lumen à sole: hinc ergo fit quod deficiente calore actuali corpus arteriæ non est aptum recipere facultatem defluentem ab ipso corde, quare argumentum non concludit. Tercium argumentum erat de vehementia pulsus in vicinis partibus & remotis: dico quod in his actibus spiritibus fit sicut in illuminatione, in qua vsque ad certum terminum cognoscitur nulla differentia luminis, neque vna pars magis alia illuminatur: at si longissimum sit spatium, varietas cognoscitur; idem dico de arteriis, quod cor transfundit facultatem, non ita tamen, ut debeat apparere aliqua diuersitas: facultas ergo eadem omnibus arteriis æqualiter communicatur, quia omnes sunt positæ ad certum spatium respectu cordis, ut non possit apparere aliqua diuersitas, aliter dico, quod nolo facultatem intensiorem communicari propinrioribus arteriis, tamen quia maius est corpus arteriæ prope cor & ad mouendum maius quantum maior requiritur virtus, ideo dico quod arteriæ æqualiter pulsant, non tamen est eadem facultas in intensione, quia illud fit idem à leuissima virtute in minimo corpore, quod fit ab intensissima in maximo corpore. Ad quartum argumentum de dextro & sinistro, videretur quod in sinistra parte deberet esse maior pulsus propter rectitudinem: tamen dextræ arteriæ vehementius pulsant. dico quod omnes arteriæ sunt sinistræ, quia oriuntur à parte sinistra cordis, diffunduntur tamen per dextram partem: nec iuxta rectitudo in hoc: validius autem pulsant dextræ arteriæ, quia dixi, quod calor in actu est ille, qui fa-

cit arteriam aptam ad recipiendam facultatem; unde si magis calidum fuerit corpus, dummodo non recedat à commensurata caliditate per consequens erit magis aptum ad recipiendam facultatem; partes autem dextræ sunt calidiores veluti omnes philosophi & Medici consentiunt. Ergo &c. Ad illud, quod sit maior facultas circa caput arteriæ aortæ, non est, vt laborem, quia concedo; sed addatis, quod nervi ascribitur magis exquisitis sensibus, non solum ratione propinquitatis, sed etiam ratione substantiæ: nam nervi à cerebro sunt molliores, quam nervi à spinali medulla. Alia erat ratio de palpitacione, dico quod non est pulsatio, sed palpitatio fit, quia vapores calidi secundo, quia contrahuntur partes nervosæ, quare motus ille non est motus arteriarum, quia motus palpitacionis inordinatus est & fit ratione vaporum, licet constituatur ex dilatatione & constrictione, quare facultas infusa est per participationem & non per essentiam in arteriis. Quærendum deinde est, an arteriæ simul cum corde moveantur, an se dilatante corde dilatentur arteriæ; pariter è conuerso, si contrahantur. Omnes fere vsque ad nostra tempora, & Conciliator & Iacobus & alii dixerunt, q. constricção vnius corresponderet dilatationi alterius & vice versa, id est, quod dilatato corde constringantur arteriæ; & dum constringitur cor, dilatentur arteriæ & infinita argumenta & varia isti pro sua opinione proponunt; ego autem tres rationes tantum in medium afferam, quæ videntur aliquid facere; quarum prima est, quod nisi hoc esset, cum suppositum sit, cor attrahere unde quæque æteri, sequeretur, quod nihil attraheret; quia si dum dilatatur arteria, dilatatur & cor, & quia dum dilatatur arteria, patitur vacuum; pariter dum dilatatur cor, patitur vacuum; ergo non posset attrahere ab arteria aliud liquidum frigidum: & contra, si dum contrahitur siue constringitur arteria, dilatatur cor, proculdubio ratione vacui attrahet cor ab arteriis. Secunda ratio est, quod in principio arteriæ sunt illæ tres membranz claudendum orificium, tunc sequeretur, quod illæ membranz essent frustra factæ & inuiles, nisi constricção arteria dilatetur cor; quia si constricção arteria constringitur cor, non esset periculum, sanguinem regurgitare in cor, quia iam constricção cor est; ergo illæ membranz inuiles essent. Tercio dicunt, quod sensu ipso percipimus, quod constricção corde dilatantur arteriæ, si ponamus manum ad thoracem & ad carpum. nam sentimus cordis percussione, quæ est dilatatio. Alias autem rationes in illis facio, quia leues & vanæ sunt.

Opinio Galeni.

At Galenus aliter opinatur, quod simul scilicet & semel ambo constringerentur & dilatarentur bene affecto animali, cum vna & eadem sit facultas, & nos possumus hoc probare, primo quia omnes arteriæ simul & æqualiter pulsant, ergo idem dicendum est de corde, quia idem eo tempore fit in corde ab eadem facultate ingenua: accipietis autem hanc sententiam à Galen. lib. 3. de præfag. ex puls. cap. 3. & in lib. de vf. puls. cap. 1. & in li. de puls. ad tyr. capit. 1. cum eadem sit facultas semper; ergo vno & eodem tempore in omnibus operatur.

Ido oppositum.

Ad primam rationem dico quod cor attrahat, quia maior est necessitas refrigerandi cor, & per consequens in corde maius est vacuum, unde magis attrahit quam minus vacuum, & ita arteriæ de necessitate trahunt aliquem aerem propter vsum cordis, & quia aliquid trahunt, ideo illæ membranz non sunt inuiles vt concludit. Ad secundum argumentum dicatis illas membranas esse constitutas, ne id, quod est crassum, ingrediatur in cor: retinent enim sanguinem crassum non autem vaporem tenuem: & ita soluitur secundum argumentum. Secundo dicitur, quod licet non inseruiunt eo tempore, inseruiunt tamen quando in affectibus præter naturam animalibus dilatatur vniui & alterum constringitur. Ad tertium de sensu, domini, decipiuntur, nam cum cor percutit, dilatatur, non autem constringitur, vt credebant isti; dico ergo, quod in thorace est fragor factus ratione insultus ipsius cordis: at dices, quod hoc non possumus videre: vos ex Gall. lib. 7. de adm. anat. capit. 14. percipietis præcipue in anatome videtur animalium, unde sensus potius pro nobis facit. Colligatis ergo arteriam moueri à semet ipsa per facultatem, quam habet à corde, quæ fouetur in corde per calorem actualem, non est tamen ingenua nec connata, sed transfunditur à ista facultas à corde per meatus rectos exterioris tunicz, superest vt videamus, quæ nam sit materia arteriarum.

Collectio dissertationum.

Materia generatur arteriarum.

Materia ex qua aluntur, Contradictio Galeni circa eam.

Materia arteriarum proculdubio est seminalis, licet Gall. lib. 1. de nat. fac. cap. 3. videatur asserere fieri ex sanguine, tamen loquebatur ad hominem, quia lib. 1. de fem. cap. 5. & alibi asserit quod à calore concoquente & à spiritu formate ex semine fiant, calor enim concoquit spiritusque vltro citroque fluit & perforat. Materia autem, ex qua aluntur, ea est, quæ alit nervum & cartilagine ipsam, vt diximus, quo ad temperaturam arteria est frigida & sicca. nam in lib. 1. de temper. cap. 3. dixit esse frigidior & siccior ipsa cute, sed oritur difficultas: nam Gall. lib. 1. de temperam. cap. 3. dicit multas partes esse calidiores arteriæ, sed in lib.

in lib. 8. de vs. part. cap. 2. inquit, quod arteria sit calidior omnibus partibus in corpore humano: quare est contradictio in ipso Galeno, quæ sic tollitur quod scilicet in lib. de temperam. loquitur de caliditate temperaturæ, in li. autem de vs. part. de caliditate actuali, nã hoc modo excepto corde nulla pars est calidior.

Vfus arteriarum primus erat, vt ministrarent cordi ad deferendum spiritum & facultatem vitalem secundus, vt tuerentur calorem in situ, quia attrahunt aerem frigiditatem & excitant calorem suo motu & expellunt fuliginem, & hic est potissimus vsus.

Vltimus vsus est, vt faciant ad conformationem aliquam partium, vt ad plexum retiformem, qui fit ab ipsa arteria, qui manifestissime est in brutis. Præterea plexus choroideus in ventriculis cerebri conformatur ex arteriis.

Passiones autem sunt, vt primo sit exanguis arteriæ substantia, & hinc colligaris, quod est attrahant sanguinẽ à partibus ipsiis, quod attrahunt per cavitatem & non per substantiam: pariter colligaris venam attrahere sanguinem ab epate per suam cavitatem & nõ per propriam substantiam. Secunda passio est, vt sit candida naturaliter, quia ex semine & exanguis est. Tertia vt sit teres, oblonga excauataque, constans ex crassa tunica & non crassissima, vt libro sexto de vs. part. capit. 16. Quarta, quod sensu priuata sit ex lib. 16. de vs. partiu, capitulo secundo & duodecimo. at dices quod Galen. lib. 2. de loc. affe. & capit. 3. & 8. & in lib. de tumor. cap. 8. dicit quod arteriæ dolent, tollatis autem vos contradictionem hanc sicut ego sustuli de vena, dicendo, quod loquebatur de sensu qui per triplicem viam à membrana vestiente arterias. Vltima passio est, quod dissecta vel comminuta non coalescit nec potest restituui, ex lib. 1. de fem. cap. 11. neque agglutinari, primo quia est ex semine, quia cum tarde hoc deberet fieri, supercrefcit caro, tertio quia continuo est in motu. At notandum est, quod Gall. lib. 1. meth. med. cap. 7. testatur se vidisse arterias & venas restitutas, sed loquitur ibi de ætate puerili, in qua (ante septimum annum saltem) possunt agglutinari in illo iuvene, quem eo in loco Galenus proponit, non fuit vera agglutinatio, sed fuit coalitus per mediam succrescentem carunculam. Et sic soluetis difficultatem illam. Et hucusq; de arteriis.

De Vnguib.

CAP. XVII.

Habemus geminas voces multum inter se similes, quæ sunt vnguis & vngula, quæ apud Græcos dicuntur *ὄνυξ* & *ὄνυξ*, quæ voces ita in ipso respondet vt in Græcis & apud nos vnguis idem sit, *ὄνυξ* vero græce apud nos vngula dicitur illud extremum durum, atque quasi corneum cum fuerit integrum at si bisulcum sit, vt in extremis animalium pedibus vngula dicitur. Illud vero durum, quo extremi digiti armantur & pedes animalium distincti in digitos, vnguis dicitur, de qua nos tractamus, quia connumeratur inter partes similes, quamuis aliqui hoc negarent: nam quædam est opinio apud omnes fere Medicos, dicentes vngues non esse corporis partem, & hoc tenent fere omnes recentiores, veluti conellator Hugo Senensis, Trusianus & omnes fere recentiores, quos vidi, & vltimus omnium fuit Fernellius, qui tueretur hanc sententiam multis rationibus: falsa tamen est cõfessio: nam ego teneo, nõ solum vngues esse corporis humani particulas & necessarias, sed etiam optimam præstare vsum, licet hoc paradoxum videatur, tamen verum est.

Rationes autem, quibus mouentur viri isti, plures sunt atque variz, & inter alias prima, quod vngues non nutriuntur, ergo non sunt partes corporis: probatur consequentia, quia non viuunt: viuendum enim proprium est ali, quo stante per consequens non sunt partes corporis viuents. Quod vero non alantur, patet, quia cum quid alitur aut conseruatur aut crescit, vt dicit Aristoteles lib. 2. de gen. animal. cap. 4. alimentum enim aut dat esse & conseruat, aut incrementum præbet per omnẽ positionem. Alimentum igitur, inquit Aristoteles duplex est, vel augens vel conseruans: hoc non accidit vnguib, quia si auferatur vngues, solũ per longum conseruantur & crescant, non autem secundũ crassitiẽ & latitudinẽ, sicut fit in his, qui vere crescant & conseruantur per nutrimentũ. Secundo probatur, si enim Aristoteles loc. citat. & aliis infinitis dicit, quod corpus humanum habeat statum, incrementum, id est, cum peruenit ad certum ætatis statum, ibi conseruatur, non crescit autem corpus animalium, quia eius particule, cum perueniant ad certum tempus, amplius non crescant, sed conseruantur, quod non fit in plantis, quæ quo vsq; viuunt, semper tam earũ crescant, hoc vero nõ est in animalibus, præipue in homine, quia particule semper non crescant, quæ componunt corpus ipsum: hoc itante, ergo quia vngues perpetuo crescant, & non habent statũ & determinatũ incrementũ, ideo corporis partes non sunt. Tertiõ si vnguis esset pars corporis, sequeretur, quod cum omnes partes crescerent & ipsi cres-

scelerent, & cum alie decreverent & ipsi vngues decreverent, contingit quod decreverit
 tibus omnibus partibus corporis magis augmentur vngues: hoc patet in senio, in quo corpus
 humanum deficit, & decrefcit, & tamen tunc temporis magis crescunt vngues. hoc patet
 etiam in marafmo, in quo ceteræ partes comminuuntur, ergo non sunt partes. Quarto vna
 gues crescunt mortuo corpore animalis: ergo non sunt partes corporis viventis: antecede
 patet ex multis experientis, ergo non sunt partes. Vltimo dicit Auicenna fen. 1. lib. 1. doct.
 5. cap. de membris, quod membrum est illud, quod fit ex prima commixtione humorum:
 at vngues non sunt ex prima humorum commixtione, ergo non possunt esse partes: mino
 rem probat ex Aristotele lib. 2. de gen. anim. cap. 4. vbi dicit, quod ab excremento nutritio
 nis & augmenti sunt ipsi vngues, pili, cornua & similes partes: ergo & c. patet etiam hoc ex
 sententia quorundam antiquorum, quos proponit Gal. lib. 1. de adm. anar. cap. vlt. qui di
 xerunt, vngues gigni & constare ex nervo, osse & cute, aliqui addere carnem, aliqui liga
 mentum. & hanc sententiam videtur laudare Vesalius lib. 1. de ossib. capit. 14. quod admi
 ror: quo stante ergo non sunt ex prima humorum commixtione. Postea addit duas aucto
 ritates, quarum prima est illa celebris in lib. art. med. capit. 9. vbi Galenus dividit partes in
 quatuor genera, & asserit quod vngues & pili non habeant regimen à seipsis, sed tantum
 generationis: ideo non connumerant vngues inter partes corporis, ex quo loco omnes
 præter Haly eliciunt hanc sententiam, vngues scilicet non esse partes. Alia auctoritas est ipsius
 Auicennæ, loc. cit. vbi ex proposito enumerans omnes corporis partes ac corpus compo
 nentes, non enumerat vngues. Tamen his non obstantibus ego oppositum teneo & credo
 esse partes corporis animalis, & primum mouer à definitione partis, quia cui competit de
 finitio partis, eidem competit etiam definitum: at apud Galenum reperio duplicem defi
 nitionem partis, alteram, in lib. 1. de vs. part. capite primo, alteram vero lib. 1. meth. meden.
 cap. 5. nam lib. de vs. part. c. 1. habetur, quod particula corporis est illa substantia consistens,
 quæ habet propriam descriptionem, atque ita coniuncta est corpori, ut possint indicari ter
 mini illius. ar nemo negabit vngues hanc definitionem habere: coniuncti enim sunt cor
 pori humano, ut pedibus ipsis, & habent propriam descriptionem: ergo & c. Secunda defi
 nitio erat, quod quicquid complet corpus & ipsum integrat, illud pars est, at in lib. primo,
 de vs. part. cap. 6. & aliis sequentibus capitibus inquit, quod vngues sint partes corporis
 integrantes digitos & pedes, aliter non essent veri digiti & perfecti: digiti enim imperfecti
 sunt sine vnguibus: ergo sunt partes corporis. Secunda ratio est, quia video vngues habere
 vitam & sensum, quia isti negabant: ergo sunt partes corporis viventis. Probo, quod viuunt, ex Ga
 leno, nam in lib. 2. de adm. anar. cap. vlt. inquit, quod vngues habent nervos, arterias & ven
 as, quæ ad ipsos perueniunt ob sensum, vitam, & nutritionem. Idem Hipp. testatur etiam
 in lib. de nat. hum. Si ergo habent instrumenta ipsius vite, ergo viuunt. Quod habeant sen
 sum, apud me non est dubium, & in hoc miror omnes fere anatomicos & etiam Vesalius,
 qui dicunt vngues destitutos esse sensu: Galenus autem asserit adesse sensum, quod nega
 bat etiam Montanus prima primi c. 2. de complexionibus, quo in loco plurimi sunt erro
 res, quorum primus est, quia citat Galenum lib. 1. de administ. anar. & est liber 2. Secundus
 error est, quod dicit Galenum obicere, his: qui dicebant secundum antiquos esse cõ
 merandos inter partes organicas: tertius quia citat Galenum in lib. 2. de temper. dicentem, quod
 vngues sunt per vltiorem exiccationem ligamentorum, quod falsum est: Quarto quia dicit,
 vngues destitutos esse sensu: quare credo, non fuisse hanc sententiam illius clarissimi viri:
 & hoc dixi ut caute legaris eius scripta. Sed quicquid sit, dico quod vngues habeant sensum, &
 adest experientia, ut enim habent sensum ipsi dentes, quia ad extremum eorum perueniunt
 nervuli, ita & vngues, quia ad eorum radices finiunt nervi. Ergo & c.

Tertio ego moueor, quia video vngues nutriri ut ceteras partes corporis, & video hoc
 fieri duabus rationibus: primo quia vngues crescunt ad omnem positionem vsque ad ætatem
 viginti quinque annorum, qui terminus est omnium partium. Et hæc est veritas, neque dubitan
 dum: quicquid enim in seipso obferuare potest, nam vsque ad hoc tempus crescut vngues in om
 nem positionem, & quamvis terminetur incrementum per profundum & per latum, & hoc cõ
 mune est augmentum cum aliis partibus corporis: sed præter hoc augmentum, quod cessat &
 factum est, ratione totius corporis, est aliud augmentum factum ratione vnguium, quia
 absumuntur, & deteritur continuo, substantia eorum: ideo necessarium fuit augmentum hoc
 per longum, quoniam diminuantur & absumuntur: & quod verum sit, conspiciatis hoc idem
 in dentibus, qui vsque ad vigesimum quintum annum crescunt ad omnes positiones, quia tunc
 crescut ratione totius corporis, post illud autem tempus dentes non sunt neque latiores neque pro
 fundiores, sed longiores tantum am crescunt dentes tantum ad longitudinem, quoniam cum
 continuo ac continuo comminuat eorum substantia ac atteratur, inde continuo accipiunt
 incre-

Opinio affir
 mativa.

Errores plu
 rimi Mont
 anæ.

incrementum, quod patet, si quis exerat dentem, quod dens oppositus sit adeo longus, ut totum spatium cauum impleat, quoniam non atteritur ab opposito suo, ut solebat. eādem causam dico esse augmenti vnguium.

Moueor etiam alia ratione, quoniam video vngues esse inter illa, quæ intenduntur à natura in generatione animalis, & perpetuo conseruari vsq; in extremum diem, & primo adest experientia, quia in formatione fœtus post 42. dies adest formatus vnguis, & in lib. de nat. fœtus inquit Hipp. quod in prima formatione fœtus formantur etiam vngues; non ergo casu sunt vngues, sed sunt partes. Vltimo vnguium dantur morbi proprii ac peculiare, & connumerantur vngues affecti inter locos affectos & particulas affectas; nam particulas Medici locos appellant, & proponunt infinita medicamenta ad vngues affectos, ergo sunt partes corporis. Sed addatis auctoritatem Aristotelis in lib. de partib. animal. in infinitis in locis, vbi semper appellat vngues partes corporis animalis, & lib. 2. de gener. anim. loc. cit. & Hipp. in lib. de nat. fœtus idem testatur, Galenus etiam in lib. 1. de vs. part. Et multis aliis in locis & præcipue in lib. de inæquali intemperie cap. 2. Auerthoes etiam lib. 1. collect. c. 2. & 13. idem testatur, ut alios autores multos omittam. His itaq; moueor rationibus ut credam vngues esse partes corporis animalis, quamuis sciam hoc esse paradoxum, tamen sententiam meam proposui & addo esse partes corporis, non tamen nobiles, sed potius cæteris partibus ignobiliores.

Quomodo ad argumenta in oppositum allata sit respondendum, item quæ sit vnguium natura, definitio, causa efficiens, materia, nutrimentum, semperies, usus & passionēs. CAP. XVIII.

Cum autem rationi consentaneum sit, ut tollamus argumenta aduersaria, quorum primum erat, quod non nutriuntur, dicatis & negetis vos, quod non nutriantur & quod non viuunt, quia continuo crescunt ad omnem dimensionem vsq; ad 25. annu: sed incrementum hoc intelligendum est circa partem mollem & circa eius radicem. Nec faciat vobis difficultatem Galenus lib. 2. de anat. adm. cap. 11. & lib. 1. de vs. part. cap. 11. vbi dicit, quod non crescunt ad omnem dimensionem: non enim Galenus illis in locis loquitur de illo incremento vsq; ad 25. annum, quod sit ratione vniuersi corporis, sed loquitur de incremento necessario vnguibus ratione ipsorum propter eorum vium, ut suis vibus inservire possint, ideo dixit in longum tantum crescere: tamen non negat, (Galenus) quin vsq; ad 25. annum pro conformatione vniuersi vngues habeant incrementum ad omnem positionem, namq; illud idem possemus dicere de dentibus, qui post 25. annum tantum crescunt per longum.

Sed vnum notandum est, quod non videtur vera nutritio vnguium, cum fiat tantum circa radices aliqua additio, quia verum incrementum esset, ut in tota substantia adderetur aliquid, quate potius dicenda esset iuxta positio. Ego autem appello vngues augeri, ad veram nutritionem vnguis, sicut alix partes, nam circa radices tantum non est aliud quod addatur, sed tota substantia attrahit & concoquit & alterat in naturam suam, sed quia determinatum est incrementum in latitudine & profunditate, ideo tota nutritio & incrementum procedit in longum, sicut in quibus circa radices additur aliquid de dentem expellens in longum: & tamen dentes vere nutriuntur, ut omnes fatentur & vident. Ad secundum argumentum, quod erat quod vngues perpetuo crescant, & propterea non possint esse partes; iam dixi, quod in vnguibus & dentibus duplex est incrementum, vnum ratione vniuersi, & hoc statutum & determinatum est in dentibus & vnguibus ratione latitudinis & crassitie, augmentum autem in longum non terminatur, sed semper durat propter necessitatem & vsum ipsorum vnguium: Facti enim sunt ad scilpendum, qui cum comminuuntur & atterantur, necessum erat, ut restituerentur; & nisi hoc esset, illud idem dicendum esset de dentibus, quate neque hoc argumentum facit aliquid.

Ad tertium, quod alix partes decrescant decrescantibus aliis partibus, vngues autem nunquam diminuuntur, dico quod si valeret argumentum illud, idem dicendum esset de dentibus & de omnibus ossibus: nam in senio omnes partes minuuntur & decrescunt, tamen neq; ossa neq; dentes decrescunt, ergo non essent partes corporis, quod nemo vnquam dixit, quate augmentum nullum est, neq; vlla potest assignari ratio diuersitatis. Ossa autem in senio videntur augeri potius, sicut enim cranei obliterantur & cartilagine ossæ fiunt. Sed dicet isti, quod eo tempore vngues magis crescunt, quam aliis temporibus: credo quod in senio magis videantur crescere quam vere crescant, quia iuniores eos comminuunt & atterunt suis continuis operationibus, quod non faciunt senes, qui cum non laborerent iuvenes, pars

extrema vngnium non ita absumitur, vnde videtur magis crescere vngues. Quare non sum certus de hoc, an scum videamus productiores vngues in senib. illud fiat, quia magis crescant, an quia videantur crescere, quod quidem apparet in dentibus seniorum, qui cum sint prudentiores, non atterunt corpora duriora, vnde eorum dentes non atteruntur; id dico de vnguibus. Sed demus, quod magis crescant, tamen id non sequitur, quod dicunt, quod non sint partes, quia dicerem, quod crescunt, quia eo tempore proprium quibundam alimentum, pariter non praeciduntur, quoniam proritur morbus, idem dico de marafmo. videntur enim magis crescere, quia partes consumuntur & vngues videntur produci, quia in ægritudinibus crescunt vngues, quia non atteruntur, & raro etiam absceduntur. Ad quartum, quod vngues crescunt mortuo animali, nescio quis fuerit admodum diligens, qui viderit eo tempore productiores vngues, quia vere non crescunt, sed quia molliores partes exiccantur & contrahuntur, ideo q. durū est, magis productū apparet: ergo &c.

Ad vltimū quod erat, particula corporis ex Auic. fit ex cōmixtione humorū, sicut pabam, ergo &c. dicimus esse falsum, quod vngues constent ex tot partibus, vt dicunt: & hanc sententiā confirmat Gal. loco ab ipsis citato, cum non videā ego quomodo ex pluribus corporib. opacis simul mixtis possit fieri diaphanum, diaphanum enim vnguis est. Secundo cum non videā aliquam partem corporis, quæ habeat neruum in substantia habere sensum per consensum & per accidēs, at vnguis habet sensum per consensum & per accidens, quare non habet facultatē, qua sentiat omnes species sensibiles, tangibiles sicut dentes sentiunt per cōsensum, quia habent partibus sentientibus per se, exempli gratia, dentes percipiunt caliditatem & frigiditatem, tamen non percipiunt duritiem & molliem neq. solutā continuatam, quia non habent facultatē qua percipiant per se ista sensibilia, quia species duri & molli non ita tam communicantur parti, in qua est vis ipsa sentiens, quia species caliditatis & frigiditatis sunt magis spirituosæ, vnde facilius permeant vsq. ad principiū sentiens, vnde dentes videntur sentire per accidens. Quod si haberent neruulum admixtum, fieret sensatio per se, quare cum ipse vnguis tantum pariat a frigido & calido, & non à duro vel molli, ideo sentit per accidens & per consensum: sequitur ergo, quod in substantia sua non habeat neruum, sicuti illi dicebant. Ad Arist. vero, ex quo probabant vngues non fieri ex prima illa cōmixtione humorū, sed ab excremento nutritionis & augmenti partiu, per excrementū Arist. illo in loco intelligit partem crassiorem, non autem verum excrementum, & quod verū sit, statim subdit, quod ex tali excremento sunt ossa, i.e. ex parte treftriori & crassiori ipsorū humorū, vt in ossū tractatione audiuitis. Ad auctoritatē autē Gal. quæ ita grauis est, vt scum traxerit omnes, quos dixi, ad hanc sententiā, tamen non videtur nos posse elicere ex eo loco, non esse partes. Credo igitur in eo loco Gal. securum fuisse ipsum sensum, & hac ratione separasse à partibus vngues & pilos. Nam cum durissimi & siccissimi sint, ideo non apparet, quod nutrantur, sicut alie nutriuntur partes. Cum ergo partes diuisisset in principales & earū instrumenta & in partes eas, quæ se regunt, & in eas, quæ de vtriusq. participant, quæ omnes partes habent in se regimen & continent seu cōseruant seipsas, statim subdit pilos & vngues, quas partes ipse non proposuisset, nisi opinatus fuisset esse partes, partes tamen non habentes in se regimen: Cum .n. proposuisset partes, quæ habent regimen à seipsis ad sensum, subiungit quod pilos & vngues non habent regimen ad sensum: quare ibi non separat vngues & pilos simpliciter à partib. corporis, sed ab illis partibus habentib. regimen ad sensum, quæ sunt vngues & pilos. Tamē posset dubitari de pinguedine, an habeat regimen. & ego habeo plura argumenta & auctoritates, præcipue cōgeneratio pinguedinis fit per accidens. Ad auctoritatē Auic. qui dimiserit vngues, dico, q. ipse fecit mentionē tantum principaliū partiu, & quod verū sit, dimisit magnitudinē, quam pponit Gal. quare dimisit, tanquā non essent exquisitæ partes & eius ordinis, cuius sunt ceteræ partes, quare Auic. de partibus minoris momenti non fuit sollicitus. sed non quod partes corporis non essent. Hoc stante, cum colligā vngues esse partes, ignobiles tamen, corporis humani, sciatis totā earum naturā consistere, vt sint particula non valde cōmunis, similis quidē, non tamē primi generis, cornea veluti substantia cōsistens, q. extremos animalium digitos nutriat. & videatis quare ego dixi, non valde cōmune partem, quia quamuis requirantur ad constitutionem digitorum, tamen non requiruntur ad alias partes sicut nerui & alie partes, & credo ad hoc respexisse Aristotlem lib. 3. de part. animal. cap. 3. vbi facit quinque genera partium communium. Et in quarto genere proponit ipsos vngues. Dixi similem, quod testatur Galenus in libro de inq. intemp. cap. 1. quod etiam testatur ipsa experientia, nam non possumus accipere minimā particulā vnguis, quæ non sit eiusdē substantiæ cū toto. At dicēs, q. in meis digitis primo est pars sicciior, postea est pars candida, deinde est pars rubea, videmusq. circa radicē vnguuium candidā partem, quā vocant aurorā: ergo similis non est vnguis, variante enim colore variat substantia.

Ad auctori-
tatem Ari-
stotelis.

Ad auctori-
tatem Ga-
leni.

Ad auctori-
tatem Auic-
enne.
Vnguis
naturæ &
dispositio.

Debitum au-
torem si
proponere.

Dico ego colorem rubeum in vngue nō esse vnguē, siue, vt melius dicam, vnguū, sed carunculæ subiectæ. Succrescit enim caro, quæ ligat vngues ipsis ossibus, quæ caruncula cum sit prædita optimo sensu, facit illos intolerabiles dolores, si pungatur, quos non verisipili Turcæ, & cum illa caro sit rubra vnguis diaphanus repræsentat illum colorem. Secundo color candidus in extrema parte vnguuium, dico quod verus est color vnguuium, maxillæ autem vnguuiū sunt potius passionēs & affectus præter naturā vnguuium, qui oriuntur ex aliquo humore crudo opaco tosto, qui non potuit verti in substantiam ipsius vnguis, sed conuersus est in corpus opacum.

*Car in vnguē
que appa-
reant vnguē
coloris.*

De colore autē existente circa radices sciatis, q̄ color ille est color chordæ digitorum quæ extendit vnumquemq; digitū, quæ chorda inseritur in dimidiam partē ipsius ossis, & in quāto maior pars vnguis erit extrēsa sup ipsam chordā, tāto magis apparet chordæ color. Hinc est, q̄ cum in omnibus digitis non extendatur eodem modo vnguis super illā chordā, ideo eodem modo non apparet in omnibus digitis iste color albus, quare diuersitas hæc colorum non tollit, quin vnguis pars sit similis.

Et hinc notate errorem aliquorum anatomicorū, qui volunt illā chordā peruenire vsq; ad extremū ipsius vnguis; totus enim apparet albus vnguis, si hoc esset. Dixi præterea esse primi ordinis, quia vngues non explent per se integrū manus sicut venæ, nerui & arteriæ: cum igitur vngues organa non sint, hac ratione sunt similes primi ordinis. Addebam consistere substantia ferme cornea & mouebam hac ratione, quia videbam maximum consortiū inter substantiam cornu & vngulū. Primo enim video substantiā cornu flexilem, secundo diaphanā, tertio albā, quarto possunt cornua in fibras scindi atq; laminas, quæ omnia sunt in vnguib; vltimo vna & eadem videtur durities vtriusq; corporis: conspicuatis vngues brutorū & confectis cum cornibus, eadē videtur esse substantia. Et hinc miror Hieronymū Catdanum, q̄ lib. 1. contradictionū medi loquens de vnguib; dixit esse vngues ex substantia cartilaginosa ex mente Vesalii, quod tamen nunquam formiauit Vesalius, quod autem vngues muniant digitos, declarabo cum de eorum vsu agam.

*Cardani
error.*

Deueniamus modo ad causas, dixi quod aliqui ex antiquis, vt habetur à Galeno in li. 1. de anat. adm. ca. 11. credebant vnguē esse os, netuum, cūtem & ligamentū quæ sententia à me confutata fuit cum Galeno loc. cit. Sed à Galeno veras causas non habemus; nam in lib. 2. de temper. c. 2. loquens de his, quæ gignuntur ex semine & ex sanguine dixit, quod coagulata ipsorū substantia generantur ossa & vngues, vnde colligimus vngues esse ex semine vel sanguine, quod tamen ipse non aliter declarat.

*Galēus
conuenit.*

Hippocrates autē in lib. de nat. scetus dicit, q̄ primo formantur quædā particulæ, quibus formatis formatur integer scetus spatio triginta dierū, sceminā vero spatio 40 dierū, postea incipiūt partes, quæ iam ceperunt formari & poliūtur & magis perficiuntur vsq; ad spatium trium mensium, ad quem vsq; terminū sit, vt moueatur scetus. In prima formatione, inquit Hippocrates, non sunt vngues, sed in secunda. Ex quo loco nos colligimus, q̄ cum omnia in prima formatione fiat ex semine & ante 30 diem formētur, postq; trigessimū nihil feminis remaneat, & post triginta dies fiant vngues, sequitur vngues non fieri ex semine sed ex

*Ad Galenū
materiam sit
femina.*

alimento addito. & mihi videtur, quod Aristoteles soluit hanc difficultatē, nam in lib. 2. de gen. anim. c. 4. pponit duplex excrementū, ex quo sunt particulæ, alterum, quod ipse appellat feminale, quia reperitur in massa feminis, alterū in excrementum est nutritionis & augmenti, & est pars quædā ex ipsis humorib; ex quib; fit nutritio vel augmentū. Norate tamē cum dicit excrementū intelligit substantiā quandā crassam & terrestriore ip vtroq; nō autem substantiā inutilem, ex primo excremento seminali, inquit, quod fiant ossa & nerui & aluntur, & addit Aristoteles, quod cresunt & aluntur ex secundo excremento nerui & ossa, vngues autem fiant ex secundo excremento; vnde habemus non fieri ex semine. Et in hoc concordat Arist. cū Hipp. materia igitur vnguū erit excrementū ipsius alimenti. Subdit etiā Arist. q̄ id excrementū habetur ab eo vnde habetur alimentū & alimentū aut ab vtero

*Præparatum
nutritio.*

betur, aut de foris, quia accipit scetus vel lac vel cibū. Istud v. excrementū quale sit difficultas est, & à quo alteretur. dico quod præparatur ista materia excrementosa ab ipso semine, q̄ semen cum statim est in vtero, statim nutritur & alitur, augetur & fugit ab vtero sanguinē & præparat ac concoquit sanguinem, cuius pars nutrit partem tenuem feminis, alterat vero crassam, & pars, quæ superflua est ac inepta nutriendo semini in vngues & pilos format; inquit enim Hippocrates hoc alimentum ita præparatū concoqui & alterari ac inspissari, vnde formantur vngues; materia igitur vnguuium est pars crassior alimenti prius præparata à semine dum nutritur; semen autem nutriti supponatis tanquam verissimum, patet enim hoc etiam in seminibus plantarum, neque hoc aliter probo. Hoc autem stante non placet Fernelli sententia, qui libro primo suæ medicinae natur. cap. 15. inquit quod materia

*Fernelli
error.*

*Vnguium
nutritio-
nem.*

vnguis est eluuius & excrementum chorum: aduersatur. n. Aristoteli vt videtis. Aluntur autem vngues ex proportionali materia, quæ eadem ferme est, quæ alit cutim, licet crassior sit, pars enim tenuior alit cutim, terrestrior vero alit vngues, & hoc credo ego propter exemplum Æthiopum & colores vnguium brutorum: nam vngues brutorum habet eundem colorem cum ipsorum corio, cum color sequatur ipsam substantiã: cum igitur idẽ color sit vtriusq; nutritum idem fere est. Præterea etiã video Æthiopes habentes coriũ nigrũ habere vngues nigros, in albis v. candidos vngues sicut coriũ: ideo credo alimentũ effici idem.

*Causa effici-
entis.*

Causa efficiens vnguium ex Gal. lib. 1. de temp. est calor densans & frigus coagulans, primo ergo à caliditate concoquente, deinde ab aliqua congelatione: patet hoc, quia à calore mollescunt, ita vt cocto vngue in aqua recipiat figillũ, q. signũ est aliquo modo cõcre-
10

Temperies.

ios esse à frigore, nõ omnino tamen à frigido, quia eliquarentur omnino à calore, & ita habemus immediatam causam vnguium & secundã causam. Temperatura autem vnguium ex Gal. lib. 1. de temper. c. 3. est, vt vnguis sit succius & frigidus corpus quocunq; existente in corpore nostro exceptis pilis. Et hinc est, q. Medici apponunt in affectibus vnguiũ medicamenta robustissima calida & sicca in quarto gradu, ex quo colligitur talem esse eius temperiẽ vt diximus. Habet vnguis varios vsus. Gal. autem lib. 1. de vf. part. cap. 10. accusat

Vfus.

*Aristotelis
& Platonis
error.*

Platonẽ & Aristotelem: Platonẽ quidem negligentia, quia dixerit casu factos esse vngues in brutis, & cum natura viderit eos viles esse, ipsos etiam dedit hominibus, & in hoc Plato merito accusatur, accusatq; Aristotelẽ qui in lib. 4. de part. animal. c. 10. dixit, q. vngues sint munimentũ partium extremitatũ: sed accusatur à Galeno, quia non explicauerit quodnam sit hoc genus nutrimentis: Aristoteles subiungit in loco, quod vngues sint additi tãquam operculũ extremitatũ partium. Auerrhoes autẽ lib. 2. collect. cap. 8. dicit, quod primus vsus sit, vt veluti tubulus ferreus additur extremitatibus hastarum ne disrumpantur, hæc ratione additi sunt vngues extremitatibus partibus, vt sint earum (partium) tutela: & hoc patet in omnibus animalibus donatis vnguibus: & hoc videtur esse munimentum ipsius Aristotelis. Ex hoc colligatis, an merito accusetur à Galeno, qui proponit verum vsum ipsorum vnguium in lib. 1. de vf. part. c. 7. qui est vt fiat certa & bona corporum cum durorum tum mollium apprehensio, & hic est vsus vnguiũ digitorum humanorum, nam corpora minuta aliter apprehendi non possent, & est potissimus vsus. Auerrhoes autem non consentit cum Galeno. nam hic, inquit, tantum est vsus digitorum manuum, nam non apprehendimus res vnguibus pedum, vnde nõ est cõmunis vsus omniũ vnguium. Domini, vt loquar de apprehensione, credo si obseruemus digitos brutorũ, quæ habent pedes distinctos in digitos, in quibus sunt vngues non est dubium, quod tales vngues facti sunt propter apprehensionem. Omnia enim animalia quadrupeda habentia vngues & digitos, celant vngues dum ambulant: sed cum aliquid volunt apprehendere, denudant vngues: sed in homine, vt ingenue dicam, cum vngues positi sunt in pedibus, credo esse appositos propter apprehensionem: quoniam cum incedimus, nisi digitũ inclinatur, vt apprehendant ipsum solum, retrocedũt pedes, & hoc in rusticis potestis obseruare, qui nudis pedibus ambulat, videbitis enim eos apprehendere terram: nos autem cum simus soleati, his non vtimur. Bene verum est, quod solea magis apprehendit, quia solũ nos arripimus digitis & vnguibus. ipsas soleas: aliter certus nõ esset incessus, cuius signũ est, quod & ipse formatũr cavitare digitorũ. quare verus vsus vnguium est apprehensio: sed diuerso modo apprehendunt digitũ & pedes.

Passiones.

Addebat Gal. alios vsus, s. vt nos possumus icalpere, excoriare, diuellere, & vii etiam illis pro armis, vt pueri faciunt & mulieres ineptæ, sicut etiam dentibus vtuntur, licet natura hoc non voluerit donans ipsi homini dentes & vngues. Vltimo ipsi physiognomĩ dicunt, vsum vnguium esse, vt indicent bonam vel malam fortunam, vitia & virtutes: legatis Hieronymum Cardanum lib. 18. de subtilitate. Passiones vnguium sunt hæc: Primo vt continuo crescant in longum ex Gal. lib. 1. de vf. part. c. 11. Secunda passio est, vt habeant quandam duritiem flexilem propter difficultatem parienti, aliter facillime paterentur. Tercio vt sensum habeant per consensum & imperfectum, quia tantum sentiunt inrensam caliditatem & frigiditatem. Quarto vt habeat talem figuram, vt sint veluti canaliculi quidam, ita tamen vt habeant formam à partibus connatis: legatis Gal. lib. 1. de loc. aff. c. 5. & 2. de prog. text. 60. vbi inquit, quod in purulenti vngues incuruantur & vnci sunt, cum tamen plani essent, & hoc mirũ videtur, & causam reddens Gal. dicit hoc fieri, quia partes spectatæ & carnosæ circa vngues absumuntur ex toto à calore absumente vniuersum corpus, vnde in omnib. vnguibus, in quibus sit affectus aliquis præter naturam, si patiatũr partes subiectæ, patitur & ipsa figura. Addatis q. semper sunt diaphani & pellucidi: in Æthiopiis hoc nõ potui experiri, credo tamen esse diaphanos: addatis vt secundum naturã possint diuidi in fibras longas & laminas longas: vltimo vt in hominib. bis in anno ad minus per-

pmurentur vngues, & h. e. perpetuū, dixi autē ad minus, quia sunt aliqui homines in quib. propter eorum exercitiū ter & quater mutantur vngues, sicut in his, qui exercēt manus in aqua calida, quā multum faciat incrementū, mollietis enim facit ad incrementum. Et hāc de vnguibus satis dicta sint.

De Pilorum nomine, definitione, materia, generatione, causis efficientibus, generibus, temperie, vsu, passionibus, colorum & crispitudinis causis & eorum casu. CAP. XIX.

Pilos vocant Latini extantes quasdā particulas tenuissimas, quā pelli inhaerent & à Græcis *τριχες* aut *τριχον* vocatas à similitudine accepta à segetibus. De his autem nos agamus non tanquam partibus animalium integrantibus atq; animatis; nam in pilis nulla adest animā facultas: aliqui tamen volunt pilos esse partes corporis; sed quia quæstio inuicilis est, ideo rationes quasdam eorum propono, & eas quoq; soluā. Nitiuntur isti auctoritate Galeni in lib. 2. de temper. cap. 9. & vltim. vbi enumerat Galenus pilos inter partes, eorumq; temperaturam tradit, ergo partes sunt. Respondeatis, Galenum enumerasse pilos tāquam aliquid additū corpori & ipsi coniunctum, non autē tanquā partes similes: hoc patet, nam & phlegma & sanguinē etiam proponit, qui tamen humores partes non sunt ab vilo positi.

Alia auctoritas Auicennæ feni. lib. 1. c. 2. de complex. eodem modo soluitur sicut ista Galeni. Alia erat auctoritas Auerrhois lib. 1. collectan. cap. 1. & 13. vbi ille enumerat pilos & vngues inter partes corporis: dico autem ego ad hanc auctoritatem, quod per partes poruit intelligere aut partes constituentes corpus aut quamlibet substantiam repertam in corpore. Si primo modo intelligat, sciatis falsam esse sententiam: nam enumerat etiam spiritus & humores, quæ tamen omnia contenta sunt, sed intellexit secundo modo per partes quācumq; substantiā in corpore repertam & sic humores & spiritus sunt partes sicut partes solidæ: Idē dico de pilis extra additis, & hac ratione enumerat Auerrhoes pilos inter partes.

Tertia auctoritas erat Aristotelis, qui lib. 4. meteor. & in lib. de part. animal. vt & Theophrastus in lib. de hist. plant. dicit pilos & cornua esse partes corporis, sicut fructus plantarum. Respdēo quod per partes duo possumus intelligere, vel quicquid corpori coniunctū est & sic pili partes sunt sicut humores & excrementa etiā proponuntur ab Arist. inter partes: vel intelligimus partes viuentes, & sic pili non sunt partes integrantes corpūs.

Ad rationes autem quarū prima validior est, pili intenduntur à natura in generatione prima, ergo sunt partes corporis. Domini, ex Galeno in lib. 2. de temper. ca. 5. & lib. 11. de v. part. c. 14. dicatis, falsum esse omnes pilos à natura intendi: aliqui enim casu fiunt & consequuntur temperamentum cutis; nam in viris sic barba siccata cute mēti, quod nō fit in mulieribus: isti igitur pili non intendūtur à natura, nā fieret in omnibus. Aliqui autē intendūtur pili à natura, vt pili oculorum & capitis, de his ergo loquendū, pili intendūtur à natura, ergo partes sunt: negatur vel negāda est consequētia, quia etsi intendātur à natura, nō tamē intenduntur vt partes integrātes, & hoc patet, quoniā animati non sunt, sed sunt ad aliquē vsum. Secūda ratio erat, nutriuntur pili, ergo sunt partes; negetis antecedēs; nam quamuis pili crescant per accidēs ab extrinseco, non tamē nutriūtur nec attrahitur alimentū ad radicem, nec cōcoquitur ab ipsis: pterea si crescant, crescant à fuligine. Tertia ratio: pili habent statutū incrementū vt reliquæ corporis partes: Ergo & c. nā in pueris videbitis pilos tenues & breues; at in iuuetute firmatur incrementū pilorū. distinguendū autē est inter pilos: aliqui enim ppetuo augētur, aliqui nō habent statutū incrementū, crescūt capilli & barba semp. pili autē palpebratū statutū habent incrementū, tamen nō sunt partes, quoniā cadūt alternis semp. annis, & nisi cadēt, nō possent renasci, quoniā non possent crescere, quoniā enim natura nō potuit siue poterat pferre longitudinē supercillorū & palpebrarū, voluit pilos cū creuerint ad debitā magnitudinē cadere sicut cornua ceruorum & capreolorū: nā magnitudo illa inutilis esset; quare pili isti, qui videntur habere incrementum terminatum, semper augerentur, nisi cadērent: cadunt autem, ne nimis crescentes impediāt oculum elusque operationem; quare pili isti semper crescant quousque stato tempore cadant ac renascantur: patet hoc, nam pili auulsi non renascerentur, nisi haberent augmentum. exēplo sunt patietes morbo gallico, in quib. pili cadunt & renascūt. Quare dicamus pilos partes nō esse, quoniā nō sunt partes solidæ neq; humores, nec spiritus impetū faciētes. Oportet igitur addere quartū genus partū earum, q̄ corpori adnascūt, quarū adnatarū Gal. mentionē fecit, vbi tractat de ouis in 11. de simp. med. fac. nā ibi dicit oua esse partes adnatas; q̄ adnatæ partes vel sunt diuersæ à subiecto corpore, vt est viscū in arboribus & verrucæ & c. aliz adnatæ partes viles sunt, vroua & pili & similes partes ad vsum aliquē institutz, quare dico pilos nō esse nisi adnatas partes corpori nō integrātes et constitutionē. Est aut pilus similis & cuti cāntū adnata pars animalū naturę ppria & valde familiaris, dixi

esse particulam similem autotitate Aristotelis lib. 2. de part. animal. c. 9. & lib. 4. meteor. capite decimo, & libro tertio, de histot. animal. capite secundo, ubi Aristoteles enumerat pilos inter similes: adest etiam ratio quoniam quolibet pars pili, pilus dicitur & est, nullaque est differentia. Addebam esse partem cui tantum a dnatam in internis enim partibus non reperietur pilos nunquam enim vidi cor pilosum nec volam manus, licet id miraculosum referatur. Aristoteles autem lib. 2. de gen. animal. cap. 4. & lib. 5. de animal. c. 3. & Gal. lib. 11. de simpl. med. fac. cap. de ouis, testatur pilos adnasci tantum cuti: præterea in brutis eolot cutis & pilorum idem est, eademque sunt utriusque passionis: in hominibus autem hoc non est, sicut notauit Aristoteles loc. cit. nisi cutis præter naturam affecta sit; nam si cutis vitiligine inficiatur, etiam pili adnascuntur albi sicut & ipsa cutis: nec in cicatricibus oriuntur pili, quoniam cutis non adest, sed callus quidam. Quod autem pili sint inter adnata familiaria & maxime propria vtiliaque, explicabo inferius, dum agam de ipsorum vsu.

Materia pilorum.

Intet causas autem pilorum prima est materia, in qua te nemo est, quid dicat materiam pilorum esse ipsum semen, quamuis aliqui pili sint facti in generatione ipsius animalis. Sed Arist. proponit materiam in lib. 2. de gen. anim. c. 4. quod est incrementum vel nutrimentum vel augmentum in vtero & extra vterum. Natura autem huius exercimenti est, ut sit terreste, crassum & tenax, namque ductilis est pilus, quod indicat tenacitatem, & Arist. huic materię admiscet aliquam humiditatem, quæ necessaria est, ne nimis siccum sit excrementum hoc, cuius humiditatis meminit Arist. lib. 5. de gen. anim. c. 3. ubi istam humiditatem, appellauit pinguedinem per allusionem quandam. Galenus autem variis in locis, sed præcipue in lib. 2. de temp. ea. 5. loquens de materia pilorum dicit materiam esse fuliginem & fumum ex quo gignuntur pili: nam sicut in eaminis conerescit fuligo facta ex minutissimis atque atomis particulis ipsius fumi, veluti etiam in fructibus marcescentibus. Si. n. accipias malum medicum, id est, citium & ipsum reponas donec marcescat, marcescentia illa sit ratione putredinalli, quid cum exhalat, facit lanuginem super ipsum malum ex fumoso halitu, qui continuo & continuo exhalat, ita & in nostro corpore, cum calor faciat plures exhalationes, exhalatio sicca peruenit ad cutim, cuius particule sensim ac sensim augent pilos in ipsis meatibus. & hæc materia proposita à Gal. videtur esse fere opposita materię, quam proposuit Aristot. tamē mihi videtur, quod vna & eadem sit (materia) inam Galenus attestatur in finibus in locis ex materia crassa, tenaci & terrestri eonstate & fieri pilos, sicut dixit Arist. talemque materiam dicit esse fuliginem; differt tamen in modo atque accidente, quod inest illi excremento, quotiescunque enim terrestris materia fuerit calefacta & attenuata, fumus est & sursum fertur; tamen materia fumi est terra, quare pili materia est excrementum ab Aristotele propositum, tamen quia attenuatum & calefactum est, sit veluti fumus; non ergo inter se discordant illi excellentissimi viri. Notate tamen, quod requiritur ad generationem pilorum ut ista materia agitet se atque protum pat expellatque pilos genitos: nisi enim materia ista ex se erumperet extra cutim, non crescerent pili, erumpit enim, dum querit exitum; propterea Galenus appellauit fumum, & sic videntur augeri pili, non quia aliquid addatur in propria substantia, sed quia iuxta ponitur hoc excrementum: non enim pilus attrahere potest, cum non vjuat, nec cutis attrahit id, quoniam ex eo nutriri non potest: ergo vel expellitur vel exit in meatus pilorum ex seipso, non autem expellitur, quoniam excelleret secundum ductus varios fibrarum, ergo vim insitam habet materia, qua ducitur æqualiter a centro ad circumferentiā. Præterea notandum est, quod materia pili reuera fumus non est, sed similis est fuligini, non enim sit fumus verus in corpore sed exhalatio sicca & terrestris fumo similis; exhalat enim a calore corpus sicut fumus ab igne. Huic autem excremento ex Aristot. additur humiditas pinguis. Sed notandum est, quod per pinguedinem non intelligamus veram pinguedinem, sed per allusionem; quia si esset vera pinguedo, tunc pili essent apti ad nutritionem & eliquarentur & concoquerentur, nullum tamen animal pilis nutriti potest; nulla enim in ipsis adest humiditas pinguis, & ex hoc sequitur pilos non fieri ex materia, ex qua aluntur reliquæ partes. Et quoniam pilorum duplex est generatio, altera in vtero vel ovo in prima generatione, post 30 tamen dicrum spatium ex Hipp. in li. de nat. foetus; altera est generatio cum adultum est animal, vel adolescens est homo vel virilis; quæro an vna & eadem sit materia vtrorumque pilorum in primo scilicet & secundo ortu, dubium non est, quod materia pilorum congenitorum, eorumque qui sunt in prima generatione, est materia humorum, qui subministrantur in vtero: in secunda vero generatione materia pilorum est materia fuliginosa & excrementum illud ortum ab alimento de foris accepto. Primum autem excrementum regulatur ab ipsa natura: pili enim vel nascuntur ut arbores nobiliores institutæ a cultore, vel casu oriuntur, ut herbe viliores, quare excrementum in vtero est materia pilorum congenitorum institutorum a natura, aliarum vero materia fuligo est, qua primi etiam pili conseruantur.

De cau-

Duplex generatio pilorum.

Dubium an materia pilorum sit eadem in primo & secundo ortu.

De causa efficiente nescio quid ex Hippocrate dicam, quoniam non explicatur manifeste ab ipso, quod ego viderim, tamen Galenus duplicem causam efficientem proponit in lib. 1. de temper. c. 5. & lib. 11. de vf. part. cap. 14. & proponit distinguendo naturam pilorum: duo enim pilorum genera sunt in hominibus: alterum cōgenitos continet pilos similes plantis instituta à cultore, alterum genus continet postgenitos casu factos similesq; plantis circa voluntatem cultoris ortis. Quando igitur formatur animal, sunt & pili congeniti, quorum quidem causa efficiens est natura & ipsa virtus formatiua communis omnium particularum, & est calor ingenuus spiritu tanquam instrumento vtens: Eorum vero, qui post geniti sunt, causam efficientem refert ad naturam ipsius cutis, id est, ad commodatā caliditatem & siccitatem ipsius cutis, & præcipue ad siccitatem: cutis enim statim orta humida est & similis caseo nondum concreto, ex quo adhuc molli egreditur serum, nullumq; sensibile apparet foramen, ita quando oritur animal, cutis mollissima est, vnde cum fiant exhalationes, statim clauditur foramen cutis: quāuis enim in corpore pueri multa materia exhalat, tamen cū nimis humida sit cutis, statim clauduntur foramina, cum in sese concidunt, propter propriā mollietē. Pariter ista cutis si nimis dura & secca sit, pili fieri non possunt, vt patet in caluitie, quādo pili cadunt, nec regenerari possunt, quia tāta adest siccitas & densitas cutis vt pili non fiat, quia clauduntur pori, atq; ita materia pilorum exsiccat, vt insensibiliter exhalet. Requiritur ergo siccitas moderata: nā sicuti in caseo aliquantisper molli & apparet meatus sensibiles ac aperti sunt, ita cutis meatus aperti manebūt atq; cōcrescet in ipsis pili, dico ergo siccitatē commodatā dupliciter esse causam efficientē: primo causa est quoniam remouet prohibēs impedimentum generationē pilorum, nam remouet ne pars ipsius cutis in se concidat. Secunda causa est efficiēs, quia dū fuligo illa, quæ sensum ac sensum crescit circa radices pilorum, sit aliquantulū humidior & siccitate ipsius cutis cōcrescit & aliquantulum exsiccat: patebit hoc, si extrahatis pilū ē corpore, si in radice eius erit aliquid durū & callosum, sciatis casurū esse pilum illū: vel si extrahatis pilū cum radice comolli & tenui & glutinosa, eo modo fuligo hæc cōcrescit, circa n. radices non est verus pilus, nisi prius à siccitate cutis concreseat & densetur humida illa materia: hæc ergo erit mens ipsius Galeni.

Pilorum temperatura patet ex lib. 1. de temperam. c. 9. & lib. 1. de temperam. c. 3. quod nempe siccissimi sunt omnium partium animalium; quod patet, quia ab vilo animali nō ex-
 30 petitur pro alimento. Præterea si quis vult inficere & tingere ipsos pilos, opus est vt robustissimis medicamentis ad hoc efficiendum. Vnus communis pilorum est ab Aristotele explicatus lib. 1. de part. anim. cap. 13. à Galeno vero lib. 11. de vf. part. cap. 14. & est vt sit tegumentum partium corporis cum in brutis, tum in hominibus; apparet hoc in velleribus & capite. Secundus vñs proponitur à Galeno & est vt sint propugnacula partium, vt patet in oculorum pilis, qui prohibent, ne quid cadat in oculos. Tercio pili sunt facti vt addant decorem & maiestatem animali: si enim videritis leonem & leonem, & virum ac puerum vel feminam, atq; consideretis in his pilorum, ornatum maiestatemq; non mediocrem ex his diiudicabit.

Passiones quoq; plures sunt, quarū prima est, vt perpetuo crescant, & huius causa est
 40 perpetua præsentia materię, non quia necessitas addit. Secunda vt si casu cadāt, possint renasci in caluitio vero cadunt pili nec renascuntur, quoniam materia deest & cutis efficiens inepta reddita est. Tertia vt defluant certo tempore pili illi, qui à natura habent statum & determinatum incrementū, veluti pili palpebrarum & superciliarū certis temporibus cadūt & iterū renouantur, & hoc apparet in multis brutis veluti in mīla. Quarta vt omnes pilicadentes excepto caluitio renascantur, dummodo naturaliter sit affecta cutis, quare si vel ob tumore vel morbum gallicum vel leprā cadunt pili, renascuntur. Quinta, vt semper sint aliquo colore infecti, cuius causa vñ proponitur ab Aristotele lib. 3. de gen. anim. c. 3. & 5. & est color ipsius cutis in brutis, vel temperamentū cutis ex Galeni lib. 1. de temper. ca. 5. & hoc maxime apparet in hominibus. Alia causa proponitur ab Arist. eo in loco c. 5. & est materia, ex qua sunt pili ipsi. idem Galenus cōfirmat locū dicto: vnde quale excrementū est fuliginosum, talis est color pilorū: namq; videbitis homines biliosos rufos habere pilos vel flavos. Sexta passio est, vt pili sint aut recti aut crispi natura, non loquor enim de arte sed natura pilorum. Idē dico de mollietē, duritiē, crassitie ac tenuitate. Causam autē crispitudinis refert Arist. in materiā, cuius pars humida exhalat, deinde secca contrahitur: & Galen. Idē cōfirmās refert etiā in hanc materiā, & dat exemplum de cortigiis: sed opus est, vt illa exiccatio sit inæqualis. Et huius causa ab vilo non redditur, sed in hoc casu refert causam in inæqualē malamq; mixtionē illius humiditatis cum terrea portione fuliginis: vbi enim humiditas non erat bene mixta, facile exhalat, vnde vbi mala mixtio est, facile pars tenuis exhalat, nō sic autem ex bona mixtione. Aliam causam crispitudinis referebat Galenus in

Causa efficiens pilorū.

Duo pilorū genera in hominibus.

Cutis quales sit in primo oritur.

Pilosus est.

Pilorum temperatura.

Pili.

Pili.

Passiones.

Causa naturalis crispitudinis pilorum.

naturā meatuum. in torti. n. meatus in tortos faciūt pilos. & hoc patet in morbo illorum pilorum aliorū, in quo pili inuertuntur, quia foramina in tortos sunt: & ideo in Echium com-
 rario propter densitatem pili crispi sunt, pariter materia crassa & latus meatus crassos gene-
 rat pilos. Vltima passio est, ut dum cadunt, quandoq; renascuntur, & quandoq; non rena-
 scuntur. causę horū dictę sunt, sed cadunt duplici de causa, ut habetur lib. 1. de comp. med.
 sec. loc. capite primo & secundo, aut scilicet ex defectu alimenti aut potentia alicuius ma-
 li alimenti vel erodentis radices ipsius. Vltimo habent, quod sunt fissiles pili ex Aristote-
 libro tertio, de histor. animal. cap. 11. quia formati sunt per longum; aliqui vero pili fissi
 sunt & dicuntur lupi, & fiunt ab ariditate nimia & absumuntur pili, ad quod prohiben-
 dum inungatis oleo amygd. d. vel oleo aliquo odorato, & sic relinquantis per noctem, de cin-
 de mane lauetis lixiuio, quoniam ego hoc expertus sum in me, quoniam xistate labii super-
 rioris tantum mihi finduntur pili propter siccitatem, hyeme vero non; quoniam halitus
 exiens eos humectat: & hæc de pilis satis sunt dicta.

De humore crystallino & de tunica cornea.

C A P. XX.

IN corpore animalium perfectorum adhuc super sunt tres substantię similes, quarum
 vna est, humor crystallinus, qui vni tantum oculo seruit, cuius naturam explicare bona
 fronte omnino, cum facile per ipsam anatomen pateat.

Alterā pars est substantia illa, quę cornea membrana dicitur circularis posita in an-
 teriori parte oculi, liuidaque substantia est, & oculo tantum dedicata, quę sapit natu-
 ram eueni, eadem tamen ratione prætermittere eam volo quā prætermittit etiam crystal-
 linum humorem.

De cute quoad eius nomina, causas, materiam, temperaturam, vsum & passionem
 eiusdem.

C A P. XXI.

Nomina.

Vltima est cutis nunc explicanda, quę *Squa* Græcis vocatur ex lib. 2. de v. s. part. c. 2.
 quia ex coriari possit, hac igitur ratione *Squa* dicta est a Græcis; à nostris vero corium
 præcipue in brutis, quasi sit corium quoddam scil. membrana vestiens forū ex Hippo-
 crate. hanc etiam cutim dixere nostri, quia sit in uolucrum corporis, ita ut vestiat corpus.
 vltimo est dicta pellis à nostris, quę vox cum aut vna multiplex sit; æquiuoca tamen est,
 nam per corium aut per cutim intelligimus illud totum, quod ex coriatur à Laniis in ani-
 malibus. quod constat ex tribus partibus, quę omnes tres partes simul differunt substan-
 tia inter se, inter istas autem substantias illa, quę est intus appellatur *pellis* à Galeno. lib. 3. de
 adm. anat. cap. 1. nostri vero appellant panniculum carnosum, & hæc est prima pars corii.
 & quamvis Curtius & multi alii negent carnosum panniculū meminisse Galenū, tamen
 sciatis e os omnes quamuis doctos decipi, nam meminist sub nomine membranę, hæc æ-
 tem membrana simplex non est sed constat etiam carne & vasīs per ea. dicuntur enim
 Secunda pars est de quā nos loquimur. Tertia verò est quædam membrana, quę vocatur
 ab Hipp. *epithymia*. nostri vero vertunt cuticulam, quę est substantia callosa, dura, frigida &
 conctescit super corium, veluti cōctescit super panatella cruxta quædam siccata, vel in su-
 perficie polente, & ista cuticula non est pars corporis, sed potius debet connumerari inter
 partes adnatas, quia non nutritur neq; habet generationē, nisi per accedens, quā gignitur
 per exiccationem ab ambiente, neq; habet sensum, & facile restituitur, si auferatur. ista pars
 aliquando corium dicitur ex Arist. lib. 2. de gen. animal. cap. 4. quando inquit corium non
 habere sensum & crescere veluti velum super polentam, hoc enim dictum verum esse non
 potest nisi intelligat per corium cuticulam, quę non habet sensum. Aliquando vero per
 corium intelligimus illud, quod vere corium est, id est, secundum illius substantiam & me-
 diā inter panniculum carnosum & cuticulā, de quā nos loquimur, tanquā de parte corpo-
 ris, cuius natura talis est, nam si volumus ipsam definire, dicimus, quod sit pars similis primi
 ordinis propria sui generis substantia constans, quę cōmode vniuersum corpus vestit. di-
 xi similem, quia & ratione, & autoritate colligimus esse substantiam similem; autorita-
 te quidem Aristot. Auctoris & omnium fere loquendo de vero corio, non autem compo-
 sito. Postea ratio hoc indicat, quoniā ex Gal. lib. 3. de adm. anat. c. 2. si separamus hanc sub-
 stantiā à panniculo carnosio, quod facile fieri potest, videbimus substantiam vnde quæque
 similem. dixi primi ordinis, ut satis facerē Galeno, quia inter partes similes alie sunt pri-
 mi ordinis quę nullam habent integram actionem, cuiusmodi corium est; alie sunt secu-
 di ordinis, quia habent integram actionem, testis est Gal. lib. de caus. morb. cap. 6. vbi dicit
 cutim esse priuatam omni actione perfecta naturali, vitali & animali, sed tantum vsum ha-
 bere ad regendum totum corpus. dixi ergo ut satis facerem Galeno, quia contra hanc po-
 sitionem est ratio & autoritas: primo quidem est ratio, quia videmus corium esse verum,

certum

certum & vſitatum instrumentū tactus, quia nerui & caro & huiusmodi partes non sunt factæ, vt percipiant exteriōra ſenſibilia, ſed vt proprias offenſiones percipiant: ſed corium factum eſt, vt ſi tangam puellam, percipiam an ſit mollis, an dura, an calida vel frigida: & dum vult animal percipere obiecta ſenſibilia, ſemper adhibet coriū: alix enim partes ſentientes non ſunt instrumenta ad ſentendas qualitates tangibiles ſed corium; quo ſemper vtimur ad ipſas qualitates ſentiēdas. Præterea nō video in corpore aliquā particulā, in qua ſit exactior viſ ſenſus, quam in corio. aliquando enim nos tangimus frigido neruum neq; cognoscimus an ſit frigidū vel calidū; non enim ſic ſentiunt nerui, quamuis inſigniter doleant: habent autem vim, non autem ſubſtantiā opportunam. Præterea conſpiciamus temperatam cutis, quæ temperatiſſima eſt quaſi ad librā compoſita, vt poſſit & calidiora & frigidiora & humidiora & ſicciora percipere, quare verū & certū eſt instrumentū tactus. Addamus autoritatē Galeni lib. 1. de ſimpl. med. fac. c. 4. vbi dicit, quod in cute manus eſt perfectā tangendi potentia, quare habet perfectiſſimam actionem. Præterea Galenus eodem loco vult ob id cutim habere hanc vim exquiſitam, quia inquit ex Platone in Timæo cutis ex genere carnis eſt, quam ſenſitiuam Ariſt. explicat. lib. 1. de part. animal. c. 1. & in lib. 2. de gen. animal. c. 4. vbi dicit cutim eſſe carnem ſiccā; caro autē ex lib. 1. de part. animal. c. 1. eſt verū instrumentū tactus. ergo cutis eſt instrumentū tactus & pars ſimilaris ſecundi ordinis, ergo habet actionem propriam: Quod autē cutis ſit caro ſiccata, patet ex lib. 3. de ſimpl. med. fac. ca. 16. ergo cutis eſt verum instrumentum tactus & vſitatum. Et hæc dicta ſint dubitationis cauſa, non quia velim deſtruere primam ſententiam Galeni, vix autē cogitabitis hoc domi. Addebam cutim habere ſubſtantiā propriā, quoniā nulla alia eſt particula, quæ cuti ſimilis ſit, licet aſſimiletur membranæ & neruo, tamen membranofa & neruoſa ſubſtantia non eſt. Dixit autē Galen. cutim eſſe neruū ſanguineum, quoniā corium neruo eſt aliquātiſper ſimile & ſanguine reſertū, qui ſanguis eſt in corio tantū, non autē in cuticula. Iſtud autē corium nullas fibras habere, videtur per diſſolutionē, ita latent, quamuis ego credā, quod adſint, ſed ita latentes ſunt, vt vix appareant, q; non eſt in panniculo catnoſo: apparent. n. fibræ; cuticula vero omnib. caret fibris: at ſi coriū ſiccetur, ad ſenſum apparent fibræ. Sed dices, quod ego dixi habere ſubſtantiā propriā ſui generis, tamen poſtea dicebā eſſe carnem reſiccātā: dicatis, quod quamuis dicebā cutim eſſe carnē reſiccātā, ob id tamen, nō credo eſſe carnē reſiccātā: decepti enim ſunt philoſophi illi maximi ex cicatricib. quæ carnes ſiccatae ſunt: credo. n. ego verū corium eſſe partē ſpermatīcā. Ad Gal. aut vbi aſſerebat eſſe veluti carnē reſiccātā, dicatis, quod ibi loquatur de cicatricibus, in quibus improprie carnē reſiccātā vocat cutim, quia cutis vera non eſt. legatis lotū. Quod aut ambiat corpus, patet: quare colligo corium verum ſubſtantiā propriā conſtare.

Cauſæ materiales huius corii ex Ariſtotele & Platone ſunt ſanguis ipſe, cum dicunt carnem reſiccātā. Sed hoc non placet variis de cauſis: primo quia reſtitueretur & regeneraretur: cutis autē non regeneratur ex li. 3. meth. med. c. 5. q; etiam ex perimēto cōprobat: cum ergo non reſtituatur, ergo non eſt ex ſanguine. Præterea Ariſt. lib. 3. de gen. animal. c. 1. dicit naturam cutis terreā eſſe, at caro terrea non eſt, quare non poſſumus admittere cutim ex ſanguine eſſe. Præterea idem Ariſt. lib. 2. de part. animal. cap. 13. & lib. 3. de hiſt. animal. c. 11. dicit, quod cutis non coaleſcit, ſed quare? quia ex ſpermate ſit, non autem ex ſanguine, quare ratione & autoritate negandum eſt cutim ex ſanguine eſſe: genita ergo eſt ex ſemine vt teſtatur Galenus in lib. de format. fœtus cap. 2. & lib. 3. de meth. med. cap. 5. & inter partes primogenitas numeratur. Hippocrates etiam in lib. de nat. fœtus dicit, quod in formatione prima & in prima generatione fœtus omnia ſiunt aut ex ſanguine aut ex genitura: & quod omne ſimile ſit ex ſimili, id eſt, molle ex molli, rubrum ex rubro, quod probat exemplo veſicæ: monet enim, vt accipiamus ramenta diuerſorum corporum & apponamus in veſicā & impleamus aqua & flaru, & poſtea concutatur, ſimam quieſcere, videbimus, quod omne ſimile ad ſimile tendit, ita in fœtu agente ſpiritu concuſſa materia omne ſpermatīcū, craſſum currit ad faciendum ſuum ſimile. Hoc ſtante videamus, quæ ſit ſimilitudo inter ſanguinem & corium. nulla quidem eſt, ſed cum maxima ſit ſimilitudo corii ad ſperma dicendum eſt ipſum ex ſemine fieri. Nutritur autem dices ex muco ex Ariſt. lib. 3. de hiſt. animal. cap. 11. dicente, quod omnis cutis repleta eſt mucosa ſubſtantia & glutinoſa, & quod corium muco turget, tamen cum ego videam temperatam eſſe partem, & illum mucum eſſe frigidū, ideo non poſſumus dicere eſſe nutrimentum immediatum; ſit enim cutis ex parte temperata ſpermatīcā, nutriturque ex optimo ac temperato ſanguine, ideo dicimus eſſe partem magis temperatam ſanguinis, qui ſapit materiam omnium partium aduerſarum.

Cauſa efficiens eſt viſ formatrix & ſpiritus calidus vltro citroque percurrrens, qui

An cutis
habeat ſub-
ſtantiā
propriā
vel ſit caro
reſiccata.

Cutis ma-
teria.

Cutis nu-
trimentum.

percurrere efficit tot foramina & aurium & narium & similia partium. Suae autem substantiae causa efficiens est caliditas concoquens: at foraminum illorum parvorum formatio per accidenis est, & sunt causae vapores, qui quotidie & quotidie egrediuntur.

Temperatura.

De temperamento autem cutis Galen. lib. tertio, meli. med. capite quinto, & libro quarto, de rat. vict. dicebat, quod cutis per collationem ad carnem est frigidiore & siccior: sed hoc non quero, sed quero ego qualitatem per exuperantiam. nullum elementum in eo praedominaturale, omnia ex aequo mixta sunt: hinc est, quod apta est percipere obiecta sensibilia tangibilia & minima & immensa: unde temperata est quod ad exuperantiam in qualitatibus.

Vfus.

Vfus cutis ex Galeno in lib. de caus. morb. capite sexto, est, ut sit vniverso corpori indumentum, ac semper quadrans praeter sensibus ac emaciat, in quibus rugas facit: ego vero addo alium usum, qui est, ut sit terminus extremus corporis humani, quo corpus sentiat sensu tactus omnia obiecta tangibilia.

Passiones naturales.

Passiones autem sunt plures, & inter omnes prima, ut habeat sensum ex lib. 16. de vl. part. cap. 1. & ex lib. 3. de admin. anat. c. 1. habet autem sensum a nervis, qui ad ipsam perveniunt, & qui connectuntur suis apicibus cum ipsa cute. Praeterea notandum est ex Aristotele lib. 3. de histor. animal. cap. 11. quod cutis, praesertim capitis, non habet sensum, intelligatis tamen non habere sensum per se & in natum, quia si intelligat sentire per facultatem transmissam a nervis falsum est. parcat mihi Aristoteles. Bene verum, quod vna pars magis exquisita sentit quam alia: cutis autem capitis non ita exquisita sentit propter pilos, vel dicatis Aristotelem intelligere per cutim ipsam cuticulam, & eum loqui de cuticula, aliter falsum dicitur. Praeterea cutis habet aliam facultatem ut casei modo concreti sit dum gignitur: dum enim generatur, est veluti cuticula casei recentis ex Galeno in lib. de caus. morb. cap. 6. & lib. 3. de temp. cap. 5. Postea vero superueniente tepore foramina apta sunt, & videntur siccato animali post septimum annum, unde erumpunt pilus ipsi. Addatis quod naturaliter cutis omnis aut habet pilos vel priuata est pilis. priuatur autem pilis ex Galeno com. 3. in 6. Epid. tex. 1. ex nimia humiditate & siccitate: pueri enim & feminae priuati sunt pilis propter nimiam humiditatem pariter propter nimiam siccitatem, sicuti in caluitio apparet, quare idem a contrariis fit causis.

Addatis quod ductilis est cutis ad omnem positionem in longum, latum & profundum, quod autem hoc sit verum, apparet in pinguescentia & augmento animalis, in quo latent fibrae quibus extenditur.

Vltimo habet hoc, ut comminuta non renascatur, sicut aliae partes spermaticae. Aliquae autem cutis varietatis explicatur in anatoe varientur ratione partium subiectarum. Haec ergo dicta sint de partibus similibus ad laudem Dei t. cui gratias non minimas habeamus, quod hanc tractationem perfecimus.

FINIS.

Tractatus quinti.

GABRIELIS FALLOPPII MV- TINENSIS MEDICI AC PHILOSO- PHI PRÆCLARISSIMI, DE VVLNERIBVS

IN GENERE SEV VNIVERSALI,

TOMI II. Tractatus VI.

*De Nobilitate & dignitate artis vulnerariae, & qui auctores in tali
materia sint legendi* CAP. I.



MEDICINAM Deorum inuentum esse, atque præsertim ad Apol-
linem referri, veluti præcipuum eius autorem, tradidit omnis anti-
quitas, quam etsi multi exercuerint vnam tamen tantum esse semper
comptum est, cum eam profitentes in solius sanitatis scopum oculos
intenderint. Sed cum multi sunt morbi varique methodi in his
curandis, hinc factum est, vt non vnatautum & vniformis perpetuo
visa sit apud omnes; nam aliqui curationem morborum inquirentes
solum experimento sunt vsi, solisque remediis contenti; alii vero rationem secuti ipsi soli
innixi hanc artem tractarunt, ideo nunc Empirica, nunc vero rationalis facta est. Præterea
cum tria sint in hac arte instrumenta, quibus mediis finem Medicus assequitur: chirur-
gia scilicet, victus ratio & pharmacia, hinc etiam factæ sunt tres Medicinæ partes, chirur-
gica scilicet, pharmaceutica & diætetica. Sed quoniam chirurgica varias continet partes
inter se distinctas iuxta varietatem subiectorum morborum, namque modo pro subiecto
tenet vlcera, modo tumores, aliquando fracturas quandoque vulnera, interdum luxa-
tiones aliaque affectuum genera, ob id & ipsa titulos varios diuersaque sortitur nomina,
vnde alia dicta est vulneraria, alia est alio donata nomine, secundum varia, vt dictum est,
morborum genera.

Cum autem de his omnibus totam completurus artem tractare intendam, ab illa,
quæ de vulneribus agit, sumens initium, dico præstantissimam esse partem inter reliquas,
quæ uero potissimum de causis, ratione scilicet necessitatis, certitudinis, facilitatis atque
antiquitatis. Nobilis enim est primo ratione necessitatis, quoniam multi alii morbi à solâ
natura sanantur; nullum tamen vulnus momenti sine Medico sanatum fuit, quod patet
ex rusticis, qui febre correpti Medicum non aduocant, sed si vulnerentur etiam eorum bo-
nes & animalia Medicos proxinus aduocant. Præterea populi quidam Medicos tantum
vulneratos vt aliis digniores honorant: non autem alios, sicuti olim fuit populus Roma-
nus, qui primum eius Medicum Atrachagatum, somni opere coluit & maximis honoribus
decorauit. Secundò nobilis est hæc ars ratione certitudinis atque tutelæ ipsius artis; quoniam
Medicus vulnerarius omnia tangit & videt & eo visque manibus attingere potest,
quo oculis penetrare valet, vnde neque errorem committere potest insignem. Tertiò
nobilis est ratione facilitatis, quoniam pars hæc facilius est aliis omnibus cum capere, tum
tractatu: nam paucissimis contenta est axiomatibus atque remedijs, licet plurima con-
sistent volumina de his; Ego tamen testor ex pura aqua vulnera cerebri sanata vidisse, at-
que aliarum etiam partium maxime lheralia. Quarto nobilis est ratione antiquitatis: Est
enim hæc ars omnium antiquissima: nam post Apollinem datur palma Esculapio, qui
delatus est in Deorum numerum eo quod sanauit Hippolytum vulnerarum Thesei fi-
lium, quinimo eum ab æquis ex terra per scopulos & saxa discerptum reuocauit ab inferis
& pristinæ incolumitati vitæque restituit; & idem Androgeum Minois regis filium ma-
ximis inflicto vulneribus recuperauit. Præterea Machaon eius filius ab Homero cele-
bratus fuit: quia nouit exactissime curare vulnera; quare nobilissima est pars artis huius
medicæ vulnerariæ dictæ.

Cum autem ex antiquis Medicis multi & ex recentioribus etiam aliqui de vulneri-
bus periti essent, optimum fore censeo vos monitos reddere, quos lege in hac imitan-
dos materia debeatis, vt reliquis relictis horum tantum doctrinam percipiat. Inter an-
tiquos igitur est Hippoc. in libro de vulneribus, in quo multa ad vulnera attinentia inue-
nietis, in quem librum cōmentatus est Vidus Vidius Florentinus apud Pisanos celeberrimus;
sed quoniam imperfectus est liber ille, quamvis maxima sit Hippocratis autoritas,

ideo pauca haurietis. Quod autem sit imperfectus, colligitur ex Galeno & ex se ipsam in eo tractatur tantum vlcus esse siccandum & alia aliqua pauca, non tamen quicquam perfectum habetur. Celsus etiam scripsit de hac materia doctissime quidem; verum quia permiscet vlcera, tumores, fracturas & vulnera omnia confundens, ideo non est exponendus. Galenus integerrime de hac rescripsit in lib. 4. §. 5 & 6. Meth. med. in quibus libris nil exoptandum est perfectius, vt legenti doctrina eius sufficiat: attamen quia abundans est plurima verba proferens ac tædiosa nimis, & etiam quia ex se facilis & perceptibilis, non est exponendus & ipse, Auicennas vero, quamuis 1. 2. & 3. diffuse de hac pertractet, & breuiter postea de hac arte agat in quarto libro, attamen in fen. 4. lib. 4. veluti defessus confuse admodum procedit, vti ipsum exponere esset difficillimum.

Inter recentiores autem aliqui non merentur legi, aliqui vero boni sunt, inter quos ego quam maxime laudo Guidonem de Cauliaco, qui legit artem hanc in Pessulano monte, qui Gallus fuit ac barbarus, quem Ioannes Tagaulius transtulit in Latinum, cuius ordo, quia mihi videtur satis laudabilis, hunc ego veluti imitatione dignum vobis propono, sicuti & ego cum in hac materia sequor. Tractaturus autem de vulneribus quatuor vobis aut quinque maxime necessaria declaranda proponam: inter quæ primo videndum erit, quid sit vulnus; secundo quot eius sint species; tertio quid præfigiendum sit in ipsis; quarto quomodo curanda veniant ipsa vulnera, agendo tam de vniuersali quam de particulari modo curationis eorum, id est, de modo respiciente locum affectum ac vulneratum. Quo ergo ad primum: Vulnus ex communi omniumque consensu nihil aliud est, quam dissolutio seu solutio continui seu continuitatis: quare vt melius pateat ac magis manifestetur natura vulneris, videndum est, qualisnam sit hæc solutio continui, ad quam pro cognitione vulneris nos transmittit Auicennas & etiam Galenus lib. 3. & 4. meth. Dissolutio ergo seu solutio continui, quæ etiam ab aliquibus dicitur soluta vnitas vel vnionis diuisio, nihil aliud est, quam separatio ad inuicem particularum aliorum membri, cui separationi contraria est vnio & continuitas: cum autem contrationum eadem sit ratio & disciplina, si viderimus, quid sit hæc partium vnitas, ex hac sciemus etiam, quid erit vnitatis solutio: vnio autem siue vnitas partium dicitur constitutio secundum naturam atque compaginatio naturalis seu coniunctio. Si itaque vnio est constitutio naturalis, solutio huius vnitatis erit habitus præter naturam, vnde sequitur, quod sit morbus, ex Galenolib. 1. & 2. Meth. med. & vbi que. Sed quoniam morborum aliqui sunt simplices, alii compositi, alii communes, alii singulares, cum corpus consistet ex partibus similibus & organicis seu instrumentalibus, simplex morbus dicitur ille, qui lædit vnā dispositionem naturalem: compositus vero, qui plures dispositiones naturales lædit, vt calfactio manus est morbus simplex, quoniam corrumpit tantum temperiem & symmetriam frigiditatis cum caliditate manus & excedit in caliditate. Morbus vero compositus est, vt inflammatio: quia corrumpit plures dispositiones naturales, vt quantitatis, qualitatis ac conformationis naturalis: cum ergo plures dispositiones corrumpantur, ideo plures læt morbi sub hoc nomine inflammationis. Morbus etiam simplex cognoscitur ex læsione vnus actionis, quoniam vbi plures læduntur actiones, affectio præter naturam multiplex est. Ad videndum autem an continui solutio sit morbus simplex, vel compositus dicamus, quod cum vnio sit vnica affectio naturalis, ergo solutio huius vnitatis erit morbus simplex. Præterea ex pluribus Medicis solutio continui est morbus partium similiarum, nam & ipse tolluntur, ergo simplex. Sed cum pateat etiam instrumenta hoc vitio laborare, colligitur solutionem continui esse morbum communem & similiaribus & organicis partibus, in quo omnes fere videntur consentire. Galenus enim lib. 2. Meth. med. & alibi dicebat morbum esse dispositionem præter naturam à qua læditur actio, ne causam dicemus morbum, quamuis aliqui accutent Galenum, quoniam morbus lædit facultatem; hoc tamen videtur leue. Sed quia facultas non apparet sed actio, quoniam non est facultas in actu, sed in potentia ideo cum Medicus sit artifex sentiat, potest dicere morbum lædere actionem apparentem, non autem facultatem latentem, ideo Galenus recte definit morbum. Supposita ergo hæc definitio morbi dico ego, quod morbus partis alicuius ille est, ratione cuius læditur propria eius actio: nam si læderetur in partibus similibus, verbi gratia, motus cum motus non sit propria earum actio ideo morbus tollens motum in ipsis non dicitur proprius. Carnis enim, verbi gratia, & partium similiarum actio propria est nutritio, reliquæ autem omnes actiones sunt partium instrumentalium: vnde si sit aliqua dispositio præter naturam, quæ non lædat actionem, dicitur tantum accidens, non autem morbus, vt cutis infecta colore nigro vel alio. Quare colligitur solutionem continui non esse morbum partium similiarum, cum non lædat propriam earum actionem.

actionem. Quod autem solutio continui non lædat nutritionem patet, quoniam partes solute maxime nutriuntur & augentur & refarciuntur. Si quis autem dicat in vulneribus non fieri veram nutritionem, dico ego, quod restituitur eadem caro & eiusdem speciei, idem assero de callio osseo genito in fractura, imo dico quod gignitur maior quantitas partis quam fuerit absque vulnere. Sed contra dicit quis ex solutione continui lædi nutritionem, quæ est actio similium; quoniam cum sint corpora continua, ergo cum diuiduntur contra suam naturam; patiuntur vel pati debent. Quod autem solutio continui impediat nutritionem, patet, quoniam puncto nervo non amplius nutritur pars, cui inferuit ille nervus. Ego autem solvens dubitationem hanc dico, quod impedimentum hoc fit per accidens atque per multa media, non autem impeditur nutritio à solutione continui per se & primo atque præcipue, quoniam ad punctum solet insequi spasmus & dolor, & à corpore pungente inducitur intemperies in parte puncta, ex qua tandem impeditur actio propria partium similium, nutritio nempe ipsa. Ad rationem autem ipsorum, quod pars similis corpus sit, respondéo; quod pars similis, quatenus corpus non est similis nec dissimilis, sed similis est, quatenus habet hanc substantiam sibi omnino similem eandemque habet temperiem, pariter organon, hoc est organum & instrumentum, non quia corpus sed quia hac figura, superficie ac numero constat, iis actionibus seruit ac ista fruatur unitate. Cum itaque pars similis sit ex propria natura, non autem ex unitate, si soluitur, patitur unitas, non tamen similitudo eius ac natura propria, quare soluta unitas non est morbus partium similium sed instrumentaliū, cum earum primo actiones lædat. Hoc autem dico ego exercitandi gratia ac pro paradoxo: quoniam reuera ex Galeno solutio continui est morbus communis tam similibus quam organici partibus. Si quis vero quærat cur communis ponatur morbus à Galeno & Medicis? hoc dico ego fieri, quia multa partes similes sunt, quæ organa sunt, ut sunt organa primi gehetis, & multa organa sunt similia & conuerso. Sed quoniam hæc partes distinguuntur inuicem ratione vñs siue vñitatis & etiam ratione actionis, ut Galenus ibi distinxit, ideo quinque erunt genera siue species morborum, quibus opprimuntur & affliguntur organa & instrumenta quatuor proposita à Galeno & quintum à me additum, quod commune ponitur à Galeno, sed à me ponitur proprius morbus partium instrumentaliū, ut infra dicam. Circa differentias autem vulnere, cum plurimæ sint species solute vñitatis & à multis tractatæ, sciendum est, quod conciliator differ. 181. solut. 11. diligentius aliis hoc tractat ex Auicenna sen. 2. lib. 1. doct. 1. c. 4. qui enumerat tredecim vel quatuordecim modos solute vñitatis, quamuis Auicenna ibi ponat & addat quinque alias, quæ attamen sub illis tredecim contineri atque reduci possunt. Sed quoniam differetia etiam fontes proprios, unde oriantur, habent, ideo conciliator ipse quatuor ponit loca siue fontes, à quibus hauriri possunt & debet, quorum primus est locus affectus, secundus est situs siue positio solutionis in parte siue vulneris; tertia est magnitudo solutionis ipsius: quartus fons à quo sumitur, est excrementum quod exit atque refudat ab ipsa solutione. Quo ad primum locum siue fontem à parte affecta, continetur in eo cutis, os, caro, vena, arteria, nervi, articuli, panniculi, &c. In secundo vero loco circa situm solute vñitatis obseruat partium principium & extremum vel secundum latum vel transversum vel partis longitudinem: In tertio obseruat, an solutio continui magna sit vel parua; in quarto vero excrementa ipsa considerat, quæ diuersa sunt, ut dicemus.

De fontibus differentiarum & speciebus ipsius solutionis continui.

CAP. II.

Quatuor ex conciliatore diximus esse fontes, ex quibus hauriri possunt vñuet siue vulnere differentia, ut pote primo à loco affecto; secundo à positione & situ solutionis, tertio à magnitudine eius; quarto ab excremento refudante ab ipsa soluta unitate. & ex his eliciuntur tredecim aut quatuordecim species ipsius solutionis: quoniam si detur solutio continui in cute per longum sed parua, non autem profunda, dicitur scarificatio, & est prima species. Si autem hæc solutio continui sit magna & per transversum, dicitur exoratio, dummodo non sit admodum profunda. Si vero in carne fiat solutio, dicitur vulnus aut plaga. Si autem solutio fiat in cartilagine vel osse per latum, dicitur incisio. Sed si hæc solutio continui emittat multam saniem, vocatur vicus, non autem vulnus, quoniam vulnus proprie dicitur ante emissionem saniei.

Quod si vero hæc solutio fiat per longum, dum parua sit, dicitur scissura. At si sit magna solutio & per longum, vocatur cōfusio: & ita sunt septem species, & tres easdem proponit in nervo, scilicet incisionem, scissuram & cōfusionem. Si autem mufculi per transversum soluantur, dicitur separatio circa extrema capita & ab Auicenna incisio. Si dicta solutio continui fiat per longum, dicitur liquefactio vel dissolutio. Si autem in chorda vel

Lædi proprii partium similium.

Peri foras aut foras.

Infermentum quare tale.

Paradoxi solutio à Galeno non ponitur, sed communis solutio dicitur morbus.

Differentia siue vñitatis.

Fontes à quibus hauritur differentia.

Quatuordecim species solute vñitatis.

neruo sit solutio continui per longum, dicitur attritio: veluti si sit in venis & arteria per longum, scissura. Si vero sit in eisdem per latum, dicitur incisio & separatio. His autem addit Auicennas perforationem & aneurisma, & est continui solutio cum abscessu. Si solutio sit in panniculis, dicitur ruptura, vt patet in disruptione peritonæi. Sed si solutio sit in articulis, dicitur dislocatio. Tot sunt species solutionis continui ex conciliatore, quas ego non laudo penitus: quoniam Galenus proponit decem genera solutionis continui in libro i. 3. 4. meth. & 6. etiam meth. cap. 1. & libr. de differ. morb. capit. 11. prima species est vlcus, 2. fractura, 3. vulnus, 4. richma, quam vocem alii vario modo transferunt, sed ego eam voco rupturam, quinta dicitur ab ipso Galeno thlasma, id est, contusio. sexta spasma, quod potest transferri conuulsio, non autem conuulsio, quæ dicitur spasmus à Galeno, qui accusatur in hoc ab Argenterio, sed immerito, septima dicitur *diastema*, id est, diuulsio, octaua *diastema*, à me vero vocatur hiatus, nona est insultus vel disultus, decima & vltima est erosio. Sed animaduertendū est, quod Galenus hæc omnia confundit, ac nulli methodo hæret, quoniam primo ponit vlcus in parte carnosa & dicitur vlcus, quia distrahuntur partes solute in opposita capita, & hoc in libr. 3. method. med. cap. 1. Secunda species est solutio in osse dicta fractura. Tertia est vulnus in parte carnosa cum perforatione tamen. Quarta richma in musculis ac nervosis partibus, quæ in vasis ruptura dicitur. Quinta contusio, quæ est muscularum vel vasorum solutio. Sexta est spasma, id est, conuulsio, quod est soluta vnitas in nervo. Septima est *diastema*, quæ est solutio in ligamentis. Octaua *diastema*, quam ego voco hiatus, & est solutio in meatibus vasorum. Nona est disultus qui est solutio in textura vasorum, quia vasa texuntur variis fibris ac filis. Vltima species est erosio, & est genus morbi mixtum ex soluta vnitate & amissione substantiæ & est quasi venarum propria solutio.

Conferenda Galeni.

Ar lib. 4. meth. med. cap. 7. & lib. 5. meth. med. c. 2. hæc omnia confundit: nam dicit vulnus esse solutionem in musculo, vena arteria & nervo, secundo dicit rupturam esse in vasis ac musculis: deinde dicit esse solutionem in neruis, tertio dicit spasma esse in neruis, at in illis locis dicit, esse in parte carnosa: quarto dicit *diastema* esse solutionem in omni organo, quare confundit hæc omnia. Hippocrates etiam variat. Nam facit contusionem & rupturam in ossibus. Deinde vulnus ossi ac cerebro ascribit: præterea vlcus omnibus partibus applicat, vnde maxima arguitur difficultas in illorum dictis.

Conferenda Hippocratis.

Exemplum Galeni.

Non tamen est accusandus Galenus, quoniam verba non curauit, sed secutus est sententias Medicorum aliorum: res enim ipsas semper affectauit maxime & enumerationem neglexit: hoc autem ostendit libr. 6. meth. cap. 1. vbi subdit voces non esse curandas iis, qui rerum cognitionem veniant, & ideo de vocibus non est sollicitus. Præterea cum alie possint ad di differentie solute vnitatis: quoniam hæc proposuit à Galeno sunt differentie tantum sumptæ à parte affecta: differentie enim morborum à multis aliis accipiuntur quas ipse omisit, non tamen est accusandus, quia cum eius propositum sit docere modum curandorum morborum, ad quem scopum maxime conducunt differentie à parte affecta: ideo ab illa tantum assumpsit occasionem diuidende solute vnitatis. Non tollitur tamen quin & ambiguitas sit tollenda, & omnes species solutionis proponenda. Primo igitur ea perpendenda sunt quæ necessaria sunt ad culusque rei contemplationem, quorum primum est causa morbi, secundum morbus ipse, tertium pars affecta, quartum modus morbi, quintum accidentia quæ morbum consequuntur: ex his enim capiuntur omnes species veluti à quinque fontibus, quos superius vobis recensendos proposui. Cum itaque sit solutio continui ab extrinseco aliquo corpore efficiente, quod facit morbum non solum nomine, sed curatione differre: nam cutis soluta à gladio & soluta à fluxione acri non eodem modo curatur. Per corpus autem extrinsecum intelligo ego omne corpus contentum extra superficiem partis affectæ cum internam tum externam: si quis enim deuorans vitrum patitur vulnus in intestinis, illud corpus extrinsecum est, quoniam est extra superficiem interiorum. Notandum est autem quod cum solutio continui non possit fieri nisi aut per lineam aut superficiem aut per punctum: si fiat per lineam aut per superficiem à corpore extrinseco dicitur vulnus, nec tunc à parte corporis oritur aliqua differentia, sed semper est vulnus & prima species, quæ etiam dicitur plaga & ictus & incisio: quamuis ego semper eam vocavi nomine vulneris dum fiat casum scilicet à corpore cædente, etsi à Hippocrate pluribus aliis nominibus vocetur. Notandum est præterea quod hoc vulnus diuiditur, quia quandoque fit separatio sine profunditate, quandoque cum profunditate, vnde si sit sine profunditate, dicitur scarificatio, quæ non tantum in cute, sed etiam potest fieri in omnibus aliis partibus, & est solutio superficie tenus tantum facta. Quandoque vero soluta vnio sensibus percipitur non potest

Vnde hanc de his species solute vnitatis Galenus.

2. species solute vnitatis est vlcus.

Notandum autem quod propter speciem solute vnitatis.

test recte, vt patet quando fit contusio in aliqua corporis parte, ibi enim est solutio continui, quæ tamen oculis non subicitur: nam tunc inter minimas particulas fibras ingreditur humor & soluit vnitatem, pariter cum rarefcit textura, fit solutio continui, ignota tamen atque oculis latens. Si vero solutio fit cum profunditate, vocatur vulnus.

1. Addatis secundo quod omnis soluta vnitatis aut sedes habet in se soluentis instrumenti aut non habet: sedes autem instrumenti non remanet nisi in vulnere & scificatione. Si autem diuidatur continuitas ab extrinseco instrumento ac remaneat sedes instrumenti punctualis ac momentanea fit punctura appellata à Græcis vero *νευμή*, de qua tractat Galenus lib. 6. meth. med. cap. 1. & 3. Si autem ab extrinseco corpore soluitur vnio non patiens ad sensum, fit *indecus*, contusio vel collisio dicta, in qua non remanet instrumenti soluentis sedes, vt si quis oculum pugno percusserit, ibi est solutio, non tamen vestigium aut sedes pugni relinquitur. Notandum est tamen, quod quandoque cum hac solutione immanifesta solet concurrere vulnus ipsi, unde Medici dicunt aliquando vulnus contusum quod compositum est ex vulnere & contusione. Quarto accidit quandoque vt corporis partes separentur manifeste diuisione ac separatione, vt patet in suspensis ad tormēta per brachia, quorum aliqui patiuntur lacerationem musculorum manifestam, alii vero immanifestam, & tunc fit *contusio*, id est, contusum, quod ab Hipp. dicitur *νεκρωσις*, & à vetustioribus Medicis diuulsum teste Galeno in 3. comment. de offic. med. com. 31. quarta igitur species diuulsi appellatur. Quinto quandoque soluitur continuū à corpore aliquo intimo, quod motu violento impellit partes ac illas manifeste dirumpit aut immanifeste ex se ipso est huiusmodi athletarum sanguine repletus, qui dum feruet, rumpit venas, pariter status intestina quandoque lacerant & abdomen ac peritonæum, quod fit etiam ab humoribus fluentibus per spatia particularum, qui ipsas dirumpunt & lacerant atque separant. Si itaque manifesta sit separatio in venis, intestinis & abscessibus ipsis, omnes hæ solutiones continentur sub ruptura. Si autem immanifesta sit hæ ruptura in venis facit rarefactionem, dicitur infusus, quoniam quando facta est hæ rarefactio, sanguis ipse exilit & quasi saltando exit. Si autem solutio fiat in ostiis venarum, quia solutio illa non patet ad sensum, vt fit in hæmorrhoidibus, quatum solutio oculis occultatur, tunc solutio illa vocatur *diuulsi*, id est, hiatus, & quantuis notissima sit à quo ad effectum, tamen immanifesta est ad oculum. Si vero solutio ista per extensionem facta sit in tumoribus omnes enim tumores habent coniunctam hanc solutionem vnitatis non habet nomen proprium, nisi sub ruptura contineatur, non enim est pura ac simplex soluta vnitatis. Sexta species est, quando soluitur continuitas cum ablatione partis siue eius substantiæ: hæc autem ablatio substantiæ vel à causa interna fit vel ab humore erodente, unde sunt vlcerata omnia, & hic est locus proprius vlceris, & hæc est differentia inter vlcus & vulnus: nam vlcus semper est cum ablatione substantiæ, & hæc solutio dicitur *diuulsi*, vel erosio. Si autem hæc solutio fiat à corpore extrinseco erodente, vt à caustico, est idem vlcus, & erosio eadem. Si autem hoc instrumentum extrinsecum fecerit, vt cum quis gladio partem secat, dicitur excisio, *νεκρωσις*, & hæc solutio proprie dicitur amputatio non autem vulnus. Sub septimo autem genere & ultimo concipitur solutio continuæ in parte aliqua dura & manifesta, in qua tamen non remaneat teli extrinseci sedes, & fractura dicitur vel *νεκρωσις*, quod idem est in osse & cartilagine: nam si est solutio immanifesta, esset contusio manifesta, & remaneat teli sedes, erit vulnus, si non remaneat teli sedes dicitur fractura. & hæc sunt species omnes solutæ vnitatis mea quidem sententia & diuisione aliorum etiam.

De vera definitione vulneris & differentiis à propriis fontibus ex Falloppii
sententia, & causis. CAP. III.

1. VVlnerum species omnes, imo solutæ vnitatis differentias ex aliorum diuisione superius tradidimus, & ex mea etiam sententia nunc modo transeundum est ad definitionem vulneris & eius differentias atque species proponendas, in qua re cum definitiones omnes vulneris à quocunque autore assignatæ vanæ sint vel manæ vel superflue, vt patet ex superius dictis & traditis: ego veram & propriam vulneris definitionem assignans dico: vulnus esse solutionem continui in qualibet corporis parte factam ab extrinseco instrumento cedente. Cum autem vulnere species ac differentie plurimæ proponantur à recentioribus, ego eas solum modo proponam, quæ ad curationem attinent, quæ à causis sumuntur, à morbo, à parte affecta, à modo vulneris & à consequentibus.

1. A causa quidem nulla videtur oriri differentia: attamen ego dico, quod quævis causa procacitica sit, tamen quia aliqua organa extrinseca inducunt malam qualitatem in vulneribus, vt si gladius rubiginosus sit vel limatus vel veneno infectus, curatione varianda

venit: sed si hæc non adsint, non variatur. Ideo dicendum aliqua vulnera differentiam sumere à causa ipsa, unde dicere possumus, quod alia vulnera sint venenata, alia non, aliarum biginosa, alia non. & sic de cæteris: quoniam per venena intelligitur hoc in loco omnis gladii siue instrumenti cadentis infectio. A natura quidem affectus oriuntur veræ differentie elicitæ vel à quantitate seu magnitudine vel à figura vel à situ, vel ab ætate vulneris, de quibus pertractat Gal. in lib. 3. meth. med. cõtra illos qui assignabant inflammationem, erysipelas & huiusmodi affectiones pro differentiis: morbi enim per se constituunt, Differentie autem à magnitudine aliquid indicare in curatione, unde habemus vulnus magnū, vulnus parvum, profundū & superficiale. A figura vero aut rectum aut obliquum aut rotundum.

A situ autem vel sit per longū partis vel per transversum, vel per obliquum: hæc enim variant curationem, quoniam recta vulnera ligantur, transversa vero confui debent. Quamvis enim in omnibus vulneribus indicetur agglutinatio, tamen non ob id tollitur varietas curationis vulnerum, non enim solum in medicamentis collocatur res sed in tractatione chirurgica, quod patet, quoniam solo vino quandoque & aqua vulnera sanantur.

A tempore vero oriuntur differentie, quas neglexere moderni, quoniam vulnus non appellatur, nisi principio quando cruentum est, deinde transeunt in vicus, sed hoc falsum est, nam vulnus habet sua tempora curationem variantia, quare vulnus aut est recens aut antiquum, aut stans aut declinans.

Pars etiam affecta maxime variat curationem totam, unde Galenus ad hoc tantum respiciens proposuit differentias solutæ vitæ tantum, à loco affecto: hæc autem differentie tot sunt, quot partes corporis, quare ex vobis ipsis eas enumerare potestis. A modo autem vulneris non variatur curatione, & ideo non est sollicitandum de hoc. A consequentibus autem oriuntur differentie nam aliqua consequuntur ad vulnera, quæ speciem vulneris non componunt, alia vero consequuntur vulnera atque ipsa variant, de primis autem veris accidentibus est cruoris fluxus, dolor & saniei fluxus. & omnibus vulneribus hæc habentibus convenit definitio vulneris superius data. Hæc autem accidentia sunt consideranda, quoniam aliqua vulnera etiam per tres dies sanguinem emittunt, aliqua non, & ex his curatio variatur, præcipue circa sectionem venæ: ego autem vos moneo ut hoc maxime observandum habeatis, ut scilicet permittatur maxime sanguinis copia effundi: testor enim me semper sanatos vidisse illos, quibus sanguis copiosus effluxit, nisi enim copiosissimus efflueret sanguis, vulnera reciduant, aut succedunt erysipelata aut herpes miliaris molestissimi, quate ego propterea manibus sanguinem exprimere iento & permitto copiosissimū effluere & cum successe. Alia quæ etiam vulnera cum dolore sunt, alia non, aliqua humidissima, alia siccissima, quæ differentie omnes curationem variant.

Attendendum est etiam ad consequentia impropria, ac ad ea quæ vulnera composita faciunt: compositi enim morbi maxime Medicos fatigare solent, quare maxime notanda sunt vulnera composita cum inflammationibus, erysipelantibus, cedematibus & huiusmodi aliis affectionibus & morbis. Circa causas autem vulnerum habemus ex lib. 4. meth. c. 3. Medicos antiquissimos ipsas maxime inspicere tanquam indicantes curationem: isti tamen accusantur à Gal. & merito: nam causæ vulnerum observandæ sunt tantum duplici de causa, primo ut cognitionem præstent Medico vulneris, secundo ut præmoneant nos de aliquo imminente malo vel bono, quod possit succedere, an scilicet instrumentum magnum sit vel acutum, vel ponderosum, an veneatum sit nec ne, an rubiginosum aut te aliqua mala infectum. Causa ergo omnis extrinseca aut est animata aut inanimata, mukum enim differt vulnus à gladio factum ab illo, quod morsu alicuius animalis est infectum.

Signa autem non inuestigantur, quoniam oculis maxime patet, pro signo autem habemus lesionem actionis partis illius quam timemus vulneratam: habemus præterea exteuntia, quæ signa sunt vulnerum occultorum.

De Prognostico instituendo in vulneribus, unde habeatur, quæ sint lethalia vulnera, quæ non. CAP. X.

Habitis iam differentis omnibus vulnerum, causis atque signis, præcedente definitione, modo tractandum est, de prognostico faciendi in vulneribus deque cognitione vulnerum lethaliū & non. Quo itaque ad præfagium, scilicet difficilem esse hoc caput, maximamque diligentiam in eius tractatione requiri, attamen sciendum etiam est, quid præfagendum sit: nam futura nuntianda sunt & ante tertium diem pro assistentium satisfactione atque Medici decore, quamvis hoc maxime periculosum sit, quoniam ars proponit septimum diem ad præfagendum. Primo ergo videamus quid prædicendum sit secundo qua ratione hoc sit faciendum. Duo autem sunt prævidenda atque prænuntianda à medicis quorum alter

terum continet symptomata omnia vulnere contingentia vsque in finē, sed de hoc in curatione verba faciemus. alterum continet finem vulnere, mortem scilicet aut vitam, sanitatem aut non, & si sanitas futura sit, an tarda fiet vel cito, & an cum noxa partis vel sine vlla noxa: præterea an noxa futura sit circa temperiem aut circa situm partis & huiusmodi, & si æger non potest sanari, videndum est an moriturus sit, vel viuere possit nec ne. In hoc autem casu obseruandum est aliqua horum fieri necessario, aliqua vero casu & contingenter superuenire, aliqua enim ratione successione necessatio habent pro fine mortem: quæ lethalia & insanabilia dicuntur: aliqua vero saluberrima sunt, quæ necessario sanantur, & ista pauca sunt ac mitia, quædam vero necessario non sanantur, sed semper noxam afferunt parti, & dicuntur malefica à nostris: quædam vero vt plurimum, sed non necessario mortem afferunt, & à Celfo lib. 7. c. 16. dicuntur vulnere periculosa. Alia vero ex æquo se habent & dicuntur graua & difficilia vulnera, quæ bene tractata sanantur, secus vero minime. Guido autem proponit horum signa sumpta primo à partib. affectis, secundo à morbo, sed hoc imperfectum est, quare ego ad perfectam horum inuestigationem quatuor proponam capita, primum à parte affecta, secundum à vulnere, tertium ab habitu, quartum à rebus non naturalibus, quæ possibilem ac necessariam sanitatem vel mortem inducunt. Circa primum ergo caput obseruandum est organum & primo eius dignitas, secundum eius substantia, tertio temperies, quarto situs, quinto quantitas partis vulnerate, sexto numerus, septimo conformatio atq; vsus & actio partis. Circa secundum obseruanda est magnitudo vulnere, figura, situs, symptomata consequentia, vt dolores & huiusmodi: vltimo sunt considerandi alii morbi compositi & complicati cum vulnere. Circa caput tertium obseruandum est habitus totius corporis & partium principalium: cacochymia enim moram affert habitus etiā singularum partium consideretur: præterea an in toto vel parte aliqua sit quædam infectio mala, vt febris aut morbus gallicus & similes affectus: præterea ætas potissimum parietis est consideranda, quoniam & ipsa variat indicium. Circa caput quartum considerandus est vitæ presens & præteritus: qui enim inordinate viuunt, raro sanantur. Omnia ergo ad vitæ attentionem considerentur. Exemplum autem hoc sit, vulneretur pars aliqua nobilis & magna, quæ sit alicuius facultatis principium, atq; continuo motu & a gladio venenato ac in habitu malo & in ætate senili, impossibile est, quin succedat mors. Sic ergo etiā obseruare alios casus. His itaq; stantibus si cor vulneretur, necessario vulnus lethale est: nullum enim visum est cor vulneratum, quod mortem non intulerit, vel subitam vel citam, quod colligere ex ipsius præstantia: cor enim partium omnium est nobilissima substantia præterea cordis hæc indicat, quæ cum dura sit, glutinari non poterit, præterea cor est in perpetuo motu, ratione cuius nunquam fiet consolidatio: præterea temperies cordis est calidissima, & ideo facillime potest inflammari, quare necessario mors succedit: quod si etiam reliqua addatis, non est dubium, quod vulnus cordis lethale est necessario. Et ideo Hipp. sect. 6. aph. 18. & in lib. de morb. vulgar. Et omnes cum eo vulnera cordis proponunt lethalissima. Venæ etiā cauz vulnera lethalissima sunt, primo ratione vsus, quia continent totum sanguinem: est enim veluti cella vitæ, in qua totus continetur sanguis, vnde ipsa vulnerata, totus etiam euacuatur & exit. Præterea ipsa vena substantia est nervosa, quæ solidari non potest: præterea ratione situs eius non possumus manum imponere ad sanguinem supprimendum, quare necessario huiusmodi vulnera lethalia sunt ex Galeno & Hipp. loc. cit. Arteriarum aortæ vulnera etiā lethalia sunt necessario rationibus dictis. Sic etiam vulnera cerebri lethalia proponuntur ab omnibus quoniam cerebrum est præstantissimum instrumentum, quamvis quo ad vitam nobilissimum sit cor: verum quia non mouetur, præterea quia frigidum est ac molle cerebrum, possumus colligere vulnera eius non esse lethalia: quod si lethale est eius vulnus, id est ob magnitudinem vulnere & præcipue circa ipsius basin vel ob complicatos morbos, vt inflammationem, &c. quare videtur dicendum, quod vulnera cerebri lethalia sunt vt plurimum: vel sunt vulnera eius ex æquo lethalia & non lethalia, testis potissimum Galeno sect. 6. aph. 18. & lib. 8. de vsu part. in princ. vbi dicit plurimos esse sanatos vulneratos in cerebro vsq; ad eius ventriculos. Guido etiā exempla proponit plura, & sic Carpus, quin imo & ego ipse præter alia multa exemplum habeo de quodā, cui Ferraria in maximo frigore ac etiam Pado glaciato refecta fuit quantitas cerebri ad instar qui auferis, & tamen sanatus, quoniam cerebrum non est instrumentum vitæ, nec est durum, nec in motu: præterea possunt manus apponi ad eius vulnera, nisi sint circa basin eius, quare in reliquis partibus cerebri homines vulnerari euadere possunt, licet pauci. Sed Hippocrates in 6. de morb. dicit, quod homo vulneratus in cerebro moritur: attamen ego ad hanc autoritatem dico cum Galeno in 6. aph. 18. quod interpretandum est maximum vulnus cerebri & vesicæ, quod ego probo ex eodem Hippocrate 1.

de præsentia
causæ morbi

Exemplum pro
propositis

Vulnera cordis

Vena caua

Arteria aorta

Dubitium, an
vulnera cerebri
sint lethalia
vel non

propterea ubi se interpretatur dicens, quod partes vulneratae, si inferant mortem, oportet ut sint validissime vulneratae: quare dicendum est, quod ibi intelligat Hippocrates perniciosa esse vulnera, si valide vulnerata sit pars. Hepar autem non habet omnia vulnera lethalia; aliqua enim tantum lethalia sunt necessario, alia vero minime: quoniam substantia epatis facillime regeneratur: quoniam non tollitur sanguificatio ablata eius substantia etiam dimidia: unde ego vidi plurimos vixisse cum epate obfesso à scirrhis: quare idem potest esse in vulneribus: enim pars eius altera vulneretur, reliqua suum agit opus. Sed difficultas est ratione partium, ex quibus constituitur & ratione situs: nam ratione situs non possunt imponi medicamenta loco laeso, ac praeterea si circa venam cavam vulneretur, lethale est necessario vulnus, circa vero alias partes minime, cuius plurima sunt apud metestomia, quae brevitatis causa omitto. Aduertendum est tamen circa Galenum 6. aph. 18: quod legendum sit litera negatiua, ubi asserti sententiam eam de glibo ablato.

In diaphragmate autem si pars eius carnea vulneretur, vulnus est graue: quoniam ratione situs non possunt medicamenta apponi, ac praeterea est in motu & circa thoracem facillime sunt inflammationes: in parte vero eius nervosa necessario mors sequitur, semper enim sequitur delirium, inflammatio & quandoque conuulsio, ac nunquam medicamenta possunt apponi, quod ab omnibus confirmatur, & praefertim à Galeno lib. 3. meth. cap. 9.

De pulmonibus autem hoc scio, quod vidi plurimos sanatos, imo infinitos, in finitis etiam mortuos, quare vulnera huius partis ex æquo se habent: vnum tamen notatur à Celso, quod si vulnus sit in parte crassa venae arterioae necessaria est mors propter cōtinuum motum pulmonum, ratione cuius sanguis sisti non potest: hoc autem cognoscitur ex natura sanguinis exeuntis, qui niger est, signum enim erit sanguinis effusi à vena caua aut ab epate. Medullae spinalis vulnera lethalia ponuntur ab Hippocrate. Ego tamen testor aliquos vidisse sanatos; verum tamen est, quod si vulnus sit in partibus superioribus, necessario mors sequatur; si vero in inferioribus, nisi vulnus maximum sit, non necessario sequitur mors, sed conuulsio partium inferiorum.

Vesicae vulnera maxime in parte nervosa lethalia sunt, dummodo ad sint aliae conditiones: ego enim vidi militem vulneratū sclopeto, qui imgebatur ex femore & vesica perforata erat in parte illa, in qua ligatur ipsa vesica à lateribus. Quare si sit in ea parte vulnus, potest sanari: quoniam per ligamentum illud conerescit caro, & succedit sanitas, at si sit in aliis partibus, vulnus lethale est, & necessario lethale, si maximum sit.

Lien autem si vulneretur, non necessariam affert mortem: quoniam non est principium aliusculi facularis: sed si vulneretur circa vasa magna aut maximum vulnus paritur, necessario mortem affert, quia sanguis non poterit supprimi, nec possunt manus imponi. Aliqui tamen dicunt lienem posse auferri sine morte, sed, ut ingenue fatear, nescio ego quid de hoc dicere, cum nunquam hoc non viderim, nec ex relatione aliqua fideli hucusque habuerim. Vesica fellis vulnerata necessario lethum affert ob eius situm, quia medicamenta non possunt imponi, ob substantiam nervosam, quae solidari non potest ob excrementum, quod continet, mors tamen non subita, sed tarda ac longa succedit. In renibus autem cum duo adsint, substantia scilicet ipsorum ac cauitas & vasa, si vulnerentur tantum in propria substantia, non necessaria est mors, ut plurimum tamen succedit ex inflammatione: si autem vulnus in signe sit, & in sinum penetret, necessario sequitur mors & breuissime: at si vulnus paruum sit, potest sanari; & ego vidi post ictum pugionis concreuisse carnem illam laxam & sanasse, ut plurimum tamen mors superuenit.

De ventriculo, ego mulierem & hominem sanavi vulnus patientes in ventriculo & alium militem sanatum vidi sclopeto vulneratum: si tamen vulnus ventriculi sit magni momenti, ut plurimum mors succedit, & etiam si paruum sit, quandoque tamen sanari potest: si vero sit os ipsius vulneratum in signi vulnere, semper succedit mors propter consensum totius corporis cum eo; quandoque autem sanantur eius vulnera, quoniam medicamenta ventriculo possunt applicari vel saltem exhiberi, si non possent exterius apponi.

Intestina vulnerata non necessario afferunt mortem, dummodo possint ipsa confui, & etiam quamuis non possent confui, non tamen moriuntur semper ac necessario; plurimos enim vidi ego ita affectos sanari, ut plurimum tamen intestinorum vulnera mortem afferunt.

Mesenterium vero vulneratum ut plurimum mortem affert propter inflammationem sequentem.

Vulnera etiam circa alas & inguina in eorum vasis lethalia sunt, nisi adsit auxilium & peritus Medicus, qui sanguinem sciat suppressere & sanare, ut plurimum tamen curant, si recte tractentur.

Alia veto vulnera mortem afferunt nonnulla, sed non necessario, exempli gratia, vulnus in cauitate frontis, vt plurimum non sanatur: ego tamen habeo exemplum studio- Cautus frons
 si cuiusdam Foroiulienſis, in quo quamuis vulnus satis inſigne eſſet in cauitate frontis, ca- 16
 ro tamen exorta eſt.

Aſperæ arteriæ vulnus, vt plurimum non ſanatur, vt & vulnera gulæ ac thoracis, dum- 17
 modo partes internæ ſanæ ſint, vt plurimum enim in iſſis ſuccedunt fiſtulæ, quare hæc 18
 etiam prædicere debetis.

Ex vulneribus autem quædam ſunt, quæ, eſſi ſanentur, noxam relinquunt ac mem- 19
 bro inferunt vulnerato, alia facultatibus noxam relinquunt, & alia motum debilitant vel 20
 auferunt. Si igitur neruus aliquis læſus ſit vel ligamentum, vel caput oſſis, ſemper prædi- 21
 cetis læſionem articuli illius, & iſta vulnera malefica ſunt & graua. Notandum tamen eſt, 22
 quod quandoque ſecantur muſculi per tranſuerſum, & tamen tunc ſemper non ſuccedit 23
 impedimentum in motu: nam ſi vulneretur muſculus in medio, ſit conſolidatio & potif- 24
 ſimum facta conſuitione nec partis læſio apparebit: ſed ſi incidatur muſculus in parte ſu- 25
 periori aut inferiori, læſionem certam prænunciabit. Præterea cum videbitis in articulo 26
 vulnerato naturalem humiditatem mucofam egredi, ſemper eſt prædicenda læſio illius 27
 articuli, quoniam ipſa egreſſa ſtatim areſcit articulus, & ineptus redditur motui: & hæc 28
 ſunt maxime obſeruanda.

*De curatione vulnerum ſecundum varias intentiones &
 ſcopos. CAP. V.*

Circa curationem autem vulnerum hunc ordinem ſeruabo: primo enim tradam cura- 29
 tionem vulnerum ſimplicium, ſecundo curabo vulnera coniuncta cum accidenti- 30
 bus, tertio coniuncta cum aliis morbis, quarto loco autem vulnera etiam per loca ſana- 31
 buntur. Quo itaque ad primum, ſi purum vulnus curandum ſit, vnum indicatur, quod 32
 maxime reſpicere debet Medicus. Galenus enim in arte medica cap. 89. dicit, quod in di- 33
 catur vnitas ac coniunctio, quæ eſt contraria diſpoſitioni præternaturali. Notandum ta- 34
 men eſt, quod partes dupliciter vniri poſſunt, quandoque enim vulneratæ vnuntur per 35
 glutinationem & coalitum, vt ſi cera vel glutine pars vtraque coniungeretur, & talis con- 36
 iunctio dicitur *vnio* agglutinatio, cum videlicet pars mollis ac viſcida inuicem conſungi- 37
 tur: & eſt vnio naturalis ac perfecta, quæ dicitur prima intentio à noſtris chirurgis, de qua 38
 Galenus pertractat, cap. 91. libri art. med. à quo tamen primus ſcopus vocatur. Secundo 39
 modo vnitur partes diuiſæ per colligationem, vt dicit Galenus, eum enim non poſſumus 40
 aliter pannum panno coniungere, conſuimus, vt etiam patet quando fabri ex duobus fer- 41
 ris vnum faciunt eum ſtanno vel plumbo, & iſta non eſt glutinatio ſed colligatio. Idem en- 42
 nim fit in vulneribus, in quibus caro naſcitur, & ipſa tota cauitas expletur ac partes per 43
 colligantiam coniunguntur, & hæc vnio ſeu colligatio vocatur etiam concarnatio, & eſt 44
 ſecundus ſcopus vel ſecunda intentio: vel coniungitur ſolutio cõtinui per generationem 45
 carnis exterius, vt in vulneribus arteriæ & venæ ex Galeni lib. 2. de compoſ. med. ſec. loc. 46
 vbi loquitur de vulnerib. capitis ex Apollonio. Et de ſciſſuris cranei ex Archigeneſi in oſſi- 47
 bus autem ſuperuenit callus, qui explet ſolutam vnitatem extrinſecus tamen. Quæ autem 48
 partes recipiant primum ſcopum, ſeu per primam intentionem tractari debeant, ſunt om- 49
 nes partes carnoſæ & omnes partes ſpermatice in ætate puerili ac prima, in reliqua ve- 50
 ro ætate poſt ſeptimum annum omnes partes ſpermatice ſanantur tantum per ſecun- 51
 dum ſcopum.

Notandum tamen eſt, quod Galenus loquens de hoc in 90. capite art. med. dicit 52
 curationem ſolutionis cõtinui eſſe vnionem, quæ in inſtrumentalibus partibus impoſ- 53
 ſibilis eſt, in ſimilibus vero non ſemper poſſibilis: quæ quidem ſententia eſt grauiſſima, 54
 vnde ſi vera eſſet, infinita ſunt vulnera, in quibus nihil agendum erit, videlicet inſtrumen- 55
 torum vulnera. Si ergo verba, vt ſonant, colligantur, & intelligantur, maxima eſt diffi- 56
 cultas: exponentes enim ibi Galenum intelligunt ſolutionem integram per tranſuer- 57
 ſum, quia pars abſciſſa mortua eſt, nec poteſt vnquam vlux vniri: ac dicunt partes 58
 ſimilares ſectæ iterum coniunguntur, vt ſi ſecetur vena in puero, reſtituitur ſolutio illa. 59
 hæc dicunt ipſi. At ego dico hoc falſum eſſe, & falſum videtur, nec Galenum ſibi conſen- 60
 tire, quoniam multa inſtrumenta ſunt, quæ reſecta ſanantur ex eodem Galeno, libro 61
 13. Method. med. & in libro de ſen. vbi dicit, quod venæ, arteriæ, nerui ac chordæ in 62
 pueris ſunt vnita, quæ ex Galeno ſunt inſtrumenta. Vt ergo conſuſio tollatur, dicen- 63
 dum eſt expoſitionem illam malam eſſe, quia præciſio nunquam curatur in viliſ par-

*Instrumentum
definitur
organum.*

*Definitio
instrumenti
pro
pse
fuit.*

Ignorantia.

*Item
fuit.*

*Error alienus
gratus in
pro
intentione
accipitur.*

*Item
fuit.*

*Item
fuit.*

*Item
fuit.*

*Instrumentum
definitur
organum.*

*Propositio
naturae
fuit.*

*Item
fuit.*

*Item
fuit.*

tibus nec similibus nec dissimilibus siue instrumentalibus, sed intelligenda est quaecumque solutio continui, & sic nulla est contradictio: quodiam hoc nomen instrumenti duo significat, aliquando scilicet partem, quae instituta est ad usum alterius partis, exempli gratia, nervi, venae, arteriae, quae non deferunt facultatem propter seipsas, sed propter membra ipsa cui inferuntur: nervi enim non propter se spiritus deferunt, sed ut cerebrum deferant. In hoc autem casu cum instrumentum sit pars illa, quae alicui servit, non est curandum, an ex simplici vel composita constet materia: & hoc est primum significatum instrumenti, de quo non intelligit Galenus, quoniam instrumenta haec primi ordinis sanantur, sed intelligit per instrumentum partem compositam simplici contradistinctam, quatenus vera sunt instrumenta, ut oculus, manus, pes, &c. & in hoc verissimum dicit Galenus.

Sed datur instantia de plurimis instrumentis per medium divisis, quae tamen sanata sunt, & ego, ut verum confitear, plurima instrumenta sanavi ex toto quasi praecisa & fere amputata: ideo respondens instantiae dico, quod Galenus ibi loquitur de vniione primi scopi, quae est agglutinatio: nulla enim pars composita potest agglutinari ex eodem Galeno, cap. 9. art. med. ubi dicit, quod os solum non potest vniiri per primum scopum, sed tantum per secundum, & vtrumque declarat, quare sic verissima est eius sententia. Notandum tamen quod nostri chirurgi per primam intentionem intelligant quid latius quam intelligat Galenus: chirurgi enim, cum fiat, vel bi gratia, vulnus in facie & consuevit, & si quid tenuis carnis in illo vlnere medio creseat, illam agglutinationem appellant: sed Galenus glutinationem vocat, quahdo partes hullo medio glutine interueniente coniunguntur, quate male nostri chirurgi vniionem illam glutinationem appellant, cum sit secunda intentio & secundus scopus, licet non ita aperte pateat. Si quis vero quærat, cur ego hanc differentiam faciam, dico quod hiis fieret hæc distinctio, Hippocrates falsum dixisset nam se & 6. aph. 19. dicit, præputium, auriculam aliaque quædam partes non coalescere, attamen partes istæ exangues nisi consuevit, nunquam coalescent ex carne replente totâ cavitatem: si ergo loquamur de coalitu primæ intentionis, auriculæ nunquam coalescent de secunda autem intentione, nisi consuevit, nunquam coalescent: tamen possumus ostendere mille aurículas conglutinatâs non per primam sed per secundam intentionem, quæ fit cum medio aliquo: ideo errant chirurgi vocantes illam glutinationem. Notandum est etiam ut pauca cavitates sit in istis vlnerebus, consuevit esse, aliter natura nunquam replebit carne cavitatem illam magnam in aliis partibus, quam in carne ipsa. Ut autem Medicus propositio vulnere ac duobus istis scopis curet, ut coniungantur partes solutæ, oportet ut diligenter obseruet causas huius vnionis faciendæ ex Galeno lib. art. med. cap. 9. & ex lib. 3. meth. med. cap. 4. Instrumenta autem & causæ, quibus assequimur finem intentum, duæ sunt, Natura scilicet & Medicus: natura enim est vera efficitur, sed auxilium Medici requirit: ego autem ex mea sententia addo tertium, quod est medicamentum, sine enim ipso hec natura neque Medicus opus perficiet, quod quidem medicamentum fortasse intellexit Galenus sub nomine Medici. Vt autem ego hac in re distinctione: nam multa facit chirurgus absque medicamentis, & medicamentum absque chirurgo: natura autem non agit, nisi omnia impedimenta tollantur à Medico & Medicamentis & in hoc quidem debemus nos naturæ auxiliari.

Quatuor autem sunt, quæ solent naturam impedire: quorum primum est mala partis conformatio, ut quando gena vulnerata cadit: secundum est mala conformationis perduratio. 3. additio alicuius corporis ex toto præter naturam: vltimum est morbus aut insalubritas partis affectæ, per insalubritatem intelligendo intemperiem aut alterum morbum partis affectæ, qui præter vulnus in ipsa parte sit: non enim est dubium, quod, si quid sit in vulnere, non sanabitur. Et hæc sunt quatuor capita ex ipso Galeno proposita.

De iis, quæ naturam impediunt, ne vulnus sanet per certa capita ex ipso

Falloppio distinctis.

CAP. VI.

Quatuor dicebamus esse capita ex mente Galeni siue impedimenta ne natura ipsa finem suum consequatur in sanando vulnere: sed quoniam mihi diminuta videntur & pauca, ut distinctius nos procedamus, sex ego vobis proponam capita maxime animaduertenda & obseruanda in curatione vulnere, ideo vos attentos cupio in his percipiendis capitibus, quorum primum est, ut caueamus ne quid extraneum in vulnus cadat. Secundum ut extrahatur vulnere, si quid in ipsum incidit. 3. quod in quocumque vulnere labia ipsius coniungantur inuicem. 4. ut ipsa labia iam coniuncta sic conseruentur.

feruentur. s. quod symptomata, si quæ sunt, tollantur: & si immineant, prohibeantur. vltimum vero quod habitus & natura partis affectæ conseruetur, aut, si amissa fuerit, restituantur.

Quo itaque ad primum caput, sit Medicus sollicitus, ne quid extraneum in vulnus incidat, quoniam aliter nunquam sanabitur, vt est pilus vel aliquid vinctuosum, quia hæc impediunt agglutinationem: nam vinctuosum humectat, ac sua visciditate consolidationem impedit. Præterea cauendum est, ne oleum cadat in vulnus cum infunditur in ipsam partem. Paulus etiam monet cauendum esse, ne arena in vulnus cadat, quæ cum tolli non possit, agglutinationem impedit: quare quandoque ego diligentissime abluui vulnera, cum aliquid videbam relictum in ipsis: nam medicamenta aliquando non habent tantam vim vt ipsa possint extrahere. Præterea ex Paulo libr. 4. capit. 3. 6. cauendum est etiam, ne qua humiditas infuset in vulnus, vel sanguis in grimum conuersus. Vt autem hæc non fiant, ex Celso libr. 5. capit. 147. oportet, vt chirurgus videat quantum sanguinis egressum fuisse enim eius parum exierit, faciat multum exire comprimendo partem; habita tamen ratione habitus corporis. Quod si egressa sit quantitas debita, explendum est linimentis siccis vulnus ipsum, quæ filamenta dicuntur à nostris ex filis excerptis.

Chirurgi autem aliqui statim ad bomicem recurrunt, quæ materia inepta est: quoniam, quando vult Medicus eam euellere, excitat fluorem sanguinis, quare potius vtendum est filamentis, deinde Celsus imponit spongiam madidam aqua frigida, qua non iuuante vitur aceto ne humores fluant in vulnus: caute tamen vtendum est aceto: primo quia dolorem facit, secundo quia sua qualitate offendit vulnus, constringendo nimis, non recipiet etiam materiam bonam. Aerius addit, quod facit quandoque partes ipsas rigidas. vtendum est igitur potius posca, scilicet, aceto aqua diluto, vnde quando filamenta sanguinem non sistant, ego accipio quatuor partes aquæ & vnam aceti si acris sit acetum: sed vt rectius procedatis, sciatis, quod mixtio illa optima est cum potest bibi posca sine gustus deprauatione, & hanc poscam impono, non tamen frigidam, quoniam frigidum est inimicum vulneribus. Sciendum autem est, quod acetum per accidens stringit, non autem per se, nisi vinum, ex quo factum est acetum, adstringens sit. Notandum est autem quod illa, quæ possunt fluere in vulnera sunt humores ex 90. capit. art. med. vbi Galenus dicit, quod impedire debemus fluxum humorum in vulnus non tantum in principio, sed etiam in processu: nam tunc quandoque oportet, vt faciamus materiam fluentem egredi etiam, ne fiat pus, vnde etiã quandoque oportet secare vulnera ratione humoris fluentis & quandoque relinquuntur ostiola quædam in vulneribus, & hæc actio dicitur suffluxio pro qua agenda nostri chirurgi apponunt tentam & bene agunt, cum cauitas magna est, at si parua sit cauitas, hocque timeatur, sunt turpes cicatrices, hoc itaque modo perficitur primum caput: sed antequam vltius progrediamur, optimum fore duxi, si de materia excrementorum vulnerum tractemus: quoniam hoc maxime pertinet ad vulnerum curationem atque cognitionem ad ipsa curanda: Diuersitas enim excrementorum vulneris ipsius diuersum statum indicat, diuersamque curationem requirentem.

De vulnerum excrementis, deque eorum nominibus, signis, speciebus, natura, materia, causis & ortu. CAP. VII.

VT ex actam consequi possitis excrementorum vulnerum cognitionem, sciendum est, quod excrementorum variaz sint voces apud autores cum Græcos, tum Latinos ac barbaros: primo enim est sanies, virus, virulencia, pus, ichor, pus oleosum, &c. Apud Græcos autem tres tantum sunt voces, prima ichor, secunda sordes, tertia pus & potissimum apud Hippoc. & Galenum, quas voces callere oportet. Quo autem ad ichorem sciendum est, quod apud Galenum non semper idem est, nam per ipsum quandoque intelligit Galenus humiditatem ferocem mixtam semper cum sanguine in venis, vocatur quoque ichor aquosus & tenuis, de qua humiditate loquitur in libr. de tum. præter nat. cap. 1. vbi dicit in inflammatione ichorem semper fluere, & declarat quid sit ichor, quandoque per ichorem intelligit, vt libr. 3. Meth. c. 3. omnem humiditatem tenuem egressam ex vulneribus: passam tamen aliquam alterationem: primus enim ichor fluit quandoque quidem ex vulnere, sed sine vlla alteratione, vt etiam Galeni sententia est loc. cit. Notandum est autem quod Galenus in libro 2. ad Glauc. cap. 8. facit huius ichoris duo genera, alterum incoctum & alterum concoctum: hoc autem coctum concutitur quasi cum pure, incoctum vero ex libr. 5. meth. capit. 10. putridum dicitur, semper enim hæret, quare sciatis, quod ubique loquor de ichore, intelligam semper de illo secundo alterato in vulneribus.

*Inde quif-
guftat.*

Per *pus*, id est, fordem intelligitur apud Galenum humor contradistinctus ab ichore, in omni enim concoctione sepatatur excrementum tenue, quod dicitur ichor, sepatatur etiam excrementum crassum, quod sordes vocatur, quæ ferme idem est cum pure Galeni, unde ipse quandoque confundit sordem cum pure. Aliquando sordes significat genus excrementi adeo crassi & sicci, ut auelli non possit ab ulceribus & vulneribus, & hæc dicitur quandoque à Galeno sordes in nata ac assata, quæ auelli debet in ano aut guttulo vel instrumentum aliquo. Et hoc modo loquens de sorde intelligitur quocunque in loco de ipsa verba faciam, sicuti vult & intelligit Galenus in libr. 5. meth. med. capit. 10. Pus autem ex sectione 2. aph. 47. & aliis etiam locis & ex Galeno, qui etiam vitur hæc voce, significat excrementum concoctum factum in vulneribus quando generatur bona caro: pus autem album esse debet vel cineritium, & quale non grumofum nec fetens: cognoscitur autem melius hoc ex loco citato & ex libr. 2. ad Glauc. cap. 8. & libr. 5. meth. capit. 10.

*Pus quid signi-
ficet.*

*Excrementa à
Celsi propo-
sit.*

*Excrementa
per se natura-
lia sunt: sunt
per se, sunt
natura-
lia.*

*Excrementa à
Celsi propo-
sit.*

*Natura excre-
mentorum natu-
ra.*

*Ichor rarius à
tenuis quid.*

Ichor, signa.

Ichor, signa.

*Secunda excre-
menta natura-
lia.*

*Excrementa à
pus fit in la-
mibus.*

*Excrementa
per se natura-
lia sunt: sunt
per se, sunt
natura-
lia.*

Hæc autem eadem excrementa proponuntur à Celso, primo enim proponit pus: quod album est, crassum ac magis glutinosum, quam sanguis fluens: nam sanguis concretus glutinosior est pure. Secunda species Celsi dicitur sanies, quæ crassa est, alba & species saniei dicta ichor, per ichorem enim saniem intelligimus apud ipsum subalbidam ex vlcere egredientem. Tertia species est *pus*, quod est sanies veluti mel album, crassa. Pus autem oleosum solet egredi ex vulneribus ossium & neruorum. Recentiores autem ponunt tres species saniei: quarum prima habet omnes notas puris, & dicitur bona sanies & laudabilis, & qualis, cocta. Aliquando autem per saniem intelligunt ichorem Celsi, quandoque pus oleosum, quandoque etiam intelligunt per saniem virus. Præterea distinguunt ipsi virulentam saniem in calidam & frigidam, cum tamen omnis virulentia sit frigida quo ad molem: quoniam plurimæ sunt partes in ea frigida. Tertio per saniem sordem intelligunt, quam vocant saniem grossam & sorditiem, quam postea distinguunt in albam, nigram & cinerulentam. Ex istis itaque ego colligo quod pus Celsi dicatur sanies bona, & à Galeno *pus*, secundo ichor Galeni sanies, ichor, *pus*, & pus oleosum dicitur à Celso. Ab his vero sanies fetens, virus ac virulentia. Sordes autem dicitur ab his sordides ac sanies grossa. Sed quoniam hæc nomina scire satis non est ad rem, ideo videnda est horum excrementorum causa ac materia. Quo itaque ad primum excrementum vulneris, quod nihil passum est, illud dicunt esse humiditatem cruentam retentam in venis cum sanguine, quod exit, quia capillamenta venarum aperta sint, & quia tenuis est humiditas illa, egreditur, & iste est ichor tenuis vel aquosus, & vulnus, in quo est hoc excrementum dicitur ichorosum, sicut datur etiã vulnus cruentum. Cognoscitur hoc excrementum à colore primum, quia erit veluti lictura carniū, dummodo purus sit sanguis in venis: nam si sanguis biliosus sit, ichor flavus erit; si melancholicus, niger. Addatur etiam si bstantia: nam hoc excrementum est tenue & aquosum penitus: tertio nullum habet fetorem: nam fetor indicat ipsum alteratum esse & corruptum quid esse in vulnere: hæc igitur sunt signa primi excrementi, cuius materia est serum in venis contentum & ipsius causa efficiens intima est.

Secundum excrementum alteratum in vulneribus à calore naturali alteratur. Galenus autem libr. 5. de simpl. med. fac. cap. 6. dicit tres esse mutationes in humoribus factas: prima à calore naturali, qui semper agit in humores: quos conuertit in bonam materiam pro nutritione partis; secunda est alteratio in humoribus facta à calore præternaturali, cum ipse humorem alterat ad putredinem & corruptionem, quæ cognoscitur ex malo odore, in quem terminat putredo ista. In hoc autem genere alterationis duo possumus obferuare, alterum quod materia bona ad malam corrumpatur secundum, quod materia mala peior adhuc fiat per putredinem, tertia alteratio facta partim à calore naturali, partim à præternaturali, ita tamen, ut calor naturalis vincat, facit enim quod materia illa non sit mala, nec lædat corpus: postea autem alteratio nulla fit in vulneribus: nam excrementum id non conuertitur in carnem: secunda vero & tertia apparent in vulneribus: & sic omnis excrementi vulneris causa duplex est: aut calor naturalis aut præternaturalis. Sanies ergo mala, virulentia & id genus alia sunt à calore putredinali, quandoqueque sic inempenes aliqua in vulnere, corrumpuntur humores à calore aucto ac putrido, unde fit sanies fetida, fit autem crassior vel tenuior, huius vel illius coloris, prout diuersa est materia, ex qua fit, ac prout caloris gradus ac vis intenditur: quandoque enim adeo durit humores, ut colorem faciat nigrum vel etiam pallidum. Quare inter hæc sanies dantur plurimi gradus pendentes à materia & intentione graduum caloris. In vulneribus autem quandoque fit tertia alteratio à calore naturali vincente eam, licet non ex toto, & ista materia

teria sanies est cocta vel pus: nam ex Galeno in omni vulnere fit duplex excrementum, *ichor* videlicet coctus tenuis & sordes non tenuis: Iste ergo ichor coctus fit ab hoc calore naturali non tamen integro, quia esset sub alia forma & quantitate; semper enim laborat & agit calor naturalis in omni vulnere, quare ab utroque calore fit excrementum hoc, tamen dominatur calor naturalis, quia non adest fetor. Alterum erat excrementum hoc crassius & erat pus coctum quod bonum est, fitque ab hoc eodem duplici calore; fit autem crassius ratione materie, cuius necessatio duo excrementa sunt, cum & ipsa habeat etiam duas partes, crassam videlicet ac tenuem. Tertio & ultimo si aut erret Medicus vel sit Intemperies sicca in parte, fiet tertium excrementum bonum illud, quod dicitur sordes, quae maxime haeret, & potest fieri ex adstringentibus medicamentis ac nimis siccantibus; vel si sit vulnus nimis detectum relictum, tunc enim ab ambiente fit illa siccitas, quae quandoque potissima est causa huius excrementi crassi.

Materia autem vna est, scilicet humiditas ipsa, varia tamen, quae proponitur à Galeno in lib. 6. de simpl. med. fac. Hippocrates tamen proponit sanguinem in lib. de vlcetibus, & per sanguinem intelligit omnes humores in venis contentos: addatis etiam carnem ipsam à sect. 2. aph. 47. caro confusa in hac excrementa conuertitur vel etiam caro elixata. & haec est excrementi vulnere.

Quo modo & arte tela & alia in vulnere contenta extrahenda sint.

CAP. VIII.

Secundum caput ex sex superius propositis hoc erat, ut si quid in vulnus incidit, extrahatur. Tria autem solent esse genera contentorum in vulnere, quorum primum est continens illa, quae habent aliquam similitudinem cum corpore nostro; secundum continet remota; tertium vero remotissima. In primo autem genere continetur sanguis grumosus siue grumus sanguinis & pilus aliquis, quae primo gossipio auferri debent, si possunt auferri, secundo forcipe, tertio alumine; unde Celsus utebatur aqua pura, qua non iuuante vtuntur aliqui aceto, sed non placet, quia nimis dolorosum est, unde ego soleo uti posca ipsa vel oxymellecum aqua temperato: aqua etiam tepida iuuat. Si aut incidat vel haeret pilus in vulnere, haec eadem conueniunt. Si autem ea dant remota quaedam in vulnere, ut est calx vel arena, haec tollenda sunt, si fieri potest, eodem modo. Fuligo etiam quandoque solet impedire consolidationem, & ablui non potest caligo ipsa, quia caligo illa siccissima cum sit, haerere potest corpori nostro ita ut difficulter per abluionem auferri possit. In hoc ergo calu monco vos, ne ad sistendum sanguinem in facie recurratis ad gossipium vstum, quia relinquitur ex gossipio vsto nigredo illa turpis atque maxime deformis.

Quandoque autem accedit Medicus ad vulnus curandum, in quo est instrumentum, vel vitrum, vel spina, vel clauus, vel squame piscium vel sagitta, vel pugionis fructu. & hoc mirum est, quod frequenter glandes plurimae in vulnere remanent, quandoque partes indumentorum, & hoc est proprium glandium plumbearum, ut secum ferant in corpus indumentorum aliquid: haec igitur omnia obseruanda sunt & extrahenda.

Si igitur potest extrahi instrumentum feriens, videndum est, an possit facile extrahi neque; nam nisi facillima sit extractio, & homo possit viuere & sanari sine lésione, non est sollicitandum de extractione. Albius autem libro secundo capite 94. ponit quatuor exempla, & ego quamplurima habeo ac nobilissima exempla glandium plumbearum relictarum in corpore absque lésione, nam extrahuntur postea suo tempore instrumenta illa: quando ergo symptomata mala non inducunt & cogunt hominem ad extractionem, omittenda sunt.

Secundo obseruandum est ex libro tertio de method. med. capitulo primo quod, si potest extrahi instrumentum, an homo statim moriatur vel superuiuere possit: non enim permittendum est, quod in nostris manibus moriatur. Nam si exempli gratia gladius infixus est dorso aut cordi aut basi cerebri, extrahere non debemus, quoniam statim exhalat anima, quod fit ex maxima fluxione sanguinis & maxima alteratione, quod idem dicendum est de vena caua, sed si extractio non coniungatur cum morte subita & afferat noxam parti, extrahendum est instrumentum.

Cum autem possit extrahi instrumentum aut medicamentis aut instrumento, sciendum est quod extractio per instrumentum citius operatur & conuenit, praecipue quando timemus inflammationem fieri & dolorem ex instrumento contento in vulnere. Praeterea si ad id instrumentum venenatum ac malum. Si autem haec non adsint, uti possumus medicamentis pro extractione teli.

Quo itaque ad medicamenta, quando adest vitrum vel spina in vulnere infixæ, aliqui vtuntur incantationibus, vt Theodoricus lib. 1. cap. 22. Sed quamvis modus sit pulcherrimus, tamen verum fateor, quod nunquam viderim successisse.

*Medicamentum
ad extra-
hendum
tripliciter
fuit.*

Ex Galeno autem lib. 5. de simpl. med. fac. cap. 17, est triplex genus medicamenti attrahentis, quorum primum facit à tota substantia, qualia sunt medicamenta purgantia & alexipharmaca, quæ attrahunt omne genus veneni apposita vulneribus. Proponuntur tamen aliqua à Paulo libro 4. capit. 1. vt est semen hyoscyami, quod trahit spicula: præterea medicamentum diaboranon dictum, quæ medicamenta frigida sunt, & ideo ego fateor non comprehendere, neque percipere, quomodo attrahant: si itaque attrahunt: ergo à tota substantia & à latente substantiæ temperie habent hanc vim vt attrahant ex vulnerib. instrumenta ipsa. Secundum genus extrahentium est id, quod putredine sua ad se infixum trahit, & in hoc genere est viscum quodcunque, quoniam omne viscum per putredinem fit; addit etiam fermentum & sterces columbinum non siccum sed calidum & putrescere incipiens; præterea triticum comestum idem facit putredine sua. tertium genus ex Galeno est medicamentorum eorum; quæ calida sunt in secundo aut tertio gradu, quæque tenuia sunt, vt penetrant, quia separant infixum ab ipsa parte & extrahunt, & ista plurima sunt, sed primo est propolis, id est, cæra virgo, secundo est radix rundinis, cæpa communis cocta, narcissi cæpa, allium coctum, pix naualis humida, resina pini nil passa, oxyridis gladioli radix, lac omnis nithymali, aristolochiæ rotundæ radix recens contusa, dictamni albi radices, dictamni Cretensis flores & folia, gummi elemi, assa fœtida, sagapenum; ammoniaci lachryma etiam fortis est. Galenus præterea proponit capita lacertarum; addatis vos vltimo anagallidis vtriusque succum. Et hæc est materia pro præparandis medicamentis compositis ad extrahenda tela.

*Medicamentum
ad extra-
hendum
tripliciter
fuit.*

Cum autem raro simplicibus vtamur, ne suo fine frustrentur, ideo inter composita aliqua à recentioribus facta sunt, alia ab antiquis: sed ego duo potissimum habeo familiaria medicamenta, quorum primum mihi hoc est.

℞ propolis.

pulu. rad. aristol. rot. an. ʒj. β

sagapeni.

fermenti

stercoris columb. putridi an. ʒj.

narcissi cæpam er. j.

pisicis natal. liquidæ & mellis crudi an. q. s. Misce in mortario contundeque & f. empl. quod imponatur tepidum.

Aliud autem robustius est hoc, quod maximam habet vim in extrahendis telis infixis in ossibus.

℞ visci quere. aut cuiuscunque ʒβ

rad. dictam. nostratis.

pulu. dictam. horrent.

sagap.

ass. fœtid.

gumm. elem. an. ʒj.

resinæ pinij. β

euphorb. gr. v.

fulph. ʒβ

pisicis liq. & mell. crudi an. q. s. contendantur & misceantur in mortario.

Non est autem negligendum medicamentum propositum à Guidone in eius antidotario assumptum ab Auicenna in lib. 5. sub nomine Andromachi. Addatis medicamentum Melinum Serapionis & viliam dictam, & tertium dictum Venus, quæ exempla describit Aetius lib. 15. ca. 14. quæ omnia ego vobis propono & enumero, quoniam varia ad hoc assequendum requiruntur medicamenta. Verum Galenus proponit tria (medicamenta) quorum primum in libro tertio, de compos. med. per gen. capite quarto, & fit ex euphorbio: secundum habetur in libro sexto, de compos. med. per gen. capite secundo, circa principium, & inscribitur diaboranon, id est, emplastrum ex herbis, sed cum duo ibi sint ita descripta medicamenta, intelligendum est de priori, nam posterius malum est & prius illud compositum occulta potius qualitate agit quam manifesta, quoniam frigida multa recipit & tamen valide extrahit. Tertium medicamentum sacrum appellatur, quia repertum est in adibus sacri Vulcani in Ægypto. & hoc describitur à Paulo

*Compositum
ad extra-
hendum
Paulo.*

*Medicamentum
ad extra-
hendum
secundum
Galenum.*

paulo inepte lib. 7. cap. 2. 4. & 10. sed nullibi eodem modo. Descripsit etiam Galenus ex Hera & Asclepiade, sed illud Asclepiadis magis probatur. Hoc autem medicamentum dupliciter paratur; vel tantum ad extrahendum, vel ad vlcera mundanda: vnde ego ad spicula extrahenda describo hoc modo.

Recip. ol. veteris lib. j. in æstate, at in hyeme lib. j. ß

lithargyri lib. j.

colophoniz lib. ß.

ceræ 3ij.

ammoniac.

aristol. rot. an. 3ij.

mannæ thuris.

galbani an. 3j. ß.

dictam. Cretens.

ærug. æris

aloes

propol. an. 3j.

squam. ær.

gentianæ an. 3vj. primum coquatur lithargyris cum oleo, deinde addatur squama & ærugo, & cætera coquendo, donec non inquinet manus. & vitamini. & hæc satis sint dicta de medicamentis extrahentibus tela & alia infixia in vulneribus.

De Extractione manuali telorum & infixorum in vulneribus, & de instrumentis ad eam rem maxime aptis.

CAP. IX.

Quoniam multoties accidit, ut per medicamenta nihil agat Medicus pro extrahitione telorum ex vulneribus, ideo deueniendum est ad extractionem quæ opera manuali periclitur, & ad instrumenta ad id agendum idonea, in quo quinque sunt obseruanda capita. Primum enim videndum est, an sit commodum extrahere telum: vel potius relinquendum sit telum in ipso vulnere: quandoque enim processu temporis facilius est extractio. Secundo, est considerandum, an telum extrahendum sit potius trahendum, vel propellendum & expellendum ad aliam partem: aliqua enim instrumenta trahi non possunt, sed si debent eximi, ea oportet ad aliam partem propellere. Tercio videndum est, an ea, quæ infixia sunt, sint in extractione frangenda vel torquenda. Quarto videndum, quomodo euocandum sit telum: Quinto instrumenta cognoscenda sunt ad hoc apta, quia eadem non conueniunt in omni vulnere.

Hæc igitur sunt animo voluenda, ut ministri possint instrui pro horum cognitione. Instructio autem hæc facilis erit, si quatuor obseruentur, quorum est genus infixi teli, quo ignorato hæc recte describi non possunt: quare omne genus teli cognoscendum est. nam quamuis non faciat ad multam necessitatem, tamen multum facit ad usum. Secundum obseruandum est, ut sciatis necessitatem cum profunditatis partium tum aliorum, ut sciatis distinde quousque pertingat ac penetret instrumentum. Tercium necessarium est, ut sciatur anatomici ipsa, cuius cognitio perfecta haberi debet, aliter nihil vel parum admodum boni peragi potest. Vltimo requiritur, ut ante oculos habeantur symptomata præsentia & futura, quoniam dolor ingens ab instrumento factus vrget ad extractionem: syncope autem imminens extractionem prohibet subitam: venenum etiam considerandum est & huiusmodi. Hæc ergo quatuor capita necessaria sunt ad cognitionem quinque illorum propolitorum.

An vero telum extrahendum sit statim? Ioannes de Vigo expertus Medicus lib. 1. prædicæ suæ compendiosæ cap. 9. vult statim educi debere spinam infixam omni modo: Aui-cennas vero & Albucasis aliquantum superfedent, deinde extrahere tela conantur. quam sententiam approbat Guido omnesque minores chirurgi: nam videtur immitte esse id pri-mum, quare summo opere mihi placet opinio Guidonis; vnde & ego tela extrahere sum sol-litus quando docuique poteram absque ægri periculo.

Statim autem extrahendum est telum, præsertim, si adsit dolor continuus; secundo, si telum fuerit veneno aut rubigine infectum, nam aliter mors succedet: semper tamen in ipsi casibus sectio facienda est instrumento ignito, nam sanguinem supprimet & vene-nam superabit.

Quando.

Non debet autem statim extrahi ex Auen. quando ex extractione maiora symptoma timemus futura quam presentia: secundo obseruanda est natura telum si latum sit, descendit, & ideo possumus expectare & non statim extrahere. tertio si factus sit tumor, & angustatum sit vulnus, expectandus est finis inflammationis, & non statim extractio instituenta. Quarto non est statim extrahendum telum, si careatis instrumento debito proportionato ac idoneo, sed differenda est extractio, donec adsit instrumentum opportunum.

*Per quam**via telum
fit extrahendum.*

Secundum caput erat, per quam viam extrahendum sit telum ac educendum. Celsus libro sexto capitulo quinto, & Auenennas & Albucasis volunt instrumentum semper educi debere eadem via, qua est infixum, quia non sunt multiplicandi morbi, sed quandoque oppositum fit & tuto etiam, ut si telum perueniat ad partem fere extimam: tunc enim cum pro extractione secentur paucae partes, telum est per sanam partem potius protrudendum & extrahendum, quam eadem via, qua infixum fuit, retrahendum: verum obseruandum est, ne adsit aliquis neruus vel vas aliquod auro ipsius impediens. Ad hoc autem cognoscendum figura teli est obseruanda, aliqua enim tela sua natura retrahuntur per idem iter, ut sunt telata & glandes plumbeae: in Sagittis autem maxima est difficultas, nam aliquae triangulares sunt, aliae quadrangulae, aliae bilingues, unde hae bilingues non possunt per partem sanam propellendo extrahi: aliae vero utraque via extrahuntur. Sed aliquae sagittae barbulae diffuciliter per eandem viam extrahuntur: praeterea aliae sagittae ligno infixuntur, aliae habent lignum in se ipsas infixum, & instrumenta adfunt ad vtriusque & omnes sagittas extrahendas opportuna.

*Ad vltima
qua fit extrahenda.*

Tertium caput erat an tela extrahenda debeant integra educi nec ne: circa quod sciendum est, quod omnia frangibilia integra sunt educenda, adeo quod nec minima frustula, si fieri potest, in vulnere remaneant, quod idem dicendum est de glandibus plumbeis, quarum comminationes impediunt consolidationem. Si vero non possint educi integra, sine maximo dolore, frangantur aut torqueantur, ut absque dolore educantur. Quartum vero caput non potest cognosci sine praesentia vulnere & luci etiam afflicti.

*Quando
per collationem
extrahenda
telum.*

Preceptum tamen est quoddam, quod scilicet eger constituitur in eodem habitu, in quo erat, quando telum accepit, quoniam sic telum facilius extraheretur.

*Varia
instrumenta
pro extrahenda
telum.*

Secundo loquitur & ger robustissime, ac nimis viridi praesto sint, ne dimoueatur & sic facilius impediatur extractio: hoc autem in glandibus plumbeis non fit, quae paulatim descendunt neque recta ferunt, sed quandoque per transfuersum & per obliquum etiam penetrant. Quintum caput ad instrumenta attinet, quibus extrahi telum debet, quod non potest facile explicari, hoc tamen dicam, quod opus est variis instrumentis: quae autem sunt in usu apud doctissimos & peritissimos Medicos, haec sunt. Primum est hamus retusus, vnus scilicet qui non habeat aciem, sed retusus sit & est aptus ad extrahenda infinita spicula & globos etiam plumbeos ob eius curuitatem: oportet autem ut sit retusus instrumentum hoc ad attollendam arteriam vel venam, absque quod pungatur. Secundum instrumentum sunt quidam canales argentei vel aenei, qui seruiunt ad extrahendas sagittas barbultas: defendunt enim partes ne vulnerentur ab illis barbis vel alis vel spiculis & quando non adfunt hi canales, ut possumus penna anserina. Tertium instrumentum est illud, quod ypsiloides vocatur à Celso, quod in extremo clauditur, & compresso manubrio aperitur, quo vitmur quando opus est dilatare vulnus. Quartum sunt scalpri incidentes ex chalybe, quibus vitmur quando volumus os scalpere, ut spiculum ossi infixum possit extrahi, s. est nouacula gemina latens in fistula ferrea: & est instrumentum recentium: dum enim ponitur in vulnere, in ea fistula latent gemini gladioli, qui compresso manubrio exeunt & dilatant vulnus, sextum est terebra dicta ad comminuenda ossa. Septimum est terebra inuenta, quae etiam necessaria est, & facit ad extrahendas sagittas habentes tubulum, octauum est impellens cauum, nonum impellens sordum, quae ambo facta sunt ad impellendas sagittas ad partem sanam oppositam, quando non potest retrahi per partem vulneratam. Impellens autem cauum est instrumentum, quod habet in summo foramen veluti fistulam, quod factum est ad extrahendas sagittas caudatas: sordum autem impellens est instrumentum, quod non habet cavitatem, & factum est ad extrahendas sagittas habentes tubulum vel canalem. decimum instrumentum est forceps iuniorius, quo inciduntur sagittae vel laminae ferreae infixae in vulnere. vndecimum est forceps coruinus Albucasis, vel forceps semilunarius AVICENNAE, & est in modum tenaculae & rostri coruini inortus, vel in modum semilunae vel semicirculi. duodecimum est cannularis forceps, id est, tenacula cannu-

canulata, quæ setuit ad extrahendas sagittas barbulatas vel alaras. 13. est forceps anferina siue tenacula anferina; videtur enim rostrum anferis, in superficie exteriori est leuigata, in intima vero admodum scobè aspera, cuius cauitate apprehenduntur globi plumbei. 14. est anferina tenacula non dentata ad extrahendos faciliores globos; dentata vero facit ad extrahendos difficiliores. 15. est Alphonsinum instrumentum, inuentum à Moderno chirurgo, qui vocatur Alphonsus, faciens ad extrahendos globos plumbeos: & est præstantissimum instrumentum. 16. est spatula anferina, quæ similis est auriscalpro, sed maior. & est quoddam asperum sicut anferis rostrum; aliud vero leuigatum est in intima cauitate. 17. est specillum annulatum pro globulis. 18. est canula terebellata, & est fistula ferrea, per quam immittitur quoddam genus terebelli chalybei, quo vimur ad extrahendos globos plumbeos infixos in osse. 19. est balista pro extrahendo spiculo: violenter enim extrahit spicula infixas in ossibus recurrende chorda & arcu. Vltimum instrumentum est illud quod à Celsolib. 7. c. 3. describitur; & vocatur Græfcoos Dioclis, quo in loco notandum est, quod vbi dicit Celsus inclinata quæ perforata est, omittenda est illa vox, quia aliter nunquam intelligètis qualenam illud instrumentum sit. Et hæc satis sint de instrumentis ad tela extrahenda è vulneribus apta.

De quibusdam præceptis circa coniunctionem vulnerum per Sutura & conseruationem eius per deligationem cum diuersis fasciæarum speciebus & per laqueos & per puluillus.

CAP. X.

Tertium caput inter illa sex à me in curatione vulneris propoſita seruanda erat coniunctio & vnio partium vulneratarum ex libro tertio metho. capitulo quarto. hæc autem in cunctis Medici, in qua duo sunt obseruanda. quorum primum est, vt leuiter, secundum æqualiter partes adducantur. Et quo ad lenitionem non confertim ac vnico tractu, sed sensim ac sensim sunt adducenda. Sed præterea si ex æquo molles sint partes, considerandum est, si ambæ sint æqualiter molles & tunc æqualiter sunt adducendæ; at si vna sit dura & hæreat osse, altera vero mollis, ista tantum mollis est attrahenda. Si autem partes istæ à frigore riguerint, accipiendum est oleum & aqua ita calefacta vt ferueat, & super vaporem tenendus est locus; nam sic mollis reddetur, vel vtendum est aqua calida fouendo locum cum spongia illa imbuta sine oleo, postea adducemus. Vltimo obſeruanda est æqualitas in adductione, quæ qualibet consistit primum in superficie exteriori, vt superficies vnus partis respondeat superficiæ alterius partis, & ideo colligendum est, nunquam incipienda esse futura in medio, quia nunquam extrema quadrabunt, sed ab vno extremo incipienda est futura; secundo æqualitas ista consistit in hoc, vt partes sectæ simul coniungantur, quod pertinet ad totum vulnus, vt scilicet ex æquo vniantur partes profundiores vulneris & superiores & exteriores: non enim sufficit vt iungantur exteriores tantum, sed etiam infimæ & profundæ sunt vnien dæ & adducendæ. Quartum caput erat vt adductis labia vulneris iuncta conseruentur saltem per spatium quatuor dierum, quo tempore fit etiam confirmatio. Ista autem conseruatio solet fieri deligationibus, vinculis, glutinationibus, infibulationibus, futuris ac medicamentis. Instrumenta autem, quibus hæc fiunt primum sunt fasciæ & vincula, secundum est acus, tertium gluten, quartum medicamenta emplastica, vltimum plumaceoli. Quod ad primum, facilis est deligatio & minus aliis molesta, ideo quando hæc sola satisfacere potest, semper præ aliis est eligenda. Quo autem ad naturam deligationis, quæ à Galeno vocatur *σύνδεσμος*, notandum est, quod Galenus vtitur etiam hac voce *ἄνω*, quæ est colligatio vulnere per carnem adnatam; *ὑπὸ δὲ* autem est ista deligatio, quæ est collectio particularum corporis humani ab instrumento extrinseco ad hoc apto. Genera autem deligationis sunt varia. nam vna fit per vnā tantum reuolutionem, alia per plures diuerſas, alia vero est simplex deligatio, quæ scilicet fit ex reuolutionibus eiusdem speciei vel generis; alia est composita, quæ fit ex variis reuolutionibus, alia obliquæ, alia latæ, alia angustæ, alia similes, alia vero dissimiles. & hæc proprium habent nomen.

Vna autem vocatur ascia, quam ignorant Medici huius temporis, & tamen est vtilissima, quoniam ego hæc ipia sola plures liberaui à magnis crurum vulneribus; & est admodum facilis; altera est quæ ambi appellatur, tertia, quæ oculus dicitur, quarta rhombus, quinta semisecta deligatio, sexta & vltima rostrum cornicis dicitur.

Materia vero qua deligantur partes corporis triplex proponitur à Galeno. quarum

Materia fasciarum pro deligatione.

De deligatio fasciarum.

Fasciarum usus.

Deligatio incarnatiua.

Retentiu.

Expulsiua.

Prohibens apostema.

Quae obferuanda in deligatione.

vna est fascia linea, secunda lanca, tertia membranea, i.e. ex chartis, qua usus est Hippocr. in vulneribus faciei: quarta ex gossipio, quinta ex fetico: aliqui veru inuenerunt aliud genus materiz & est coma cannabis vel coma lini pexi: & hac vtuntur præsertim in fracturis ossium. sed ego etiam hoc usus sum quandoque, imo & sepe in vulnerib. ipsis & feliciter. Cum autem variz sint fasciez, opus est vt elegantur opportune, non autem quæcunque offeruntur; ideo vt etiam in electione ipsarum sit certa regula, sciendum est, quod primum obseruandus est fasciarum numerus: sunt. n. aliqua vulnera, quæ vnica fascia deligari possunt, alia verò duabus vel tribus, alia paucioribus, alia pluribus. Secundo est obseruanda magnitudo fasciarum in latum & longum: tertio est ipsarum puritas, puræ enim fasciez & mundæ debent eligi quantum fieri potest: quarto est adhibenda lenitas, vt scilicet lenia & mollia sint linteamina, ex quib. confici debet: quinto vt tenues sint fasciez, sexto æqualitas est obseruanda in fasciis: æquales enim semper esse debent. septimo simplices esse debent sine lineis illis iniercurrentib. 8. sint integræ & non laceratæ: vltimo structura telæ debet esse eiusdem vel variz naturæ, prout requiritur, aliquando enim requiritur structura telæ vnus naturæ, aliquando diuersæ.

Quo vero ad vsum fasciarum, triplicem earum vsum proponit recentiores, quorum primus vocatur incarnatiuus, secundus expulsiuus, tertius vero retentiuus. sed ego alios addo vsus, vt quartum disunctionum, quando fasciis diuiditur pars, ne coniungantur simul: præterea quintum directionum, quando in tota partem fasciis volumus dirigere, sextum quando volumus prohibere, ne fiat abscessus, & dicitur deligatio prohibens abscessum, septimum est deligatio faciens abscessum seu apostema, quando indigemus abscessu & volumus ipsum facere. Octauo & vltimo quando volumus partes inæquales adæquare, & dicitur deligatio adæquans partes.

Ex his autem omnibus incarnatiua primum opportunissima est, quoniam confertur partibus, vt agglutinari possint & hiantia labia coniungens dicitur ab Hippocrate, secunda est retentiua, tertia expulsiua, quarta prohibens abscessum; his enim quatuor maxime indigemus in vulneribus. Quo autem ad primum, deligatio illa incarnatiua solet fieri dupliciter, primo per fasciam duorum caputum, quæ in dimidia sui parte applicatur parti sanæ oppositæ, & hæc deligatio dicitur incarnans, circa quam notandum est ne sic lata sicut longum est vulnus, sed parum strictior, duplicata autem latio sit, ne rugæ plurimæ fiant super vulnere, dum concurrunt capita fasciæ: exempli gratia, si vulnus sit longitudinis quatuor digitorum, fasciæ latitudo sit trium digitorum tantum non plus nec minus. Secundo vero modo fit deligatio incarnatiua vnico linteo, quod latius sit quam vulnus longum, quo super vulnus curtimus, deinde cõsumimus eum concurrent capitula super ipsum vulnus, sumimus autem capita illa sutura transuerfa: sed hic modus non est ita commodus vt prior, nam habet multas difficultates. quare vtamini priori modo.

Secunda deligatio dicitur retentiua, instituta tantum ad continenda medicamenta & linteamina, quæ quandoque fit vnica, quandoque pluribus reuolutionibus, laxis tamen, quoniam eius vius est ad retinendum tantum.

Tertia dicitur expulsiua, qua vtimur cum timeamus in vulneribus cauis aliquid colligi: vt autem hæc deligatio recte fiat, obseruandus est terminus, à quo vultis exprimere: si enim vultis exprimere ab inferiorib. ad superiora, tunc incipere debetis de uinciendo partem sanam vsque ad ipsum vulnus: addit autem Guido vulnus esse in hac deligatione deligandum duabus deligationibus, laxis tamē, deinde ligetur pars sana super vulnus, vt prohibeat materiz influxum.

Quarta deligatio est prohibens apostema vel abscessum cum adest cacochymia, & timeamus fluxum materiz ad vulnus, obuoluendo primo vulnus & sensim postea ascendendo vsque ad primum articulum, deligando partem sanam. Præterea in his deligationibus obseruandum est quintum caput, quod continetæ, quæ obseruanda sunt in deligatione, quæ sunt itidem quinque ex ipso Hipp. primo scilicet, vt citissime atque celerrime fiat deligatio, secundo sine labore, id est, sine labore cum Medici tum ægeri: quandoq; enim corpus attolli debet vt deligetur: quare æger non laboret, ne incidat in syncopen, aut fluxum sanguinis: Tertio addit Hippocrates fasciis expedite esse applicandas: quod fit remouendo filamenta atque omnia impedimenta. Quarto concinne omnia faciendæ sunt, id est, cum proportionē sine rugis & complicationibus aut nodis. Quinto fasciæ debent paribus quadrare affectis: Hæc enim pertinet ad fascias. Quo ad puluillos autem, qui dicuntur plumaceoli, sciendum est, quod ipsis antiqui non fuerint vsi, sed spongiis mollissimis & lanis splenisque, & linteamina faciebant figura splenis, duplicata tamen.

Noſtri autem puluillis ſiue plumaceolis vtuntur, quorum materia eſt varia: nam aut eſt lana, aut ſtuppa, aut goſſipium, aut linreamina inuoluta.

Figura autem eorundem puluillorum varia eſt, nam habemus puluillos quadratos, rotundos, & longos. Notandum eſt autem, quod puluillis non ſemper vtendum eſt, vt in facie, in qua non poſſumus applicare faſcias ad detinendos puluillos, vt poſſint egri comedere, quare vnicæ partes conſuetati debent.

De Laqueis & telis pro glutine: Item de diuerſis glutinibus, ceratis glutinoſis, & modo applicandarum telarum pulcherrimo.

CAP. XI.

Quoniam laqueorum materia ſeu tractatio eſt fere noua & delectabilis atque valde utilis ad vlnera coniungenda, volui ego per caput diſtinctum de iſſis tractare, quamuis in ſuperiori capite tractationem eorum promileram. Sciendum eſt itaque, quod cum conſuſiones non ſint quandoque opportune, & præcipue, quia etiam aliqui vulnerati & ex aſſidentibus multi non admittunt conſuſionem iſſam, ideo inuentus eſt ſecundus modus conſuetandi vnitæ labia vulneris, qui ſit per laqueos, dum ſcil. applicantur duæ telæ medio aliquo glutine ad vtunque latus vulneris, quæ deinde laqueis conſunguntur & ſic ex iſtis laqueis attrahentibus & adducentibus iſſas telas ſit labiorum vulneris iſſius conſuetio ſatis opportuna abſq. alia ſutura & ægri moleſtia.

In applicatione autem laqueorum tria ſunt obſeruanda, quorum primum eſt applicatio & præcipue harum telarum præparatio, quando enim hoc fieri debet, accipiantur duæ telæ fortes ac tenues neque nimis craſſæ: præterea circa partem reſpicientem vulnus ita compaſta ſit tela, vt diſſolui nequeat, ad partem autem ſanam facile diſſoluatur tela, vt ſimbriae illæ parti magis adhiereant, vel forcipe ſecetis eam faciendo multas ſimbrias. Præterea huiusmodi telæ ſecentur ad formam partis, cui debent applicari. Vltimo huic telæ applicanda & adaptanda ſunt vincula in parte ea, quæ reſpicit vulnus. Sint autem vincula iſta ex filo ſolido ac duro. Secundo obſeruandum eſt gluten medium, quo applicantur telæ partibus. hoc autem gluten trium generum à me proponetur, & non vnius tantum, quia multum ad rem facit, nam aliquando ſoleo accipere gluten piſcium vel taurinum coctum in aceto: ſecundo vti poſſumus mixtura quadam admixto albo oui ad mellis conſiſtentiā, qua telæ poſtea imbuuntur. Pulvis autem hic eſt:

Recip. ſimlag. triticeæ,
puluer. maſticæ,
gypſi cocti
col. Armen. orient.
aloes
tragacanth.
gummi Arab. an. ʒj. Miſceatur, & fiat pulvis tenuiſſimus, quo vtitur cum albo oui.

Cum autem hæc materia quandoque deſit, aliqui conſciunt cetatum quoddam optimum ſecundum hanc formam.

Recip. pulu. maſtic. ʒij.
bitum. Iudaici
charabæ an. ʒj.
roſinæ colophonie & terebinthinæ an. ʒj.

Ex his liquatis ad ignem fit paſta, qua vti poteſtis addita olei roſati gutta vna aut altera, ſi nimis durum ſit, & emollimus igni & vltur. Ego autem poſſiſſimum vtor alio medicamento molliori, accipiens album ouis & diligentiffime concutiens, & eo telam mado faciens, deinde aſpergo puluerem calcis viuæ, parum tamen, ſuper patinam albo oui tinctam, & poſtea telam appono, vt ſuſcipiat puluerem illum, deinde telam applico. Et ſciatis, quod hoc ſuperat omne medicamentum glutinoſum, neq. exurit, cum ſit calx in minima quantitate: & talis eſt materia, qua telæ applicantur parti.

Tertium caput continebat modum applicandæ telæ in vulnerata parte cum non admittitur ſutura: paratis ergo telis & glutine aliquo, vnam imponimus in parte inferiori, alteram in ſuperiori, facientes vt telæ vtræque diſtent à vulnere per ſpatium digiti vnius. Secundo cum apponitis telas, obſeruare debetis, vt laquei ſibi inuicem reſpondeant, aduerſentes etiam ductus laqueorum, ne cicatrix fiat obliqua ac rugoſa.

Oportet .n. eo ductu collocare telas, quo trahendi ſunt laquei, tertio antequam traha-

*Obferuan-
da circa ap-
plicationem
telae.*

mus laqueos, oportet expectare, vt gluten sicceetur apponendo lintem calidum duplicatum. Altero v. die imponenda sunt medicamenta ad vulnus, postea altera die contrahendi sunt laquei quousque labia vulneris coniuncta sint facientes nodum. Notandum est tamen, vt manum adiuuemus, nec fiant duo nodi sed vnus tantum. postea totqueatur filum; nec etiam vitendum est ansula, vt faciunt aliqui, quoniam hoc non est commodum; quia quandoque adeo siccat filum; vt trahere non possimus sine molestia. Sed quoniam quotidie telae relaxantur, ideo quotidie sunt melius coniungendae ac alstringendae. Vltimo medicamenta vuloeris imponantur tantum super vulnus, non autem super telas, praeterea cum opus est vti vino; caueatis eo vti supra telas. Et haec de laqueis.

*De Sutura, de fibulis, acubus, filo, pennis, formicarum capitibus, & omnibus iis, quae ad
suturae pertinent.* CAP. XII

Successit vltimum genus conglutinandorum vulnorum, quod continet suturam. Si itaque vulnere tur particula aliqua, debet vni, sectum autem per primam intentionem, scilicet agglutinationem, vel medio quodam interueniente, quod est caro, & est secundus scopus, qui dicitur incarnatio.

Prior autem scopus solet à natura obtineri, cum partes molles sunt; sed hoc non potest facere natura, nisi vulnus expurgeretur, ac tale seruetur ac labia consueantur taliaque feruentur, quod opus est Medici & instrumentorum, vt aliqua ex parte dictum est, quod scilicet adiuuentur & adducantur labia vulnorum & adducta conferuntur. Relinquitur vt tractemus de; instrumento, scilicet de futura, circa quam primo videndum est, quid sit futura, secundo quor eius genera, tertio quo instrumento fiat, quarto quomodo sit facienda.

*Quatuor ob-
seruanda
circa suturem.
Quid futura
sit.*

*1. Natura
species.*

Quo ad primum per suturam intelligimus compositionem illam, quae fit filo & acui in morem consutorum pannorum. Quo ad secundum plures sunt suturae species, quarum prima est illa, quae ex toto suturae pannorum respondet, in qua tantum vnica futura consuitur vsque ad extremum, & haec est vera futura; quae partes consui debent, & hac praecipue vitium in consuetione cuius cum eduximus glandulam cancerosam; hac etiam consueimus intestina, quoniam aliter non vnitentur; cum ergo tantum eorum consueundum est; hac vel debemus. Secunda suturae species est illa, in qua quauis plures labia perforantur, tamen non est vnus ductus à principio vsque ad finem, sed perforatis labiis colliguntur capita filii & sic nodus & secatur; & sic aliae partes consueuntur, de perforatione in perforationem & de puncto in punctum, vnde haec consueo dicitur per puncta apud nostros chirurgos. Haec tamen futura est ex libro sexto method. med. capite quarto & dicitur à nostro Celsi libro quinto capitulo vigesimo sexto fibula, quoniam fibulae assimilatur, quae vestes vniuntur, & sic graece dicitur. Sed per fibulam omnes Medici & praecipue Guidonius intelligit instrumentum quoddam habens geminos hamos, quo vtuntur cimatores pannorum; volunt ergo quod & sic graecorum & fibula sit hoc idem instrumentum. Et etiam Ioannes Tagalinius per fibulam hoc idem instrumentum intelligit. Ianus autem Cornarius in suis commentariis in librum secundum Galeni de compos. med. sec. locos istis assensum videtur, quod omnes postea secuti sunt alii. Sed ego compositionem dicere moneo, si cendum esse, fibulam quae & sic dicitur, plura significare; nam fibula significat primo instrumentum quoddam, quo iam pueri utebantur ad caligas; & patrum discessit à fibula antiquorum; secundo per fibulam intelligebant antiqui annulum; quo traiciendo penem ac praeputium utebantur ad conseruationem vocis mollioris, cuius modum tradit Celsus lib. 7. cap. 25. & erat opus chirurgicum, & haec erat secunda fibula antiquorum. tertio fibula apud Medicos significabat filum collectum nodo ad labia vulnorum coniungenda; ad quam rem non bene respexere recentiores, nec poterant credere esse suturam; nam Galenus libro tertio method. med. capit. 4. dicit, labia vulnorum coniungenda esse fibulis, deligatione vel futura vel omnibus fibrulis; ergo fibula distinguitur à futura. Sed ego dico, quod per suturam Galenus intelligit primam suturam veram, per fibulam vero hanc secundam suturam, quod patet ex Celsi lib. 5. cap. 26. vbi ille loquitur de futura & infibulatione, & facit veram quae filo & sine hamo; praeterea dicit fibulam esse vinculum factum filo, & omnia praeccepta tradit communia fibulationi & suturae; quare fibula est secunda species ipsius suturae.

*Dubium
quid per fi-
bulam sit
intelligen-
dum.*

Secundo addatis Galenum in libro 2. de compos. med. sec. loc. in cap. de plaga capitis ex Archigene dicere, si pericraneum vulneratum sit de raso osse coniunges fibulis labia vulne-

vulneris; quod si futura non possint conseruari labia vnita, vtendum est incarnatione, quæ videtur in aliis vulneribus; ergo sibiula est futura. Tercio non obseruantur hi Galenum lib. 6. meth. med. cap. 4. præcipientem molliorem fili maximam requiri, modo si apponamus hamos: hoc erit contra præcepta Galeni. Quarto quando Galenus vult nos hæc tria imponere ad vultus, hæc tria simul non poterunt aptari; erit enim cruciatus maximus facta deligatione; quare his rationibus ductus ego credo, non posse sibiulationem fieri illis instrumentis, sed esse puncta ipsa, in quibus omnia præcepta sunt, & in quo omnes errant.

10 Tertia ac vltima futuræ species est illa, qua utebantur antiqui, vt faciunt nostræ formæ minæ, quando emendant, quæ confusio latens est ac oculum decipit; hanc Galenus docet libro tertio, meth. & libro sexto, meth. in qua non damus neque ducimus filum super vultus vnquam, sed semper manet adductum in lateribus; talisque confusio in abdomine fit, ne fecentur labia vulneris. Vltimo didicere chirurgi nostri consuevere a caligariis, qui gemino filo consuunt caligas, quam confusionem docet Albucasis libro secundo, cap. 85. & est confusio illorum, qui consuunt scarpas, & est in ordine quarta. His autem quatuor generibus futurarum coniunguntur vulnera non tantum vt agglutinentur, sed etiam ad incatnandum vel retinendum, vel ad supprimendum sanguinem: Et hi tres sunt vsus harum omnium quatuor futurarum, vnde futura facta ad incarnationem dicitur incatnatiua: alia retentiua vel seruatiua dicitur, quando consuuntur vulnera ne nimis dilatentur, & in hoc non nimis stringendum est: Tertia est futura suppressiua, quæ fit ad sanguinem supprimendum, quæ sæpe in vulneribus opus est, licet non indicetur a vulnere.

Circa materiam autem, ex qua fiunt futuræ, primo requiruntur acus, qui non debent nimis longi nec etiam breues esse. Longitudo autem trium digitorum per transuersum, aut quatuor sufficit. Crassities etiam moderata sit, & sint politi acus ipsi, acies eorum triangularis sit aut quadrangula vel biseptatales autem acus habetis Venetiis copiosos Damasceenos dictos, quoniam illi, qui ex Mediolano deferuntur, pessimi sunt neque expoliti. Requiritur autem acus & chalybei & argentei; chalybes quidem pro partibus durioribus, argentei vero, quia possint flecti; chalybei enim non ita commode possunt flecti, in partibus præcipue cauis consuendis. Sed notandum est, quod acus debent fieri cum malleo, non autem lima, loquendo de acubus argenteis, quoniam per limam argentum fit durum. Numerus etiam requiritur, vt scilicet minister non vnum tantum acum habeat, sed plures, quoniam in insibiulatione plures requiruntur, ne fiat dolor, & hoc præsertim in corporibus delicatioribus obseruandum est. Præterea ne rubigine afficiatur vel inficiantur acus, conseruandi sunt in fistula argentea vt plurimum & sæpe oleo inungendi. Cum autem facta erit futura, proiciuntur frustra filii eorum infecta, quoniam si obuoluantur acui, inficiunt ipsum rubigine; ponatur itaque, vt conseruentur in fistula argentea, quoniam etiam fistula illa poterit inservire ad confusionem, vbi manus non potest applicari, applicando alterum caput fistulæ parti illi vulneris, quæ traici debet ab acu, faciendo quod acus ipse sua acie intret in caput fistulæ, & postea, dum pertransierit, manu arripiatur & extrahatur, & sic de puncto in punctum. Atinet autem ad confusionem filum ipsum quod acia vocatur siue accia à Celso. Filum autem sit robustum sed non nimis crassum nec durum: Tercio sit æquale, ita vt præter æqualitatem non habeat nodos interpositos, nec sit putrescibile, quare fila ex gossypio vel lana non sunt opportuna. Galenus autem lib. 3. meth. cap. vlt. affectabat filum molle ac satis durum, vnde dicebat ipse filum Caietanum optimum esse: vel loco eius utebatur sericino: quare filum lineum sit vel sericinum: Linum autem Brixienfe optimum est, & nunquam marcescit, ipso ergo vtendum est vel sericina materia, quæ itidem optima est. Filum præterea sit album vel cremesinum tantum; nigrum enim vel alio colore infectum malum est.

Recentiores autem in ventriculo & intestinis consuendis meminerunt de formicis & earum capitibus, quod tamen ego nunquam feci, nec credo in nostris his regionibus adesse formicas adeo magnas, vt ipsis hoc peragi possit; quare cum hoc videatur præstigium, filo potius utamini. Albucasis addit nos vti debere filo facto ex aliquo intestino animalis allucius, vt fiat optima similitudo, sed vult recens filum, non autem siccum, sed hoc mihi videtur absolum, quare pro certa materia vtendum est filo dicto. Cum autem aliqui chirurgi vrantur acub sine filo vel si filo vrantur, ipso vrantur, vt colligat acus vt faciunt futores aut fartores cum reponunt acus in vestimentis, ne ipsos amittant: sciendum est quod hic vsus malus est ac dolorosus, præter id, quod ac periculū excitat. Aliqui accipiunt pennas aliquius auis mundantes hastā mediā, deinde perforant vulnus & imponunt hastā in vtrūque labi-
prebentur.

An sibiula
distinguan-
tur à futura
an vero sit
idem cum
ea.

Tertia futu-
ra minæ.

Materia fu-
turarum.
Acuum tem-
peramentum.

Acuum ma-
teria.

Numerus.

Ad conser-
uandum rubi-
ginem a-
cuius.

Fili condi-
tionem &
materia.

Formicæ &
quæ pro fu-
tura veni-
unt.

Formicæ
aliquando
malæ.

Ventres pen-
narum ad con-
suetudinem re-
prebentur.

bium, & ponunt tres aut quatuor pennas, sed ego, ut ingenue fatear, quid sciam de hoc, dico hos reprobans me nescire ubi fuerit tanta sili penuria, ut pennis vii sit opus pro consuetione. Alii accipiunt stupam vel linamentum, & appellant cannulam, & in vitroque labio imponunt ad aëre nodo; ne fiat labiorum laceratio, Et hic modus opportunus est in abdomine consuendo, ut diximus in tertio modo. Quo vero ad quantitatem carnis consuendam vel in consuetione arripiendam, sciendum est, quod ad quantitatem digiti minoris arripiendum est acu labium: neque nimis distare debent inter se fibulae, neque etiam nimis spissae esse. Notandum praeterea, quod non tantum corium perforandum est, sed etiam caro subiecta usque ad profunditatem dimidiam vulneris, aliter conglutinetur tantum corium remanente cavitatem in fundo vulneris cum maximo patientis periculo.

Quantitas carnis arripienda in consuetione.

Sanguis cur sit statim sistendus in vulneribus adhaerentibus.

Notandum est autem, quod vltimum praeceptum est Hippocratis in libr. de vlc. quod vulnera, si sint in artubus, indigent excretionem multi sanguinis: si autem vulnus sit in abdomine, statim sistendus est sanguis, quia tunc sicciora sunt vulnera ac facilius sanantur, huius autem causa est, quoniam extremi artus facilius tentantur fluxionibus, nec possunt resistere, quia debiles sunt, ventres autem fortiores sunt, quoniam in his viget calor naturalis, praeterea per sanguinis euacuationem pars siccatur, quae exiccatio magis indicatur a parte naturaliter sicca, quam a parte naturaliter humida existente, venter autem est naturaliter humidus, ergo non indiget tanta exiccatione. Praeterea multus sanguis contentus in artubus suffocat calorem eorum imbecillum, ac in abdomine educto sanguine eductur pabulum caloris in eo existentis, ergo debilitatur pars, quare bonum fuit Hippocratis praeceptum. His itaque rationibus possumus vñire vulnus, ut deinde natura agat. quandoque autem vimur puris medicamentis emplasticis, sed quoniam hoc raro fit, ideo de his ego faciam mentionem.

De Conseruatione temperiei partis affectae siccitate, ipsius, quoniamplex sit temperamentum, & quando conueniant siccantia diuersorum graduum & qualia debeant esse sarcotica.

CAP. XIII.

Quomodo conseruetur loci affectus temperies.

Requiritur praeterea in vulneribus, ut conseruetur temperies loci affecti, sicuti docet Galenus lib. 3. meth. cap. 9. temperies enim est causa efficiens sanitatis atque coniunctionis ipsius partis. Quintum ergo, quod tentare debet Medicus, est, ut natura agglutinet conseruata ab ipsa propria partis temperie: Hippoc. autem in libr. de vlc. dicit siccitate partem esse seruandam, quoniam siccum sano simile, humidum vero aegro vicinius est: ergo si adiecit humiditas, remouenda est. Sed cum hoc videatur monstrum, nam qualitates actiuae magis agunt, dicendum est, Hippocratem, cum dixit siccum, omnia intellexisse, tam caliditas & frigiditas partis in vulneribus per se consistunt, nec adest aliqua occasio corrumpens caliditatem, sed siccitatem fluxio illa statim corrumpit, quare ad alteratam siccitatem sequitur corruptio aliarum qualitarum & temperaturarum partis. Hunc ergo scopum ante oculos semper habentibus. conseruanda siccitas loci affecti, siccitas autem variis modis conseruari potest, sed praecipue medicamentis, quae licet diuersa sint ac varia, ad ea tamen inuenienda obseruari debet temperamentum, quod duplex est, vel vniuersi corporis vel particularum.

Cur siccitas partis semper sit conseruanda.

Siccitas quae medicis conseruetur.

Temperamentum quatuorplex.

Siccantia leuata in primo gradu.

Temperamentum totius est obseruandum, an aequale sit in specie vel inaequale: temperamentum enim humanum semper inclinat in aliquam humiditatem, licet temperamentum sit quo ad iustitiam, tamen respectu plurium animalium humidum est, & hoc reperitur in maiori hominum parte. Aliud est temperamentum corporis, quod sequitur ad aetates & caeli regiones & exercitia, ut est temperamentum senum, Aethiopum & rusticorum. Praeterea temperies partium subiectarum considerata veniunt non enim eadem cum temperie totius: videndum est ergo an temperatura partis respondeat toti corpori, ut genam pueri & mulieris; vel inaequalis sit ac diuersa a totius temperatura veluti in pueris genu est siccior habitu totius; pariter digitus mulieris siccior est totius corporis habitu. Hoc constituto supposita gena pueri vulnerata vel feminae, primo considerata est temperies aequalis in specie licet humidior, deinde partis vulneratae temperies consideretur aequalis toti. unde statim ego sum solutus imponere medicamenta siccantia leuia, quoniam excessus multus non est, neque requirit oppositum valde agens. Quod si pars sit sicca ex se & humectata sit, indicat medicamentum siccans robustius. Leue autem medicamentum siccans in primo gradu siccum est, ut farina hordei, fabarum, thus, chamaemelum, adianthum, eupatorium, farina orizae & similia imponenda in partibus mollibus ac humidis. Si quis autem siccioris sit

fit habitus, ac vulnerata sit pars sicca & forte humectata, opus est validis siccantibus: si vero non, præseruanda est cum validis medicamentis, quoniam excessus magnus est à contrario in contrariū, quare in eo viu ego impono siccantia in secundo gradu, vt in rusticis, senibus ac viris, qui sicciores sunt. Si autem pars toti habitui non respondeat, vt si firatculus pueri vel Æthiopis, tunc in his partib. siccioribus vtendum est medicamentis, ac validioribus, vt siccis in tertio gradu, quæ conueniunt etiam in sicco habitu, & in habitu sicco vulnerata parte sicciori, conueniunt deinde siccantia validiora & in tertio gradu intensius, & hæc est norma inueniendorum siccantium. Sed notandum, quod hæc imponuntur non tantum vt conseruent partis temperiem, sed etiam vt iuent naturam agentem: nam in partibus vulneratis est humiditas insita, quæ est in gluten vertenda ad vnienda labia vulnerum, quæ humiditas sanguinea concrevit & vltro citroque currit.

Efficiens autem causa est natura ipsa, quæ adiuuatur à medicamento, quod facit gluten siccius atque solidius, quare requiritur, vt medicamenta sicca sint atque excedant gradum à parte affecta indicatum pro sui conseruatione, vt si pars indicet primum gradum, vt amini secundo, & hoc patet, quoniam vnum & idem medicamentum respectu diuersarum partium siccum est in primo, secundo & tertio gradu prout mollis erit vel sicca pars affecta, cui medicamentum applicatur, & hoc ratione glutinis indicatur quod formidum est. Vltimo siccans medicamentum debet repellere sanguinem copiosum fluentem ad locum affectum, non enim potest ipsum absumere, debet ergo habere adstringentem facultatem constipando meatus partis ipsius, & hoc est medicamentum glutinatorium, scilicet habens has omnes condiciones. In sarcoticis enim sat est, vt ad sit vis conseruans temperaturam partis, & ideo satis est, quod sicca sint in primo aut secundo gradu incipiendo in mollioribus, at in durioribus in secundo intenso aut tertio incipiente. At in agglutinatoriis medicamentis requiritur etiam vis adstringens.

De Resutatione & expulsiōe illorum, qui in vnlneribus vtuntur aqua benedicta, incantationibus, benedictionibus, oleo atque linteis benedictis & albo cum maffiche. CAP. XIV.

Leximus in superiori capite ratione partium diuersitatis vnum & idem medicamentum esse diuersæ actionis, dum sit aut in primo aut in secundo aut in tertio siccantis gradu, prout mollis erit vel sicca pars affecta cui tale applicatur medicamentum, & in super repellere debet per vim adstringentem constipando partis ipsius meatus: sic enim erit glutinatorium opportunum: & quod denique sarcoticis sat est vis conseruans temperaturam partis, vnde sufficit, quod in primo sit gradu sicca intenso aut secundo incipiente in mollioribus, ac in duris in secundo intenso aut tertii initio. Hoc stante sequitur, omnes aliter facientes errare, vt illi, qui vtuntur aqua benedicta frigida vel oleo benedicto & albo, cui, multi enim aqua frigida pura, etiam tētant sanare vulnera, & potissimum in Hetruria & Neapolitano regno, volunt quæ hanc esse curationem methodicam ex Celsi lib. 5. cap. 26. vbi dicit, Licetq; vulnus curare sine peregrinis medicamentis imposita spongia vel linteum cum aqua frigida: opus enim naturæ est agglutinatō: seruat autem siccitas partis repellendo materiam fluentem quacumque, quod optime facit aqua frigida. Additur deinde ab illis autoritas, nam habent incantationem quandam diuinam compositam, & benedicunt multis crucibus fidentes orationi illi, tertio addunt infinita exempla ducum, comitum & Baronum. Sed vt meam ingenuè proferam sententiam, non credo ego curationem hanc totam esse, quamuis quandoq; viderim successisse, sicut quandoq; ab his empiricis videtur vulnera sanata, sed præter rationē. Methodus enim optima est & confirmata ab omnibus scriptoribus, attamen quandoq; sanantur vulnera ex aqua, sed casu, ratione facultatis repellentis in ea existentis: imo ego attestor vulnera vidisse sanata ex aqua etiam non benedicta, qua etiam ego vsus sum quandoq;, quia nesciebam benedictionem illam: sed tutus non est hic vsus semper, sicut est tutum medicamentum siccantis & adstringens. Ad Celsum vero dico eam ipsum proponere in leuissimis vulneribus atq; iis, quæ per se etiam absque alio auxilio sanantur. Ad benedictionem autem dico, verba bona esse neq; damno verborum viti, dicor tamen fidem non negans bonam facere minime aquam: vnde credo ego, istos quam maxime deludi istis neniis à Diabolo, qui vt ipsos subducat & vincat, successum præbet illis incantationibus & superstitionibus: vnde sententiam meam proferens dico, me non credere. Ad experimenta autem sua plurima opponens dico, hunc esse morem nebulonum: vulgus enim facit elēchum mortuorum medici vero & potissimum nebulones sanatorum: sed ego attestor plurimas gangrenas sanasse secutas ad vulnera ita curata & tractata.

*Error Scitu-
rum oleo
benedicto
& puro lin-
teli.*

Quantum vero ad oleum, minus etiam probo vsum olei benedicti, quoniam humectans oppositum facit illius, quod intendimus, quamvis aliqui sentiantur: sed maxima ex parte explosa est hæc ratio, quoniam oleum vulneribus contrarium. Alii vtuntur puris linteis benedictis, quæ non sint confecta ex indumentis muliebribus. Ego tamen dico vsum linteolorum purorum bonum esse, affirmo tamen illos non recte agere, quoniam nihil addunt parti intus vulneris: linteæ enim hæc non penetrant ad fundum vulneris, quare in vulneribus momenti vsum hunc tutum non esse, censeo.

*Error Scitu-
tum albo cui
cum masti-
che.*

Alii vero vtuntur albo oui tantum, vt Guido nosse & Rhases. Alii vero mastichem inspergunt addentes album oui: sed neque hæc ratio mihi placet, quoniam non omnia ad sunt requisita, quia mastiche leuissime adstringit, præterea ex albo oui prohibetur, ne descendat mastiche in profundum vulneris, quod maxime optat Gal. lib. 3. meth. med. cap. 4. album enim oui refrigerat & siccât, quamuis Auicennas vel itouum humectate, tamen falsum est, ideo deficit adstrictio, ergo opportunum non est: Præterea album oui non penetrat, quare neq; vsum hic probatur, quoniam tutus non est, sed vitendum est albo oui primæ die, cum aliud non habemus præcipue ad supprimendum sanguinem: sed quoniam cum siccatum est, nihil agit, ideo ego in hoc casu mando, vt affundatur copiosum vinum ad humectationem, non ob id dies ipso semper vitendum esse in profundis vulneribus.

*Albi cuius-
dam.*

*Albi cuius-
dam.*

De Medicamentis conglutinantibus ad vulnera opportunis, & de diuersorum compositione, & recta applicatione.

CAP. XV.

*Congluti-
nantis tri-
plici sunt.*

Explosis illorum rationibus, qui in vulneribus vtuntur aqua benedicta frigida, oleo benedicto, linteis benedictis atq; incantationibus exotericis superstitiosis operationibus, & dimissis omnibus, quæ finem intentum non ita facile possunt assequi, quærenda sunt medicamenta ad vulnerum curationem tuta & opportuna, qualia sunt illa, quæ tempus habent substantiam, vt penetrant ex Galeni sententia; nisi enim sint ex se tenuia medicamenta, oportet illis tenuitatem ex arte præbere ac penetrationem, quare siccantia sunt & adstringentia suaq; substantia tenuia. Hæc autem triplicia sunt, nam vel sunt liquores, qui quidem opportuni sunt, quia tenues cum sint, penetrant, sed hoc afferunt incommodum, quoniam facile siccantur, nec habent substantiam solidam, vnde horum continuus sit vsum ita, vt linteæ continuo madidæ permaneant. Secundum genus est puluerum tenuissimorum dilutorum humore aliquo, sed quoniam etiam hæc siccantur, requiritur humiditatem aliquam assusam. Tertium genus est medicamentorum compositorum, quæ linteis siccis penetrant, de quibus omnibus verba nos facientes dicimus, quod in primo genere primum locum tenet vinum austerrum, quod siccet & adstringat ac etiam penetrat ex Gal. lib. 4. de simpl. med. fac. cap. 8. quod vinum sit illud quod garbum dicitur, quod quidem vbiq; non est, nam scio ego quod Mutinæ non reperitur tale vinum. est etiam bonum acerbum, quod madesant conuino lateamina. Præterea est succus hypericonis, id est, persforatæ herbæ, quo nihil præstantius. addaris succum foliorum cupressi, caudæ equine, millefolii ac etiam pentaphylli: Præterea omnes tormentillæ optimæ sunt, vt & consolidæ maior & media ac etiam pimpinellæ succus optimus est. In vinis autem nascuntur vesicæ quædam ad latera foliorum, quæ mense Maio repletæ sunt liquore quodam in melleo, quod optimum est ad coagulanda vulnera, & ego quidem testor ex vsum istius mira vidisse multoties, & ita vt quandoque solo spatio viginti quatuor horarum coagulata sunt vulnera, quare hoc nihil esse præstantius censeo, & conseruatur multo tempore, quo etiam ego quandoque sum vsum in podagra satis feliciter: Colligo autem ego hoc oleum copiosissimum in mense Maio, hoc explens phialam vitream & eam cera optimæ obturans, ac linteo deinde foueam facio in terra pedalem, in cuius fundo pono salem, in quo deinde ampullam colloco, quam postea terra effossa cooperio, post viginti dies eam inde rursus extraho limpidamque aquam separo & seruo ad vsum maximo cum successu. Inter pulueres autem ienues & adstringentes optimi sunt manna thuris, bolus orietalis, coralium vtrumq; gallæ immaturæ, omnia ex punicis malis sumpta, sanguis draconis in lachryma alicuius, lapis hæmatites, terra sigillata & aloes succus. His autem pulueribus tenuissimis vtentes aliquo liquore diluimus vel saltem aqua pura. Alibacis autem lib. 2. cap. 8. proponit puluerem quandam, à quo ego dico cauendum esse, quoniam accipit calcem viuam, thus & sanguinem draconis, & ipso nunquam vitandum esse moneo, quoniam potius nocet.

*Felici-
tatis
sum succus
mirabilis.*

*Succi huius
preparatio.*

*Pulueres
serui con-
glutinant.*

Compositio

Si autem vultis medicamenta composita, legatis Celsum libro 5. in tractatu de emplastris,

feris, inter quæ est barbarum optimum & basilicum pro mollibus, Smaragdinum, paracolumicon, ruffumq;. Aetius vero lib. ij. cap. 12. plurimâ proponit, quæ videre potestis. Ego autem semper vsus sum vno tantum medicamento in omnibus alterando, eam vel con-temperando, & est ceratum barbarum, quod quidē preciosum est, & ipso semper feliciter vsus fui, hoc enim omnia agenda operatur, & ad omnia in hoc casu agenda valet. Quo-
niam vero huius plures sunt compositiones, curavi ego semper, vt fieret, sicut docet Gale-
nus in lib. 2. de compos. med. per gen. in fine: & est duplex, prius autem, quo Galenus vtē-
batur, hoc est.

℥ picis sicce libr. viij.

ceræ citrinæ libr. vj. & ℥ viij.

resinæ pini libr. v. & ℥ iij.

asphaltici vel bitum. Iudaici libr. liij. (circa quod aduertendum est,

quod bonum sit quoniam raro habetur hoc bitumen, vel non vramini pice nauali: suppo-
natur ergo mumia, id est, bitumen repertum in ventre corporum illorum siccatorum)

olei libr. j. β

lichargyri

cerussæ

æruginis æris an. ℥ iij

thuris libr. β

alum. liquidi ℥ j. β (loco cuius ego impono alumen rochæ non v-

stum) aluminis scissilis ℥ iij. q. Puteolis habetur, non habemus tamen nos, sed loco ipsius

ego addo alumen rochæ combustum.

opopahacis

squammæ æris

galban. an. ℥ j. β

alocis

opli

myrrhæ an. ℥ β

terebinthinæ, vel resinæ laricinæ vel abietinæ libr. ij.

succi mandragoræ 3vj. loco cuius admisceo ego corticem radicis

mandragoræ siccum.

aceti libr. vi.

Sed notanda est compositio, quam docet ibi Gal. Tritis teredis & mixtis coquantur
ad consumptionem aceti. Sed aduertatis, quod ego raro vidi hunc modum succedere, nō
enim potest extendi: Quare hoc modo fiat: Sepiasarii capiant lichargyrium, cerussam &
oleum, & coquant ad mellis spissitudinem, deinde accipiant picem nigram, quam super
clineribus calidis liquefaciant, addantq; puluerem bituminis Iudaici ipsum incorporando
transmissum, deinde alia addant & coquant donec consumatur acetum, vel quousq; non
inquinet manus: talis enim est præstantissima compositio; & hoc vtor ego in omnib. cor-
poribus; sed in mollibus misceo eum cerato amygdalarum dulcium vel cerato rosato;
in iuuenibus vero puro vtor: in rusticis autē ac durioribus misceo aliquid emplastri li-
dis. Notandum est præterea, quod ego in temporibus frigidioribus, si volo diluere, vtor
cerato mastichino aut chamæmelino, alias vero vtor cerato rosato; in durissimis autē cor-
poribus vsus sum ipso cum vnguento lîdis, quod reperiunt fuit in templo Vulcani, ita vt
omnes illo vterentur: tunc enim temporis non seruabantur cetera medicamenta, vt
temporibus nostris, sed offerebantur ad templa: vt ab omnib. viderentur, & vt quilibet ad
suum placitū vti posset in infirmis. Vocatur etiam emplastrum Epigoni, quoniam
ipsum liberauit à morte, vocatur quin etiā emplastrum Hermonis sacerdotis & Hermo-
nis sacri scribæ: & sit hoc modo.

℥ ceræ luteæ 3. c.

colophon. 3. c. c.

rad. ari siccat.

squammæ æris rubei

ærug. æris

aristol. rot.

thuris

salis ammon.

thymiamid.

ammoniaci

Cerati bar-
bari: q. Ga-
l. no deservit
pne.

æris vñt an. 3vij.
alum. rochæ 3vj.
aloes
myrrhæ
galbani an. 3xij.
ol. antiq. lib. j.
aceti q. ſ.

Hoc autem emplastrum non coquitur, sed metalla omnia dissoluuntur sub sole diebus canicularibus in aceto, deinde affunduntur omnia liquabilia, deinde pulueres, postea sunt magdaleones, qui continuo seruantur in aceto vsque ad decem annos, & huius rationem fateor me nescire, attamen testor vidisse. Quod si spatium sex mensium detineatur extra acetum, non potest extendi & colorem amittit, quare seruetur in aceto & in vase æneo, & hoc emplastrum est illud, ex quo fit vnguentum lûdis, quod fit ex vna parte huius emplastri & duabus vel tribus partibus cerati rotati.

Hippocrates autem in libro de vlcere proponit medicamentum optimum pro siccis, simis & durissimis corporibus ex vna acetba, quod imponitur quotidie aut alternis diebus; non enim quotidie vulnus detergendum est nisi multa affuerit copia ichoris vel laquei costringendi sint, & hoc obseruandum est maxime. Monet autem Hipp. ichorem & saniem esse abstergendam & exprimendam; Galenus vero libro sexto, Meth. quando volebat siccare vulnus, accipiebat lanam madefactam vino vel posca. Ego autem vtor bombyce felici cum successu, deinde iterum impono medicamenta hoc agens vsque ad quartam diem, in qua si vulnus erat agglutinatum auferebam suturam secando fibulas aliquo instrumento commodiori, licet statim possent auferri, sed has fibulas cito solitus sum auferre, ne fierent cicatrices turpes: hac ergo de causa sic procedo, & ista agenda sunt in curatione vulnerum.

De Regimine circa sex res naturales, & de phlebotomia & euacuatione per pharmacum. CAP. XVI.

Quoniam plerumque supradicta non sufficiunt pro integra curatione vulnerum ratione alicuius impedimenti, ut potissimum est fluxio ipsa quæ hanc curationem maxime impedire potest, itaque oportet, ut corrigantur res non naturales, ne offendant, unde oportet habere oculos ad cibum & potum, aliter nihil fiet: corpus enim aut est plenum aut vacuum, quare videndum est an secanda sit vena nec ne. Aliqui dicunt eam esse superfluum, quoniam sectio venæ non indicatur à vulnere, quod confirmatur ex lib. 4. meth. med. c. 6. vobis ponit Galen. præceptum vniuersale, quod vulneris ut vulnus est, nulla est curatio in sectione venæ. Præterea ex Hippocrate, qui non secat venam, sed educit sanguinem per locum affectum, ergo, dicunt isti, inutilis est venæ sectio & euacuatio sanguinis per eam. Alii dicunt esse secandam in vulnere tantum magno, quoniam morbus magnus indicat sectionem venæ: magnum autem vulnus dicimus vel ratione essentiae suæ, vel ratione partis affectæ, vel quia occultam habet malam naturam: Et si simplex sit, quare in vulnere magno concludunt isti venam secandam & aperciendam esse siue sanguinem euacuandum per phlebotomiam.

Ego autem nec cum prioribus nec cum posterioribus consentio; non quidem cum prioribus, quia etiam curatio vulneris non fiat per sectionem venæ, tamen per eam conseruatur siccitas partis, siccitas enim partis sequitur ad euacuationem totius, quæ fit per phlebotomiam ac venæ apertionem. Et verum est, quod nec sectio venæ indicatur à vulnere nec à magnitudine morbi, sed à conseruatione siccitatis, quæ commodior fit per sectionem venæ, quam per alia auxilia, quare sectio venæ conuenit, quod confirmatur ex Celso lib. 5. ca. 16. ubi præcipit sanguinem debere fluere copiosum per vulnus, quod si non erit facta euacuatio debita, dicit ipse, seca venam. Non consentio præterea cum posterioribus, quoniam magnitudo morbi indicat magnitudinem auxilii, non autem sectionem venæ: Galen. n. locis dictis commiscet morbum vehementem cum magno, ex quo indicatur vehemens remedium: at quodnam requiritur auxilium de magnis istis ex morbi magnitudine, non indicatur. Quare etiam si Galen. indicationes omnes absoluerit & doctissime, in hoc tamen mihi nunquam potuit satis facere, quare indicatur sectio venæ in magnis vulneribus à siccitate totius & partium; quod autem corp. cito siccandum sit, indicabunt passionem animi & habitum corporis & vulnus & ætas. Primo autem obseruandum est an maxima copia sanguinis effluerit, quoniam tunc vena non est secanda: Si autem minima effluerit, secetur vena. Præterea si adsit dolor, secetur vena, ne fiat

An secanda sit vena morbo.

Indicatio vulnere magna dicitur.

An magnitudo morbi indicet venam secandam.

ne fiat attractio ad locum, secus autem minime. Præterea si futura non sit violenta sed moderata, non attrahet, & per consequens non erit opus sectione venæ. Quarto si pars talis sit, in quam humores non facile fluant vt est facies & cutis capitis, non egemus sectione venæ: vltimo si pars robusta sit, inflammatio & fluxio non admittitur, nec egemus sectione venæ; hæc ergo indicat vulnus. Præterea circa vniuersum, si plenum sit, oportet ipsam euacuare perfectam venam, vt si sit tempus plenitudinis sanguinis. In vniuerso etiam temperies obseruanda est, quæ nisi sanguinea sit aut biliosa, non secatur vena. Vltimo videndum est, an adsit febris nec ne, an aliz affectiones: nam si adsit febris, secatur vena, ne fluxio fiat. tertio obseruandæ sũnt animi passionēs: nisi enim homo agitur furore, sed quietus sit, non secatur vena, vt in hyeme æstate autem secatur vena. Si autem secanda sit vena, seruetur oppositio & rectitudo vt fiat reuulsio & euacuatio.

Euacuationis siue purgationis etiam per pharmacum est habenda ratio, quam omnes fere despiciunt, licet decipiantur: nõ enim euacuatio hæc indicatur à vulnere, sed à fluxione impedienda ad vulnus: & quoniã inter humores biliosus potius fluit, ideo ego dico hunc potissimum esse euacuandum; in vulneribus autem sit vt plurimum inflammatio aut erysipelas, quare sanguinem bilemque euacuare debemus præcipue & præsertim in biliosis corporibus. Vtemur autem medicamento bilem ducente, quo utebatur etiam Hippocrates dans veratrum suis temporibus, quoniam homines mundi erant hec ita excrementosi, quoniam pauperes erant & non ita opulenti, vt nostris temporibus, in quibus ideo tutus non est hic vsus, præsertim cum non euacuemus per vomitum, vt faciebat Hippocrates dans veratrum album & nigrum, huius autem causa est victus mollior & delicatior atq; copiosior.

Aduertendum est autem, quod semper euacuare oportet per inferiora tuto dantes cassiam, tamarindos, mãmam, elect. ros. sol. viol. sol. & quandoque elect. de succo rosarum elect. ros. diaprun. sol. & illud de psyllio, quæ electuaria mollia sunt, scãmobiũ enim non timebitis.

Vulnera vero in quibus hæc medicamenta conueniunt, sunt omnia magna vulnera, vt vulnera capitis & vtriusq; ventris, tertio articulorum vulnera. Præterea si superuenerit inflammatio aut erysipelas, dubium non est, conuenire pharmacum. addita etiam futura hoc requirit. indicat enim vulnus magnum esse in quo valde timetur fluxio: præterea futura facit dolorẽ, qui deinde facit attractionem & fluxionem. Addendum est mea quidem sententia, quod omnia vulnera, in quibus necessaria sit sectio, dilatio & ossis ablatio, necessario requirunt medicamenta per os siue pharmaca, quoniam proficitur natura ex his actionibus, & quia vulnus detectum detinendum est. Quod si bilis non domineatur, non est statim dandum pharmacum, sicut in bile fit: si pituita dominetur vel melancholia, corpus est primo præparandum & euacuandum, deinde per medicamenta propria: at dominante bile, potest pharmacum exhiberi sine alia præparatione, quoniam facile, quia fluxilis, euacuatur.

Sed sciendum est, quod nihil agemus, nisi recte viuat æger, quamuis hoc aliqui Medici nõ curent, sed omnia concedunt. Ego autem cum Hippocrate moneo, quod in vulneribus magnis victus debet esse tenuis, id est, pauci alimenti ac etiam potius frigidus, non tamen attenuans. secundo vulnera, in quibus imminet inflammatio aut erysipelas hunc eundem victum requirunt & vniuersaliter omnia vulnera confuta. De vino autem non datur in vllis vulneribus, sed aquam bibant & coctam, non carnes nec oua ante septimam, nec ius nisi tenue; quando autem datur ouum, datur integrum, nam albumen contemperat alimentum lutei calidius, exhibeatur panis lotus, panatella, endiuia cocta, oriza, spinachia, fugiatur fructus omnes, quoniam sanguinem generant, qui facile feruet vt multum; frigidi ergo duntur & cocti.

Sed quoniam vulnerati solent maxime sitire, ideo interdiu danda est potio aliqua pro siti tollenda, vt ex syr. de endiuia, viol. de ros. siccis diluto cum aliqua aqua & præcipue æstatis tempore: Ex his enim lotum etiam prouocabitur, quod auxilium modelæ præstabit. Vulnerati præterea sint semper in quiete optimeq; ac commode iaceant & præcipue pars affecta & vulnerata commode quiescere debet. Præterea notandum est aliud, quoniam cum membrum aliquod vulneratum debet vel potest mutilari, illud situm imponatis & in membro destinetis, qui ipsi commodior sit futurus, & hoc erit iudicio Medici committendum, quod fieri debet in prima etiam die, ne membrum malum suscipiat habitum & mendum, vnde ortum est proverbium illud, brachium & collum vel pectus, crus vero ad lectum esse apponendum & detinendum.

Recta præterea somni ratio & vigilariū instituitur: somnus enim nimis ac pro-

Sectio venæ in vulneribus quando conueniet Et quando non.

De euacuatione per pharmacum.

Quæ humores potissimum euacuandi debeat in vulneribus.

Quæ pharmaca sint exhibenda.

In quibus vulneribus conueniunt pharmaca.

Bilis euacuari potissimum præparatio.

Vitus vulnerati quæ esse debeat.

Potio pro siti tollenda.

Quies.

Somnus & Vigilia.

fundus facit ad fluxionem. Vulnerato autem aliquo vase solet succedere euacuatio sanguinis & præsertim in extremis partibus, quæ si refrigerentur faciunt ad fluxionem, unde hoc præceptum habeatur, ut hyemis tempore tepido foueantur calore partes extremæ vulneratæ. Somnus præterea commodus est, ubi dolor adest, quia somnus sopit facultatem.

dem. Aeris etiam habenda ratio est, tradita ab Hippocrate in lib. de vuln. ubi dicit in omnibus vulneribus excepto ventre & capite commodius semper esse tempus calidum quam frigidum; tempus autem æquinoctiale commodius est omnibus his, ex quo colligitur, Hippocratem eligere aerem temperatum præ omnibus, cui sententiæ addendum est, nos cognoscere aerem non solum ratione naturæ sed etiam ratione artis. Possumus enim alterare aerē vel libet. Et quod diximus de aere idē dicitur de omnibus tangentibus corpus, ut sunt linteola, ablutiones, manus Medici & deterioria atque medicamēta. Aer ergo temperatus optimus est, quare si talis sit, conservetur: si vero talis non sit, arte pareatur, & idem dicendum est de aliis contingentibus corpus omnibus, quod scilicet si temperata hæc non sint, calefiant saltem, semperque calida applicentur, præcipue in vulneribus artuum & articulorum. Sed notandum, quod Hipp. excipit capitis ventrisque vulnera, in quibus frigiditatem eligit diuersis de causis, & primo quia ventres hyeme & vere calidiores sunt, & ita facilius agunt: caliditas autem extrinseca dissipat robur. Secunda causa est, quia maxima vasa sunt, calorque immensus, qui resistit etiam ingentissimo frigori, at hoc in artubus non adest, in ipsis enim vasa exilia sunt.

Cura in Ventris & capitis vulneribus frigida, in artibus vero calida esse debent, ut hanc contingant, & rursum calidius in capitis vulneribus. Aliter autem.

Vnde notandum est error illorum, qui calida omnia in cerebri vulneribus imponunt, nam sic coquant cerebrum & ægrum interficiunt.

Animi accidentium quoque habeatur ratio: maxima enim quandoque mala suboriuntur, cuius infinita exempla adducere possem, quæ breuitatis causa omitto, solum dicens, quod maxime aduertendum est circa hæc pericula: ut autem hæc cuitari possint, oportet ut Medicus sit mendax in prognostico, præsertim dum alloquitur infirmos, unde quandoque in vulneribus puerulorum concedantur noxia aliqua, ne fiat sterus, qui maxime nocet puerulis vulneratis, & ne alia peiora succedant incommoda. Veneris quoque ratio habeatur & cura: nam ut plurimum Venus mortem affert vulneratis, imo & sentigo propterea etiam & cogitationes veneris fugiantur. Et hæc de correctione rerum non naturalium.

Præm.

De agglutinandis atque carne implendis vulneribus, & de signis vulneris cocti, deque vulnere excrementis.

CAP. XVII.

Posito regimine circa sex res non naturales, & constituta iam lege circa sanguinis missionem per venam sectam & totius euacuationem per pharmaci exhibitionem, deueniamus ad vulneris ipsius tractationē per ea, quæ ipsa coagulare possunt, in quare nos monitos vult esse Guido, quod aliqui sunt tentantes glutinationem viscerum per potiones aliquas calidificas, qui tamen ab ipso Guidone vituperantur: ideo iis non est vitendum, quamuis enim siccant, attamen sunt periculosa auxilia: nam ex eorum caliditate excitantur inflammationes & fluxiones; quare potiones glutinantes non debent esse calefacientes, sed ut sunt ex cōsolidis, pimpinella, tormentillis horminoque sylvestri, à calidis semper abstinendo. Cum autem sistenda sit sanguinis fluxio in vulneribus explendis carne vel modo antiquorum vel modo recentiorum imposito linteolo imbuto albo oui & luteo etiam simul prætermisso sale & sequenti die inspiciendum est vulnus an crudum sit vel coctum. Aduertendum est autem, quod linamenta isti solent siccari & contrahi, & ideo partem adstringere ac dolorem excitare: ideo ne talis dolor succedat, moneantur astantes, ut vino madefaciant linteola austero ac frigido in æstate, calido vero in hyeme, & videndum est, an coctum sit vulnus. Signa autem vulneris cocti sunt, quod colore rubro erunt infectæ partes carnosæ, nervosæ vero albæ erunt candidæ ac lucidæ: ossa itidem erunt candida vel subrubra, & linteola aliquo albo pure infecta. Si vero vulnus crudum fuerit, erit nigrum vel liuidum, vel aridum, & passum erit frigus.

Potiones glutinantes calidificantes damno sunt.

Quales debent esse potiones glutinantes.

Notandum circa linamenta.

Signa Vulneris cocti.

Crudi.

Quæ requiruntur ad explendum vulnus carne.
Altera carnis generatio.

Si itaque vulnus coctum sit, quod ut plurimum etiam sine dolore erit, opus est, ut expleatur carne. ad hoc autem agendum duo requiruntur, quorum primum est materia, ex qua gignatur caro; secundum est causa efficiens, quæ carnem gignat. Materia autem est sanguis, qui habeat proportionem cum parte affecta, cuius tanta sit quantitas, vel oportet. Si vero pars erit nervosa, sanguis sit frigidior & crassior, si carnosa sit, humidior & calidior.

Cum

Cum autem moderetur materia ista à natura moderata à Medico, ideo opus est vt optimus victus instituat, non quidem plenus nec etiam tenuissimus. Pariter etiam habeatur ratio euacuationis & aliarum rerum non naturalium. Causa autem efficiens carnis istius est natura siue tempestas partis, q̄ debet conseruari primo per conseruationem totius habitus, vt docuimus superius, scilicet per sectam venam vel per pharmacū. Secundo conseruatur per conseruatū habitū ipsius partis præsertim siccum, si humidū nimis redditū sit, & hoc fit per medicamenta siccantia vulnus.

Materia carnis pinguis. Causa efficiens.

Sed cum in vulneribus duplex genus excrementi gignatur, vnum crassum, alterum verò tenue, dum caro generatur, ideo non solum medicamentū vulnere imponendū siccum esse debet, sed horum excrementorum ratio etiam habenda est, quoniam tenue & humidum excrementū nocet, quod ichor dicitur: si enim retineatur, caro mollis præter modum generatur, & ideo siccandum est tale excrementum: alterum vero est excrementum crassum & tenax & viscidū dicitur q̄ sordes. Quando autem moderate se habet, in his dicitur pus, q̄ etiam impedit carnis generationem, & dicitur à Galenō sordes congenerita, quare indicatur, vt ista sordes sensim ac sensim detergatur ac separetur à vulnere, ideo oportet eligere medicamentū, quod possit etiam hæc præstare, id est, vt conseruet temperaturā partis, & possit siccare ichorosisā humiditatē & sordem detergere, ideo oportet, vt sit siccans medicamentum ac detergens.

Excrementum vulnere duplex.

Qualis medicamentū siccans esse debeat.

Hoc autem medicamentum erit ex Galenō libr. 5. meth. cap. 12. facultatis siccantis & tenuium partium, vt penetrer in minimas ac profundas vulneris partes, & sua siccante facultate siccet humiditatem quæ intercedit & recurrit inter illas minimas ac minutissimas partes vulneris, siue calidum sit siue frigidum, non refert. Bene verum est, quod calidum medicamentum magis detergit quam frigidum, medicamentum ergo sarcoticum est siccans ac detergens ob partium tenuitatem, vnde patet differentia inter medicamentū sarcoticum & glutinatorium, nam glutinatorium non detergit nec separat, sed componit, sarcoticum vero separat & detergit.

Differentia inter sarcoticum & glutinans.

Cum autem medicamenta siccantia & detergentia aliqua sint mordacia, aliqua non, sciendum est quod detergit cum morfu acetum, quia frigidum est: præterea succus vix acerbz, succus mali punici acidi & alia similia multa, quæ nullo modo conueniunt in vulneribus; quia inducunt dolorem, colliquant carnem, & ratione doloris attrahunt humores à longinquo: Sint ergo sarcotica medicamenta sine morfu siccantia & detergentia.

Mordicatio medicamenti quando auferatur.

Si autem his careatis, dicit Galenus, quod debet abluī materia illa, si abluī potest, si minus, decoquatur in aqua ad medietatis cōsumptionem. sic enim auferetur omnis mordicatio à medicamento.

Dubium de aceto.

Si quis autem dicat Galenum volentem reddere medicamenta metallica sine morfu, diluere ex aceto, ego dico ipsum non vti aceto ad morfum tollendum prius & per se, sed vt magis attenuet medicamentum, quod sit, si maceretur aceto diebus canicularibus, deinde aqua abluir, & sic tollitur omnis mordicatio medicamenti ac materia mordacitas. Circa quantitatem autem siccitatis, quæ debet esse in sarcotico, aduertendum est, quod in vulnere requiritur, vt conseruetur habitus partis, qui requirit paruam siccitatem, vt cōseruetur, ideo ratione habitus partis medicamentum sarcoticum non requiritur valde siccans; quare in mollioribus habitibus sat est siccans in primo gradu, vt in pueris & in mulieribus vsque ad duodecimum. Sed cum in isto gradu sit principium, medium & finis, ideo possumus modo vno, modo alio vti pro ratione habituum. In durioribus autem corporibus vtetur medicamentis siccantibus in 1. gradu vel in principio vel in medio vel in fine secundi gradus.

Quomodo gradum siccantis requirit sarcotico in hoc vulnere corpore. Siccantium mod. tres classes.

Hæc autem medicamenta Galenus libr. 3. meth. med. capit. 3. distinguit in tres classes, quarum prima est medicamentorum simplicium siccantium in principio primi gradus; secundā classis est siccantium in primo intenso vel in principio secundi gradus. Tertia est siccantium in secundo gradu intenso.

Quomodo ex non sarcotico fiat sarcoticum.

Sed notandum, quod Galenus docet, quomodo, ex medicamento nō sarcotico possumus facere sarcoticum, exemplo æruginis, quæ siccatur in quarto gradu & mordicat & eliquat carnem, & tamen redditur sarcoticum in primo gradu & secundo: nam si vult vt hoc medicamento in puella, & non habeat tempus præparandi ipsam, accipit oleum & ceram & æruginem aris vel ferri, & facit ceratum: si corpus erit molle, paucam quantitatem æruginis ponit: si durum, in maiori

quantitate.

*Sarcotica,
simplicia.*

Diximus in præcedenti capite medicamenta sarcotica diuisa esse ac distincta ab ipso Galeno in tres classes sine ordines, in quarum prima erant medicamenta simplicia siccantia in principio primi gradus: in secunda vero siccantia in primo gradu intenso vel in principio gradus secundi: & in tertia illa, quæ sunt siccantia in secundo gradu intenso. Modo dicimus ipsa enumerando, quod in primo ordine simplicium sarcoticorum ex Galeno eo in loco est thus, farina hordei, fabarû, & farris vtriusq; hæc enim sunt siccantia in principio primi gradus, & sine mordicatione: addantur furfures istorum optime triti ac molli.

Secundus ordo continet resinam terebinthinam, laricinam & abietinam, gummi elemi, mel coctum & despumatum, sach. ros. recens, mel rosatum, violatum, farinam orobi dulcis, viciz, cicerum & lolii, quæ omnia siccant in primo intenso vel in principio secundi gradus: addatis spodium lotum, cadmiam lotam, lithargyrium lotum, minium lotum, plumbum vltum lotum & similia. Sciendum est autem, quod ista, quæ sunt sarcotica in secundo gradu, ut resinz, si abluantur, fiunt sarcotica in gradu primo.

Composita.

Tertius ordo continet farinam orobi amari, farinam lupinorum, puluerem ireos, Aristolochiz omnis, puluerem opoponacis, myrrhæ, sarcocollæ, mel crudum &c. quæ si abluantur vel decoquantur, fiunt sarcotica secundi gradus, classis & ordinis.

Composita etiam sarcotica in tres classes easdem distinguuntur, in quarum prima est basilicum minus, quod in officinis conseruatur, in quo tamen notandum est, ne sepiari pro pice sicca admisceant asphaltum, sed picem colophoniam: secundo est tetrapharmacum, etiam basilicum traditum à Paulo, præstans est in gignenda carne. Tertio est medicamentum resinum vocatum, quod ex putâ resina pini oleo & cera fit, & est optimum.

*Digestiui
cum omni
compositis.**Aliud.**Basilicum
maius.*

Si autem ex vobismet ipsis componere vultis, primum sarcoticum erit primi generis illud, quod digestiuum commune vocatur, quo omnes vtuntur chirurgi, & hoc modo componitur. ℞ terebinthinæ vel olei abietini ℥j. abluatur cum aqua vel betonicæ vel communi, postea addatur vitellum oui & fiat medicamentum, præstans quidem; notandum est tamen, quod aliqui addunt huic medicamento oleum rosatum & male faciunt, quod oleum non detergit, sed potius constipat. Aliud autem est hoc modo confectum: ℞ ol. abietini vel terebinth. ℥j. abluatur, deinde addatur thuris, vel mastichis & farinæ hordei an. ʒß. Misce & vtare ipso in pueris & feminis. Composita vero secundi generis in officinis sunt vnguentum basilicum maius, quod recipit myrrham & aloem & magis siccans est. Sed etiam in hoc notandum est, quod non commisceatur pro pice asphaltum, sed colophonia, vel mastiche loco picis siccæ.

Aliud vero est, quod appellatur in officinis vnguentum de matresylua, cuius descriptio talis est.

*Vnguentum
de matre-
silya.*

℞ fol. martisylu. puluerif.

beton. pulueris an. ʒviij.

ol. ros. complet ʒxx.

terebinth.

resini. pini

ceræ nou. an. ʒx.

gummi elem. ʒiij.

vini nigri dulc. & potentis libr. xij. Misce & bulliant ad ignem ad

vini consumptionem, deinde coletur medicamentum in aquam frigidam, & cum concreuit, colligatur & conseruetur ad vsum, quoniam præstantissimum est, præsertim in vlnis capitis, vbi volumus gignere carnem in membranis cerebri & partibus nervosis.

Tertium vnguentum est illud, quod appellatum est de gummi elem. conciliatoris, quod fit ex emplastro de gummi elem. & conseruatur in officinis, potest tamen etiam secundum hæc formam componi & erit optimum.

℞ terebinth. ℥j.

syr. ros. rec. ʒij. vel loco eius mell. ros. ʒj.

farinæ orobi ʒij.

myrrhæ

aloes

thuris ana ʒj. Misce & si medicamentum sarcoticum secundi generis optimum

*Vnguentum
de gummi
elemi.*

Interdum autem genere habemus in officinis tantum vnguentum lſidis pro durissimis & emplastrum ex gummi eieimi.

Reperitur etiam absterſiuum medicamentum compositum in officinis ad robustissima corpora secundum hanc formam

℞ terebinth. ʒj

mell. ros. ʒiij

pulu. itidis

opoponae.

aristol. rot. an. ʒj

thuris

aloes an. ʒʒ. Misce pto medicamento.

Cum autem quandoque ita dura fiant hæc medicamenta, vt extendi non possint, & aliquando humidiora neque bene mixta, ideo aduertendum est, quod quando admiscentur pulueres cum terebinthina sine aliquo liquore pro quaque vncia terebinthin. sat erit drachma vna pulueris. Si vero addatis aliquem liquorem, vt syr. ros. vel mel. ros. pro ʒj. liquoris addatis ʒj vel ʒʒ pulueris. nam si aliter fiat, liquor non bene miscetur cum terebinthina.

His itaque medicamentis aut primi, secundi aut tertii ordinis imbuantur linamenta vel turunda vel splenia, & ipsis explicatur vulnus, quo expicto tentandum est vt ista maneant in loco. Tentari autem hoc potest dupliciter, vel accipiendo linteolum maius imbutum medicamento duriori & super splenia imponimus vel fascia vincimus, quod vtrumque ego facere soleo. Medicamentum autem, quo imbuitur linteolum, opus est, vt habeat aliquam tenacitatem & habeat etiam rationem adiacentium, id est, vt habeat aliquam vim mitigandi doloris impediendo inflammationem & si inflammatio adſit, mitigandi ac moderandi calorem & impediendi Erysipelas materiam aliquantisper reprimendo, & si Erysipelas adſit, leniendi dolorem. Vnde colligendum est, male eos facere, qui imbuunt linteolum medicamento sarcotico, & ob id ego sum solutus vt medicamentum magistrali officinarum, vel linimento simplici officinarum, vel tertio loco vnguento de thutia magistrali, vel diapalma mixto cum linimento simplici, vel cum cerato ros. vel mirrino. Si autem his caremus, accipiat vinum austerum & ol. ros. vel mirrhinũ. simul hæc concutendo & ipsis linteolum imbuendo & fasciam ac imponendo & bis in die vulnus detegendo in æstate, & quando etiam adest copia saniei aliter semel in die sufficit ipsum detergere & detergere vel etiam alteris diebus. Aduertendum est autem, vt in hyeme hæc tepi imponantur, æstate vero frigida, & aliquando oportet, vt medicamenta refrigerentur, non tamen in capite.

De Medicamentis impediendis ne caro nimis crescat, vt etiam de iam aduata & superflua auferentibus. CAP. XIX.

Valia debeant esse sarcotica & quæ cum simplicia, tum composita, recensuimus, sed quoniam vel ex horum nimio vsu, vel ex alia aliqua causa caro ipsa interdum nimis eruitur & augetur in vulnere, quod sepe euenit præter spem, vnde turpes postmodum fiunt ac remaneant cicatrices. Hoc autem fit, vel quia nimis abundat sanguis in corpore, vel quia quia nimis fluit ad locum, vel quia pars sit nimis calefacta, ideo vel detrahendus est sanguis a corpore toto, vel retrahendus est a parte, vel ipsa pars refrigeranda venit: hoc autem potest fieri per frictiones, per vincula, vel pannis frigidis impositis. Et si hæc non iuuant, si sanguis à parte est, quod pars nimis auida sit ad carnis generationem, vnde tunc continuenda est caro vel secundo ipsam vel fricando cum panno aspero, ita vt effluat multum sanguinis. Quandoq; vero vtendum est medicamentis auferentibus carnem, moderate tamen, ne exciteat dolorem: vnde primum vtendum est linamento sicco.

Si vero hoc non sufficiat, accipiat alumen rochæ combustum, quod maxime familiare est omnibus. Tertio est emplastrum lſidis. Quarto habemus silem nitrum exustum, quo inspergimus carnem aduata. Quinto vtimur vnguento apostol. Sexto vnguento Damasceno viridi, quod fit ex sarcotico resino appellato, addendo florem æris, donec fiat viride medicamentum. Solemus etiam vt præcipitato & squama æris sed copiosa, & aliquando erugine æris lora. Ego autem peculiare habeo medicamentum hoc in habitu robustiori secundum hanc formam compositum

℞ vngu. xgyptiaci

ol. ros. complet.

Et ita lutea ana 3ß. Misce ad ignē & fiat medicamentū, quod exedit carnem sine vilo dolore, & est præstantissimum medicamentum pro adæquanda carne supererescente. Si vero hæc non sufficiant, recurrendum est ad ea, quæ tractantur & à me tradita sunt in tractatu de vlceribus, vbi ex professo locuti sumus de vlceribus cum carne supererescente; ad illa itaque confugiatis optima, quando hæc pauca supra dicta non sufficiunt ad auferendā carnem excrecentem nimis atq; superfluum. de hoc enim nihil amplius hic dicam.

De Modo inducenda cicatricis super vulnus.

CAP. XX.

Præcepta sic
cicatricis
inducenda
sunt.

Cum autem repletum fuerit vulnus carne, obducendum est cicatrice. Sed notandum est, quod caro illa, quæ continetur in vuneribus, non debet esse absolute æqualis cuti, sed parum excedere, quia dum postea siccatur, fit æqualis.

Cicatrix
quid sit.

Secundo notandum est, quod vbi pars aliqua ossis vulneratur & perit, remanere solet cicatrix caua atque admodū turpis: vnde hoc igitur euitetur, non est statim veniendum, quāvis caro illa promineat, ad inducendam cicatricem, sed prius est constipanda & conspicienda caro illa ne fiat cicatrix caua. Hoc autem constituto obducenda est cicatrix, quæ est quid callosum & durum tegens vulnus, quod inducitur loco cutis deperditæ, quæ etiam, licet improprie, quandoque vocata est cutis à Galeno lib. 5. de simpl. med. fac. c. 16. Fit autem cicatrix ex carne vel ex materia carnea conspiciata; sicut caro fit ex sanguine conspiciata.

Causa efficiens.

Causa autem efficiens cicatricis sunt tantum medicamenta imposita à Medico, quæ cicatrificantia & in Græcis dicuntur ex lib. 3. meth. cap. 5. Notandum est tamen, quod ego dissentio à Galeno, quoniam non sentio ego; quod medicamenta tantum sint causa efficiens cicatricis, cum vulnera magna brutorum sanantur & obducantur cicatrice absque medicamentis, vt & quandoque in hominibus.

An cicatrix
sit tantum
a medicamentis.

Nec est dicendum, quod aer ambiens sit causa efficiens, quoniam in eo non est tanta vis siccandi præterea in puerulis vlcera manantia & præcipue in capite sanantur & obducuntur cicatrice absque medicamentis. Præterea qui sanant vulnera cum aqua & oleo, obducunt ipsa cicatrice, & tamen cicatrix non fit ab aqua nec ab oleo, ergo dicendum est cicatricem fieri non à medicamento solo sed etiam à natura. Præterea qui imponunt epulotica, illa copiosiora imponunt in medio vulneris, quam à lateribus vulneris; & tamen cicatrix prius fit & fieri incipit à lateribus vulneris quam in eius medio: Ideo dico ego, quod causa efficiens cicatricis est natura, id est, facultas cutis: nam cicatrix non est solum caro siccata, sed est similis cuti, at medicamentum potest quidem siccare carnem, sed non potest eam facere similem cuti, quod facit natura & potest facere.

Epulotica
quælibet
debeant.

Cum autem medicamenta cicatricem inducentia sint siccantia, & cum sit caro siccanda non solum ab humiditate extranea, sed etiam ab insita humiditate, ideo requiritur vt medicamenta hæc sint valde siccantia, imo multo magis siccantia quam medicamenta agglutinatoria. Sed quoniam si fluere sanguis copiosius ad locum, gigneretur caro, ideo opus est, vt medicamenta ista sint etiam adstringentia ne sinant sanguinem fluere, quia non est amplius opus carne: gradus autem adstrictionis percipitur gultu; siccatioris autem gradus sit in tertio intenso, qui tamen non debet esse in omnibus habitibus talis: nam in mollioribus corporibus Epulotica sicca esse debent in secundo gradu, ex quibus colligitur quod medicamenta agglutinatoria valida sunt, epulotica leuiapro mollioribus corporibus, pro quoribus autem sint sicca in tertio gradu intenso cum adstrictione.

Epulotica
quæ
gradi
siccitatis
in requi
rant.

Notandum est tamen, ne medicamenta ista sint acra ac mordacis; & si sint talia, remoueat illa mordacitas vel abluendo vel coquendo, ne carnem absumant. Epulotica autem cum distinguantur in tres classes, in prima continentur Aloe, cortex thuris, cortex pinis, cyperi radix, cadmia optime lota, quæ thuria Alexandrina vocatur, plumbum vltum & lotum; cinis ostrearum combustus & lotus; & his primi ordinis vitmur in mollioribus. Secunda classis continet gallas immaturas, malicorium, balaustia, citria, sumiach, myrobalanos citrinos, myrtillos, sanguinem draconis in lachryma, tertiam sigillaram, rubricam sinopicam, quæ est bolus orientalis, rubricam fabrillem, quæ est bolus armena. In tertia classe est æs vltum præparatum, squama æris præparata, mysi, fory, chalcantem, alumen scissile, & similia potissima epulotica. Notandum est autem, quod Aetius lib. 14. cap. 37. dicit, quod Mysi, chalcitis & alumen sunt potentia epulotica, æs vero adustum est adhuc potentius, squama vero æris est potentissima: Galenus autem viceversa libro tertio method. capitulo quinto dicit, quod potens est squama, potentius æs vltum, potentissima autem chalcitis & mysi, quare est manifestissima contradictio, quam ego reuera

Contradi
ctio inter
Galenum
& Aetium.

reuerant cicio aliter soluere, quoniam codicem græcum Actii videre non potui, nisi dicamus, Galenum loqui de vehementia medicamenti in erodendo non autem de potentia inducendi cicatricem & de præstantia eorum. Actium vero è conuerso loqui de præstantia ac dignitate in inducenda cicatrice: & si hæc solutio vobis non placet, fateor me nescire contradictionem hanc alio modo neque ratione tollere. Habentur præterea in officinis composita epulotica trium generum, in primo quorum pro mollioribus est vnguentum de minio, ceratum de minio, diapompholigos primum Actii lib. 15. c. 36. vel 37. In secundo ordine est diapalma, diapompholigos Oribasii, & vnguentum de thutia magistrale. cuius compositio hæc est.

10 2℥ ol. ros. compl.
omphac. an. 3vj
mirthini
vnguent. populeon. an. 3iij
fol. planrag.

Vnguentum
de thutia
magistrale

folani hortens. an. M. ij. Incidantur minutim folia ista virentia & misceantur cum prædictis oleis per octo dies & quotidie agitentur, postea coletur & exprimatur oleum, quod ponatur deinde ad ignem & addantur ceræ albæ 3iij, postea auferatur ab igne, & cum coeperit tepescere, misceantur pulueris lithargyri auri 3vj.

thutia Alexandr. præparat. 3ij

10 ceruss. 3ij
plum. rubei vsti 3vj
camphor. 3j. simul hæc misceantur & collocentur in mortario plumbæ, & deducuntur per duas horas, quoniam si sic fiat & agiteretur, erit optimum medicamentum secundi generis.

In tertio autem genere est ceratum de bolo armena, vngu. de thutia magistrale addita squama æris vel ære vsto, ita ut singula vncia vnguenti habeat 3b vel squamæ vel æris. Actius præterea lib. 14. c. 38 & 39 infinita itidem Epulotica & pulueres describit. Ego autem duos habeo (pulueres) familiarissimos ad inducendam cicatricem, quorum alter est squama ferti bene lota & optime emollita, alter vero squama æris bene lota & optime siccata, quæ sunt tenuiter inspergenda. Vt etiam quandoque præcipitatio, sed in minima quantitate, imo etiam hoc quandoque ablutionibus tentari accipiens illa simplicia primi, secundi vel tertii ordinis, & decoquens in vino austero vel acerbo, quando validius optabam medicamentum, & cum illo decocto continue fovebam locum, & his quandoque cicatricem inducebam etiam in vulneribus rebellibus.

Epulotica
propria

De Curatione symptomatum, quæ superuenire solent vulneribus, & de eorum
præcautione. C A P. X X I.

40 Vltimum caput in sanandis vulneribus erat, quomodo impedirentur symptomata, ne superuenirent, & si euenirent, quomodo tollerentur. Inter symptomata autem hæc solent præcipue superuenire, conuulsio, paralyfis, defectus animi, febris, liuor, durities & ariditas vulnerum, quæ cruditatis nomine continentur; præterea dolor, inflammatio, quæ frequenter aduenit Erysipelas, œdema, gâgræna, & malæ carnis generatio, vltimo omnis interperies. Inter hæc autem de conuulsione vt & de paralyfi hoc in loco non est tractandû, quoniam de his tractabimus postea ex professo in interpretatione libri Hippocratis de vulneribus capitis, quam aggreditur post horum vulnerum vniuersalem curationem. Quare nunc agendum est de animi defectu, qui a Galeno vocatur & a Hippocrate in libro primo ad Glauco. cap. 14 & lib. 14. meth. cap. 5. est autem animi defectus spirituum animalium resolutio momentanea, vel corruptio in propria substantia ab habitu quodâ venenoso, ad quam resolutionem vel corruptionem sequitur vt calor & reliqui spiritus concentrentur & sic pereant sensus exteriores.

Defectus animi quid.
Defectus animi causa

Hæc autem symptomata solent accidere multis de causis ex lib. 12. meth. cap. 5. vt ex maximo calore, ex tristitia infirmi, secundo ex maxima sanguinis fluxione, tertio ex resolutione facta spirituum & diminutione, quarto ex mala aliqua & venenata qualitate impressa in armis & communicata ipsi vulneri vltimo fieri potest ratione vehemensissimi doloris. Probus itaque atque peritus Medicus hæc duo ante oculos habere debet, vt scilicet impediatur deliquiû animi, ne superueniat in vulneribus, si fieri potest; aut si superuenit, statim sciat ipsum remouere ac tollere. Præcauebit autem deliquiû animi, si statim, cum viderit egrotum, seueriori facie ac læto animo nullum esse malum ac nullius momenti pronuncia-

Quæ animi defectum præcauet
nec possit.

*Præcepta et
seruanda
in prima
situatione.*

bit, ne æger mœrore afficiatur, semper dicendo vulnera aduersari esse magna vel saltem suis maiora sine tamen periculo mortis, ne æger mœrore afficiatur timens iustitiam ex morte inimici. Secundo quando aduocatur Medicus ad magni vulneris medelam, statim manum admoveat vulneri, comprimens ne sanguis egredietur, inuestigando an vulnus profundum sit nec ne, deinde inspicendo faciem ægri, an abundet sanguine, pulsus tangendo, ut vim virium cognoscat, atque iniretrogando an plurimus sanguis effluxerit: si enim abundet sanguine, & paucus effluxerit, sinat Medicus adhuc fluere, si secus, statim sistatur. Præterea interroget ægrum, an diutius dimicauerit, & sit labore consumptus: si enim hoc fuerit, non est statim deueniendum ad futuram & deligationem, sed manus sanguis est suppressendus & ossa vino intincta danda est, permittendo ut aliquantisper bibat ut vires reficiantur. Præterea iubere debet Medicus, ut æger semper decumbat, nunquam autem rectus maleat, neque sedeat neque ipsum vulnus respiciat. Præterea si dubium sit de veneno in vulnere statim curandum est, ut fugatur venenum ex vulnere, mandando ut ille, qui vult fugere, primo mandet ruram cum sale & caricis, deinde bibat potentissimum vitum; postea colluat os cum oleo, & sugar deinde totum illum sanguinem ex vulnere:

*Si ægri
pro sustinenda
deliquio
animo.
Præsertim
jugiter Ge-
nerum ex
Sulphure.*

Si autem nullus hoc velit facere, apponatur cucurbitula parti læsæ. Quarto si maximus vigeat dolor, recurrendum est ad sedantia dolore, de quibus infra. Et hæc quo ad præseruationem seu præcautionem à deliquio animi. Si autem superuenierit deliquium animi, reuocandi sunt sensus exteriores per compressiones, per deligationes artuum, per puncturas, per vitiones per immensas caliditates, & per refrigerationes ac etiam distortionem.

*Defectus
animo curan-
do.*

Vi autem soler omnis practantium turba communiter aqua frigida in faciem proiecta hoc enim optimum est & tutum remedium inorquando digitos, moderate tamen, Solemus præterea ligare artus & præcipue digitos minimos vinculis robustissimis, in quo tamen obseruandum est, quod, si vulnus sit in partibus superioribus existente deliquio animi ligentur partes inferiores, si vero in inferioribus, superiores. Secundo quoniam in deliquio animi solet fieri magnus feruor circa thoracem, ideo oportet, ut etiam arteriæ libere possint aërem frigidorem attrahere, quare dissoluantur ægri ac liberentur à vestibus & maxime circa pectus, sitientur etiam in aere frigidore, ut partes internæ refrigerentur: semper enim ducendi sunt ægri in aere frigidiori nisi sint. Addatis ultimo quod aliquando in deliquio animi iuuamus ægros per resti rationem spirituum. Restituuntur autem cum odoratis, quæ potius sunt frigida quam calida naribus oppositis, semper tamen acetum etiam admiscendo, ut melius possint ferri odores ad cerebrum; quod faciebat Galenus præsertim in deliquio animi ex mœrore, sed hoc etiam potest fieri in deliquio animi ex venenosa qualitate. Si autem videatis ægrum eructare, & persensitatis in eructatione malum odorem, sciatis illud animi deliquium provenire ex materia corrupta in ventriculo & eius vitiatio: ideo tunc monet Galenus, ut pennam aceto intinctam in os iniiciamus ad excitandum vomitum, & hoc præcipue accidit in vulneribus capitis; quia ventriculus per cœcissum patitur & sic liberatur. De febre autem cum hic non sit proprius tractationis febris locus, nihil dico.

*Spiritus re-
staurantia.*

De Cruditare Vulnerum.

CAP. XXII.

Signa.

*Causa cur
vulnera er-
rant.*

Curatione.

*Digestio
concoquen-
tia.*

*Materia em-
plastrorum
concoquen-
tium.*

Post præcautionem atque symptomatum, vulneribus accidentium, curationem sequitur ut dicamus de cruditare eueniente in ipsis vulneribus: circa quas ideo dicimus, quod crudum vulnus hac ratione cognoscemus, quia erit vulnus liuidum vel nigrum, vel ariditatem & duritiem insignem in ipso vulnere percipieris. Crudescunt autem vulnera, aut quia vna cum corpore vulnerato affuerit vis contundens, aut ratione frigiditatis ambientis, aut ratione impositi medicamenti, ut ex bolo Armena, aut ratione aque frigide, quam aliqui imponunt, aut ob nimiam compressionem & vulneris constrictionem. Quoties ergo vulnus erit crudum, statim veniendum est ad concoquantia medicamenta, inter quæ primum locum habet digestium commune, quod constat ex terebinthina, luteo oui & ol. rosm. vel ol. amygd. dulc. vel chamaemelino & mastichino.

Si vero validiori opus sit concoquente, si hæc non adsint, accipiat oleum commune & cera & vitellum oui vel butyrum admisceatis cum vitello oui, vel utramini terrapharmaco Pauli ex lib. 7. & ex Celsi lib. 5. sed addendo parum olei amygd. dulc. Possimus etiam uti terrapharmaco Celsi, si volumus cito concoquere, quod etiam in forma emplastri supra locum imponemus. Materia autem concoquentium Emplastrorum erit malvarum folia,

folia, altheæ radices, medulla panis cum oleo & axungia Emplastrum faciendo & imponendo super vulnus. Notandum est autem ne hæc imponantur super vulnus ita vt ipsum his expleatur, sed circum circa ponantur, vel imponatis diachylon simplex vel emplastrum mollicium, vel diachylon magnum, vel diachylum cum gummis, quæ omnia habentur in officinis & optima sunt, & ita procedatis, donec videatis mundari vulnus, ita vt incipiat esse vulnus rubrum & purum. Notandum est autem, quod cum ista applicantur in medio linteolo. sit foramen factum, quod aptetur super vulnus, vt continue possit exire pus concoctum.

*Præceptum
circa concen-
quentiam
emollienti-
um.*

*De Dolorē vulnerum, de inflammatione, Erysipelate, intemperie qualitatū, & dematē
atq; de nimio sanguinis fluxu.* CAP. XXIII.

Cum autem frequentet superueniat vulneribus dolor & maxima incommoda producat, qui dolor sit vel ab aliqua intemperie excedente vel à solutione continui vel ab aliqua qualitate venenosa, vel ab aliquo corpore infixo vulnere, qd sit ex toto præter naturam. Si autē dolor fiat ab intemperie, vt vel à frigiditate vel à caliditate nimia, per fomenta opposita curari debet: vnde si ex nimia frigiditate proueniat, sanabitur eum fomento ex vino dulci, in quo decoctum sit cuminum, semina anisorum & similia calida: vel fovebimus oleo lil. alb. vel chamæmel. vel anethino. Si autem dolor sit ab intemperie calida, fovebimus locum cum decocto rosarum, nenupharis, violarum, vel cum aqua rosarum, plantaginis, violarum, solatri & huiusmodi frigidis.

*Doloris causæ
sæpe
Curantur.*

Si autem dolor fiat ratione fibularum nimium strigentium & soluentium continuum, statim secandæ & auferendæ sunt fibulæ, & foveendus locus puro linteolo duplicato & calefacto. Si autem dolor fiat ex qualitate venenosa, sugendum est venenum, vt supra docuimus, vel applicanda cucurbitula, ac alia faciendæ, quæ alias à nobis doctæ arque dictæ fuere. Si autem sanguis fluens ad locum solueno continuum faciat dolorem, statim est secanda vena, vt subtrahatur copia sanguinis fluentis. Si autem aliquid impediat sectionem venæ, exhibendum est pharmacum pro ratione humoris peccantis, quo facto foveendus est locus oleo rosato omphacino, in quo sint cocti vermes terreitres. At si ex his non cessat dolor, veniendum est ad frigidiora medicamenta, vt ad oleum nenupharis vel papau. cum aliqua portiuncula Opij, addito tamen castoreo, vt opium facile penetret. vel urgente necessitate ad medicamenta opiata deueniatis, de quibus alias etiam tractauimus. Aliqui tamen accipiunt folia hyoscyami albi viridia & folia solatri iidem viridia facientes fasciculum, & coquunt sub prunis, postea contundunt & faciunt emplastrum, quod imponunt satis feliciter. vel accipiunt panem, lac & folia prædicta facientes Emplastrum & imponentes, quod quidem optimum est remedium & omnia superat.

*Præceptum
circa
venam.*

Si autem superueniat inflammatio, impedienda est materię fluxio per venam sectam & exhibitum pharmacum, & repellenda est materia emplastro aliquo, vt hoc factum ex pane, lacte, farina hordei aqua & oleo rosato. Si autem hæc non sufficiant, possumus vii cum Hippocrate lenticula palustri cocta in vino & addito oleo rosato in forma emplastris: si vero non possumus habere lenticulam, accipiantur auricula muris & coquatur in vino & addito oleo ros. fiat empl. vel accipiantur folia rubi canini & coquantur & cum ol. ros. empl. vel accipiantur folia verbasci sylvestris confusa & cruda imponantur: vel folia taifolii confusa & cruda imposita: vel folia maluarum vel altheæ, vel simul mixta & emplastris modo imposita, quoniam optima sunt & magis repellunt ex Hippocratis præcepto.

*Inflammati-
onis causa
est.*

Si autem superuenierit Erysipelas, primum imponatis hoc medicamentum in vulnere accipiendo terebinthinā decies lotam aqua solatri & admiscendo farinam hordei & ouilutem. Quod si vultis magis refrigerare, loco aque solatri accipiat aqua lactucæ vel aqua papau. postea inungetis circū circa oleum nenupharino, confecto ex oleo loto: vel accipietis oleum violarum ablutum, quo inungetis circū circa vulnus expletum cum illo medicamento supra dicto, postea imponentis folia lactucæ.

*Erysipelatis
causæ.*

Abluitur autem hoc modo oleum accipiendo pro vnaquaque vntia olei duas vntias aque & in phiala vel mortario optime simul concutiantur, quo vsque medicamentum acquirat spissitudinem butyri, quo deinde circum circa illinatur locus, vt dictum est. Postea imponantur folia vel solatri vel nenupharis: vel vtamini aqua lactucæ vel solatri, vel cum succo etiam ea imponatis: vel accipiantur folia solatri, violarum, nenupharis, plantaginis & glasti & confusa imponantur in modum Emplastri.

*Quomodo
abluitur
vntia.
Emplastrum
varia pro E-
rysipelate.*

Ego autem quando opus erat, accipiebam farinam hordei, medullam panis, folia mali aurum & folatru & oleum rosatum & aquam faciens emplastrum quoddam præstantissimum curat. In rebellibus vero Erysipelatibus procedebam cum his, quæ iam fuere à me proposita in tractatione ex professo de Erysipelate, ad quæ recurrere poteritis supra dictis non inuuantibus.

Curatio Erysipelatis rebellis

Curatio intemperatæ

Si autem adierit intemperies calida impediens sanitatem vulneris, utimini iisdem, quæ dicta sunt in Erysipelate. Si autem adierit intemperies frigida, utimini fusco Nicolai, vel vng. de matris sylua dissoluto cum oleo laurino vel castoreo vel de castoreo: vel fovebitis locum oleo irino completo vel ol. lil. completo. Ita etiam si adierit intemperies sicca, foveatur locus hydrelæto, id est, aqua cum ol. amygd. dulc. vel communi linteolis in adidis, vel conferuetur pars super fumum hydrelæti, postea accipiatur emplastrum vel ceratum amygdalinum factum ex ol. amygd. dulc. & cera lutea, & imponatur. Si autem superuenierit edema, imponatis spongiam salsuginosam madefactam in posca & expressam. Si autem fuerit nimis fluxus sanguinis, qui peticulosissimus est, neque solet superuenire nisi in magnis venis & arteriis vulneratis, quia in exiguis vasculis vulneratis facit album ovi cum luteo. Et id eo cum requirit hoc maximam diligentiam de eo tractabimus in eo loco in quo agemus de vulneribus venarum & artiarum. Nam hoc symptoma de fluxu sanguinis est diligentissime tractandum, quia maxime agit Medicos, & maxima affert infirmis incommoda. Et hæc de vulneribus in vniuersum satis finit. sequitur modo ut tractemus de vulneribus particularibus, unde primo verba faciam de vulneribus capitis, pro quibus optime perfectæque curandis librum pulcherrimum Hippocratis de vulneribus capitis inscriptum interpretandum accipiam.

Ceratum amygdalinum. De edematæ. De nimis sanguinis fluxu.

Huius libri Hippocr. tractatus & expositio in totum primum ab autore Fallopio relata est, quam benignus lector fol. eiusdem tom. 545. querere ac suo perlegere placito potest. nihil enim ab eo postmodum immutatum est, nisi quod eiusdem libri caput 18. quod pagina huius postremæ editionis. 574. continet, à linea capitis octaua ad finem vsq; his verbis reddiderit & auxerit.

Secundâ facta est Medicorum quorundam, qui possunt dici de secta Magistri Grilli, qui circa partem affectam nihil imponentes cum vulnera tum vlcera etiam curant potionibus & pulmentis quibusdam secretis & plurimos sanant, inter quos potissimum est gens Hebræorum, qui nolunt docere nec reuelare huiusmodi secreta medicamentis, & potiones quidem nobiles, attamen aliquando deteguntur, unde vna est compositio potionis cuiusdam, quæ ad manus mihi hæc admodum perquirenti peruenit, qua tam en vos consulto, ut utamini in fistulis, quæ sunt in thorace, in his enim quam maxime laudo hanc potionem, quam exhibendam volunt matutina hora singulis diebus, & supra vulnus nihil aliud aunt imponi debere q̃ folium brassicæ, sed quoniam hæc non sum ausus vniquâ experiri in capitis vulneribus, sed tantum in aliis, eas ideo potiones non admodum laudo nisi in fistulis dictis, in quibus sæpe præbui feliciter. compositio autem potionis siue decocti talis est.

26 rad. altheæ
fol. millefol.
marub.
artemis.
lapatii
caulium rub.
pimpinell.
cimar. rubi
rad. rub. tinctor. cum foliis
aristol. rot. cum fol.
fol. fragrar.
marricar.
centaur. min. ac maior.
marrissylu.
bethonic.
saluiz
rad. charyoph. an. M.ß.
thur. mascul. ʒß
sarcocollæ ʒj
sem. plantag.
anisor.
fenic.

49

50

cannabis an. ʒß.

croci

rhabarb.

rhaponic.

centaur. maior. an. ʒj. incidantur herbæ optime & contundenda

contundantur, tandem sterin infusione vini per 24. horas, postea bulliant ad consump-

tionem tertiæ partis, tandem coentur, & colaturæ addatur mellis lb iij.

Iterum bulliant ad mellis consumptione, facta despumatione imponantur pulueres
 thuris, croci cum sacrocolla, bulliant modice, tandem remoueatut ab igne & vsui serue-
 tur, huius autem decocti dosis erit singulis horis matutinis ʒvi. & exhibeatur. Dicunt isti
 quod faciat ad siccationem & expulsionem ossium, si adsunt aliqua corrupta, & etiam ad
 generationem carnis & ad alia, quæ promittunt. Multa quidem hoc medicamentum agit,
 sed tardè & cum periculo etiam, quod non possit impedire inflammationem, hoc tamen
 uti poteritis, in fistulis rebellibus; quoniam succedit feliciter, & ego inquam exhibui cum
 laude quam maxima, nunquam tamen vsus sum in vulnere capitis, & præcipue cum isti
 nolint, quod aliud ponatur, nisi folium caulis.

Tertia secta est Empyricorum, qui non deueniunt ad exhibitionem pharmacorum
 neque potionum nec victum instituunt, sed tantum quædam ad vulnus imponunt medi-
 camenta optima, exquisita, & preciosa, quæ infunduntur vulneribus. Et ego quoq; his ali-
 quando sum vsus felici cum successu, ac plurimi chirurgi his vsi sunt, & fuit Iuuenalis ille
 quæ securus est Ioannes Baptista Romanus ambulo siue Ceretanus, curauitq; quampluri-
 mos, ac est lucratus plurimum, & eo medicamento utebatur ad omne genus morbi, sed
 miscebat varia, ut videretur theriaca antiquorum, & ipsum vocabat elixir, quo utebatur
 præcipue in vulneribus capitis, & nihil curabat de victu, madefaciens hoc medicamento
 vulnus, & deinde inspergebat pulueres superius. Et hoc ego attestor medicamentum ma-
 gnas habere vires: nam primis annis vsus sum eodem felici cum successu. medicamentum
 est magnum & maxima paratur impensa hoc modo:

ʒl. chariophyll.

bacc. iuniperi

nuc. mulch.

Zinzib.

cortic. citon.

arantior.

pip. long. nigri

fl. saluiz

basilici

rorismar.

maior.

rad. gentian.

menth.

puleg.

bacc. laur.

fl. calaminth.

sambuc.

ros. rub.

spic. nardi

cubebat.

ligni aloes

cardam.

calam. arom.

capitum aridiadis

chamædr.

chamæpyr.

mannæ thuris

aloes hepatic.

sem. aneth.

artemif.

— moschi

— ambr. an. ʒß.

Hæc simul mixta, scilicet arida cum aridis tunduntur, & sic pulvis, deinde pingula ac mollia miscetur cum reliquistandem addito melle & saccharo, quantum ad incorporandum satis sit, conseruantur per octo aut decem dies in vase vitreo vt fermententur: facta fermentatione addunt aquæ vitæ lb̄xxiiij. atque omnia simul diligentissime miscent, & quoniam talis massa est satis ampla & per alembicum est extrahenda aqua, ideo massa debet diuidi in duas vel tres partes, tandem prius vna pars alembicatur in balneo Mariæ: dum autem incipit stillare, exit prima aqua substantia quasi pinguis ac aerea, & exit in maxima quantitate & hanc appellant elyxir tandem ex eadem massa egreditur liquor aquosus, crassus & albus, qui appellatur phlegma, nec ipso vtuntur in vulneribus, sed ad lentiginines ac cutis denigitationem factam à sole & ad dealbandam faciem mulierum nihil præstantius inueniri potest præterea habet preciosum odorem, quo multum valet: vltimo in alembici fundo remanet quid limosum, quod lutum vocatur, & ipsum exhibebat Iuuenalis ille protheriaca pauperibus atque rusticis dicens & affirmans ad multos valere morbos. Vnde ex hac destillatione habemus tria medicamenta, lutum scilicet, quo protheriaca vtuntur phlegma, quod valet ad dealbandam faciem mulierum: & elyxir, quo curantur vulnera. Hoc autem elyxir, quod matrem balsami vocant, fit hoc modo:

℞ terebinth. opt.

thuris albi.

ligni aloes an. ʒ liij.

mastic.

caryophyll.

galang.

cinnam.

nuc. musc.

tubebat.

gumm. hederæ an. lb̄j.

Hæc simul omnia terantur, & cribrentur, quæ possunt cribrari, deinde imponantur in vas vitreum & fermentur in aliquo calido per septem vel octo dies, deinde ponantur ad ignem & destillantur in calidis cineribus, donec tota humiditas exeat. Non autem potest hoc in balneo Mariæ destillari, sed in cineribus, quia terebinthina & gummi hederæ non extrahuntur per balneum Mariæ, nisi cum maxima difficultate, & sic hæc humiditas, quæ stillabit, vocatur mater balsami, deinde ex hac aqua & elyxir prædicto faciunt medicamentum hoc modo. Cōmescunt elyxir cum matre balsami & imponunt in alembicum, tandem alembicant & colligunt liquores egredientes, inter quos primus est mater balsami dicta, supra quam natat oleum, quod dicunt oleum balsami, postea extrahitur balsamum dictum, deinde in fundo remanent fæces crassiores post oleum balsami & aquam: & sic colliguntur quatuor, primum est aqua, supra quam natat oleum, quod colligitur ex aqua, deinde adiuncto igne egreditur quoddam nigrum, quod appellatur balsamum: vltimo remanent fæces, quarum non est vsus. Balsamum ad ploriam validum est & præcipue ad ægri tudines nervorum, & ad paraly sin. Aqua vero est illa, quæ valet ad vulnera omnia, præcipue capitis: hæc ergo vtuntur hoc modo: Sit aliquis vulneratus, quia habeat detectam membranam, & vulneratum non tantum sit os, sed etiam si (vulnerata sit) ipsa membrana, primo volunt vt deradatur caput, deinde aperiant vulnus manibus solum, nam nec igne nec ferro vtuntur & infundunt hanc aquam copiose in vulnus, deinde inspergunt puluerem, quem dicam, tandem supponunt lintecolum madefactum hac aqua, & iterum inspergunt puluerem, rursus aliud lintecolum madefactum hac eadem aqua, superponunt & ligant vulnus; deinde sic relinquunt vulnus vsq; ad tertium diem & illis duobus diebus, quibus non remouent medicamentum applicatum, madefaciunt lintecola aqua illa & mundant gossipio, si aliquid sit commaculatum sanie. Quod si etiam oporteret dimouere medicamentum, vel quia pingeretur membrana, vel etiam aliud aliquid noxii adesset, illi non dimouent tamen, & dicunt, quod medicamentum omnia exprimit; instituunt autem victum ac exhibent bonum vinum, bonas carnes, bonos fructus & alia pro tempore, & quando medentur ægto, volunt vt sit aer temperatus, & æger ambulet, si possit; pulvis vero, quem inspergunt, talis est:

℞ aloes lb̄j.

mannæ thuris

thur. albi an. ʒ iij.

Terantur hæc simul & s. pulvis tenuissimus. Sed notandum, quod quando membrana est detecta ac apparet cerebrum, & est periculum fluxus sanguinis, apponunt solum aloem

cum illa aqua: sed si hoc non fit, vtuntur integro puluere, & perficiunt curationem hanc maxime cum successu: ego etiam vsus sum hoc modo medendi, tamen iam reliquissimam probi autem & impii improbant nostram artem dicentes, nos facere per plura, quod possit fieri vnicui auxilio, vt sit per hoc medicamentum. Secundo dicunt, quod ipsorum medicamentum est siccatum, ac potens ita, vt efficiat, quod sanies non gignatur in vulnere, & hoc verum est, & ipse experientia vidi, quando eo vsus sum, & isti ideo dicunt, quod non est timendum de partibus subiectis, imo dicunt etiam, si gigneretur sanies in profundo, est tanta vis medicamenti istius vt illam extrahat superius ex osse, & sic nullum est periculum à sanie si aliqua generatur sub osse, ideo dicunt nos stultos esse, qui facimus infinitas
 10 fracturas osterebrandis: adducunt etiam ab analogia rationem dicentes, quod in fracturis costarum & fractura coxehidicis non secatur caro, ne sanies descendat in abdomen: ergo neque in fractura capitis est id faciendum, quoniam facto hoc miseri patientes valde enecantur. Præterea dicunt esse præceptum Hippocratis, vt blande omnia tractemus, vos methodici exhibetis medicamenta, excoctis caput, vbi sit maximus dolor: præterea deraditis os ac secatis & sic cruciatu ægrum, vt ergo omnia blande agamus, insequimur hæc nostram sententiam, hocque dicunt isti ego tamen his non acquiesco: nam vti dicebam, vtebar in principio cum felici successu, tamen quia medicamentum non facit omnia, quæ pollicentur ipsi, ideo reliqui: & reuera si non sit os pungens membranam & sit dilatatum vulnus, ac non sit inflammatio, nihil hac præstantius esse affirmo: sed si ad hoc os pungens
 15 membranam, & ad sit inflammatio, nec vulnus sit dilatatum, maxime nocet, & hæc fuit ratio potissima, cur ego ipsum dimiserim: in aliis quoque vulneribus non vror, quia hæc compositio maxima impensa paratur, valet enim quinquaginta ducaris. Tertia causa, cur ipsum dimiserim est, quia aduocati phisici vna ad curam, videbant medicamentum illud & damnabant me, quare vel ego dimitteendus eram vel illi, & cum hoc esset graue, nolui amplius hoc in medicamento vti.

Quarta secta est Hippocratica & omnium rationalium Medicorum, qui cum ratione procedunt in eorum actionibus cum experientia coniuncta: exhibent enim potiones, quædā opus est, vt vntura aqua, aceto, oleo, emplastris & ad medicamenta opportuna ad vena sectionem, confugiunt, quando expedit pharmaca exhibent, præparant, euacuant, & in summi
 30 ma omnia applicant, quando à ratione indicantur selecta ab his omnibus sectis, ac si fletus faciculus florum selectorum: quoniam in hac secta, vt diximus præparantur humores, purgatur corpus per pharmaca electiue ducentia, subducitur venter per lenientia, per elyteres administratos, instituitur victus ratio, & circa locum affectum præter prouidentiam totius statim conspiciunt considerantes, cum os fractum esse cognouerunt, an vulnus latum sit, vt omnia necessaria conspici possint: nisi enim latum sit satis, aperiunt ac dilatant ipsum, vt omnia cognoscant necessaria ad curationem, & hæc est prima actio, quæ non semper conuenit: nam cum dilatamus, dilatamus os, & ideo est etiam secandum pericranium, vnde si dilatatum est, non amplius dilatant & non faciunt, vt barbisoni fores isti hominum lanii & anthropophagi, qui præcepta artis ignorantes, non nec essitatem &
 40 rationem sed prauam voluntatem aut saltem ignorantiam sectantur sine distinctione aliqua. hinc est, quod nostri Medici chirurgos in collegio admittentes ipsosque interrogantes proponunt ipsis vt plurimum casum aliquem in vulnere capitis curandum, & ipse respondit, ego appono manum, & video si os detectum sit, nec ne: si non est detectum, coniectus de eius latione dilato, vt manibus possim vulnera in profundo contrectare, & ita in hoc differt Empiricus ab optimo Medico: quoniam opus est, vt diligentissime adhibeatur ocululus, vt si non sit necessarium dilatare, non dilatetur, & si sic, secundum est ac dilatandum, vt detergatur os, ideo non tantum corium, sed pericranium etiam est separandum & non cutis saltem, vt faciunt inepti, qui postea delusi manent cum maxima vulneratorum iactura.

FINIS VI. TRACTATVS.

GABRIELIS FALLOPPII MV. TINENSIS MEDICI AC PHILOSO. PHI PRÆCLARISSIMI, DE VVLNERIBVS PAR.

TICVLARIBVS A CAPITE AD INFRA VERSVS.

TOMI II. Tractatus VII.

De Oculorum vulneribus, & eorum diuisione, agglutinatione, sutura & tractatione
post consensionem. CAP. I.

Capitulum
oculorum fuit
fuerit ante
diuisione.



TRACTATIONEM de vulneribus ita nobis volentibus absolueri ordine sic postulante ad oculorum vulnera deueniendum est, in quorum curatione eadem ratio, quæ difficultatem faciebat sanandorum vicerum oculorum, eadem quoque facit difficultatem sanandorum vulnerum, quod variis de causis provenit. Primo enim sunt difficillima sanatu oculorum vulnera propter loci nobilitatem ac subtilitatem, videlicet ratione præstantiæ ac nobilitatis ipsorum. Secundo ratione sensus exquisitissimi ipsis oculis inexistens. Tertio ratione consensuum, quem cum ipso cerebro habent ratione muscutorum ipsorum: quoniam si quæ sunt partes, quæ habeant multos nervos, sunt ipsi muscoli oculorum, cum ergo tot sint nervorum propagines in musculis oculorum, merito habent maximum consensum cum ipso cerebro. Quarta ratio, quæ facit difficultatem curandorum ipsorum vulnerum est fluxionis infestatio facilis: oculi enim facillime ac maxime fluxionibus infestantur, ratione quarum fluxionum non parum impeditur vulnerum consilidatio. Quinta ratio est motus ipse: oculi enim semper in motu existunt, qui motus non potest villo pacto prohiberi, cum sit eis naturalis. Quoties ergo proponitur curandum vulnus oculorum, accedat Medicus timide tanquam ad vulnus magnum ac periculosum, pertractetque vulnus ipsum atque partem læsam minutissime vnguentisque mollissimis. Quod si hoc non faciet, multa prava symptomata superuenire poterunt, ut inflammationes, dolores, & etiam mors ipsa. Sed ut distincte procedamus, diuidere oportet vulnera oculorum ipsa. Horum ergo vulnerum tria sunt genera siue species, quorum primum est, quando vulnerantur & secantur palpebræ per transversum, quod est vulnus oculi proprium: nam hic per oculum omnes partes oculo circumiacentes intelligimus, ipsumque cum continentia, rum in ipso contenta. Secundum genus horum vulnerum est quando non solum palpebræ, sed etiam corpora ipsi oculo circumiacentia vulnerantur, ut musculi, membranae, &c. Tertium genus horum vulnerum est, quando bulbus ipse vulneratur, id est, quando vulnerantur ipsorum oculorum tunicae, & hoc duobus modis accidere potest, primo quando vulnus in oculo existit vulneratis etiam prædictis partibus, secundo modo, quando oculus tantum vulneratur absque læsione partium adiacentium. Vnde hæc vltima species potest esse cum penetratione ad interna, ac etiam absque penetratione, sed agamus modo de prima specie. In omni autem palpebrarum vulnere hoc tantum agendum est, ut agglutinationem scilicet tentemus ipsam: quoniam & bene agglutinantur & statim quod tamen videtur esse contra aphorismum Hippocratis ac Aristotelis opinionem, qui est vera sententia Hippocratica: multa enim habet desumpta ex Hippocrate ipso: est autem aphorismus ille 19. sect. 6. ita dicens: cum discissum fuerit os aut cartilago aut nervus vel genæ particulatenus vel præputium, neque augetur, neque coalescit, & ideo videtur, quod frustra debeamus tentare conglutinationem, tamen experientia nos toties docuit palpebras ipsas facillime agglutinari: ne ergo videamur nos Hippocrati contradicere, hanc opinionem & hoc obiectum sic soluemus dicentes, per agglutinationem duo intelligenda esse apud Hippocratem, quemadmodum etiam recentiores distinguunt in primam & secundam intentionem. Prima intentio agglutinandi recentiorum est, quam Græci *συνέχουσι* vocant, & est quando partes discissæ simul coniuntur. Secunda autem recentiorum agglutinandi intentio est quam Græci *συνέχουσι* vocant, & est quando partes discissæ mediante carne succrescente vniuntur, & hæc à recentioribus incarnatio dicitur: de hac igitur secunda intentione intelligens Hippocra-

oculi vultu
diuisione.

Diuisione vulni
non videtur.

De his oculi
palpebra vulneribus
agglutinetur.

Agglutinatione
est duplex.

tes dixit in aphorismo illo non fieri agglutinationem, videlicet per succrescentem carnem, & ita de labiis, de cartilaginibus, de nervis, de genis, & partibus huiusmodi dicendum est non agglutinari quoniam in huiusmodi partibus caro succrescere non potest: quoniam partes istae non habent subiectum in quo, vel supra quod caro gigni possit, qua intermediente, partes dissilire videntur.

Sed forte aliquis dicet, non agglutinantur nisi corpora humida: palpebrae autem sunt corpora sicca atque arida, & ideo non mirum, si difficillime incarnantur partes istae: sed respondeo ego verum esse, quod sunt corpora sicciora: respectu aliarum partium corporis, tamen iis non deest humiditas illa, quae satisfaciat ad agglutinationem. Praeterea experimento comprobauimus, quod agglutinantur. Nostra est itaque sententia, quod omnes corporis particulae, sint quantumcunque voluerint siccae, possint agglutinari per primam intentionem, praeter ossa, de quibus suo loco dicemus, quoniam vt dixi partes istae tantam humiditatem habent, vt agglutinari possint. Cutis enim, ligamenta & nervi agglutinantur, praecipue si recte possimus ipsas partes suere, & hoc manifeste patet in cure, quae, quanquam sicca sit, agglutinatur tamen, vt clarum est in sectione venae & appositione cucurbitularum scarificatarum, sic itaque etiam de aliis est dicendum partibus. Nos ergo in vulneribus palpebrarum semper agglutinationem tentabimus adhibita prius sutura vulneri ipsi, quae licet sit diuerso modo ab auctoribus proposita: eam tamen ego probo quam subtilis vel ponctua vocamus, quae fit hoc modo: traicimus acum per vulnus ipsum, & traducto filo ligamus iterum in alio loco idem facimus & toties, quoties opus erit, notandum tamen est in hac sutura, quoniam summa diligentia fieri debet, & primo obseruandum est, vt partes dissilire bene iungantur, quod fiet, si labia vulneris recta simul linea coniungantur. Secundo optime aduertendum, ne oculum pungamus: sutura autem, de qua nunc locuti sumus, est sutura pellipariorum, id est, eorum, qui parant & confuunt pellicias, vt superius diximus, vbi de suturis ipsis & diuersis earum speciebus tractauimus.

Notandum est praeterea, quod materia, qua suimus, ad hoc apta sit: apta autem erunt maxime fila sericina. Acus deinde optima esset argentea, si fieri potest, vt facilius inflecti possit: vel si sit ex chalybe, sit ex eo non temperato, vnde igniatur prius, vt modicum humectetur a sua friabilitate, vt facile flecti possit. Ego autem accipio acum Damascenum & inuoluo eius aciem peria aliqua madida aqua frigida, deinde candela accensam calefacio reliquum ipsius acus: nam per hanc calefactionem distemperatur acus relicta acie temperata, vt possit flecti & facilius perforare ipsam cutim. Facta sutura solemus statim infundere album oui bene conuassatum in ipsum oculum, in parte scilicet non sana, vt facilius internae partes agglutinari possint: in exterioribus autem partibus apponere solemus ceratum barbarum & nihil aliud. Impositis medicamentis opus est, vt quiescat oculus & palpebra ipsa, quod hoc modo consequendum est, imponatur gossipium vel lineum multipliciter duplicatum, & ligetur fasciola aliqua, sed danda est opera, ne id, quod imponitur, incalcescat, quare imbuatur lineum ac madesiat aliquo liquore, qui etiam ad agglutinationem faciat, vt esset vinum austerrum, quod etiam inflammationem prohibet, deinde ligetur fascia: nam hoc modo procedendo ad agglutinandum pars per quatuor vel quinque dies ad summum, & hoc ipse saepius expertus sum. Cum autem praeteribit dies quarta vel quinta, & nos palpebras videbimus agglutinatas, tunc illa puncta suturae abiciemus & vulnus ad cicatricem perducemus.

De Secundo genere vulnerum oculi contingentium.

CAP. II.

Secundum genus vulnerum oculorum est, quando non solum palpebrae, sed in simul & cum palpebris vulnerati sunt musculi ac partes circumiacentes, vt sunt supercilia, genae, &c. In hoc itaque casu quid agendum? statim indicatur, vt sanguinem supprimamus, quo cohibito non est adhibenda sutura: quoniam non possumus per confusionem nisi cutim vnire, vnde imminet & sunt abscessus plerumque cum in superficie tantum consueere possimus: est enim vel sit magna laxitas partium, in iis praeterim vulneribus, quae sunt ita magna, vt pertingant ad orbitam oculi, id est, concauitatem ipsam: vnde videtur, quod non debeamus suere, quia non assequimur agglutinationem nisi in superficie, & sunt abscessus, neque possumus etiam vt in iisdem vulneribus deligatione, quoniam sicuti per ipsam suturam, ita etiam per deligationem sunt ab-

*Palpebra de si
foram pappe
dura valeret
turi per anst
terium.
Palpebra asu
si dappiani*

modi 2.

*ad prelo
dum p
m.*

*Quia con
mte m
m m
m m*

*Ad ducem
applicand
pall p
vel f
d.*

*De vulner
bulbi oculi.*

scellus. Si ergo non adhibetur futura nec fasciæ ligentur, sequitur quod frustra expectatur partium harum agglutinatio. Sed dicat aliquis, si casu vulnus sit per transversum in superiori parte oculi, quod vulnus nisi suatur, cadet palpebra & efficiet difficultatem appetendi oculum, quid igitur faciendum? Casus autem palpebræ fit duobus modis; primo per se cadente supercilio ratione aggravationis; contingit enim plerumque cum sit vlcus vel vulnus in eodem supercilio & cum osse corrupto vel fracto & aliquis imperitus volens os extrahere, secat per transversum superciliū ipsum, quo facto cadet & palpebra ipsa, & succedet difficultas aperiendi oculum. Secundo modo fit casus palpebræ, quando scilicet palpebra cadit per accidens ratione musculi vel resoluti, vel recisi: cum enim resectus est musculus vel resolutus vel chorda ipsius, cum dubium est, quod 10 palpebra cadet, cum non possit à musculo ipso adiuvari? Hoc ergo stante, maxime opus est chirurgi diligentia in adhibenda futura in his partibus: quoniam nisi agglutinabitur, cadet palpebra ac manebit oculus semper clausus. Ego itaque in hoc casu, ne hoc fiat, sic procedo: semper enim primum confuso futuram satis arctam adhibens, & ut etiam arctior ac brevior fiat confusio, portiunculam palpebræ abscindo, ratione cuius abscissionis etiam sit tolerabilius pondus & ad agglutinationem aptius: quoniam ratione frontis fit aliqua elevatio, quia palpebra reddita est brevior. Si vero non tollatur illa difficultas futuri abscellus, quia scilicet partes in profundo non agglutinentur, tunc opus erit hoc nos peragere per curam illam propositam à Galeno in methodo mcedendi: vnde recentiores imponunt linamentum siue tentam, ut egrediatu id, quod contentum est: 20 sic enim agit Galenus in vulneribus profundis, in quibus non speratur agglutinatio, tentando, ut pars tantum superior agglutinetur: sed advertendum est, quod nunquam bene attollitur palpebra. Partis vero anterioris habenda est ratio, ut semper sanies ibidem collecta egredi possit, quod si casu fieret, ut confusio requireretur, erit adhibenda multa confusio, ad quam etiam multa sequetur fluxio: tunc in eo casu ego soleo relinquere locum, aut novam & minus periculofam facere sectionem, per quam & medicamenta imponebam, & quicquid fluxerit, per eundem locum egrediebatur.

Si vero chorda musculi non sit dissecta, non est tentanda confusio: quoniam pro 30 ritaretur futurus abscellus & dolor quoque intolerabilis. Medicamenta autem, quæ his vulneribus conveniunt, sunt illa, quæ habent vim digerendi, concoquendi, siccandi atque detergendi, & etiam dolorem mitigandi, quibus medicamentis procedendum est usque ad septimam diem, excepta tamen prima die, in qua imponimus album oui. Advertendum tamen est, quod alia ratione in his vulneribus apponitur album oui, quam in reliquarum partium vulneribus: quoniam in aliis vulneribus relinquimus album oui semel applicitum stare per spatium viginti quatuor horarum, permittentes, ut exiccat: arin vulneribus oculorum non est admittenda ipsius albi exiccatio, quoniam si permitteretur exiccare, humores attraherentur & fluxiones fierent, & hinc inflammationes atque dolores exercebant maxime. Ne ergo hoc fiat, semper affundendum est aliquid ad humectationem faciens, ne stuppa exiccet. sic igitur facimus; imposito albumine oui accipimus petiam duplicatam vel triplicatam, & hanc imbuimus vel aqua rosa- 40 cea, vel vino austero & superponimus albumini ipsi, sed cum hac conditione, quod toties peria illa imbuatur & intingatur, quoties videbimus incipi exiccare, & albumine hoc cum hac petia madefacta aliquando sic procedimus per duos dies, sed ut plurimum per diem vnicum tantum. Transacta autem prima vel secunda die ordinamus medicamentum vires supra dictas habens, quod componatur secundum hanc formam:

℞. ol. abietini ℥℥.

massich ℥j. vele contra massich ℥℥. & abietini ℥j.

croci grana quinque. Misce pro medicamento imponen-

do post album oui: hoc enim concoquit, digerit ac dolorem lenit. Imposito autem hoc medicamento supra vulnus, rursus applicentur eadem, ut in vulnere palpebræ diximus, linamentum scilicet madidum vino austero. Tandem si opus sit absterfione, cum hoc admiscemus mel rosatum, & cum tenta imponimus. Post mundificationem vero farcoticis vtendum est medicamentis, & ultimo cicatrizantibus: & hæc si non consuatur palpebra. Si autem consuatur palpebra, semper uti debemus cerato barbaro; Si vero non consumus, oleis est vtendum: & hæc de vulneribus palpebrarum.

Si vero vulneretur bulbus oculi, quanquam hoc leuissimum sit vulnus, attamen opus est maxima chirurgi diligentia, ut si scarificetur adnata vel etiam ipsa cornea & palpe-

palpebra quoque sit simul discissa, tunc peractis communioribus palpebra consuecunda est, si vulnerata sit deinde super oculum imponantur medicamenta, quæ habent vim siccandi, leniendi atque refrigerandi, vt est album ouium cum syceph albo sine opio, vel syceph cum opio si dolor adsit, vel commiscemus cum syceph de thure siue collyrio de thure, præterea gummi Arabicum: gummi etiam tragacanthæ dissolutum cum aqua rosæ, vel cum aqua ex albo ouium commixta cum cremore facto ex radicibus consolidæ maioris: nam ista omnia faciunt ad consolidationem: & medicamenta hæc siue vnum aliquod ex his pro necessitate electum quater & quinquies in die infundantur in oculum per duos dies vel quatuor etiam, & deinde claudatur oculus, postea imponatur illud, quod prohibeat inflammationem.

Notandum est tamen, quod plerumque accidit, quod si vulneretur oculus cum palpebra simul & cum ipsa coniuncta, quod ob negligentiam Medici omnia simul conglutinentur, ita vt oculus cum palpebra concreascet, & sic impediatur motus ipsius oculi: quare aduertendum est, ne in consolidatione motus ipse impediatur. Ad euitandum ergo talem casum, danda erit opera, ne huiusmodi consolidatio fiat, quod his rationibus effici potest. Primo sollicitandum est, vt æger quotidie oculum aperiat, & in partem oppositam voluere tentet & voluat, si potest. Quod si æger hoc primum per se efficere non potest, admonetur, vt per se tentet obuolutionem oculi in partes varias, ipsūque hinc inde voluat, & qualitercunque inspiciat tertio si neutrum horum effici potest, tunc nos medicamentis oculi apertionem tentabimus, & deinde imponemus folium auri duplicatum super ipsum oculum sub palpebra, extensum tamen, ipsum scilicet aptando inter palpebram & oculum: hoc enim impedit consolidationem, neque enim timendum est aliquod impedimentum ac periculum ex auro, quoniam aurum siccatur atque refrigeratur, modice tamen; super palpebras autem ponatur barbarum, aut aliud quid simile agglutinans.

De tertio genere vulnerum oculorum difficilium ac perniciosorum. CAP. III.

Tertium genus vulnerum oculorum est, quando vulneratur & secatur bulbus ipsius oculi, ita tamen, vt humores oculorum vel membranz ipsorum egrediantur, & hoc est vulnus difficile, periculosum atque perniciosum: nam si perforetur vena tunica, egreditur humor aqueus, quo egresso ex Galeni sententia in lib. de sympt. caus. necessario glaucoma expectare debemus, ac ipsius oculi cæcitatem, quamuis semper hoc non fiat: quoniam videmus aliquando miracula in natura ipsa, quinimo & auctoritatem Galeni habemus in hoc casu, dum in libr. method. med. citat historiam de quodam puero cuius oculi vulnere vidit egressam copiam & quantitatem magnam humoris aquei, non tamen subsecuta est cæcitas. Ego quoque in multis eiusmodi vulneribus vidi exempla & præcipue in quodam octuagenario, cui vi deposita fuit suffusio seu catara cta, dum autem acus exempta fuit ex oculo, magna copia humoris aquei effluxit, tamen tertio die vidimus nos oculum plenum ipso humore, neque quicquam mali passus est propter effluxum humoris illius, quo ad visionem scilicet, neque etiam exicantur partes sicuti pluries vidi & verum testor.

Si vero cornea sineretur scissa per spatium tantum aliquot horarum, fiet sine dubio periculum; tunc enim totus ipse humor efflueret, nec vnquā amplius regeneraretur, necessarioque obcæcatur ipse oculus.

Fit autem in eiusmodi vulneribus magnum periculum, quando egreditur humor vitreus, vel tunica aliqua aut tunica, vt vena, quæ facile elabitur, qua elapsa sequitur cæcitas. In omni ergo vulnere tertij generis oculorum semper periculum est cæcitatis: nam effluente humore crystallino & procedente vena tunica semper sequitur cæcitas; effluente autem albugineo vel aqueo humore aliquando sequitur, vt patet ex historia Galeni supra allegata. Sed si cornea maneat aperta per duas tantum horas, non consolidaretur vlte rius, & sic efflueret totus ille humor aqueus, & nunquam regeneraretur, quo facto necessatio sequeretur cæcitas. Si ergo egrediatur humor albugineus, & vulnus possit cito agglutinari, periculum non erit visus: reliquis vero humoribus defluentibus semper aut deprauabitur aut penitus corrumpetur visus ipse.

Si itaque vulnus oculorum erit penetrans in oculo & ita penetrans, vt egrediantur humores, ac tunica ipsorum oculorum, sciendum est, quod talia vulnera fiunt à diuersis causis, sed vt plurimum à causis exterius proueniunt; aliquando enim illata sunt à gladio, quandoque autem à vitro, modo à sagitta, ab arundine, à spina, à festuca & similibus in-

Si peris in-
framentis: se-
cretis si in o-
culo.

strumentis, quæ quia facile rumpuntur ac franguntur, ideo mirum non est, si sæpe, imo
sæpissime portiuncula aliqua ex his remanet in oculo ipso, & præcipue si à vitro factum
sit vulnus. Primo ergo cum incipitur curatio talium vulnuerum, videndum est, an aliquid
relictum sit nec ne corporis ferientis, ut pars ferri, vitri, festucæ & similium: nam si relin-
quatur pars aliqua, auspicanda est cura ab extractione inhaerentis, unde videndum est pri-
mo, an res inhaerens appareat nec ne: si enim apparet, volsella ipsam arripere debemus, ac
extrahere: sit autem volsella apta & idonea ad arripendum & etiam extrahendum: nam
quoties infixum arripitur, & volsella tractui resistit, toties etiam noua faciet vulnera: apte-
tur ergo optime volsella, ut bene arripiat ac facile extrahat. Præterea notandum, quod ex-
trema volsellæ non fecent, ne sua acie noua efficiat vulnera, ac intro magis ingredietur
infixum. Si autem hoc quod infixum est, non appareat in superficie ipsa, vel si quidem ap-
paret, tamen difficile potest extrahi, in hoc casu monent Medici cum antiqui, tum mo-
dèrni, ut omnia tentemus pro extractione, & ideo mandant, ut primis diebus madesiant
linamenta in oleo rosæ completo, ac ipsis oculum foueamus, hoc enim dolorem lenit, in-
flammationem sedat, ac locum vel ipsum laxat & maxime ad apertionem conducit. de-
inde apertionem vulneris tentant foramenque ipsum dilatare conantur cum medulla ex
sorbo vel ex sambuco, vel cum spongia præparata. Dilatato vulnere postmodum tentant
extractionem corporis contenti explorantes specillo id, quod inest oculo, postea im-
mitti iubent volsellam & apprehenso illo, quod infixum est, extrahi mandant. Ego au-
tem cum id satis periculosum sit, & nos assequi difficillime possimus, semper enim & cer-
to ex huiusmodi actione proripitur inflammatio fluxionesque causantur, & proinde dor-
lor magnus ac ferme intolerabilis succenditur, in tali casu hoc modo non procedo, sed
cum viderem in oculo multa ingressa ac in profundum etiam immersa, vulnus verosa-
natum fuisse illis in eodem apparentibus, quæ infixæ erant, sine omni potius periculo ac
nocumenno ipsius visus. Vos itaque moneo, si hoc, quod infixum est, non appareat, ut
non tentetis hanc manualementem extractionem causa euitandi intolerabilis doloris, ego
enim, ut dixi, experientia actus vidi frustra vitri, similiter portiunculam ferri ac spi-
næ, ac vnguium fragmenta & similia relictæ in vulnere remansisse in oculo, & sanata
fuisse vulnera. Quare si commodè non potestis extrahere talia infixæ, & sine multo
dolore, derelinquatis ea, quia sanabitur vulnus absque contentorum extractione, ut
ego pluries vidi, talia remansisse in oculo post vulneris consolidationem, & immersa
transparere ex oculo & conspici sine magno periculo ac momento visus. Hortor ita-
que vos omnes, ut relictæ & abiectæ hac periculosa actione, si vultis extractionem tenta-
re, eam tentetis per medicamenta lenia vim habentia extrahendi: nam id satis erit per
medicamenta facientia ad extractionem tentare sine periculo, quam per manualementem
actionem cum manifesto detrimento & periculo. Ego ergo in tali casu hoc medicamen-
tum hoc modo conficio:

Medicamentum
lenius pro ex-
tractione oculi
ipso.

℞. ol. vitell. ouor. ꝯss.

abietini ꝯij.

croci gr. iij. Misceatur. & fiat medicamentum infun-

dendum in oculum: & sic eo vtor procedendo vsque ad septimam vel nonam
diem.

Quod si natura emittere vult quod est infixum, bene res peragetur, si vero non ten-
tat expulsionem ac vulnus consolidari vult, remanente adhuc infixo in oculo, sinendum
est ipsum consolidari. Si vero hoc per se non fit, vos consolidationem non tentabitis,
quia non desunt viæ ipsi naturæ, neque laceretis homines, cum hoc experientia ipsa do-
ceat multos huiusmodi fuisse casus, & hæc cura in iisdem casibus facta sit & tandem libe-
ros ipsos euasisse absque ulla visionis detrimento. Ego autem vnum hoc, quod mihi ipsi e-
uenerat, dicam: vocatus fui iam ad curam huiusmodi vulneris in quadam muliere, cui vi-
tro vase illatum erat vulnus in facie ac præcipue in vno oculorum, cum ergo venio voca-
tus ad curam statim perpendo & inspicio omnia, video magnam partem vitri esse impa-
ctam in oculo, hoc extrahere volui volsellaque arripui, sed quod arripui frangebatur, &
extrahabatur, reliquum vero profundissime immersum manebat, quod postea mediat-
mentis ipsis extrahere tentabam: sed dum hoc agerem, vulnus consolidatum est vitro re-
manente in oculo, & obstaculo erat ipsi visui, & vixit ita mulier annos aliquot, quo-
usque tandem peste correpta interiret. Si vero corpus feriens non erit infixum ac ratione
vulneris periculum erit, ne humores prolabantur, ac reliqua etiam in ipso oculo contenta,
tunc statim deueniendum erit ad medicamenta vim habentia robuste adstringendi.
Sed

Si viderem oculi
periculū
si, ut dixerem
procederem.

Sed quia in huiusmodi medicamentis adstringentibus semper coniuncta est vis quaedam exasperans, quæ oculis est inimica, necessarium est, vt illis addantur illa, quæ leniant asperitatem illam; ideo in hoc casu vtor ego medicamento siue decocto secundum hanc formam:

℞. fol. ros. rubr. cum vnguib.

myrobal. citrin.

myrthillor.

sumach. an. ʒß.

aloes hepatic.

mastic.

thurus mann. an. ʒj.

aq. plantag.

Decoctum ad
leniendam asper-
ritatem adstringen-
tium.

ros. an. quantum sufficit. Misce & fiat decoctum & percoletur; sed quia exasperat, his addo syeph. albi sine opio ʒj. Et dissoluo eum sufficienti quantitate dicti decocti, & infundo in oculum, & hoc eodem vtor vsque ad finem. Si vero vultis robustius, addatis metallica aliqua, vt esset bolus atmena orientalis, lapis hæmatites & similia, & infundatis in oculum. Ekterius autem imponantur linteola madefacta vino austerò, vt prohibeatur inflammatio; sæpe autem mando, ne incalescat locus, vt replicentur. Si autem vicia egressa sit vel dissecta, vel portuncula aliquis oculi amputata, tunc omnia agenda sunt, ne partes relictæ putrescant, & vt dolor leniatur cicatrixque inducatur, hoc autem faciemus, si imponamus album oui per se absque linamento: non debemus enim in oculo gossipium imbutum aut aliquid simile imbutum medicamēto relinquere: quoniam oculi talia tolerare non potest, sed sæpe album oui infundatis cum syeph albo cum opio, vel etiam sine eo mixtum. Si autem sordes adsint, non est detergenda neque petia neque gossipio neque alia vllare propter dolorem, sed lac iniiciatur, pro quo optimum erit, si potueritis habere mulierem, quæ lac ex mamillis ipsis in oculum emulgeat, tamdiu donec omnes sordes detergantur hoc inquam erit optimum. Si autem mulier non adsit, accipiat capram, quæ similiter hunc in modum lac emulgeat, siue cuius lac eodem modo in ipsum oculum emulgeatur. Si vero neque mulier neque capra haberi possit, accipiatur lac mulieris vel capræ, vel cuiuscunque etiam sit generis, & sensim guttatimque in oculum ipsum instilletur.

Sed quoniam non semper in huiusmodi vulnere albumine est vtendum, ideo loco albi oui infundatur gutta medicamenti siue decocti talis:

℞. fol. plantag.

ros. rub.

flor. meliloti an. Mß.

sem. fornugr. ter lorum ʒß

aloes

myrrh.

thuris an. ʒj.

eroci gr. iij.

thuriz Alexandr. præparat.

pompholyg. præparat.

cerussæ lotz an. ʒij.

syeph. alb. cum opio ʒj.

aq. ros.

feniculi an. quantum sufficit. Misce & fiat decoctum quo sæpius

& continuo perfundatur oculus.

Sed quoniam hæc medicamenta liquida non perdurant in loco, sed cito effluunt, neque moram trahunt in oculo, vnde paruum oculo afferunt auxilium: ideo post affusionem dictam atque perfusionem inspergatur puluis aliquis, & interdum etiam puluerem inspergimus absque perfusione facta. puluis autem sit, qui dolorem mitiget, siccet & adstringat. Sed notandum & maxime aduertendum est, quod pulueres isti sint optime emolliti & læuigati, ita vt mirum sit atque nihil amplius esse possint neque fidendum est in hoc seplasiatis, vt scilicet læuigent tales pulueres: quoniam laborem fugiunt vel negotium famulis commendant, qui vel ignari, vel ignari etiam existunt, quare vos, ne decipiāmini, hoc modo ipsis vtamini pulueribus, accipiat puluerem ita læuigatum, vt haberi potest, ipsumque in linteolo siue fascia admodum spissa imponatis ac in modum fasciculi optime ligetis, postea specillo siue stylo aliquo pulsare ac tundite fasciculum

Decoctum gut-
tæ in oculum
ad leniendam
asperitatem
adstringen-
tium.

Decoctum in
oculo per
affusionem.

ipsum super oculum: nam ex hoc fasciculo eribrabitur & exibit puluis subtilissimus ac tenuissimus, qui vilo modo asperitate sua oculum ledere non poterit, neque super pondere ipsum aggravare, & intentioni satisfaciet optime; pulvis autem sic componi poterit:

*Pulvis ingru-
endus in oculo
est de alio mil-
lemodis facien-
dus.*

℥. syeph. alb. cum opio
chut. alex. præparat.
pomphol. præparat.
lapid. hzmaz.
gumm. arab.
tragacanth.
aloes an. ʒj.

croci ʒss.

Hæc omnia misceantur, terantur, & leuigentur, ut po-
test, in puluerem tenuissimum, quo uti possumus vsque ad quartam diem, vel etiam ali-
quando vsque ad septimam.

*Medicamentum
recomendatum
est pro præparan-
do.*

Transacta autem septima die vtemini magis derergentibus, siccantibus atque ag-
glutinantibus & epuloticis, id est, cicatricem inducentibus. Sunt autem eiusmodi medi-
camenta illa siue collyria, quæ plura ab antiquioribus & Galeno etiam pluribus in locis
sunt descripta, quæque ex vobismet ipsis videre & assumere potestis. Apud autem re-
centiores Medicos inter cætera hoc vnum habetur præstantissimum, quod ex ovis
conficitur hoc modo. Accipiunt oua recentia, coquunt ea in aqua, quo vsque dura fiant,
& hæc sunt ad summum numero octo, postea aperiunt per medium, siue per transfueri-
sum vbi libet, reiectis vitellis ablatisque corticibus albumina ipsa filo traiecta in medi-
phialæ vitreæ suspendunt: ita tamen, ut non tangerent parietes, neque fundum phialæ: sed
prius explent albumini cauitatem puluere quodam inferius describendo, impletis ve-
ro ipsis albuminibus puluere ipso, & suspensis, claudunt phialam panno vel vesica, deinde
de accipiunt phiala hoc pacto clausam & ipsam suspendunt, sic clausam super caldarium
aqua ebulliente plenum, ex hoc autem fit, ut incaleseat phiala, quæ dum calefit, calorem
albuminibus impartitur, & sic etiam albumina, simul incaleseunt ac elixantur, ratione cu-
ius elixationis eliquatur & stillatur humor quidam, qui præstantissimum est remedium
in hoc casu ac mirabile præsidium. Materia autem siue pulvis, quo explentur albumina ʒo
vorum, fit secundum hanc formam:

℥. myrrhæ cl.

mann. thuris

aloes

sarcocollæ in lecto nutritæ an. ʒj.

gumm. arab. ʒij.

sem. papau. alb. ʒss.

croci ʒj.

thutiz alexandr. lotz

Pomphol. lot.

retuss. lotz an. ʒj.

*Pulvis præparan-
dus in oculo
est.*

Hæc misceantur & contundantur optime & in albumina ouorum ponantur: & ex
hoc postea inungimus oculum: possumus etiam post inunctionem eodem puluere ead-
dem vulnera inspergere illita prius liquore: pulvis autem inspergi potest per fasciculum,
ut superius dictum est.

De Doloze vulnerum oculorum.

CAP. IV.

Sed quoniam, ut notandum est, sanatio & curatio hæc vulnerum oculorum ex cædredra
facilis admodum videtur, sed in actu practico sanatu difficillima sunt, & hoc prouenit ʒo
ratione doloris, quare in vulneribus oculorum non tantum laborandum est circa solutio-
nem continui, sed maxime doloris est habenda ratio: quin imo si dolor sit ingens, cæteris
omnibus neglectis ipsi tantum dolori est attendendum.

*Quædam præparan-
da sunt.*

Facienda itaque, si dolor adest, sunt fomenta ex lacte humano vel caprino, vel vac-
cino, & fouendus est locus cum spongia dicto lacte imbuta. Facto aurem fomento appli-
centur stupefacientia aliqua, ut esset collyrium de thure, vel syeph. album cum opio, cum
albumine oui, vel cum lacte dissoluta.

Si autem dolor his non cedit, nec zger perferre possit, ut hæc imponantur in oculo,
tunc in tali casu ego conficio emplastrum ad hoc maxime faciens, quod tamen (em-
plastrum)

plastrum) duplex est, aliud scilicet simplex, & aliud compositum. Simplex est tale. ꝯ. car-
nis pomorum dulc. sub prunis coctorum quantum sufficit, iis postmodum adde saccha-
rum copiosum & croci & olei ros. complet. q. f. ad emplastri formam, sed hoc leue est em-
plastrum.

Empl. Polipo-
pura siccandi
debet.

Compositum vero hoc modo conficitur:

ꝯ. carnis eorundem pom. sub prun. coct. ꝯ. j.

fol. papati. alb. coct. sub prun.

hyoscyam. eod. mod. coct. an. ꝯ. j. ꝯ.

croci ꝯ. j.

far. scenogr. ꝯ. j.

laet. muliebr.

ol. ros. compl. an. q. f. misceatur & f. empl. quod extendatur super

petiam, & deinde imponatur super oculi clausi palpebram. Si autem oculus non potest
perferre contactum illo modo, vel ratione, nos facimus liquorem & cum perfundimus
super oculum.

Sed notandum est, quod primo perfundi debet super partem sanam, deinde sensim
ac sensim influat super locum affectum ac partem laesam, aliter ægri non possunt tolerare
ratione doloris, liquor autem siue decoctum stupefaciens est tale:

ꝯ. sem. fenugr. ꝯ. j.

sarcocoll.

myrrhæ an. ꝯ. j.

croci ꝯ. j.

flor. chamom. M. ss.

opi ꝯ. j.

Misce in s. q. aquæ feniculi fiat decoctum, deinde cole-
tur & vsui seruetur pro doloris mitigatione. in eodem casu aliquando inspergimus pulue-
rem ex syeph albo cum opio vel eum syeph de thure, & inspergimus: quoniam in tanto
dolori necessarium est ad opiata deuenire, sine enim stupefacientibus talis dolor non se-
dabitur.

Decoctum fan-
ticuli.

Sed notandum, quod maxima diligentia sunt ægri pertractandi ac seruandi primo,
vt non videant lumen, neque maneant in loco calido ob inflammationem & dolorem;
facile enim proritantur, nec stent in loco nimis aperto ac lucido: nam ex luce facile exca-
cabuntur, quare cum vulnus inspiciendum est, ac ipsi maderi volumus: accipiat candela
cum obumbraculo, vel lumen sit charta circumuolutum aut in laterna dicta, vel saltem
manus interponatur, & sic vulnus ipsum inspiciatur. Notandum est præterea, quod sem-
per lumen ponendum ad partes superiores capitis, vt pote ad frontem, à retro scilicet: quo-
niam sic æger non ita facile lumen aspiciet, & etiam per ipsam palpebram extensam pene-
trant radii, propter quos possumus inspicere etiam profundissimas partes oculi, quamuis
ponatur lumen ad partes superiores, quia transparentis est palpebra, quare circumspexit
sit Medicus, & assidentes circa hoc.

Acquid sit an-
ger in capite
debet.

Sit præterea semper æger in quiete, non decumbat, sed rectus maneat, dormiat quan-
to diutius potest: si enim quid est iuuans oculos, est somnus ipse. Excrementorum etiam
ratio est habenda, ideo singulis diebus sæces eliciantur. Et si natura non facit opus hoc,
clysteribus adiuuetur. Frictiones conueniunt ac omnes reuulsiones optimæ sunt: medi-
camenta semper bilem purgantia in principio maxime exhibeantur: vena secetur eius-
dem lateris, si ætas & cætera consentiant. Altera vero die applicentur hirudines post
aures ac in occipitio. Caueat æger à Venere tanquam re maxime perniciofa ipsi
oculis.

Sicut æger
medici sunt.

De tollendis Cicatricibus, quæ post sanationem relinquuntur.

CAP. V.

Sanatis vuleribus oculorum cicatrices tollendæ remanent, quæ nisi emolliantur ac
attenuentur, visum impediunt: Quomodo autem hæc attenuandæ sint, dictum est sa-
tis in tractatu de vlcibus oculorum. Nonnulla tamen hic addo, quibus vtuntur antiqui
Medici ad has cicatrices maxime tollendas, ac est collyrium de feniculo ad hoc quidem
præfatißimum, collyrium etiã de anagallide, vt & alterum ex salibus optimum est; colly-
rium ex floribus, leucoij & ex sagapeno, collyrium de succo turæ cum melle & similia.
Sunt etiam diuersa medicamenta à Galeno descripta in libr. 4. de compos. med. per loc.
Ego autem hoc seq. medicamento vtor libentissime:

Collyrium ad
cicatricem tollen-
das.

℞. succi anagallid. rubræ virid.

rutæ

fœnicul.

elæoxylini

fol. euphrag. an. ʒij.

mellis delpum. ʒij.

fellis taurini ʒij. misceantur, simul coquantur & ponantur sub

sole diebus canicularibus, vt deinde eo cum aqua fœniculi vti possimus, vel etiam aliquando cum lacte, aliquando vero ipso solo & simplici. Sed notandum est, quod ille, qui linget, moderate lingat, & si mulier erit, quæ linget, aduertendum est maxime, ne lingat, quando ei fluunt menses, sed maxime tunc ab hoc caueat, quoniam perniciosissima esset actio, & aliquando, qui lingit, colluat prius os aqua fœniculi, vel fœniculum ipsum mandat, deinde vero lingat, & hoc si semper obseruetur, optimum erit.

Cætera vero, quibus cicatrices attenuantur, si hæc pauca dicta non sufficiant, habere poteritis copiosa ex tractatu de vlceribus oculorum capite proprio. Et hæc de vulneribus oculorum.

De Vulneribus nasi & narium refrigeratarum, & de earum consuetione. Item de formis narium & glutine pro applicandis ipsi formis.

CAP. VI.

Succeedunt iam narium vulnera, quæ nares variis modis possunt vulnerare: nam quandoque in iis sit vulnus cum ossis in cisione ac sectione, aliquando sine ea, vt quando scilicet secatur tantum pars cartilaginosa, quandoque vero sit, vt nares ipsæ pendeant in aliquo paruo frusto suspensæ. In his autem omnibus ac quibuscunque vulneribus, vel magna sint vel parua, dummodo viuat adhuc substantia ac viua sit pars secta, statim indicatur, vt sanguinem sistamus fluentem, quanquam incisum etiam sit os. Sanguinem autem sistimus posca ipsa: vel etiam aceto solo, & nullum est periculum in vulneribus hisce. Suppresso sanguine statim consueundum est vulnus, deinde tentanda est eius sanatio per agglutinationem: quoniam hæc vulnera sananda sunt per primam intentionem. Sed quoniam hæc pars est maxime potens, & oculis valde subiecta, ideo summa est cura ac diligentia adhibenda in consuetione, ne turpis reddatur ipsa facies; primo itaque bene apponatur ac aptetur pars secta: secundo sibilæ artæ siue consuetiones strictæ fiant, ita vt labia optime coniungantur: quoniam aliter facta cicatrix postea erit magna, & turpem efficeret hominem: tertio oportet vt habeamus flexiles acus propter concauitatem loci ipsius, vt opus rectè perficere possimus. Consuecenda enim sunt nares ad latera, sintque sibilæ parum inuicem distantes. Aduertendum est autem, quod pars dissecta pendens esset iam refrigerata, tunc statim ad fomenta deueniendum est, vt incalescat, etiam si persentiantur frigida adhibita futura, tentanda est agglutinatio, licet sit in vsu ac commune præceptum in omnibus membris, quod cum aliquod dissectum fuerit ita vt in minima portione pendeat, vel cutis aut caro, aut caro & cutis simul, obseruandum est, si illa pars, quæ pendet, calida est, aut frigida est: si enim calida est, consolidari potest peractis omnibus pertinentibus: si autem frigida, erit discindenda ac amputanda: quoniam iam emortua est, ac spiritus vitales sunt in ipsa extincti, vnde priuata est sensu ipso ac vita: nam etiam cum arteriæ, venæ atque ossa rescissi sunt, nunquam consolidantur: ac in narium vulneribus hoc non semper sequitur: quin imo semper agglutinatio succedit, nisi ita mortua pars esset, vt appareat iam liuida. Nos enim experientia didicimus etiam exanguem ac semimortuum partem narium agglutinari posse.

At si pars vulnerata etiam post agglutinationem mortua remaneret ac liuida, mollius est ipsam præscindere, quod in vno tantum homine ego feci, sed post agglutinationem ita semper siccaui partem illam mortuam, vt sine noxa aliqua nasum suum ferre posset: & siccaui autem cum medicamēto ex dictamno, vnde sine noxa aliqua agglutinatum fuerit vulnus vel saltem siccatum nasum suo permansisse loco sine aliqua noxa, testor. Si ergo frigida sit pars dissecta narium, in primis fouēda erit aliquo liquore calido, vt incalescat, vt esset etiam lotio vel cū decocto factio ex vino & chamæmelo, deinde consueatur. Consuetis autem vulneribus duo debemus obseruare, primo vt confirmatio narium seruetur recta, solent enim plerumque in aliquam partem inclinare & sic agglutinae deturpant faciem arque hominem. Secundo obseruare debemus agglutinatione ac consolidationem partium molliorum ac etiam duriorum: ideo semper in exterioribus applicabitur

seruanda in consuetione narium.

Sibilæ parum distantes.

Ac pars non frigida & semimortua potest agglutari.

Docuit me pro facie parte narium refrigerata.

Ad præparandam exteriorem agglutinationem.

tur ceratum barbarum Galeni, quod primum locum tenet & maxime facit ad agglutinationem, vel etiam aliquādo ipsum dissoluimus cum pauco cerato rosato vel oleo myrthino. Sed quoniam in omni vulnere natium habemus etiam partes internas vulneratas, quæ & ipse consolidatione indigent. Ideo interius inuicimus album oui vel decoctum aliquod faciens ad agglutinationem, vt si fiet decoctum ex gallis, rosis, myrtho, tormentilla & ex rad. consolidæ maioris; hæc in aqua vel vino coquendo, eius decocti portionem in nares iniicimus; vel ægri attrahunt ipsius portionem per nares; vel in nares ipsas bombyx madidus dicto decocto detineatur, vel accipiat ceratū barbarum dissolutū cum oleo myrthino ipso partes inungendo internas: hoc modo enim succedit agglutinatio cū internarum tum etiam externarum partium natium vulneratarum simul.

10 Conseruatur autem natium cōformatio, vt iuxta proportionem ac debita figura agglutinentur, aut fistulis aut deligationibus iuxta præceptum Hippocratis aut formis natium dictis ex argento confectis aut plumbo vel etiam ex fistulis plumbeis, vel linamentis, quibus hoc modo vtimur. Conscimus tentas ex stuppa ad longitudinem & crassitudinem vnius foraminis natium, & has tētas imbuimus albo oui vel barbaro dissoluto aut aliquo simili medicamento aut decocto; & tentæ fieri possunt ex quacūq; materia attamen fistulis plumbeis vt plurimum vtimur, & iis ego semper sum vsus, cum & ipsum plumbum habeat vim exiccandi & in eo potissimum casu & vulnere, si æger tentas ferre non potest, & præcipue his vtimur fistulis, quando patientes extremētirosi sunt ita, vt plurima materia destillet a capite, ne materia, quæ iam est assueta per nares effluere, retineatur, ac nouū faciat abscissum, quia per foramen ipsius fistulæ egreditur. Fiant itaq; tunc fistulæ ex lamina plumbi tenuissima ad crassitudinem & longitudinem foraminis natium, vt de tentis dictum est, deinde obliniatur barbaro & imponantur in nares.

Per formas autem conseruamus natium rectitudinem, fabricatis formis siue laminis ex argento vel alio metallo, ita vt possint aperiri ac stringi, & his vtimur quando nates agglutinandæ inclinant in illam vel alteram partem, tunc enim aptantur formæ ipse barbaro obliniæ ac super nates satis stricte imponimus. Vtimur præterea & fasciis iuxta intentionem Hippocratis; & est cura facilior & non ita fastidiosa, & semper ego his vsus sum procedens vsque ad quartam diem; quarta autem die præcidentia sunt puncta siue futura, ne ab ipsis punctis cicatrices fiant, neque tamen tunc exhibendæ sunt fibulæ sed altera die, quoniam in quarta die fiet natium consolidatio, si recte fuerint tractatæ & curatæ.

Cum agglutinantibus deinde procedimus vsque ad septimā, imo etiā non tantū vsque ad septimā, sed etiā vsque ad curationis finem. Ex his autē propositis præcipue vtimur barbaro ipso, etiā si vulnus sit cum fractione ossis, quoniā barbarum præstantissimum est, ac maxime etiā facit ad ossa fracta; & sic procedimus vsque ad 20. diēnam vt plurimū in 20. die cōsolidari solent ossa natium: consolidatis autem ossibus nil aliud agendū est, nisi quod si distorquetur nates, instrumentum argenteum dictum applicabitis, quoniam sic recta reddentur earum figura. Si autem acciderit, quod pars natium dissecta sit iam mortua ac putrida, antequam 40 ad eius curam venias, amputanda erit, deinde vulnus relictum curetur, vt reliqua solēt curati vulnera. Curato autem vulnere, cum remaneat turpitudine ob dissectam natium portionem; in hoc ergo casu sunt aliqui, qui turpitudinem hanc tegere conantur variis ingenii: aliqui enim formulam nasi parant ex argento vel alio aliquo metallo & apponunt; alij eandem formam natium emunt ab his, qui masearas conficiunt & applicant; & hæc mihi magis placet, quoniam facilius potest aptari & etiam colore infici simili cum reliquo naturali colore; & hoc quidem est melius, quam restitutio illa ex medicis Calabris. Has autem formulas siue masearas apponimus facto glutine, quo intus obliniuntur, vt fortius hæreant: sit autem gluten hoc confectum ex terebinthina, gummi elemi & pice colophonia, & cum pauca cera fiat ceratum, aut etiam hoc sit gummi solo Arabico dissoluto, quod semper in phiala dissolutum seruetur. Ad hoc etiam facit aliud genus aliquod gummi, quod 50 naso ipsi aptetur, quidam etiam loco harum formularum extendunt ceratum vel emplastrum dictum in tela aliqua & conficiunt formas natium & applicant; telam autem accipiunt quamcūque, sed vt plurimum sericinam & supra postea aptant emplastrū dictum, & naribus deinde applicant formam natium confectam. Sed quia modus

hic est nimis apparens ac deturpans, ideo non laudatur, & hæc de vulneribus nasi.

Quia eadem est ratio in curandis vulneribus auricularum, quæ in narium vulneribus servatur, ideo brevibus dicendum est, quod in dissectione auricularum idem sentietur, quod dictum est in vulneribus narium, videlicet sanguis prius supprimatur cum posca seu aqua & aceto mixtis, postea suturæ aptentur, deinde cura tenetur per primam intentionem atque perficiatur barbaro supposito, ligaturis deinde bene aptatis, procedendo servetur conformatio ipsarum, quarta die seindantur suturæ, quinta sibilæ extrahantur, postea, procedatur cum ipso barbaro usque ad curationis finem. Fretiâ quandoque, ut abscindatur penitus auriculæ ipsæ, tunc cum pisciû glutine sunt aptandæ & consuevandæ deinde: non est enim dubium, quod agglutinatur optime. Cætera vero agantur iuxta præcepta tradita in narium vulneribus, unde ultimo deveniatis ad restitutionem illarum cum facticiis ac masticis ut dictum est de narib.

Si amputata sunt auricula.

De Vulneribus colli. CAP. VIII.

Vulnera colli sequuntur in qua quidem parte cum habeamus varias particulas, varia quoque sunt vulnera ac varia eorum curatio, ita ut vulnera colli diversa fiant pro ratione variarum particularum existentium in ipso collo, nam in collo sunt partes anteriores, posteriores, internæ & externæ. Habemus musculos & superficiales & profundos. Habemus nervos plurimos à sexto pari nervorum cerebri originem ducentes, quæ ad ipsa deinde viscera descendunt. Habemus præterea venas singulares atque arterias magnas, quæ ad caput ascendunt. Adest præterea aspera arteria, per quam aer attrahitur à pulmonibus. Adest & gula siue cesophagus, per quem cibus intrat & deferitur ab ore ad ventriculû, super quæ adest aspera illa arteria. Est enim spina ossea siue dorsû, in qua continetur medulla spinalis, & ex qua plura nervorum patia oriuntur. Cum ergo tot sint & tam varæ particule in ipso collo, necessario sequitur, quod earum partium diversarum ratione vulnera etiam ipsarum variantur, ita ut sicut varia sunt vulnere genera, ita etiam curationes fiant varæ. Nos autem incipimus à simplicissimo vulnere dicentes, quod simplex erit vulnus, quoties tantum vulneratur cutis ac pars musculosa exterior sine latione venarum, artiarum, gulæ, asperæ arteriæ, spinæ dorsalis: vel, ut in summa dicam, aliarum partium nobilium. Si itaque tale simplex sit vulnus, hoc modo procedendum erit: primum & ante omnia supprimatur sanguis cum posca, aqua scilicet aceto mixta, deinde sutura adhibeatur, quoniam quanquam aliquando vulnera colli sunt maxima teniamus tamen eorum curationem per confutionem, nam per primam intentionem eam curare intendimus.

Vulnus simplex colli quod sit.

In simplici colli vulnere quod agendum sit.

Si etiam transversaliter musculus sit dissectus, cum facile glutinentur muscoli, sed etiam profundiores muscoli sunt confuendi, et si etiam, ut dixi, per traheretur essent dissecti, postea tentetur cura per primam intentionem, id est, per agglutinationem ipsam, quoniam non tantum in hoc simplici vulnere ut dictum est, sed in reliquis omnibus vulneribus colli etiam maximis semper tentatur cura per agglutinationem. Facta autem diligenti sutura glutinâ

Quid post suturam agendum.

Ad prohibendum abscessum si pars musculosa latur.

At in confusione notandum est, quod non tantum musculus dissectus & cutis ipsa, & si etiam transversaliter musculus sit dissectus, cum facile glutinentur muscoli, sed etiam profundiores muscoli sunt confuendi, et si etiam, ut dixi, per traheretur essent dissecti, postea tentetur cura per primam intentionem, id est, per agglutinationem ipsam, quoniam non tantum in hoc simplici vulnere ut dictum est, sed in reliquis omnibus vulneribus colli etiam maximis semper tentatur cura per agglutinationem. Facta autem diligenti sutura glutinâ imponantur medicamenta, ut esset emplastrum barbarum Galeni, per exterius autem supponatur aliquod prohibens inflammationem, ut sunt linamenta made facta vino austero vel oleo rosaceo.

Accidit autem sæpius, ut propter amputationem partis aliculus musculi non possimus profunde musculos confuere, unde fit ut relinquatur cavitas sub ipsa cute iam confuta, quæ si talis remaneat facit abscessum, cum in ea multa sanies colligatur. ne ergo hoc fiat, sic erit procedendum: accipiat peria duplicata, vel triplicata & fiat plumaceolus ad formam cavitatis illius & in cavitatem ipsam applicetur ut corium ac musculi hæteant ipsi cavitati ne sanies ibi relinquatur ac colligatur & faciat abscessum.

Sed notandum quod antequam aptemus plumaceolum ipsum cavitati, prius sunt inspergendi intus pulveres adstringentes super ipsum vulnus, hoc agentes usque ad seprimam: supra vero ponatur semper barbarum, deinde secunda sibilæ ac auferendæ. & cum istud consequimur. Notandum est autem quod in vulneribus ceruicis, quâquam superueniret abscessus, accidit. n. sæpe, ut in illis cavernis colligatur sanies, tunc nunquam immo teris emplastrum barbarum, sed incidatur & aperiat modice tumor ille ut sanies effluat. Ar si superueniret inflammatio, commisceatur barbarum cum cerâ rosato æquis portionibus: in sinu vero ipsius vulneris expressa sanie infundatur oleum abietinum aliquando ipsum cum melle rosatum, aliquando vero ipsum mel rosatum solum ad maiorem abstersionem, semper tamen cum barbaro procedendo, reliqua autem suo ordine perficiantur.

Si autem gula vulnere tur vel aspera arteria, tunc vulnus est maxime periculosum pluribus rationibus: primo ratione exquisitissimi sensus quem habent partes istæ propter internam membranam. Secundo quia intumescit oesophagus, non potest æger deglutire, & ex consequenti neque nutrirî, neque si intumuerit aspera arteria poterit aer attrahi per ipsam, & sic periculum erit de suffocatione. Tertio periculum & difficultas adest in his vulneribus ratione motus ipsarum artierarum, quæ nûquam quiescere possunt: & ratione motus ipsarum vulnera etiam semper sunt in motu, vnde quiescere non possunt huiusmodi vulnera, quoniam aspera arteria perpetuo attrahit aerem & per oesophagum necesse est vt cibus semper transmittatur in ventriculum: necessarium enim est, vt comedant, inspirent at expirent. Cum ergo quiescere nō possint hæc vulnera, mirum non sit, si rari admodum sint illi, qui liberentur ab huiusmodi vulneribus: quare semper prænunciandum est in his periculum de morte: non tamen ob id taliter affecti sunt derelinquendi absque auxiliis, vnde si forte huiusmodi casus eueniat, sic procedendum erit: vt scil. primo statim tentemus cohibitionem sanguinis, secundo deueniamus ad consutionem statim per fibulas, quæ sint parum inuicem distantes & arctæ admodum fiant: tertio imponantur agglutinantia, vt barbarum vel pulueres agglutinantes, de quibus superius egimus. Linteamina deinde supponantur, quæ semper madida sint vino austero ac oleo rosaceo. Sed quoniam in his vulneribus est etiam tentanda agglutinatîo per inietus, quare debemus semper dare aliquid per os quod descendat & inibilet per illas partes, vnde medicamenta sint transmissa per oesophagum, vt sunt gargarismata quæ debent in ore teneri, vt sensim ac sensim guttæ descendentes perfundant locum affectum & vulneratum: vnde ego conficere soleo gargarisma in hunc modum paratum:

℞ rad. consolid. ma. M. ij.

tormentill.

penaphyl.

fol. beton.

ros.

cimar. an. M. j.

fol. pimpinel. M. ss.

gumm. tragac. ℞j.

seq. chalyb. q. f. Misc. & coq.

sec. art. deinde coletur decoctum, & postea pro singula decocti sine uocolaturæ libra addatis syrupi myrthini ℞j. & hoc decocto abluat æger sæpe fauces ac os colluat, & curet vt liquor descendat ac declinet ad vulnus ipsum, quoniam maxime facit ad consolidationem.

Si vero gargarismate uti non possit, teneat in ore continue aliquod medicamentum, quod dissolutum per se fiat ad vulnus oesophagi & oblinat ipsum, quare conficietis eclegma secundum hanc formam.

℞ rad. conf. ma. subprun. coct. ℞ij.

pulu. tragac.

gum. Arab. an. ℞j.

spec. diatragant. frig. ℞j.

bol. arm. orient. z. ss.

syrup. myrth. vel de ros. sic. q. f. Misc. & f. eclegma aut elect. in ore tenendum.

Si autem sit vulnus in gula, bibat æger continue vel sæpe aquam optime chalybeatam addito syr. myrthino aut facta decoctione cum portulaca, vel etiam bibat ipsam aquam portulacæ, vel habeat decoctionem aquæ chalybeatæ factam cum radicibus consolidæ maioris, vel etiam portulacæ addito syrupo myrthino, quoniam maxime iuuat ipsa portulaca.

In omnibus etiam eius cibariis coquantur similiter radices consolidæ maioris, atque ipsa cibaria cocta sint in aqua chalybeata, cui addantur radices consolidæ & pimpinella, fugiat clamores, non deglutiat cibaria solida, nō bibat vinum, ne causetur inflammatio: seceetur vena & mittatur sanguis in maxima copia, habita tamen ratione illius qui defluerit. Et si alius adstringatur, exhibeatis sæpe clysteres, atq; etiam syrupum ros. sol. non exhibeantur autem pharmaca, ne ledant vulnus ipsum in transitu: ac etiam ne casu prouocetur vomitus, quoniam maximum afferret detrimentum. Bene possunt pharmaca

exhiberi in vulnere asperæ arteriæ. Maneat æger læto animo sed maxime lethalia sunt hæc vulnera, & potissimum vulnera arteriarum: & hæc de vulneribus gule.

De Vulneribus ac incisuris venarum & arteriarum collo, & de diversis modis

stiffendi sanguinis eorum.

CAP. X.

IN collo diximus aliquando fieri simplicissima vulnera, ut quando cutis ac musculi vulnerantur exteriores, de quibus egimus: egimus præterea de vulneribus tractæ arteriæ ac ipsius gule siue œsophagi. Et qua ratione sint curanda diximus, iam succedunt vulnera illa, in quibus inciduntur venæ atque arteriæ in ipso collo, existentes, quæ quidem sunt quam plurimæ, & in parte dextra & in sinistra, quæque feruntur ad superiora. Sed ut dist. n. cte procedamus, dico, quod si sit vulnus colli cum incisione venarum & arteriarum, hæc vel magnæ sunt, ut sporales dictæ ac irregulares sursum ascendentes vel parvæ. Sed de novis, quod vulnera sunt in primis vas m: ximis, nulli dubium est, quod statim supprimendus sit sanguis: & obstruendum ipsum vulnus: Nam nisi statim supprimatur sanguis, ac solidetur vel obstruatur vulnus, egredietur ac totus breui temporis spatio effluet sanguis & peribit homo. Ut autem hoc agamus, ac quomodo agere debeamus Galenus lib. 1. Meth. med. docet cap. 5. ubi dicit, hoc posse fieri dupliciter, primo: ut impediamus sanguinis fluxionem impediendo autem in vel auerendo vel decedendo aut firmando materiam ipsam, seu prohibendo, ne ad locum fluat, ac existentibus fluxum protitantibus ea de medioculendo. Secundo autem modo hoc agemus, si obstruemus vasorum ipsorum ostificia. Cum obstruimus autem vasorum possumus duobus modis procedere, vel scilicet per conunctionem labiorum vulneris, vel per obturationem osculorum vasorum, id est, venarum siue arteriarum ipsarum tantum, quæ obstructio perficitur, quando digito comprimimus osculum ipsarum: comprimimus enim venæ osculum digito aliquo temporis momento, cuius compressionis ratione tandem concrevit sanguis in ipso, qui postea concretus & in grumum conuersus non permittit sanguinem amplius fluere.

Recentiores Medici solent hoc perficere per suturam & confectionem labiorum vulneris, quod ego tamen non probor: enim magna sit effluxio, nihil proficiat ista consultio. Ego itaq; oppositum facio, nam si magna est fluxio, non consulto sed in eunib; primo ipsis vas, sed de re etiam consultio quandoque, præsidium hoc fieri potest tribus modis, primo modo opera manuum ipsarum vel digitorum, ut si digitis obturetur os vasis, unde postea concrevit sanguis ne fluat. Secundo modo per fascias & deligationibus adiuvabimus ac sistemus sanguinis fluxionem: accipimus enim fascias & involuimus aliquoties super vulnus ipsum, deinde cum eadem deligatione procedendo tendimus ad principia venarum & arteriarum, ut exempli causa: Si vulnus sit in carpo manus, nos debemus procedere cum ligatura ad cubitum, quoniam si retrahemus sanguinem ad principia venarum & arteriarum ipsarum, oportet tamen ipsas fascias madidas reddere aliquo liquore adstringente pro impedienda fluxione ac inflammatione. Tertio modo poterit id fieri, cum faciemus suturam profundam, non tantum scilicet cutis ipsius, sed etiam carnis de scissæ. Ut autem sciamus & inueniamus modum certiore ac perfectiore sistendi sanguinis, nos colligamus & antiquorum & modernorum rationes siue modos sistendi sanguinis esse septem: prima ratio est, ut obturetur vulnus & osculum vasis dist. 8. ut mediante obturatione conuertatur sanguis in grumum, qui sic conuersus postea prohibeat ac impediat fluxum, & hoc fit dupliciter, vel si obturata vena intrinsecus vel extrinsecus intrinsecus possumus hoc efficere imponendo in corpus arteriæ aliquod claudens & obturans ad formam tente: extrinsecus vero tenemus per suppositionem medicamentorum. Si per intrinsecus sistere volumus sanguinem, Avicenna hoc docet fen. 4. lib. 4. in cap. de fluxu sanguinis, ubi facit linamentum, imponendū in ipsam venā & arteriam, quæ claudit ipsam, & hæc actionem bucculationem vocat. Fit etiam, ut dixi, impositio digito, quocies unque ingredi potest: nam servato aliquantisper digito super vas in extrema parte ipsius vasis semper cōcrevit sanguinis grumus, qui reliquū sistit fluentē: sed advertatis, quod hæc ratio non est bona, neque ei fidendum est, quoniam periculum est, ne iterum liquato grumo sanguis fluat. Fieri. n. potest quod statim sanguis in grumos concrevit & sistatur fluxus, ac deinde colligatis illis concrevis grumis novus succedat fluxus, qui miserum in firmū iugulare poterit. Secunda ratio est, quæ perficitur per linamenta vel corpora extrinsecus imposita: & hæc optima est, nos enim prius obturato osculo ipsius vasis digito sistimus sanguinem, deinde cōfectis linamentis ex stappa vel gossipio aut tela aranea imbuimus primo illa albo oui & deinde imponimus in vulnus ipsum hoc modo, videl. primum splenium imbutum pomini & digito comprimimus supra osculum vasis, deinde aliud splenium, & sic per consequens, donec totum vulnus repleamus.

Tertia

Tertia ratio est, quando per excisionem vas per tranſuerſum efficiamus vt contrahatur ſubſtantia vaſis ipſius: nam ſeparata vena vel arteria capita incisionis retrahuntur, caro vero deinde ſupercreſcens obſtruit ac obturat ſpatium illud.

Quarta ratio eſt illa, quæ peſſicitur per inductam cruſtam vel ſetro ignito vel cauſtico medicamento: quare ſemper cauendum eſt à ſuppreſſione ſanguinis per grumum ipſius inductum, imò ſemper auferatis ipſum grumum, præcipue ſi eſt in exteriori parte factuſſe: ſed ſecunda ratio dicta opportuna eſt, quæ ſit per corpora comprimantia, & ideo vtiſſis la-
 10 biis imponatis ſtuppam imbutam albo oui, vel linamentis vtamini aut ſpongiæ: ſed præſti-
 tiſſima materia eſt goſſipium, ſi imponatur ſemiſtuppi: tela aranea etiam optima eſt, & præ-
 cipue ſi imbuta eſt polline ſeu fatina.

Sæpe etiam ſuſtinemus ſanguinem per additam carnem, & ita eſt tuta atque certa cura-
 tio, & hoc ſemper tentamus, maxime in vlnere magnis. In eo ergo caſu ſolemus vi medicamenti emplaſtici ac vim habentibus regenerandi carni, videl. ſarcoticis, vel etiam
 vtimur iſis, quæ ad ſtringunt aliquantisper atque carnem generant; vnde optimum fore du-
 xi, ſi hoc in loco de emplaſticis primò verba faciamus. Vnde ſciatis, quod inter hæc primò
 10 locum tener medicamentum illud ex Galeno lib. 5. meth. ca. 4. quod impoſitum cito ge-
 nerat carnem, cuius materia ſunt thus, aloë & album oui; in his enim adeſt vis emplaſtica
 & ſarcotica. Verum quia opus eſt vt hæc impoſita diu in loco ſeruentur; in hoc igitur me-
 dicamento aliquod addatur, quod non ita facile putreſcat, ſeu non ſit aptum putredini, &
 15 Inſuper ſit laxum, molle atque rarum, vt poſſit multum liquoris imbibere, quare thuri, aloë
 & albo oui ſi addatis pilos leporinos optime inciſos, præſtans erit medicamentum, quini-
 mo his omnibus ſimul agitatũ & conquaſſatũ nil eſt præſtantiuſ.

Ego autem in corporibus mollioribus accipio duas partes thuris & vnã aloës: in
 mediocribus vero corporibus æqualiter, in durioribus autem duas partes aloës & vnã
 thuris, quibus ſemper addimus pilos leporinos, qui hanc materiam debet ſuſcipere & ipſa
 imbuti. Materia ergo quæ medicamento hoc imbibere debet, erunt pili ipſi leporini, quos Ga-
 lenus accipiebat albos & ipſos pro materia accipiebat variis de cauſis: primo quia pili lepo-
 20 rini non putreſcunt, ſecundo in his adeſt mollities; tertio nulla in ipſis adeſt malignitas;
 quarto in ipſis eſt mundities, quinto adeſt in eis ſiccitas, cuius cauſa id quod accipitur, re-
 25 tinetur adeſt etiam præterea ratio, ratione cuius facile imbutur: & vltimo nihil in iſis in-
 eſt, quod agglutinationem impedire poſſit.

Præterea goſſipium etiam cum eaſdem habet conditiones, optimũ erit materia: nos
 itaque hoc linamentum applicemus eo modo dato hoc exemplo: Si itaque ſit arteria diſſe-
 cta, nos primo applicabimus digitum ſuper vas ac oſculum ipſius comprimimus, & inde
 goſſipio madido poſca vulnus abluimus, vt ſanguis concretus expurgetur. Expurgato ſan-
 guine & exiccato vulnere goſſipio, inſpergimus puluerem ſiccum, quem paratum ha-
 bere debemus ad hoc æ aloë & thure, quo vulnus inſpergatur circa digitum, in pauca ta-
 30 men ſit quantitate: dein de accipimus linamentũ imbutum dicto medicamento, & eleuato
 digito ſtatim ſuper vulnũ impoſatur, & iterũ ſtatim digitum ponatur ſuper linamentũ ipſum
 35 leuiter comprimendo, & ſic per conſequẽs. At cum vultis eleuare digitum aduertendum
 eſt, ne faciatis, vt aliqui faciunt, quicum volunt eleuare digitum à linamento nullo inter-
 poſito inſtrumento inſimul cum digito auferunt etiam linamentum; quare vos accepto
 ſtylo ſiue ſpecillo & interpoſito, antequam eleuetur digitum, ipſo ſeparabitis linamentum
 40 primũ à digito, & ita digitum à ſecundo linamento, & ſic ſucceſſiue de ſingulis eſt agen-
 dum. Expleto autem vulnere inſpergatur ſuperficies ipſius puluere, deinde ligetur fascia
 madida vino aſtremo & oleo roſato.

Sed notandum, qd primæ deligationes ſiue reuolutiones ſint ſuper vulnus & ſint tres
 vel quatuor, primæ enim tres vel quatuor deligationes fieri debent ſuper vulnus, deinde a-
 ſcendẽdum eſt cum fascia verſus principia vaſorum, vt retrahatur ſanguis & fiat ipſius ex-
 45 preſſio, ne ita facile ſuat ad locum, & inibi ſiniatis, vel iterum aſcendatis, quod erit melius
 firmando fasciam in parte ſana, non autem ſupra vulnus, maneat autem iſta prima deliga-
 tio viſque ad tertium diem, vt matura ſint linamenta impoſita incepta concoctione vul-
 neris, quoniam ita fortiter hærent linamenta ipſa, vt ſi vi & ante hoc tempus auferantur, ma-
 ximum erit periculum, quod iterum ſuat ſanguis. Tertio vero die immutantur linamen-
 50 ta: ſed aduertendum in eorum immutatione, quod non omnia linamenta ipſa auferri de-
 bent, ſed ſiniatis ſemper linamenta illa, quæ ſunt viciniora vaſiſſima vero remouentur; vt ſi
 exempli gratia, fuerint in prima vice linamenta decem impoſita, auferantur tantum octo,
 ſuo relinquent ſo in fundo vulneris; dein de renouatis octo iterum ligetis modo dicto, ſic
 55 proecedendo donec ſuccreſcat caro, quæ obruret ſubſtantia diſſecti vaſis, quo tẽpore po-
 60

*Medicamen-
tū aliud pro
sistendo san-
guine.*

*U. ratio sif-
fi di sangui-
nem.*

*Medica-
menta ad-
stringentia.*

*Medicamen-
tum optimū
ad siften-
dum sangui-
nem ex ius-
sis.*

*U. Modus
sistendi san-
guinem.*

*Anatomia
necessaria
in hac ad-
diti-
one.*

*Cur natura
nervus con-
iunctus cu
arteria.*

*Modus deli-
gendi arte-
riam.*

*An con-
iunctio deli-
gendi per
ligamentum.*

terunt tuto auferri omnia linamenta: quoniam illa, quæ sunt super vulnere, per se tunc so-
lent eadere & cadent. Est etiam aliud simile medicamentum descriptum ab eodem Gale-
no libro quinto, meth. med. cap. 3. quod quidem constat ex resina fixa: quam colophoniam
vocalamus: præter ea ex polline farinæ tritici & paucō gypso mixtis cum albo oui. Ex
eadem est ratio imponendi huius, quæ in primo medicamento existit: at ego, vt verum fa-
tear, magis laudo primum (medicamentum) quoniam nos nunquam fallit. Possumus
etiā sanguinis fluxum prohibere constringendo ipsa vasa per medicamentā adstringentia,
& est sexta ratio siue sextus modus sistendi sanguinis ex recentioribus, ipsius medicamentis
vteudo extrinsecus applicitis, præcipue quando non possumus digitum commode appo-
nere vasi, nec etiam medicamenta ipsa commode aptare loco: in hoc itaq; casu medica-
mentis vti possumus adstringentibus, quæ tamen frigida sunt & adstringant iniiciendo per
clysteres ac infundendo in locum, inter quæ primo sunt decocta vel succus ex balaustis,
ex hypocyrtide, ex rhu vitroque, obsoniorum scil, & coriariorum, ex omphacio, ex acacie
præterea quocunque genere, ex gallis immaturis, ex mali corio, ex pini conice, x i terra si-
gillata, ex rubrica sinopica, i.e. bolo oriēiali, ex lapide hæmatite, qui omnia superat, ex quo-
libet corallo, ex sanguine draconis: omne præterea genus gypsi cū crudum coctū est opti-
mum: est etiam plantaginis succus, polygoni succus, ex myrtho omnia: succus rubi &
lentisici, succus cupressi, hippuridis siue equiseti, mucus etiam ex radice consolidæ maio-
ris, quæ omnia conueniunt in huiusmodi vulneribus instillata per clysterem. Sed succus
foliorū porri ac totius plātæ omnia superat addito succo equiseti, quo medicamēto quan-
doq; ego in fluxu sanguinis ex vtero lucratus sum quinquaginta scutatos aureos, & ideo
hoc vtor libenter, & crebro: quoniam ipsam experientia competi optimum, & conficitur
in hanc formam: ℞ succ. rad. consol. ma.

polygon. masculi

equiseti an. ʒ. β.

fol. porror. ʒj. misceantur & per clysterem siue syringam in vas vul-

nerantium iniiciantur. Vtor etiam hoc medicamento in fluxu sanguinis narium & vteri,
quoniam hoc nihil f.licius neq; præstantius inueni. Aliquando autem vtor aquis stillati-
tiis ex eisdem reb. confectis, opinione illorum postposita atq; neglecta, qui aquas stillati-
cias nullius esse momenti affirmant; aqua etiam plantaginis in quocunque fluxu maxime
facit, & aliquando loco medicamenti cōpositū ex succis, loco succi conficio aquam ex iis-
dem simplicibus, & ipsa vtor feliciter, imo sciatis, quod magis aqua ista composita adstringit,
quam succus illi: quoniam magis penetrat aqua quam succus: & hæc sint satis quan-
tum ad medicamenta adstringentia.

Sed quoniam quandoque in his vasīs dissectis non satis est pro cohibendo sanguinis
fluxu medicamenti adstringentis impositio & vsus, ideo deueniendum est ad exercitatio-
nem septimæ rationis siue modi sistendi sanguinis, quæ perficitur per vinculum seu deli-
gationem vasīs, à quo sanguis emanat, & hoc p. ipse cōuenit in arteriis ipsis præcis & dis-
sectis: deueniamus itaq; ad modū ligandi. Actio hæc inquam difficilis est, neq; ab omnibus
opportune fit, quoniam hanc nisi optimi anatomici perficere non possunt, cum oporteat
vt minister talis actionis sciat situm vasīs deligādi, vnde opus est, vt qui talem vult perficere
exercere actionem, anatomem optime calleat, quoniā non vnum tantū scire debet, sed plu-
ra in hac actione necessaria, q̄ per solam anatomem appræhendī possunt: nam non tantum
situm vasīs cognoscere debet, sed etiam an nervus coniunctus sit cum ipsa arteria nec neq;
præterea quomodo sit vulnerata arteria, & an simul cum arteria vulneratus sit etiā nervus:
Natura enim sic ordinavit ac coniūxit nervos cum arteriis ipsis tanquā corpora frigida vt
foucantur à calore arteriarū. Et ideo aduertendū est in hac deligatione ne casu chirurgus
imponens hamū liget vtrumq; corpus simul, nā si ligetur nervus, statim pars priuatur sensu
ac motu ac stupor sequitur mēbris: oportet itaq; si nervus sit coniūctus, vt antequā fiat talis
deligatio, nervus ab arteria separetur & id vnguibus, q̄ facile fit, & deinde arteriā delige-
mus, p quo perficiendo Gal. iubet, vt quoq; denudemus arteriā ipsam à membrana, q̄ ve-
statur arteria ipsa, & ratio est, quoniā ligata ipsa membrana excitabitur dolor: ego aut nū-
quā denudavi, quia non datur occasio, sed absq; denudatione hoc feci dū modo sequētra-
uerim nervū ipsū, quoniā licet dolor ad sit, ad est tamē satis exiguus, tolerabilis ac brevis,
quare solliciti eritis tantū de ipso nervo, vt separetur. Aliud præterea notandū est & obseruan-
dū in deligatione, vt si deligates moderate & nō arcte stringamus, quoniā si arcte liget, pi-
culū esset ne secaretur vas ipsū antequam carne obduceretur, & sic noua fieret sanguinis
fluxio. Materia autē qua deligare volumus vas ipsū eligēda est, quæ pō sit apta putredini.
Sic itaq; solum sericinū inortorum ac duplicatum. Sed perquiret aliquis an semper deue-
niendum sit ad deligationem, cum per deligationem sicceetur vas & impediatur alimentū,

ne ulterius per vas ipsum deferri ac transire possit ad membrum ipsum, si vena sit, quæ ligatur: si vero arteria, impeditur transitus spiritus vitalis: vnde videtur non conuenire: Ad hoc autem ego respondeo & dico esse faciliorem rationem in deligatione ac sectione venarum, quoniam licet secetur vena magna vel ligetur, vt in exemplo poplitis patet, attamen membrum ipsum nutriri potest à venis ipsis intercutaneis, quæ ab eadem vena magna ab inguine seu multos ramos distribuuntur. De arteria autem ego expertus sum in arteria poplitis, quæ sola ransum est: hoc tamen dico mihi semel euenisse: habui enim infirmum quandam mechanicum cum huiusmodi vulnere poplitis, in quo (vulnere) oportebat me deligare ipsam, quoniam si secus fecissem, ille procul dubio periisset, deligavi ergo & secta est illa arteria, tamen post spatium anni vnus persensit pulsus in arteria in ipso malleolo: qua ratione autem hoc fiat, ego puto quod spatio temporis vulnere iam ipso consolidato concurrunt ipsa orificia arteriæ & coniunguntur iterum, aliam autem rationem fateor me nescire. Hoc etiam potest fieri, quod iterum refarciatur arteria per callum carneum, qui quidem fungitur officio arteriarum, & ideo non timeatis vsum laqueorum: imposito vero vinculo imponatur quodque medicamentum sarcoticum. Et notandum est, quod vinculum non est violenter tractandum, vel cum violentia extrahendum, quoniam successu ipse cadet, carne quoque orificia ipsa vas obducetur.

Sed quoniam quandoque non datur occasio ligandi vas, ita vt semper ligamento uti possimus, quare tunc vasa ipsa per transfuersum secanda sunt: nam hæc est natura vasorum propria, vt si secetur, recurrant orificia ad suum principium atque carne occultantur, ita vt facilius glutinentur, vt etiam superius dictum est. secatur autem instrumento aliquo, vbi est vulnus, vt hamo secante, & hanc sectionem docet Galenus lib. 7. meth. hoc modo, vt scilicet prius eleuemus vas ipsum & tunc imponamus hamum, & postea secetur. Facta sectione deinde circumuoluatur vas retorquendo hamum ipsum aliquantisper, vt stringatur, quoniam tunc optime recurrent orificia vasorum. Si autem sit vulnus profundum ita quod nos nec sectione nec deligatione neque aliis præfidiis sanguinem suppressere valeamus, tunc ad vitionem solemus deuenire, quoniam per hanc inducta crusta sistitur sanguis: sed hoc raro, imo rarissime facimus, ac etiam moneo vas, vt quantum possibile sit, ab vitione caueatis, quoniam talis actio & dolorosa nimis est & per eam maxima cum difficultate sine allequimur incerta enim est cura, quoniam si casu aliquo cadat ipsa crusta, iterum fit profusum sanguinis, sed cum facere aliud non possumus, neque alia remedia iuuant, vt in casu aliquo desperato accidit, tunc omnia tentanda sunt.

Si ergo deuenit necessum sit ad vitionem, hæc erunt obseruanda: primum vitiatio per ferrum ignitum fiat, sed aduertendum est, quantum fieri potest, ne exuramus sanguinem coniectum in ipsum vulnus, sed illum prius expurgare oportet vino austero vel posca: quoniam si vratus sanguis illud, tunc ex hac vitione fiet, aut vt sanguis ille ita incalescat vt partes etiam vicinas coquat ac vrat & vulnus ipsum, aut aliquis grumus exuretur sic, vt vertatur in carbonem, vnde pars hæc sanguinis crassior reddita eluatur vas ipsum & videatur sanguinem sistere: sed sciatis postea non esse inductam crustam, & ideo ipso eliquato vel in pus conuerso iterum fiet noua sanguinis fluxio, quare sitis in hoc non parum cauti. Secundum præceptum seruandum est, ne in vitione nimis vratur, sed tantum teneris rugationem ipsius vasorum sine corrugationem per primam vel secundam impositionem ferri igniti. prima enim vitione applicato ferramento ignito corrumpitur arteria, vt patet in membranis ac facile videri potest. Secunda autem vitione magis corrumpitur. Quod si addatur tertia vitiatio, exuritur penitus vas, vnde facilius postea cadit subiecta pars ac elichara ipsa, & sic fit rursus noua fluxio. Tertium præceptum notandum est, quod non semper ferro ignito vtendum est, sed quædamque medicamenta caustica id fieri solet: vnde nostri medici ac multi chirurgi statim imponunt caliginem sive fuliginem, quod quidem medicamentum furis bonum est: ex hoc, nam inducitur crusta & sanguis supprimitur. Sed notandum est, quod in partibus apparentibus ac quod oculis subiciuntur, vt in facie, vbi vitiatio medicamenti non placet, neque est commodum, quoniam semper relinquitur vestigium fuliginis ipsi denigrat acturpe & turpe reddens faciem, imo nec vnquam remoueri potest. Alii autem imponunt alumen, chalcanthum, myrsin, vel vruntur Aegyptiaco mixto cum chalcantho. Alii faciunt hoc cum aqua illa, quæ dicitur de pauir: alii oleo vitrioli, alii oleo sulphuris. Ceteri vruntur trochiscis de minio Ioan. de Vigo: sed sciatis esse pessimum medicamentum, quoniam excitant magnum dolorem, qui etiam augetur per spatium viginti horarum. Ego itaque in profundis vulneribus hoc facio: primo conspicio latitudinem vulneris, deinde accipio cannulam arundinis, quæ sit similis & eiusdem latitudinis cum vulnere ipso: postea accipio chalcanthum robustissimum, vt est illud, quod Vngarici dicuntur, & hoc ad ignem liquefacio, deinde accipio fistulam illam arundinis, & in altero eius capite siue foramine impono cottonem & obduro, ex altero vero foramine expleo fistulam chalcantho eliquato, & sic permitto vt refrigeretur, postea derado

vel collimo partem substantiæ illius fistulæ siue arundinis ita vt chalcantum appareat extra fistulam, ab vno scilicet capite abbreviando fistulam, ita vt aliquantulum chalcantum ipsum sit refrigeratum excedat ipsam, deinde impono siue inicio ipsam fistulâ in fistulâ cû chalcantio in vulnus profundum super vas per aliquod temporis spatium comprimens, moderate tamen, quoniam chalcantum illud, quod excedit fistulam, colligatur ab humiditate, & sic inducit crustam, quæ longissimo tempore super vas ipsam perdurat, fistula autem illa potest teneri super vas per horam saltem, vt bene firmetur sanguis.

Sed quoniam quandoque non satis est agere circa locum affectum, sed opus est, vt firmetur per retractionem, quod fit per venæ sectionem in parte opposita, vt & alijs possumus vt reuulsionibus, vt cucurbitulis vel deligationibus, aut ablutione loci sani oppositi cum aliqua lotionē calida, vt locus in ea fectus sanguinem attrahat, & sic fluxio firmetur, vel quandoque detractionibus vtendum est, quæ tamen paruum quandoque afferunt commodum: vnde his omnibus non iuuantibus aliqui Empyrici deueniunt ad loci affecti refrigerationem aut alieuius particulæ ipsius corporis vsq; ad animi quandoq; deliquiū, prius tamen deuenientes ad refrigerationem ipsius particulæ. Si ergo loci affecti refrigeratio fieri debet, fiat hoc modo: perfundatur locus ipse plurima aqua frigida vel posca & petæ quoq; intingantur & imbuantur ipsa aqua frigida & loco applicentur, vel circumuoluantur ceruix linteolis imbutis vel aqua, vel posca, vel succis refrigerantibus. Si autem velint refrigerare aliquam particulā corporis certam & determinatā, refrigerant testiculos ipsos hoc modo, imponunt testiculos patientis in catinum aceto plenum donec frigidi fiant ac intus hoc enim multū facit, imò sepius hoc facto sanguis sistitur, & præcipue in profluuiariorum hoc felicissime succedit, vnde ego refrigerationē sum in opere laudo. Cum autem nec prima nec secunda refrigeratio succedit, tunc totū corpus refrigerant, vt in exēplo, sūt vulnus colli cū sectione arteriarū vel venarum, & illi empyrici velint sanguinē per refrigerationem sistere, tunc implent aliquod vas aqua frigida, & submergunt corpus infirmi totum vsq; ad partem vulnēratam, (vulnus enim ipsum submergere solūt), & linunt ægrum manere in illa aqua vsq; ad animi defectum, vulnere tamen permanente, vt dixi, inactō ad perfusionē, quoniā tūc sanguis firmatur, & postea infirmū per auxilia à syncope seu animi deliquio subleuant. Sed quoniā dolor & intēperies calida vt plurimū sunt in causa fluxionis, ideo cum adierit dolor in vulnere simulcum fluxu sanguinis, alijs non conferentib; tunc ad opiata deueniendū erit stupeficientia, quæ scilicet stupefactionē inducant; licenim & dolor sedatur, & fluxus sanguinis cohibetur. Firmatio sanguinis curatur vulnus, vt dictū est in curatione vulnēris simplicis, & hæc satis firm, quo ad incisionem vasotum.

De Vulneribus spinalis medullæ. CAP. XI.

Vulneratur collum aliquando, & cum tali vulnere scinditur etiam spinalis medulla, & hoc fieri potest duobus modis; aut enim in vna tantum parte vulneratur, vt si punctum aut cecum excindatur, aut ex toto pertransuerfum scinditur. Si ergo hoc pacto fuerit vulnus, vt pertransuerfum secetur, lethalis est casus, vnde nō suscipiatis eius curationē spē de diu futuri iuuamenti, quoniam necessario sequitur resolutio partium earum omnium, quae infra vulnus existūt, quare tunc indige mus tantū prognostico, & solo ipso, p̄gnostico sunt relin- quendi, quamuis tamen fieri potest aliquando, vt huiusmodi vulnerati superuiuant vsq; ad quartam vel etiam septimā diem ad summū, neque hanc pertranseunt quin moriantur tunc autē temporis, interim scilicet si deueniat eiusmodi infirmus, poni poterit quodcumq; & qualecumq; medicamentū vel oleum, quoniam nihil refert, tunc enim pro satisfactione a- stantiū ac ipsius ægri tantum modetur, & non quāuis sit aliqua salutis.

Si autem in altero tantum latere sit vulnus ipsum, ut si tñtum pungatur medulla ipsa, vulnus sanari potest, ac aliquando liberatur homo, quamvis hoc rarissime succedat, & ratio est, quoniam cum medulla spinæ sapiat naturam cerebri, non est mirum, si difficillima sine quinimo sunt difficiliora vulnera huius medullæ, q̃ vulnera cerebri ipsius, quoniam i-
sta vulnera non ita facile ac cōmmodè curari possunt, ut si essent in cerebro, quoniā in ca-
pite possumus dilatare vulnus ac terebrare, & inibi contentam saniem erodētē evacua-
re: in cervicis autē vulnere id fieri non potest, tamen ob id non sunt derelinquendi ægri, sed
curandi sunt isti hoc modo, primo scilicet o præfagio de morte certa accita.

Euepit etiam quandoq; huiusmodi vulnus cum sectione in vna tantum parte membranae succulentis modullâ ipsam, cuius signum hoc erit, resolutio partium eiusdê lateris vulnerati, si autem per transversum sit vulnerata ac secta, omnium partiû sequitur resolutio. In huiusmodi autem casu recedentes omnes sanguine colubito ducuntur ad medicamenta calida & sicca, quæ etiam sint tenuium partium, vt facile penetrent etiam in oculum.

136

ris vulneribus; ob id enim vtiuntur talibus, quæ sunt tenuissimæ & ciliquidissimæ substantiæ ratione patris, quoniam habemus occulta vulnera, in quibus minima pars collecta potest efficiere inflammationem, vtiuntur ergo oleo terebinthinæ stillatitio. Vtuntur quoque multi chiturgico oleo hypericonis stillatitio, item oleo lumbricorum stillatitio. Elixir etiã istorum empyreicorum conuenit, ac olea multa sunt apud varios auctores ex multis ac variis simplicibus & aromatis composita. Inter omnes autem chiturgicos Ioannes de Vigo de his vulneribus optimè tractans dicit, q. vulnera ipsius medullæ eodẽ modo tractanda sunt, sicuti vulnera cerebri, quare semper Medicus debet eadẽ ratione curare & ista vulnera & ista cerebri. At cũ geminã sit via curandorum capitis vulnerum, vt diximus, quando de his agebamus, altera q. sit per medicamenta lententia ac molliencia, altera autẽ quæ sit per exciccatia. Ego semper lenienti medicamento vtor his vt ol. ros. omph. vel ol. ros. complet. vel stillatic. vel misc. eo oleũ omphacinu cum succo rosarũ nisi penetratiũ satis videatur, & facio destillare oleũ per alẽbicum. habet enim hoc vim penetrandi, robora diu ac leniendi. Si aut adit inflammatio, continuo vulnus ablucere solent cũ lacte muliebri, sed quoniã partium etiam adiacentiu ratio est habenda, cumq. omnia loca nervosa foueri debet, ideo ego in tali casu totã spinã in iugo aliquo oleo calefaciente, & non solũ spinam sed et scapulas & alas & inguina, in quoru etiam caritate sunt nervi insignes, hoc bis vel ter in die facies, oleum autẽ quo ego vtor, sit hoc modo: 2. ol. mastichini, chamamelini, ping. gallin. an. 3. ss. ol. lil. alborũ 3j. vel è conuerso ol. lil. 3. ss. aliorum v. an. 3j. misc. & in iunge. sed quoniã mihi magis familiare est emplastrũ illud Hippocratis quod constat ex farina hordei, ol. ros. & posca, ideo ipsum vobis propono imponendũ super vulnus maturina hora ac vespertina etiam renouandũ, inest enim in eo maxima vis in prohibenda inflammatione. Verum aliquãdo solent vulnerari nervi sexti partis nervorum cerebri, q. per colũ tranuntantur ad interiora thoracis, sed quia eadẽ est curatio cum aliis nervorum vulneribus, ideo de his suo proprio loco inferius agemus, dum sc. de curatione vulnerum nervorum tractabimus. & hæc de vulneribus colli satis sint.

De Vvnerum thoracis cognitione, & potissimum de signis vvnerum penetrantium. CAP. XII.

Deueniẽtes modo ad vulnera thoracis, in quibus maxima est opus anatomes cognitio-
 30 **D**ue, & potissimum quia non est commodum vt anatomen explicem, cum vos ex vobis metipsis in memoriã partes in ipso contentas reuocare poteritis. Thorax enim est contentus ex nervis, costis, membranis, musculis ac cartilaginibus, addamus etiã partes contentas, arteria magnam sc. venam caviã capsulã cordis, cor, pulmones & diaphragma, q. partes omnes in vulneribus thoracis lædi ac vulnerari possunt.

Necesse est ergo vt Medicus distinguat, quoniã si aliqua harum pars vulnerata sit, fieri non potest, quin & alia aliqua vulneretur, & vna vulnerata, necessum est & alias aliqua vulnerari. Sunt itaq. huiusmodi vulnera ex Gal. lib. 7. meth. c. 9. duoru generum, quedam enim sunt penetrantia, quæ quidem curatu difficillima sunt ac etiam periculosa & vt plurimũ lethalia; quedã non penetrantia, vt quando tantũ vulnerantur muscoli aut costæ, quæ
 40 etiã difficilia sunt ppter mortũ thoracis alidũ, sed primo agam⁹ nos de his nõ penetrantib.

Si itaq. vulnus thoracis sit non penetrans, tractandũ est ea ratione, qua tractantur omnia vulnera simplicia. Si autem costa detecta sit, debemus eam abradere vsq. ad medullũ, siue vsq. ad succum sanguineũ, deinde vulnus vt simplex consolidare. Si vero fracta sit costa, debemus eam in suum locũ restituere & curare eo modo, quo fracturæ curantur, vt sc. primo optime detergatur, qua detergẽ deinde vulnus consuetur, postea imponendum est medicamentum agglutinatorium siue sarcoticũ, q. est barbarũ ipsum, sed ego quandoque non solũ barbaro vtor sed alio aliquo emplastro, vt quãdo accidit, q. vulnera ipsa intorta sint, dũ modo munda sint, consuo, & arte ligo & contriue affundo vinum austerũ: aliquid autem etiam vtor emplastro ex rad. consol. maior. hoc modo confecto: 2. rad. consol. maioris, contũduntur & coquũtur in vino austero, deinde illi admisceatur vel oxymel vel mel putũ & formetur emplastrũ quod superponatur vulneri, quoniam satis feliciter succedit.

Si autẽ vulnus penetrans sit, nullũ tamen ex contentis lædat, periculosum quidẽ est, nõ tamẽ lethale. At si vulneretur cor, vel iecur, aut vena cava vel arteria magna, siue alia pars contenta, ista sunt vulnera lethalia & necessario. at si pulmo vulneretur, tale vulnus non est necessario lethale, sed vt plurimũ. Cognoscimus autẽ vulnus penetrans varis rationibus & primo à causã extrinseca, vt ab instrumento ipso feriente, vt si fiat vulnus cum punctione vel alia repungente, & ideo latum sit ipsum vulnus in exteriori parte, signũ erit, quod penetrat, maxime autem si fiat à repungente: sed signũ hoc non est sempiternæ veritatis, & hoc ratione instrumenti, quia aliquando et instrumenta lata sunt in apice, & ideo interrogandus est

One calida emittantur.

Si adit inflammatio.

Si vulneretur nervus colli.

Partes constituentes thoracem.

Vulneris penetrantis prognostica.

Non penetrantis curatio.

Empl. ex rad. consol. maioris.

Prognosticum in vultu penetrante cum lesione contentorũ. Signũ vultus penetrantis.

eger à quo instrumento vulneratus fuerit. Secundum signum colligimus ab imposito specillo, dummodo tamen vulnus intortum non sit vel musculi non sint inflammati, ita ut non possimus stylo reuulsiare: quare oportet maximam habere patientiam, ac diligenter perquirere & deuenire ad alia signa, & notandum est, quod dixi, vulnus latum in parte exteriori esse signum penetrationis. Sed sæpe fit vulnus à sagittis atque à pugionibus illis stylis dictis, & tunc non adest latitudo in exteriori parte ipsius vulneris, tamen ut plurimum talia vulnera sunt penetrantia & ex hoc fit. Tertia ratio cognoscendi vulnera quæ penetrant, est coniectura ipsa, quare latitudo superficialis non est semper verum signum & infallibile penetrationis ipsius vulneris. Quarta ratio signorum habetur ex difficultate respirationis, nam aliquando si tangantur partes circumpositæ, videntur ac apparent vesicæ quædam sub manibus tangentibus, & videntur vesicæ illæ frangi. Ex quo colligitur quod talia vulnera penetrant, ratio autem huius rei est, quoniam musculi sæpe interponuntur ita ut status non possint egredi sed retinentur & ex his causantur vesicæ illæ, unde postea ab ipsis fit difficilis respiratio & aliquando ita musculi interponuntur & claudunt, ut neque etiam specillo siue stylo vulnus penetrare possimus. Quinto cognoscitur vulnus penetrans ex ingrediente & egrediente aere cum adest maxime respirandi difficultas: hoc autem cognoscimus opposito lumine ad os ipsius vulneris vel appposito bombyce super vulnus. Sed sciendum est, quod vulnere hæc thoracis maxime Medicum decipere possunt, quoniam aliquando etiam non adsunt ista signa, tamen vulnus penetrat, & ideo Medicus oculatus sit ac omnia tentet & perquirat in tali vulnere inuestigando, ne decipiat. Si autem penetraret vulnus thoracis & lædat partes contentas, Gal. lib. 5. meth. cap. 9, & sect. 6. aph. 18, & etiam Celsus lib. 5. ac plurimis aliis in locis testantur, quod vulnera thoracis penetrantia ut plurimum sunt lethalia, quare prognosticis in hac parte maxime indigemus. Sed cum hæcenus posita sint signa vulneris penetrantis, videamus modo, quibus signis possimus cognoscere vulnera cor ipsius lædentia. Signa ergo cordis vulnerati sunt hæc: Primo si vulnus sit in ventriculo dextro cordis, sanguis effluit niger cum magna vehementia: Si autem vulneretur sinister ventriculus, effluit copia sanguinis vehementer rubri: Secundo habemus syncope: frequenter enim animo concidunt: tertio habemus sudores frigidissimos ac etiam frigoris partium omnium corporis: quarto adest casus ipsius pulsus, ac postremo mors repentina fit. Sed non est necessarium, quod solliciti valde simus in huiusmodi vulneribus, quoniam talis est præstantia ipsius visceris, (cordis scilicet) ut omnes, qui sic vulnerati sunt, repente vel cito insimul cum sanguine animam effundant, & ideo in his non indigemus signis. Signa enim requiruntur pro curatione morborum signatorum, at hæc vulnera curatione non indigent, quoniam non curantur, & mors succedit ante curationis initium, ideo signorum tractatio est superflua.

Signa vul-
nerati cor-
dis.

Signa vul-
nerati cor-
dis.

Signa vero pulmonis vulnerati ut plurimum habemus ab exeunte sanguine, quia sanguis egrediens aliquando ruber est, aliquando vero niger, semper tamen sanguis talis egrediens spumosus est, niger vero quandoque, quoniam ibi adsunt vasa talem sanguinem continentia. Secundo cruciatur æger perpetua tussi cum eiectione sanguinis ac respiracionis difficultate. Tertio solet taliter vulneratus inequaliter intalescere ac refrigerari, & præcipue eius facies. Quarto adsunt etiam dolores, sed ut plurimum potius grauantes. Sed notandum ac animaduertendum est maxime, quod aliquando in his vulneribus decipiamur, quoniam quandoque vulnerantur pulmões, & tamen hæc signa non adsunt neque apparent, exceptis sputaminibus sanguineis: unde quoties præ manibus habebitis talia vulnera recurratis statim ad sputamina, quæ sanguinolenta perpetuo apparent.

Signa vul-
nerati dia-
phragma.

Si autem diaphragma vulneratum sit, primo cognoscitur, quia adest difficultas anhelitus, secundo adsunt dolores magni ac purificationes continuæ in hypochondriis, aliquando etiam adest grauitas: præterea habemus tunc tussim insignem ac resonantem, præterea alienationem mentis, & ideo etiam à Graecis dicitur & hoc ratione maximi consensus, quem habet cum cerebro ipso, insuper febris adest ac maxima difficultas, ingerendi cibaria ac postremo cadit appetitus ipse. Si autem vulneretur vena cava vel arteria magna, ista vulnera cognoscemus ratione materiæ egredientis, exit enim tunc maxima sanguinis copia, sanguinis autem nigri, si vena cava vulneretur, rubei vero, si arteria. Adest præterea grauitas ratione sanguinis extrahentis contenti in thorace ipso. Et si casu sanguis hic putrescat in thorace, hoc cognoscitur per sputamina, quæ sunt putrida ac fixida. Si vero sanguis coneretur in ipso thorace copiosus collectus sit, cognoscitur primo ex vulnere ipso, secundo ex eius situ ac latitudine: quoniam si sit tam latum vulnus, ut vtramque costam oppositam tangat, tunc coniectura assequimur incisæ esse venas atque arterias, & per consequens adesse sanguinis collectionem, quæ etiam totum thoracem replebit: fieri enim non potest in

Arteria vul-
nerata mai-
or.

Sanguis
putrescit
in thorace.

eiusmodi vulnere, vt nō fecetur aliqua vena vel arteria intra costas contenta & ex illa sanguis profluens totum thoracem non impleat. Secundum signum contenti sanguinis in thorace est hoc, quando scilicet si statim aduocari simus, videamus vulnus penetrans, & volumus tunc educere aliquam partem sanguinis ibi contenti, & ideo tunc dilatamus vulnus, quo facto nihil sanguinis egrediatur, sed cū peruenerit ad orificium ipsius vulneris, videamus ibi multas ampullas fieri, certum signum hoc erit sanguinis contenti, qui propter attractum aerem à pulmonibus ampullas illas procreat, quæ deinde non sinunt reliquum sanguinis egredi. Tertium signum sanguinis collecti in thorace est, quādo æger sentit grauitatem aliquam in thorace perferentiq; dolorem grauiatum.

De Curatione vulnerum thoracis quorūcūque, & præcipue de euacuatione sanguinis collecti & grumosi contenti in thorace.

CAP. XIII.

Si vulneretur thorax absq; q̄ vulneretur ac lædatur aliquod membrum contentorū in ipso, quod plerunq; accidit, præcipue si vulnus sit in sinistra parte thoracis, in qua pulmones nō sunt colligati membranæ succingenti costas, cuius oppositū est in dextra, quoniam in ipsa sunt colligati ipsi membranæ, sed vel sit in dextra vel in sinistra, dummodo contenta in ipso thorace illa scā cognoscantur & sint, varia est secta chirurgorum in his vulneribus curandis. Quidam .n. volunt, vt statim consueatur vulnus, deinde medicamentis agglutinantibus sanetur. & ratio est, quoniam, dicunt isti, seruato vulnere aperto, refrigerabitur pulmo, quo modo refrigerato multa incommoda sequentur, atq; curatio vulneris ipsius difficilis fiet & reddetur. Alii autem aperta seruari debere talia vulnera absq; consuetione & ratio ipsorum est, quoniam materia ibidem collecta, si consueatur vulnus & agglutinetur, putrescet, ac febres faciet, quæ postmodum homines iugulare possunt: Multi quoq; dicunt ipsi, ex eiusmodi curatione sunt empyematiq; quæ de causa oportebit postea secare thoracem in altera parte ad euacuandam materiam illam; nec obstat, dicunt isti, quod allegari alii, imminere pulmonum refrigerationem ob ambientem aerem, quoniam possunt artificio temperari ac calefieri prout videbitur. Guido autem noster diligentissimus utramq; sectam expertus eligit quoq; ex utraq; (secta) medium; aliquando enim huiusmodi vulnera consueat & agglutinare & aliquando non tunc autem consueundum vulnus ait, quādo certū sumus sanguinem non esse collectum ac copiosum in cavitare thoracis esse concretum, vt habetur ex signis propofitis. Si itaq; paruum sit vulnus, ita vt ratione vulneris cognoscemus, non esse sanguinem ingressum in thoracem, præterea nulla sit grauitas, nullumq; pondus perferentiatur ab ægro, neq; sanguis regurgitet spumofus ad os vulneris, nec vllum signum aderit quod arguere possit sanguinem esse contentum in thorace concretum, tunc possumus consueare tuto atq; agglutinare. Ego autem dico non esse admodum sollicitandum de consuetione ipsa, quoniam ratio hæc anceps est plerunq;.

Bene verum est, quod, si cōsueatur, deueniendū sit ad agglutinantia & exiccantia medicamenta tam per interius quam per exterius applicanda; per interius quidem, vt est radix consolidæ maioris, quæ habet vim agglutinandi; per exterius vero vt est emplastrum barbarum, & ea etiam, de quibus inferius agemus.

Si autem vulnus non sit consueundum & adsit sanguis collectus atq; in grumum conuersus in ipso thorace hoc faciendum erit, primo obseruandum ac cōsiderandum an vulnus rectum sit vel obliquum, quamuis raro accidat, quod vulnera hæc non sint in tortu. Secundo considerandum est, an amplum vel angustum sit vulnus, quoniam si in tortum sit, sectione rectum fieri debet: si autem erit angustum, amplum etiam reddere debemus per facta sectionem.

Notandum est tamen, quod caute procedendum sit in sectione, ne venam vel arteriam secemus, quare semper ad inferiora facienda est sectio, quia in parte costæ superiori sunt dicta vasa, videlicet arteria & vena, & ideo ne ipsa vasa secemus, semper est facienda sectio super costam inferiorem, nam in parte inferiori costæ superioris collocata sunt dicta vasa. Facta sectione imponatur linamentum imbutum albo oui: linamentum autem sit crassum, vt ampliatur vulnus, ac magnum, vt sistatur sanguis; molle, ne dolorem exciet: sitq; breue, ne pulmones attingat; latum tamen, ne totum ingreditur in ipsum vulnus ne cadat in thoracem: vt itaq; tuti atq; cauti sitis, traiciatis linamenti caput filo, ne in thoracis cavitatem intret, si enim cadet, arripito filo extrahi poterit. Posito itaque albo oui inungatis thoracem cum ol. ros. quo facto supraponantur vulnere lintea madida vino austero, atque ol. ros. vt dolorem mitigemus ac inflammationem impediāmus.

*Medicamen-
ta eleganti-
ssima sangui-
nem concre-
tum.*

Secundo autem die tentanda est sanguinis eductio, & ideo opus est, ut infundamus liquorem aliquem in vulnus ipsum, qui grumos sanguinis concretos dissolvere valeat: in hoc autem casu Galenus infundebat melicratum vel aquā mulsam. Recentiores autem infundunt aquam hordei mulsam, vel aquam furfuris triticeæ mulsam; aliquando autem miscent oxymel ad quantitatem libræ j. Ego autem hoc vtor feliciter; recipio syr. myrtilini & mellis rosati æquas portiones & infundo ad ʒij. hoc enim medicamentum maiorum est virum, & quoq; infusum in hac pauca quantitate potest diutius detineri in thorace ipso, nam debet permanere vsq; ad alteram diem per spatium scil. 24. horarum, quia non facit gravitatem aliquam. Aqua autem mulsā non continetur tanto spatio, quoniam si tanto tempore sineceretur ibi, tussim excitaret nimiam. Aliquando etiam ego impono & misceo diamorōn cum melle rosato; hoc enim roborat & dissolvit & sanguinem sistit: Et hoc potissimum facio, quādo eredo pulmōnes vulneratos esse, ad ditis etiam iis, quæ consolident. Si verò infundimus aquas dictas, voluatur æger hinc inde, deinde tentetis, ut egrediatur aqua, quoniam quandoq; sanguis concretus egreditur etiam cum ipsa. Cum autem materia iam eliquata & dissoluta erit, educenda est.

*Quæ in medi-
sanguinis con-
cretum videri
potest.*

Materia autem eliquata variis modis educi potest, sed tribus potissimum. primo enim eius eductio tentari potest per decubitū, ut si æger supra latus vulneratū decumbat, si quæ vulnere inferioris eum reliquarum partium. Sed quoniam quandoq; pulmo super os vulnereis labitur, ita ut impediatur ne materia in thorace contenta egrediatur, ideo imponatis fistulam vel specillum in vulnus ipsum, ratione cuius attollantur & propellantur pulmōnes obtegentes vulnus ipsum: sed animā duerendum est, ne tale instrumentum pun-
gat, quoniam fieret novum vulnus.

*Quæ in medi-
sanguinis con-
cretum videri
potest.*

Secunda ratio educendæ materiæ est, quod æger tussiat, quoniam ex motu illo, qui fit per tussim, agitantur pulmōnes ipsi, ita ut materia facilius propellatur & euacuetur suo egrediatur.

*Præter in-
strumentum
descriptum.*

Tertia ratio educendæ illius materiæ proponitur à Galeno, qui iubet ut materiam hanc extrahamus per instrumentū illud q. pulcum vocatur, quale autem illud fuit apud antiquos, ego penitus ignoro: vidi tamen hoc nomine vocatum instrumentū apud empyricos quosdam, quod quidem erat huius figuræ, erat quasi pomum vel pila & nea excavata. in cuius cavitate possit contineri lib. j. liquoris: erant autem in hac pila duæ cannulæ, quarum altera erat longā ex vna parte, ex altera autem canbula brevior, & eius usus hic fuit: Imponebatur cannula longior in vulus thoracis, breviori vero applicabatur os, & suctione extrahebatur sanies contenta: quicquid autē extrahebatur, cadebat in pilam seu pomū. Sed huius instrumenti usus mihi videtur nimis sordidus atque periculosus, quoniam licet materia per suctionem siue anhelitum attracta cadat in pilam ipsam, scetor tamē ipsius materiæ attrahitur in os operantis & attrahentis, qui scetore postea potest sugentē phthisi inficere, quare instrumentum hoc ego non approbo.

*De Consolidatione vulneris. quos modis ea fieri possit, & per quæ, & qualia sunt talia medicamen-
ta cum simplicia tum composita.* CAP. XIV.

*Quos modis
consolidan-
tia applica-
ri possint.*

Facta euacuatione materiæ contentæ siue sanguinis grumosi ex ipso thorace, vulneris ratio habenda est, imponendo medicamenta consolidantia. Sed quoniam ista vulnera tripliciter possunt consolidari, vel scil. per medicamenta injecta in ipsum vulnus, vel per os exhibita, id est, per linctā: vel per exterius administrata & supposita, ideo tripliciter etiam huiusmodi consolidantia applicantur: vel enim iniiciuntur in cavitatem thoracis, vel linctū assumuntur ac deuorantur, vel exterius applicantur. Hæc autem consolidantia debent esse exiccantia atque adstringentia. Componuntur autem hæc medicamenta consolidantia ex duplici materiæ genere: alia enim componuntur ex plantis ac animalium partibus, alia ex metallicis. Sed aduertendum est, quod metallica hæc pessima sunt in huiusmodi thoracis vulneribus, quoniam si cadant in ventriculum, cum ipse illa digerere nō possit, sic necessatio in venenum conuertuntur: excipiuntur tamen ex his metallicis quatuor tantum, quorum primum est terra sigillata, secundum bolus armena, tertium rubrica sinopica, id est, bolus orientalis: quartum vero est lapis hæmatites. Aduertendum est tamen, quod hæc metallica sunt in pauca quantitate exhibenda, reliqua vero omnia metallica mala sunt: dixi autem illa quatuor etiam in pauca quantitate esse administranda, quoniam etiam hæc thoracem adstringunt & respirationem impediunt, reliqua vero mala omnia esse, quoniam hæc thorax perferre non potest, quare cauendum est ab his tam per linctum quam alio modo, vel scil. ad deuorandum vel quoquo modo vtendum: cauetis ergo

*Materia ex-
solidantium
quatuor plas-
ta.*

*Quibus con-
solidantia
possint in
thorace
vulnere
descripto.*

ergo ab omnibus metallicis exceptis illis quatuor modo, quò dixi: quare rutilius erit deuenire ad ea adstringentia & consolidantia; quæ ex plantis vel animalium partibus assumentur, quoniam hæc periculosa non sunt ac facile concoquantur, vnde magis opportuna sunt. Sunt autem hæc duorum generum: quædam scilicet simplicia & quædam composita. Simplicia sunt vitæ gummi Tragacanthæ, gummi Arabicum, hypocyttidis succus, balaustrorum, citrini, gallæ immaturæ, malicorium, rhus obfonsiorum, rosæ, acacia omnis, decoctum citoniorum, lentisci decoctum, terebinthini decoctum, ex myrtho omnia, ex rubo omnia & præcipue rubi decoctum factum in vino austero, cui decocto addatur manna thuris, aloë, rha ponticum, & illa quatuor metallicà dicta, videlicet terra sigillata, bolus armenus, rubrica synopia, & lapis hæmatites.

Ex recentioribus autem præstantissima sunt hæc, quibus & ego vtor, vt primo tormentilla vtraque & illa, cuius radix est rotunda, & illa etiam, quæ longam radicem habet, fenicula vtraque, mas scilicet & scemina, sed omnia superat præcipue mascula: tertio pilosella omnis, præcipue illa, quæ scripit: radices symphyti vel consolidæ maioris, pimpinella, garyophyllata: quæ optima est in hoc casu cum aliis medicamentis mixta: folia oliuarum tenera etiam sunt opportuna. Aliqui ex recentioribus addunt rhabbarum, quod quidem optimum est, atque mumiam, quæ maximam habet vim, & à me quoque maxime laudatur. & hæc sunt simplicia.

Composita autem remedia pro tali casu varia sunt, inter quæ à Gal. lib. 5. meth. duò proponuntur, primum diaspermation vocatum, alterum vero diacassia. Sed notandum habemus apud varios auctores varia inscripta medicamenta sub hoc nomine diaspermation, hoc est, de seminibus dicto: nam apud Paulum est quoddam emplastrum hoc nomine vocatum: apud Aetium etiam & reliquos, quæ differunt ab hoc descripto ab ipso Galieno. præterea est etiam apud eundem Gal. in lib. 2. de comp. med. secund. loc. emplastrum quoddam diaspermation vocatum, quod quidem maximam habet vim sistendi sanguinis, sed neque hoc quoniam in eo sunt multa ingredientia calida, quæ vim habent potius dilalandi vias & proinde aperiendi ac dilalandi orificia venarum. Apud Nicolaum Myrepsium ego inuenio medicamentum diaspermation vocatum in eius opere de antidotis pag. 108. quod conficitur ex melle & aqua pluuiali, quodque optimum est in hoc casu. habet. n. vim sistendi sanguinis, siccandi, astringendi atque agglutinandi: hoc ergo felici cum successu usus sum per sæpe. Illud vero, quod in eiusmodi casu propositum est a Gal. sub nomine diacassia, ignoratur ab omnibus; quamvis per hoc intelligat Auicennas, vt refert Guido, diapodion vel diatraganthum: Quid autem voluerit Galien. per diacassiam, ignoramus quidē omnes.

Cum ergo non possimus habere medicamenta in hoc casu proposita ab antiquis, nos deueniemus ad ea composita, quæ habemus in officinis parata: sunt autem hæc triplex: vt primo trocisci de spodio, qui preciosi sunt in vulnerib. thoracis habent. n. vim siccandi & glutinandi sine aliqua noxa: secundo habemus trociscos de terra sigillata: tertio trociscos de charabe, qui sunt medicamentum opiatum & optimum in sistendo sanguine ac sopiendo dolore. Cum ergo hæc maxime conueniant in diæis vulneribus, his itaque vtamini, quoniam optima sunt omnia. Cum autem nos eduxerimus sanguinem è thorace, opus erit vt consolidemus cum dictis, atque prohibeamus amplius sanguinem resudare è venis ipsis, pro quo consequendo nostri Medici solent exhibere per os rhabbarum tentantes talem consolidationem per exhibita per os, vel mumiam exhibent addendo etiam rubiam tinctorum: Sed sciatis hanc esse malam commixtionem, quoniam licet rubia tinctorum habeat vim resoluedi grumofum sanguinem, tamen aperit venarum orificia & incitat fluxum hæmorrhoidarum ac vteri: quare ego in prima visitatione exhibeo rhabbarum cum mumia in hanc formam:

℞ fl. cass. ʒi.

rhab. robustioris, id est, acerbioris ʒliij.

mumiæ ʒij.

pulu. hyssopi ʒi. misce, f. bolus.

Vel fiat in formam portionis hoc modo:

℞ pulu. rhab. ʒi.

mumiæ ʒij.

terr. sigill. vel boli orientalis ʒ. ss.

vinigranatorum

aq. buglossi an. q. s. misce. f. potio & exhibeatur: Ex his enim sub-

ductionem habemus alui ac vaforum roborationem & consolidationem. In cavitatē autem thoracis infundatur syrupus myrthinus, vel mel rosatum addita decoctione ex tormen-

Consolidanda simplicia

Consolidanda simplicia
Eiusdem generis
Eiusdem generis
Eiusdem generis

Diacassia

Composita
consolidanda
simplicia

Vel in prima visitatione exhibendum.

Potio.

Decoctum infundendum in cavitatē thoracis.

*Syrupus in-
fundendus.*

tilla, fanicula, garyophyllata, radice cōsol. maioris q. f. quę infundatur in vulnus, vel ego ad idem conficio syrupum ex sumach, manna rhoris, aloë, malicorio quę addito syr. myrrhino ac melle rosato & infundo. Possumus etiam capere illa quatuor metallica, vel potius aliquod ex his in pauca tamen quantitate dicto decocto addentes, & postea infundo in vulnus ipsum huius decocti ad quantitatem ʒij. Exterius autem expleri soleo vulnus linamento madido oleo abietino cum melle rosato vel cum ol. mastich. aliquando autem, ut citius carogeneretur, addo myrrham, thus & aloën. In exterioribus vero supra vulnus ac supra linamentum impono aliud linamentum ex petia lineā infectum siue imbutum ex oleo rosato & vino austero, vel etiam pono ceratum rosatum, deinde ligo cum pannis madidis vino austero & ol. ros. ut inflammationem impeditet. Transacto autem tempore inflammationis, si multa emanat sanies, solemus applicare exiccantia & consolidantia, ut esset emplastrum ex radicibus consolidę maioris, bolo orientali & melle, vel radices consolidę maioris cum albo oui & melle contusas simul, vel imponimus diapalma vel barbarū quandoq. Circa thoracem autem, si aderit dolor in respiratione, foueatur vino & ol. amygd. dul. vel mastichino: vel accipimus oleū viol. & ol. amygd. dule. addito vino & locum fouemus. Ego autem præterea quotidie syrupum exhibeo matutina hora confectum ex decocto betonicę, vel aqua fol. portul. vel etiam eius decoctū vel polygoni, aut radicibus consolidę maioris, his etiam addito syrupo myrrhino vel melle rosato q. f. Ante syrupum vero aliquando exhibeo pilulam vnam factam ex trociscis de spodio, ex terra sigillata æqualiter mixtis, pondus autem pilulę sit ʒij. Si vero adsit dolor, facio pilulam ex trociscis de charabe, quoniam magis facit ad doloris mitigationem. sed aduertendum est, quod vulnera hæc multoties ita protrahuntur in longum tempus, ut ex collectione materie & retentione succedat aliud peius, de quo infra.

De Curatione vulueris illius, in quo ex saniei collectione successit empyemia.

CAP. XV.

*Saniei ma-
gnitudo di-
plex.*

*Agenda in
empyemate.*

Quoniam autem rari sunt, qui vulnus thoracis alicuius momenti passi sint, qui demum non fiant empyematice propter collectam & retentam sanie in ipso thorace: quare in hoc casu, quando scilicet facti sunt empyematice, duo sunt obseruanda, quorum primum est, an possit euacuari materia per ipsum vulnus, atq; educi sanies collecta vel non, & si potest, laudo maxime, ut ea euacuetur per vulnus ipsum. Secundum obseruandum est, quod si potest euacuari per vulnus, oportet, ut nouum faciat vulnus per sectionem factam in inter sextam & septimam costam, ut exinde sanies educatur ac euacuatur. Euacuatio autem saniei dupliciter tentatur, vel scilicet quod perpetuo euacuatur per impositam cannulam, quę continuo feratur in vulnere factio denuo: secundo modo si non potest perpetuo euacuari, saltem id fiat ita ut istis temporibus, ut scilicet bis in die saltem, quod fiet per reuolutionem corporis patientis super ipsum vulnus: tertio oportet ut exicetur fortissime, quarto formamus fistulam ex aliquo metallo, & hanc imponimus in vulnus, ut per illam sanies egrediatur, & non decineatur in thorace: hæc enim sunt agenda in empyemate.

*Decoctum
exiccans sa-
niem ad ab-
luendum
vulnus.*

Pro exiccatione autem facienda debemus abluere quotidie vulnus aliquo decocto exiccandi vim habente & hoc modo confectum. ʒ rad. consol. ma. fol. pilioellæ, oliuari, agrimon. betonicę, sumach, rad. liquirit. ad placitum, & ex his fiat decoctum in vino potēti & abluatur thorax. Si vero adesset febris, fiat decoctio in vino non potēti & austero: possunt etiam decoqui in aqua chalybeata cum vino mixta, quod melius erit, & hæc cū melle ros. mixta infundo in vulnus bis saltem in die, sed rursus ex vulnere extrahop. reuolutionem corporis super os vulneris,

*Emplastrū
externū ap-
plicandum.
Medicamen-
tum reuolu-
tionem.*

In exterioribus autem imponuntur medicamenta vel emplastra facta ex radicibus consol. maior. addita tormentilla, agrimonio & melle ros. q. f. vel etiam impono emplastrum sacrum vel coehleas contusas cum baccis lauri addito melle. Sed si adsit febris, omittantur bæcæ lauri, loco quarum addantur radices consolidę maioris: nostri vero recentiores solent exhibere medicamentum secundum hanc formam. ʒ rad. garyophyll. sem. cannab. artemis. chamomill. rub. rin. & or. centaure. min. costia ad placitum, & in vino conficiunt decoctum. sed hoc medicamentū mihi non satisfacit, ideo eo non vtamini, quoniam habet aliqua ingredientia, quę vim habent aperiendi orificia venarum.

*Medicamen-
tum propriū*

Ego itaq; medicamentū efficio secundum hanc formam, quo vtor feliciter, ʒ rad. garyophyll. rad. filicis vtriusq; maris f. & scemina. sem. centaure. maior. sapontic. th. barb. exolei, coquantur in vino, deinde colentur & ad vsum seruentur. Cum vero hoc vti solimus, addimus mel rosatum vel syr. myrrhinum & exhibemus in mane pro syrupo. Verum

Verum quia multi sunt homines, qui sanari ex toto non possunt ab huiusmodi vulneribus, sed remanet fistula, non ob id dubitandum est, sed potius audacter fistulam aliquam ex aliquo metallo in ipsum vulnus immittendum & in eo gestandum, quoniam tunc salus infirmo est promittenda, sed in ipsa fistula ponatur ipsa cannula, ut per ipsam sanies sensim ac sensim egrediatur. Ego enim aliquos vidi sic vulneratos; quibus tales superuenere fistulae, & cum ipsis fistulis per spatium 30 & etiam 40 annorum superuixisse & absque aliqua lésione: vidi etiam quamplurimos, quibus post aliquot annos ipsa fistula per se fuit agglutinata & sic sanati sunt & nihil mali passi fuere: instituat igitur in his optimam victus rationem, de qua nunc non est, ut agamus, & hæc satis sunt dicta de vulneribus thoracis cum penetrantibus, tum extrinsecis.

*Signum
mors fistulae.*

De Vulneribus abdominis, de eorum differentiis, de signis quarumcumque partium contentarum vulneratarum, & de presagio in eis faciendis.

CAP. XVI.

Si quis recte voluerit omnia vulnera sanare, opus est, ut sit exercitatus in anatome ipsa, ra-
diene cuius optime cognoscat situm viscerum omnium internorum ac partes omnes
ab eo contentas; & hoc intelligo & dico etiam de quocunque vulnere cum thoracis ipsius,
nam etiam ipsius abdominis. At cum de thoracis vulneribus in superioribus iam tractaue-
rimus, transeundum est modo sic ordine postulante ad abdominis vulnera.

Per abdomen autem intelligimus ventrem inferiorem seu partem illam totam quæ
continet epas, lienem, ventriculum, mesenterium, venam cauam, intestina, renes & ve-
sicam.

*Quid per
abdomen his
intelligatur.*

Abdominis autem vulnera in duplici sunt differentia: ea enim distinguimus in vul-
nera simplicia ac non penetrantia, & in penetrantia atque composita: quoties enim vulne-
ratur abdomen, vulneratur aut vulnere simpliciter & non penetrante, aut penetrante & com-
posito hoc est, cum vulnere quoque & lésione particulæ alicuius contentæ, vel etiam hoc
modo distinguimus, vulnera abdominis vel simplicia sunt vel composita, & hæc composita
vel penetrantia sunt vel non penetrantia: penetrantia deinde vel sunt cum lésione inter-
norum viscerum vel absque lésione.

*Distinctio vul-
nerum abdo-
minis.*

Si ergo vulnus penetrabit, hoc sensu ipso cognoscetur, per impositionem videlicet spec-
illi, secundum egressionem intestini alicuius siue plurius aut Zircib; tertio cognoscimus
per instrumentum ipsum vulnerans, ut est hasta, lancea, gladius, pugio & similia. Fieri enim
non potest, quod vulneretur huiusmodi instrumenta non faciant vulnus profundum ac
penetrans. Quarto per latitudinem superficiæ ipsius vulneris: cum enim vulnus angustum
est, signum est, quod non penetret: dummodo tamen non sit factum ipsum vulnus ab angustio
instrumento. Si vero vulnus factum sit ab angustio instrumento, attamen latius sit, signum
est, quod penetret: sed signum hoc non est sempiternæ veritatis. Verum cum læditur parti-
cula aliqua contenta, non ita facile sensu cognosci potest: sunt enim huiusmodi vulnera an-
gusta & ita stricta, ut non possimus intrinsecus ibi ac inuestigare particulam læsam per im-
positionem specilli: transeamus ergo ad talia signa, quæ à coniecturis sumuntur.

*Signum vul-
neris pen-
etrantis.*

Et primo si vulnus penetrans erit in epate, hoc cognoscimus primo sumentes signum
à copia magna profluentis sanguinis, secundo à situ vulneris: si enim vulnus fuerit in hypo-
chondrio dextro procedens ad regionem hepatis, vulnus epatis indicabit, & potissimum si
simul adsit profluvium sanguinis: tertio à dolore satis insigni: Quarto si superuenierit tussicula
quædam, quæ quasi videtur secum trahere iugulum dextrum ad partem læsam, quo-
niam per consensum læduntur etiam viscera superiora, thoracis scilicet hæc omnia viderimus,
coniectura tunc certa assequemur vulneratum esse hepate.

*Signum vul-
neris hypo-
chondrii.*

Vulnus autem lienis cognoscitur primo ex situ loci, vti sit vulnus in sinistro hypo-
chondrio, secundo à sanguine exeunte, qui aliorum est sanguine hepatis: tertio à dolore exi-
stente in hypochondrio sinistro: Per hæc enim signa distinguemus vulnus lienis à vulne-
re hepatis. Vulnerantur etiam quandoque intestina ipsa, quæ tamen duorum sunt generum:
distinguntur enim in gracilia & crassa: opus ergo est, ut non tantum cognoscamus, si vul-
nerata sint intestina in genere, sed etiam scire oportet, si gracilia vel dura intestina vulnus
susceperint, ita ut non solum haberi debeat signa generalia intestinorum vulneratorum.

*Vulnera
lienis.*

Signa ergo generalia hæc sunt: primo enim generale signum vulneratorum inte-
stinorum erit suppressio stercoreis siue factum in sede, & egressio eiusdem per vulneris la-
bia: vel si non egreditur stercores, egreditur tamen chylus, vel saltem fætor aliquis sterco-
ris præcipue.

*Signum gene-
ralis vulne-
ris intesti-
norum.*

*Gracilium
intestini.*

Gracilium.

Renum.

*Utriculi
Ventriculi.*

*Omenti
Vulnere
signa
certa
habentur.
Mesenterii.*

*Præfagium
in quocumque
Vulnere
abdominis.*

*Præfagium
Vulnere
in
Mesenterio.*

*Si Vulnus
perit
ab
que
lesione
contingit.*

Verum vitrum sint crassa vel gracilia intestina vulnerata, hoc modo cognoscemus: primo scilicet situ vulneris: Si enim videmus vulnus circa umbilicum & ex eundem stercorea luida, vel chylus ac simul feces in sede supprimantur, signum erit vulneris gracilium intestinorum. Si autem vulnerentur crassa intestina, hoc etiam à situ cognoscemus: primum, si enim vulnus erit in imo ac inferiori ventre à lateribus præcipue abdominis in regione coli intestini, & stercorea exeunt vel fecor stercoreum ac simul fecum ipsarum suppletio adest, signum tunc erit vulnerati intestini crassioris.

Cum autem vulnerantur renes, hoc etiam cognoscimus ratione situs ac etiam ratione doloris ipsorum renum, qui satis molestus est ac gravis: præterea sequitur lotii suppressio vel immutatio coloris ipsius, si enim color eius (lotii) aut cruentus niger, aut cruentus rubens, & aliquando ita magna sunt illa vulnera, ut quandoque perveniant usque ad cavitatem ipsorum renum, quod cognoscemus ex maximo vulnere & ex dolore, & ex egressione lotii propter ipsum vulnus: vel si sanguis pallidus profuat ab ipso vulnere.

Vulneratur sæpe etiam vesica urinaria, & hoc vulnus cognoscetis ex suppressione lotii, præterea à situ vulneris, tertio ex lotii egressione per ipsum vulnus. Ventriculorum vero vulneratum cognoscimus primo ex nimio vomitu, secundo ex situ vulneris, tertio ex exante cibo, vel chylo, vel etiam potu per vulnus & similibus: præterea adest maximus dolor: quinto superuenire solent vertigines ac syncupe, ac capitis vertigines quidem insignes.

Omenti autem vulnerati nulla habentur certa signa vel notæ, ex quibus possumus certo assequi ipsum tantum vulneratum esse, quoniam neque adest dolor neque sanguinis perfusio, sed quoniam particula hæc vulnerata parum aut nullum affert periculum, ideo non multum erimus solliciti de signis, neque de prognostico istius vulneris.

Vulneratur etiam mesenterium, sed signa istius patris vulneratæ difficilime habentur, ego tamen ea, quæ haberi possunt, hic itradam. Si appareat sanguis egrediens copiosus & ipsius sanguinis nigricantis maximam copiam egredi, quamvis non ita nigri, ut in lienis vulneratibus. Succedit præterea & dolor intolerabilis, qui non talis est in liece. Signum tamen certissimum habemus mesenterii vulnerati, quando nervi circa cervicem videntur conuelli & contrahere iugulum ad partem læsam, cuius rei ratio est, quoniam per mesenterium disseminantur plurimæ nervorum propagines secundæ complicationis, qui oriuntur à sexto pari nervorum ac à medullâ spinali: unde læso mesenterio ista succedunt, quæ dicta sunt. Situs etiam ipsius vulneris in signum certum nos potest deducere.

Cognitis vulneribus præfagium faciendū est, quod quidem nō vnum sed diuersum est, quoniam in omni vulnere abdominis non penetrant ad cavitatem, si Medicus petitus sit ac diligens, certa spes salutis promitti potest. Si etiam vulnus sit penetrans sed sine læsione alicuius particulæ contentæ, excepto omento, quod vulneratum etiam sit, potest salutem prænunciare, difficilem tamen, sed sanari potest: nam scias, quod etiam sine omento homo viuere possit, Ego enim testis sum quod multis omenta extraxerim, qui tamen multo tempore superuixere: difficilis tamen præfagienda est curatio.

Vulnera raro partium internarum ac contentarum, ut hepatis, lienis, intestinorum, vesicæ, ventriculi, renum & mesenterii teste Hippocrate sect. 6. aphor. 8. difficilissima sunt, ac ut plurimum lethalia.

De Curatione vulnerum abdominis.

CAP. XVII.

SI vulnus abdominis erit simplex, adhibita diligentia consuat primum vulnus, postea supponatur barbarum, vel pulvis adstringens, quoniam sic consolidabitur & citissime, præsertim cum linamentis madidis in melicrato. Si etiam intestina sine vulnerata, habemus nonnulla exempla quod ista vulnera sanantur quamvis etiam non consuantur, & inter alia habeo ego exemplum cuiusdam rustici Parauini, qui per duos annos tulit vulnus in intestino, & post hoc elapsum tempus sumpsit potionem succi ruræ capraræ, siue castracabi vulgo dicti, & sanatum fuit vulnus. Si autem vulnus penetret in cavitatem absque tamen læsione inlutarum partium, deueniendum est ad consutionem & postea ad agglutinationem: facile enim agglutinabitur. Sed dicit aliquis, non videtur, quod ita cito consiendum sit vulnus, cum in huiusmodi vulneratibus rampantur venæ, ex quibus sanguis emanant potest in grumos concresecere ac remanere in cavitatem: nam si copia sanguinis fluit

adi-

ad ipsam vulnus, si inuenit os vulneris clausum & confutum, ca dir in cavitatem ipsam, unde si consuatur vulnus, non parebit iter exiendi, & ita sanguis putrescet, & incitabit alia mala symptomata.

Respondeo, quod eo in loco non sunt venæ admodum insignes, sed tantum in lateribus ipsis, quarum vulnerationem sequitur & arguit magna sanguinis effusio, sed & hoc concessio, quod si sanguis concretus in cavitare, non tamen debemus timere quâuis cadat in ipsam cavitatem, sed debemus consuere, quoniam quamuis sanguis cadat & corrumpatur ad intra cavitatem abdominis, non potest tamen corrumpere intestina ipsa, sed fluere ad inguina & ibi abscessum faciet, qui deinde facile sanatur, vel antequam corrumpatur totus ille sanguis, quamviscunq; fuerit, totus etiam emittetur per sedem: quare siue collectus sit sanguis, siue non, semper consuatis ipsam vulnus, ac renoretis agglutinationem; imo sciendum est, quod non solum possumus tentare agglutinationem sed confutionem in hoc casu, sed etiam quamuis aliquod instrumentum ingressum fuerit in cavitare a cibi remanente in, quale esset ferrum sagittæ, vel glans plumbea quâviscunq; sit, & etiam quâuis pungat instrumentum illud, ibi finatur ac relinquatur; excepto tamen hoc casu, si esset instrumentum & appareret circa labia vulneris & tunc posset apprehendi & extrahit si sit in profundo cavitatis, dimittatur, & vulnus consuatur & agglutinatur, quoniam per aliquod spatium temporis remanebit ibi & postea per se egreditur. Natura enim sagax semper expellit nocua ad opportuna loca, unde processu temporis aliquid excernet quicquid ibi continebatur huiusmodi, ut experientia pluries compertum est; hæc autem sunt obseruanda in vulneribus abdominis quando possumus consuere ac tentare agglutinationem: obseruandum tamen & hoc est, quod huiusmodi vulnera abdominis, licet ut plurimum facile sanentur, sunt tamen eorum aliqua quæ difficulter sanari possunt ex sententia Galli. 6. meth. c. 4. & sunt illa, quæ in parte anteriori in medio abdominis fiunt, & ratio est, quoniam locus ille carnosus non est, sed partes illæ nervosæ sunt, quod non est in lateribus ipsis, tamen neq; in his timere debemus, sed semper consuendum est & agglutinandum.

Difficilia etiam sunt vulnera illa in medio abdomine, quoniam eo in loco facile exit omentum & intestina, sed, ut dixi, consuenda sunt & agglutinanda huiusmodi vulnera, ac quoniam ratio consuendi apud autores diuersa existit, ideo in sequenti de confusione agam & de eius speciebus.

De Confusione vulnerum abdominis & curatione ac amputatione omenti excutitis
& refrigerati. CAP. XVIII.

Cum dixerim utrumq; vulnus abdominis esse consuendum, sciendum est ratione consuendorum huiusmodi vulnerum abdominis difficilem esse apud autores. Reperio enim ex Galeno, Albucasi, Theodorico atq; ex recentioribus septem esse species siue modos confusionis in his vulneribus, ut vobis inferius ostendam. Ego autem in his consuendis hæc obseruanda esse moneo. Primo obseruetur quâtitas partis ac accipienda: si enim parua quantitas præhendatur in confusione, secabitur à filo; si autem magna, irascitur dolor. Secundo obseruandum est, ut tantum puncta adinuicem distent per spatium minimi digiti, tertio obseruetur profunditas inhiromittendi acumen non nullum Medicorum nostrorum decipiuntur à pinguedine, & ipsam tantum consuere solent; ego autem moneo, ut profunde acus intromittatur ac totum abdomen consuatur; quoniam si sola pinguedo consuatur, superficies tantum vulneris ipsius consolidabitur, musculi autem nequaquam, & ita intestina prorumpent, ac succedet hernia intestinalis appellata, quod solet evenire in mulieribus, quæ sæpe fuerunt enixæ ac plures pepererunt. Quarto filum non sit nimis crassum nec nimis tenue: si enim erit nimis tenue, secabitur; si vero nimis crassum, non percurrerit foramen ab acu facta, in quibus retinetur. Quare eligatis vos pro confusione filum medicre & etiam æquale, ne per vices ex difficultate permeandi dolores exciet.

Notandum autem est, quod in huiusmodi vulneribus sutura non est quarta die scienda, sed maneat usque ad nonam & diutius etiam iuxta necessitatem, quoniam hæc vulnera non tam cito consolidantur. Quinto obseruandum est, ut non tentetur confusio in his vulneribus abdominis, nisi adsit etiam minister, qui partem confutam digitis arripiat, ac vulnus siue partem non confutam suis digitis comprimat, ne intestina exeat, & partem quæ confutam teneat apprehensam, ne dum in alio loco sutura siue punctum applicatur ac firmitur, id, quod iam confutum est, rumpatur; ac præterea digitis comprimat, ne intestina in simul subiacentia consuatur.

*Si omentum
egrediatur
ex vulnere
illudum.*

Vulnerato abdomine vel perforato absque lisione internarum partium, quomodo sit tractandum per consuetudinem dixi. At quia sæpius tali existente vulnere omentum etiam egredi solet vel intestinum aliquod, ideo cum egredietur omentum, egredietur vel laceratum vel illæsum: Illæsum voco omentum, quando est egredietur è vulnere, tamen nondum refrigeratum nec denigratum siue corruptum, sed potius suum naturalem retinet calorem atque colorem: tunc autem si illæsum sit, ipsum intromittere debemus ac in cavitatem suæ locum suum reponere ac restituere, deinde vulnus consuere, ac si esset simplicissimum vulnus.

*Si refrigeratum si uel
tunc est
corruptum.*

At raro accidit quin aliquid patiatur omentum ex vulnere egressum. Sæpe enim refrigeratur. Si itaque sit refrigeratum, aduertendū est quod tunc aut putrescit ac incipit corrumpi, aut denigratur & iam corruptum est: si incipit putrescere, cognoscitur ex pallore ipsius, nam cum pallescere tantum incipit, signum erit ipsum etiam incipere putridum fieri, tunc nos ipsum fouebimus spongiis imbutis vino dulci potius, nigro vel albo vel cum decocto chamomillæ, seu aqua, in qua scilicet decocta sit chamomilla, vel etiā vino chamomillæ ipsi addamus incoctā. Facta fomentatione obseruandum est, si recipit omentum colorem proprium ac naturalem & viuum ita ut incalcescat, quoniam si tale fiat, intromittendū est. Si autem frigidum adhuc sit omentum ac adhuc in eo remaneat color liuidus, tunc ipsum amputare debemus: ratio autem secunda & amputandi omenti apud recentiores hæc est, ut accipiat omenti pars corrupta & deligetur filo circa partem sanam, ut ipsi soliti sunt; postea in regione vinculi secetur, & deinde exiunt, intromittentes deinde sanum omentum relictum: sed ratio hæc mihi non placet, quoniam nos potius debemus de parte sana etiam aliquid ligare & amputare, ne si parum aliquid corrupti relinquatur, id postea sit in causa corruptionis reliqui omenti. Ego itaque hac ratione feci: accipio totam partem illam denigratam & ligo illam cum aliqua etiam portiuncula partis sanæ, postea forcipe feci usque ad viuum etiam, ac deinde omiſsa lisione, intus immitto omentum ipsum, vel etiam possumus consuendo ligare & separare deinde partem corruptam à sana: quare laudo quod colligando consuamus, deinde forcipe vel nouacula secemus.

Modum pro-

grium. Sed aduertendum est, quod in deligatione sinere debemus caudam filii extra abdomen permanere, ut cōsolidaro omento viuulum extrahere possimus, quamuis & natura ipsa hoc cōsummare possit, id tamen cum difficultate aliqua ac grauitate facit, quo facto vulnus curetur ut simplex.

Notandum

est aduertendum est, quod in deligatione sinere debemus caudam filii extra abdomen permanere, ut cōsolidaro omento viuulum extrahere possimus, quamuis & natura ipsa hoc cōsummare possit, id tamen cum difficultate aliqua ac grauitate facit, quo facto vulnus curetur ut simplex.

De Curatione intestinorum cum egressorum ex abdomine, tum etiam vulneratorum. CAP. XIX.

*Si egrediantur
intestina.*

Si autem intestina egrediantur extra ipsum abdomen, hoc fieri solet duobus modis: nā egrediuntur lacerata vel etiam non lacerata: intestina illa lacerata intelligenda ea, quæ non sunt vulnerata, sed tantum egressa quæ mollia & æqualia conspiciuntur. Si uero lacerata sint, hoc tribus modis fieri solet, vel enim vulnerata sunt, vel refrigerata vel inflammata. Si egrediuntur illa lacerata, statim abluantur liquore aliquo, etiam vel aqua & vino simul mixtis vel vino tantum, vel lacte, vel posca, vel lotio: ut si quid ipsis hæreat, ut puluis vel alia sordes, optime per hanc abluentionem detergatur pluries, quatenus opus sit repetitam, deinde imponatur & intromittantur in suam cavitatem, quod fiet appposito digito ad alterum latius vulneris ac sensum & sensum per suos anfractus in propriam sedem propellantur. Notandum est autem, quod sæpe solet chylus aggregari in vna tantum parte ipsius intestini & maxime ipsum inflare, quare & huius habenda est ratio. In hoc ergo casu debemus vitare manu propellere chylum externorum intestinorum paulatim ad interna intestina, ita ut intus totus transmittatur. Sed sit in hac actione peritus chirurgus: nam empiricus, & qui confuse rem tractat, dolorem maximum incitabit.

*Si vulneratum est
intestinum
transitum.*

Si autem vulneratum fuerit intestinum aliquod, obseruandum in ipsis est, si intestinum, quod vulneratum est, sit crassum vel gracile: quoniam si crassum vulneratum est, possumus alacri animo rem agere & infirmo ac etiā astantibus specti & salutē magis certā quā si gracile suscepisset vulnus, promittere, quāuis cum difficultate aliqua sanentur. Quando vero vulneratum est gracile ac tenue intestinum, certa spes salutis promittenda non est, non tamen derelinquendus æger, ratio autē difficultatis est, quod non consolidentur facile, quia primo tenuia intestina repleta sunt quam plurimis vasibus, ex quibus emanat continuo sanguis qui agglutinationem impedit: secundo tenuitas substantiæ ipsius intestini: tertio bilis ipsa, quæ a meatu felice descendit ad intestinum duodecimum & ad gracilia ipsa intestina, quæ maxime impedit consolidationem. Præterea notandum, quod quamuis istæ rationes

*Si gracile
vulnera-
tum est
difficile.*

rationes veræ sint, tamen etiam ipsa gracilia intestina, si vulnerentur, sanari etiam possunt, & falsum est, quod lethalia sint hæc vulnera; sed dico quod omnia intestina sanari possint & lethalia vulnera non sunt necessario, quamuis vrin pluribus sint insanabilia. Galenus tamen addit, quod cum intestina gracilia habeant similitudinem cum hepate, itaq; cura illorum difficilis. & ego quidem plurimos sanavi cum difficultate tamen: in his autē vulneribus antiquiores nostri chirurgi vti sunt consuetione, quam & ego laudo.

Sed aduertendum est, quod hæc consuetio à diuersis chirurgis diuersimode administratur; quidam enim hoc modo consueunt, accipiunt cannulam vel fistulā ex sambuco & ipsam per vulnus imponunt in ipsam cavitatem intestini, & deinde consuunt & intestinum & abdomen: & ratio ab istis datur, quoniam ex hac consuetione prohibetur ne chylus in intestino contentus effluat per labia vulneris consuti, sed pertranseat & exeat per fistulam ipsam, quo facto consolidatio non impeditur: & præterea dum sanabitur vulnus, æger quoque copiosiori cibo utetur ac vti poterit, quoniam deinde cannula hæc per anum excerneretur.

Sed hæc ratio non admodum mihi placet, nec eam laudare possum, cum dubitandum sit, quod cannula à natura deinde non emittatur per anum, sed sic fistula ipsa egrediatur ante vulneris intestini consolidationem, ideo hoc non tentabimus.

Alii accipiunt intestinum exiccatum alicuius animalis & extensum ponunt quoque hoc modo & propter eandem rationem: sed neque hoc probatur à me, quoniam intestinum humefactum abscedere vel ita emigrescit. Alii hoc fere idem faciunt accipientes asperam arteriam ex anse vel alio animali & imponunt in ipsum vulnus, deinde consuunt, sed quoniam & hoc morari diutius non potest, ideo laudo vt consuuntur vulnera intestini. Alii vero videntes, quod quandoque ex consuetione accidit inflammatio, passio iliaca ac etiam vomitus & denique ipsa mors, loco futuræ vtuntur labiis formicarum accipientes formicas illas maiores alas, quæ inueniuntur in caudicibus salicum & hoc modo faciunt, quod formica accipiat ore labium vtrumq; intestini, deinde accipiunt formicam illam in parte posteriori eam aliquantisper digitis comprimentes, vt ex dolore formica valide perstringat, & postquā viderint quod formica stricte arripuerit labia vulneris, separant caput ipsius formicæ à reliquo corpore, relinquentes caput formicæ siue formicarum (quoniam multa capita sunt applicanda pro longitudine vulneris) ad vulnus ipsum applicitū & appēsū, sed neq; hoc mihi placet, quoniam deinde cadunt etiam illa capita formicarū & sic iterum vulnus dilatur. Alii autem moti auctoritate illas, quam se tuentes allegant, quod scilicet similia similibus conferuentur, consuunt huiusmodi vulnera intestini orū chordis ex intestinis animalium confectis: sed neque hoc laudatur; quoniam hæc materia apta etiam est putredini, quæ propter eam illam non laudo.

Ego itaque consuo huiusmodi vulnera filo sericino ratione communis futuræ quæ confuitur tela à mulierculis, puncto illo scilicet qui vocatur vulgo puncto sopra mano, sicuti etiam consuunt mulieres, quando faciunt ex gallis capos quando scilicet gallos castrant.

Quantitas autē intestini filo attingenda in consuetione non sit nimis pauca, nec admodum multa, sed moderata: quoniam si parua accipiat, ob motum perpetuum puncta ruperentur: motu enim ipso intestina extenduntur. Si autem maior portio accipiat, quantitas sit, obstatuere facile intestinum, ac nimis stricta reddetur ipsius cautitas, unde vel tunc sunt dolores maximi vel succedit passio iliaca; & ideo vt hoc euerit, aliqui capiunt formicas pro consuetione, aliqui vero materiam ex animalibus, vt supra dictum est, quam tamen opinionem non approbau neq; nunc approbo.

Facta vero consuetione relinquatur fili pars siue cauda extra abdomen super ipso vulnere, quemadmodum de omento supra dictum est.

Sed aduertendum est, quod antequam incipiatur consuetio, oportet aliquod imponere medicamentum in internam partem intestini, quod faciat ad agglutinationem, & ideo ego impono aloē & mannam thuris, & Illinio sed in pauca quantitate, & ratio est, quoniam aloē stimulat. Sit ergo aloēs pars vna & duæ partes mannæ thuris.

Sed notandum est, quod medicamentum hoc est tamen imponendum ante sanguinis suppressionē, imo si quæ venula secta sanguinem profunda, liganda erit & sanguis prius posca sistendus, quoniam ita supprimeretur: at si in hoc medicamento timeatis aloē siue eius accedine, possumus admiscere eremore radicis consolidæ maioris, & vtiā tūm partem aloes accipere, duas vero mannæ thuris: vel infundatis super vulnus cremorem consolidæ maioris, & deinde inspergatis puluerem ex manna thuris. Sunt præterea aliqui, qui vtuntur succo pilosellæ, pentaphylli & tormentillæ: & est optimum medicamentum; alii vero vtuntur succo vlmī, qui præstantissimus est: accipiunt enim isti vesicæ ex arbore

*Liquor in
2-4 horis ag-
glutinat.*

*Cur dixerit
Hippocrates
vulnera in-
testinorum
efflethalia.*

vulni, quæ nascuntur in mense Maio, & ex ipsis contentum liquorem accipiunt & vtuntur, quoniam præstantissimum est remedium; imo ego vidi Empyricum quendam siue circum-
latores, qui vendebat hoc oleum pro agglutinatione vulnerum & sibi manum pungebat
plaga satis profunda, & hunc liquorem postea imponebat, & agglutinabatur vulnus spatio
horarum saltem 24. Agglutinatione itaq; fit ab huiusmodi liquore, quo etiam vtuntur poda-
grici, qui vt plurimum solent liquorem istum penes se habere, quoniam repellit materiam,
quare etiam nos hunc feliciter imponimus & consumimus.

Causa autem, cur Hippocrates dixerit, hæc vulnera esse lethalia, est duplex, primo
quia sæpe superuenit inflammatio propter dolorem, ratione cuius (inflammationis) postea
alia succedunt pessima accidentia; facile autem inflammantur hæc vulnera, quoniam inte-
stina habent multas ac magnas venas, ex quibus fit magna sanguinis profusio, quam ple-
runq; sequitur inflammatio & succedit iliaca passio.

*Si intestina
egressa sint
refrigerata.*

Accidit quoq; aliquando, quod egressa intestina refrigerantur. In hoc itaq; casu foue-
bimus intestina ipsa sic egressa spongia madida vino calido ac potenti donec incalcescant,
vnde in hoc casu optimum erit vinum maluatium seu aliud admodum potens.

*Si inflam-
mata.*

Si vero inflammatum fuerit intestinum egressum ita, vt intromitti non possit (& hæc
est propria passio intestinorum, quoniam dum manent extra vulnus, excitatur quidã va-
por à concavitate ipsa, qui replet illa intestina super vel extra vulnus existentia) in eo casu ag-
gendum ita est, vt discutionem status tentemus per fomentum aliquod, vnde recentiores
accipiunt anethum, absinthium, chamomillam, semina odorata, vt anisum, & hæc co-
quant in vino maluatico, quo postea decocto fouent. Ego vero accipio vinu potentissimu,
vinosum scilicet austeru & incoquo folia lauri, chamomilla & rutam, & hoc foueo, & optime
succedit. Verum notandum est ex Gal. quod non semper succedit hæc status discussio;
quare nisi inflatio illa per fomenta discutiatur, tunc in eo casu audacter secandum est abdomi-
& aperiendo magis vulnus; caute tamẽ, ne intestinũ lædatur; & ita ampliandũ est vulnus,
quo factò intestinum intromittendũ est ita inflatu, quoniam per spatium 6. vel 8. horarum
discutiuntur status illi à calore naturali. Galen. itaq; iubet vt sectio fiat syringotomo. Pau-
lus autem vnum notat, quod scilicet sectio fiat syringotomo recto; sed hoc non refert, dummo-
do caute ita fiat actio, vt non lædatur intestinum. Bene verum est, quod ob id syringotomo
vrimur incidendo inter vulnus & ipsum intestinum, quoniam istud instrumentum nõ se-
cat in illa parte, quæ respicit intestina, in altera autem parte, quæ respicit abdomẽ, secat. Sed
ego magis laudo syringotomum curuum quam rectum, quoniam ex curuo perficietur se-
ctio absq; læsione intestini, quod in vsu recti non ita facile evitari potest. Facta sectione ac
intromisso intestino in cavitatem ipsam consumimus ea arte, vt in simplici vulnere dictum
est, quoniam statim detumescet inflatio illa discussa à calore naturali. Facta autem reposi-
tione intestinorum in locum suum, oportet vt vulnus consolidetur; consolidabitur autem
cum per vsum medicamentorum acceptorum per os, tum & per medicamenta exterius
applicita. Sed notandum est, quod in omnibus agglutinantibus per exterius applicitis in
intestinorum vulneribus, oportet semper aliquod stupefaciens admiscere, vt prohibeatur
inflammatio ac fluxio cohibeatur, vnde in hoc casu laudo ego diaspermatum illud Nico-
lai Myrepsi & Galeni ac etiam ceratum barbarum. Per intestinum autem id possunt facere
trochisci ex charabe, trochisci ex terra sigillata dissoluti cũ aliquo liquore, vt cũ aqua theri-
acali, quæ etiam abluendo exiccat, & ita in iis, quæ exhibentur per os, semper addatis ali-
quem liquorem. Si autem fuerit vulnus in intestinis crassis, quæ inferiora sunt, tunc cly-
steribus satis faciendum est; vnde pro clystere inicienda sunt illa, quæ habeant vim agglu-
tinandam, semper tamen his admiscendo aliquod opiatum ac stupefaciens. In exterioribus
vero ponatur emplastrum barbarum, vel emplacum ex rad. consolidæ ma. Sed difficul-
tas non minima adest in huiusmodi vulneribus, quando internum vulneratum est, sed nõ
exeat extra abdomen; queritur enim tunc, an debeamus educere ipsum intestinum & cõ-
suere vel non? Vidus Vidius Chirurgus doctissimus dicit consuevndum esse abdomen absq;
educatione intestini, & absq; eius vulnus consuatur, quoniam per consuatur calorem ra-
tione consuati abdominis facile consolidabitur vulnus intestini; ac testatur vir iste se vidisse
vulneratum intestinum & eo non educto, imò consuato vulnere abdominis agglutinatum
fuisse abdomen & intestinum ipsum vulneratum.

*Exterius ap-
plicanda.*

*Interim su-
menda pro
agglutina-
tione.*

*Si intestini
crassum est
vulneratum.*

*An intesti-
num vulne-
ratum non
apparens
educi de-
beat, vt con-
suatur.*

Ego autem non sum huius sententiæ, vt scilicet debeamus vulnus abdominis consuere
vulnerato intestino & non egresso, sed sic relinquendum esse vulnus abdominis apertum
ac non consumum, vt quicquid egredietur, ab intestino possit per vulnus abdominis excer-
ni, aliter impediatur potius agglutinatione; interim tamen dico infundendum esse in vulnus
liquorem aliquem facientem ad intestini consolidationem, vt esset succus rutæ capratæ,
quæ

quæ vulgo dicitur astragalus, quo nullus præstantior liquor esse potest, vt repertum est in illo rustico, de quo superius meminimus, qui hunc succum mane bibebat & sanatus fuit peroptime, sic itaq; tractanda sunt intestinorum vulnera.

De Vulneribus ventriculi curandi.

CAP. XX.

Vulneratur etiam ventriculus quandoq; & variis id fieri modis potest; aliquando enim vulneratur tantum in superficie, aliquando penetrat vulnus ad cauitatem ipsius, aliquando vero vulnerantur ac perforantur ambo parietes ventriculi, & ego calum hunc vidi in quadam muliere, quæ vulnerata erat globulo bombardico, & tamen sanata fuit.

Si ergo vulneretur ventriculus in exteriori tantum tunica seu superficie, nos debemus alacriori animo curam suscipere, quoniam sanari potest, quamuis cum aliqua difficultate. Sed si perforatus sit ventriculus, obseruandum est, in quo loco sit ipse perforatus; quoniam si circa orificium eius sit vulnus, cura difficilis est ac periculosa. & ratio est, quoniam ibi multi concurrunt nervi, propter quod dolor, & dolorem inflammatio, inflammationem autem denique sequetur difficilis cura, propter hoc, quoniam medicamenta per os assumpta, per vulnus tantum transeunt, & ibi non morantur. Quod si perforetur circa fundum, est cura possibilior ac faciliior, quoniam & illa pars est carnosa & medicamenta per os assumpta vel etiam infusa diutius manent ac durantes in loco, neque ibi tot adsunt nervi, ratione quorum etiam causetur dolor. Si itaque vulnus sit in superficie ventriculi tantum, hoc modo curabimus; prius suturam in abdomine adhibebimus ac agglutinationem ipsius abdominis tentabimus; vulnus vero superficiale ipsius ventriculi naturæ curandum committimus, quoniam ab ipsa natura consolidatur dummodo id agamus sine inflammatione ventriculi.

Si autem perforetur ventriculus, videndum est, an possit consui nec ne, quoniam si potest consui, consuatur eo modo, quo in intestinis dictum est, nam nisi superueniat inflammatio, consolidabitur, nec dubitetur. Quando autem perforatur & consui non potest, hoc agendum erit; primo videndum est, an perforatus sit à lato instrumento vel pungenti, an à lato sit vulnus factum ab instrumento admodum lato; vel strictum sit à sagitta gladii vel pugione aut à glande sclopetica: & si hoc modo punctus sit, non dubitetur quod consolidabitur, dummodo vindicemus vulnus ipsum ab inflammatione; quare consuendum est vulnus abdominis, & nihil est timendum, quoniam per hanc consutionem abdominis calor internus vigebit, atq; per illam strictam puncturam nihil exiet ventriculo neque cibus neque potus, & ita consolidabitur.

Verum si vulnus sit amplum in ventriculo ipso, ita vt non possit consui, tunc debemus aperire vulnus abdominis, & querere an per vulnus ventriculi exeat chylus & in cauitatem abdominis cadat. Quod si enim exeat, tentandum est, vt per vulnus extrahatur chylus ille, qui exiens è ventriculo in cauitatem cadit abdominis: quoniam tunc non est deueniendum ad consutionem abdominis, quoniam eius agglutinatio vulnere exeunte chilo vel potu è ventriculo, claudetur meatus vulneris, & ita affluet inter intestina & contumpet ea. Vt itaque cuitetur ne intestina corrumpantur ratione materiæ illius, relinquendum est vulnus apertum sine consutione, sed hoc agehdum erit, vt per superius exhibeatis aliquod medicamentum, quod ad consolidationem faciat, adstringat & dolorem leniat, quale est diaspermation Nicolai Myrepsii pondere granorum iij dissolutum cum vino, vel diluatis cum decocto rad. consol. ma. Aduertendum est autem, quod ego non laudo opiata in vulneribus ventriculi, nisi adsit maximus dolor; quoniam immediate opium tangit locum affectum, vnde laudo, vt potius exhibeatis trociscos de spodio vel de terra sigillata, quam trociscos de charabe ac diaspermation. Et hæc sunt, quæ per os exhiberi debent.

In vulnus autem semper infundendum erit aliquod decoctum, vt decoctum factum in aqua chalybeata ex rad. consol. ma. pilosella, torment. myrthill. mastic. & manna thuris. Si etiam exhibeatis in iure, semper incoquatis vel tormentillam vel pimpinellam vel radices consolide maioris; vel hæc incoquantur in vino dulci & subaustero, in quo tamen adsit vis adstringendi.

Cibaria quoque omnia, quæ exhibentur, habeant vim medicamentosam, vnde semper in cibariis eoque rad. consol. ma. vel pimpinella vel etiam rhabarbari rusticissimi, quælibet habeat vim tantum adstringendi, non autem solvendi, exhibeantur etiam oua forbilis. Sed ne ventriculus intumescat & extendatur, adhibenda est summa diligentia in exhi-

bendo cibo, quoniam non debemus multum cibi exhibere, ne impediatur eius consolidatio: exhibeatut itaque cibis per vices, & pro quaque vice tantum ad 3j. ss. ad summum, & hoc faciendum est singula quaque hora vel tertia ad plus.

*Clysteris nu-
merus.*

Si autem requiratur alimentum maius, quam fieri possit à cibo exhibito, tunc applicetur enema confectum ex iure pingui vel lacte addito saccharo, quoniam hoc alimentum facile distribuitur vel etiam consummatum seu destillatum, vel ovum dissolutum in iure itidem per clysterem iniciendum, vel saccharum tum ovo, vel saccharum cum melle, sed ius cum saccharo optimum est pro clystere.

*Exterius ap-
plicanda.*

In exterioribus autem vulneris tentanda est agglutinatio, vnde imponatur vel barbarum vel medicamentum confectum ex rad. consol. maioris. Verum si apertum fuerit vulnus abdominis; debemus infundere in ipsius cavitatem super vulnus ventriculi duas vel tres guttas medicamenti, quod habeat vim consolidandi, constringendi ac doloris mitigandi; & simul etiam applicentur linamenta in eodem medicamento madefacta super vulnus. In hoc ergo casu aliqui chirurgi solent accipere vinum maluaricum cum oleo abietino mixtum. & hoc vultur: sed reuera mihi non placet, quoniam nimis calefacit partem: vnde ego soleo conficere medicamentum secundum hanc formam.

*Medicamen-
tum propriū
infundendum
super vulneri-
culo vulnus.*

2℥ ol. mastich. 3j.
abietini 3j.
matthæ thuris 3lj.
puluer. tormentill. vel chamomill.
pulu. fl. hyperici
rad. consol. ma. an. 3j.
vermum terrestri. N. v.
croci 3j.

vinum alb. aust. & impotentis 3j. misce, coquantur hæc ad vini consumptionem, postea exprimatur, coletur & purgetur ac cum linamentis infundatur.

*Per circum-
iacentibus
partibus.*

Verum in vulneribus abdominis complicatis cum vulneribus ventriculi habenda semper est ratio partium adiacentium; & ideo omnes partes circumpositæ ipsi abdomini, ut thorax, lareta siue inguina semper imbuantur plurimo ceraroso vel ol. ros. ac vino, ne inflammatio succedat ac tandem mors. Et hæc satis sunt dicta de vulneribus abdominis cum simplicibus, tum penetrantibus & complicatis cum ipsius ventriculi vulneribus nunc modo agendum venit de vulneribus hepatis.

De Vulneribus hepatis.

C A P. XXI.

*Qualiter
vulnera fiat.*

Vulnera hepatis diabolica sunt, & nullum ego vidi sanatum vulnere horum; quoniam ibi maxima sunt vasa, & semper sanguis emanat, vnde si sanatur aliquod horum vulnere, inter miracula connumerari debet, quoniam nisi solus Deus hæc sanare potest.

Prognosis.

Attamen si ad curam huiusmodi vulnere aduocemur, hoc erit agendum, ut ægris potius

*Per exterius
applicanda.*

satis faciamus, quam quod vlla adsit spes salutis. Ego autem dum fui vocatus, affandere sum solitus medicamenta adstringentia ac consolidantia, imò si etiam latum sit vulnus, consolidandum est & primo vitendum confusione. Si vero fuerit strictum, sic est relinquendum, & in vulnus infundi potest succus pimpinellæ aut tormetillæ, aut pentaphylli, aut polygoni vel etiam hippuridis.

*Per interius
exhibenda.*

Per interna vero exhibeo, quæ sanguinem sistunt ac consolidant, ut sunt trochisci de charabe, vel diaspermaton, quæ optima sunt, quoniam opiata sunt, sed quam maxime probò trochiscos de charabe, de terra sigillata & de spodio: ac deinde vulnus abdominis confuso, quoniam ista vulnera sunt relinquenda ipsi naturæ.

De Vulneribus renum.

C A P. XXII.

*Si vulnus
penetra.*

Si autem renes vulnerentur, obseruandum est in primis, an effluat lorium, siue materia squamosa, vel sanguis aquosus, quoniam si non exeat talis materia, signum est, quod non penetrat vulnus ad cavitatem ipsam renum. In hoc itaque casu infundemus medicamentum in vulnus ipsum, quæ sunt consolidantia, inter quæ primo est succus siue liquor ille folliculorum seu vesicarum aluti, vel alii succi, de quibus dictum est in tractatione vulnere intertestinorum. Hoc facto confusatur vulnus abdominis ac consolidetur, & vulnus renum naturæ relinquatur: attamen etiam per interius exhiberi possunt ea quæ facere apta sunt ad renum consolidationem; in exterioribus vero applicentur fortissima agglutinantia. Sed

dicet

diacet aliquis, agglutinato vulneris sanies effluens ex renibus ipsis aggregabitur in cavitatem abdominis, & sic superuenient symptomata: Respondeo ego, quod aggregabitur quidam, tamen, quamuis sanies ex renibus effluens agglutinato vulnere in ipsius cavitatem aggregetur, nihilominus à natura ipsa transmittetur per intestinum rectum, vel digeretur ita vt nullum symptoma superuenire possit.

Si autem vulnus renum profundum sit, ita vt egrediatur vrina, vel serosus sanguis, tunc non debetis confuere vulnus in exteriori parte, sed id debetis agere, quod diximus in vulnere ventriculi penetrante, vt scilicet in vulnus ipsum medicamenta imponamus, quæ habeant vim consolidandi, vt si infundamus oleum abietinum cum illis succis herbatum, de quibus diximus in vulnere ventriculi. Per interius autem exhibeantur troisci de charabe si dolor adsit, vel de spodio, siue etiam de terra sigillata vel diaspermato, sed eos dissoluetis aliquo decocto diuretico, vt cū decocto capillorū Veneris vel liquiritiæ, vel maluz vel alkekengi, vel cum decocto seminum maiorum vel citrulli, melonum, cucurbitarum, vel dicta medicamenta dissoluantur cum succis aut pimpinella, vel consolidate maioris vel pilosellæ, & exhibeantur cum dictis diureticis. Ego tamē maxime laudo succum rutæ caprarie siue astragalidis ac aliarum supra dictarum. Cauendum tamen est à diureticis calidis ne inflamment, sed inuenienda sunt ea, quæ temperata sint.

De Vulneribus vesicæ.

CAP. XXIII.

SI vero vesica vulneretur, sciatis, quod sanari potest, sed maxima cum difficultate, præcipue si circa os ipsius vulneretur. Eadem ergo agenda erunt, quæ in vulneribus renum agenda esse diximus. Verum si vesica discissa sit in fundo, timenda est mors; tamen vtrumque vulnus adueniente inflammatione lethale est, & ego vidi vnum tantum sanatum fuisse ab huiusmodi vulnere: habebat enim vesicam perforatam à parte ad partem à glande scelopeti. Vos autem hæc vulnera curabitis vt vulnera ventriculi curantur: sed vulnus abdominis apertum seruetur neque cōsuatur, quoniam excrementa perpetuo emanant. Sunt aliqui, qui infundunt in vesicā aliquod medicamentum cōsolidans, vt sunt liquores dicti p-syringam, sed hoc, domini, mihi non placet, nisi orificiū vesicæ ita latū sit, vt siringa ingredi possit & facile, quoniam si orificiū strictum sit vel earuncula ad est, tunc nō sunt infundenda medicamenta per siringam, quoniam medicamenta illa obstruerēt meatum vrinarium: ex quo sequeretur inflammatio, & præcipue cum siringa imposita esset aliquantulum violenter, & ita inflammationem postea sequeretur mors ipsa. Si autem possit medicamentum imponi per vulnus ipsum, imponatur succus aliquis ex dictis herbis mixtus cum sero lactis caprini chalybeato, qui tepidus imponatur. Illis autē medicamentis per os exhibendis atque assumendis semper admisceantur medicamenta diuretica, vt medicamenta agglutinantia possint locum affectū petere; nec vltus eorum timendus est, quoniam nulla fit læsio ab illis, licet generale sit præceptū, quod in omnibus renū affectionib. ac vesicæ non conueniant diuretica. Adhibeatur etiā diligētia in exhibendo cibo: venā quoque secetur cubiti recti, ac magna sanguinis copia extrahatur, & fere ad deliquiū animi. Sed in his renū vulnerib. aduertendū est & vesicæ, ne exhibeantur pharmaca per os electiue ductoria, sed tantū leniētia moderata: vnde si haberi posset aqua Villensis pro potu optima quidem esset. Et hæc sunt, quæ agenda veniunt in vulneribus cum abdominis, tum pectus ab ipso contentatum.

De Vulneribus neruorum, & præcipue de eorum qualitate, diuisione signis, præ-sagitiis & sensu.

CAP. XXIV.

NUllarepetiuntur vulnera, quæ magis estimētur à chirurgis quam vulnera neruorum, & semper deterrentur ac ab illis abhorrentur vnde semper pro curatione talium vulnerum solent habere medicamenta præ manib. atque veluti per traditiones comunicata, quæ ad spasum seu cōuulsionem faciunt. & merito inquam terrentur, quoniam huiusmodi vulnera difficilia sunt curata multis de causis, & primo quia nerui sensum exquisitissimū habent, secundo quia cōuulsionem imminēt in his vulnerib. ac eueniunt, quæ sæpe mortem inducunt; tertio quoniam maximum habent consensum cum cerebro, vnde superueniunt vertigines ac alia praua symptomata infirmos iugulantia; quarto quoniam substantia neruorum frigida est & sicca, ratione cuius substantiæ non possunt cito sanari, merito itaque chirurgi vulnera hæc maxime timeant ac faciunt.

Distinguitur autē huiusmodi vulnera in tria genera: primū genus est, quādo vulnerratur neruus puncturā, & vulnus tale etiā punctura vocatur ipsū nerui: secundū est quādo secatur neruus per longum vel per transversum: tertiu quādo contunditur, laceratur &

attetur. Ista sunt tria genera vulnerum sectionum heruorum, quæ etiam vel sunt cum detectione nervi vel absque detectione. Sed in omnibus his tribus generibus sit vel tactus vel detectus nervus, cognoscendum est in primis & ante omnia, quomodo vulneratus sit nervus, sumpta indicatione ab instrumento feriente, ex quo vulnus cognosci potest, quale sit.

*Digna nervi
vulnerati.*

Signa autem nervi vulnerati sunt dolor intolerabilis, sensus atque locus ipse affectus, unde si quæ est pars, quæ requirat compositionem partium, nervi sunt: item superueniens febris cum rigore & cum doloribus repetitis signum erit certissimum vulnerati nervi: præterea si viderimus superuenire vertigines, habemus indicium vulneris in nervo: unde in omni

Præsigium.

*Nervosa
substantia
quætriplex
sit.*

mini vulnere nervorum prænunciandus est dolor, læsio ipsius partis vel privatio sensus ac motus difficultas. Notandum est autem, quod cum dico nervum, geterice loquor; nã sub hoc nomine intelligo nervosam substantiam, quæ triplex est: primo enim herius genere sumptus continet sub se ligamenta nervicã, unde per nervum intelligo ligamenta illa nervosa, quibus iunguntur articuli, quæ nullum penitus sensum habent, habent tamen membranas ortas ab ipso nervo, quibus scilicet vestiuntur à nervis ipsis, à quibus procedunt, ut dixi, quæ membranæ maximo pollent sensu. Secundo sub hoc nomine continentur chordæ siue tendones nervorum, quæ constant ex ligamentis & nervis, & quæ faciunt ad motum voluntarium: & istæ sensum habent, quamvis non exquisitum. Tercio per nervum intelligimus verum corpus nervosum à cerebro & medulla spinali procedens, quod est corpus fibrosum ac plenum meatibus siue canalibus, per quos transeunt spiritus animales sensitivi. omnes tamen nervi, licet habeant exquisitum sensum, non tamen habent exquisitissimum atque perfectum, quoniam non discernunt inter obiecta, quamvis excitent dolores intolerabiles, sed sola caro illa, quæ nervosa est, perfectum habet sensum, quoniam discernit visionem, puncturam, compressionem, sectionem & alia id genus; attamen caro per se non sentit sed per nervum. Cum ergo tres sint species nervorum, ita faciunt ad præsigium, quod semper in læsione substantiarum istorum sunt impedimenta operis illorum.

*Qualis sit
sensu ner-
vorum.*

De Punctura nervorum.

CAP. XXV.

His constitutis quæ supra diximus, si habeamus nervum præ manibus, qui puncturam sit passus, quid agendum est? Hoc cogito id agendum est, quod docet autores, & potissimum Paulus lib. 4. cap. 40. vel lib. 14. ca. 24. & Aetius lib. 14. cap. 19. præterea Galenus lib. de comp. med. per gen. & lib. 6. meth. med. & infinita numerantur à nostris quoque chirurgis recentioribus, qui omnes tamen proponunt geminum scopum, ut si primo tractetur locus affectus robustissimis medicamentis ipsum succando atque dolor emolliendo: deinde ut prohibeatur inflammatio, ne succedat, quoniam si quæ est vulnus, quæ inflammationem inducit, est profecto ipsa nervi punctura. Primo igitur ad prohibendam inflammationem fecetur venæ servata rectitudine partis, & copiosum sanguinem euacuamus, ac etiam usque ad animi deliquium, quamvis hoc non videatur convenire atque competere, attamen quia euacuatio sanguinis per phlebotomiam maxime refrigerat, & ob id inflammationi resistit, admitti potest. unde postmodum inflammatio non succedit. quare fiat intrepide.

*Ad prohibendam in-
flammationem.*

Præterea humores calidi pharmaco debent euacuari, ut inflammatio idem prohibeatur, sed hoc modo: primo præparabimus corpus per duos dies exhibendo mel rosarum cum syrupo de betonica, non tamen simul in magna quantitate, sed hoc modo, viscil. matutina hora, quando experscitur æger, exhibeantur duo vel tria cochlearia huius mellis cum syrupo dicto: deinde iterum post quatuor horas tantundem exhibeatur & sic etiam ante coenam.

Modus præparandi matutina pro euacuacione.

Euacuatio.

Videtur.

Tertia autem die exhibeatur pharmacum expurgans, quod tamen agaricum suscipiat, ut esset rhabarbarum cum agatico vel cassia cum agatico, vel confectio hamech, vel pilulæ de agarico, vel cochlearium cum agarico. Victus præterea ratio instituitur, quæ immunis sit à vino, sed aquam mulsam bibat æger, omnia autem cibaria sint parvi alimenti ac optimi succi, exhibeatur syr. de betonica, de ros. siccis, addito decocto betonicæ, cichoreæ & iug. si inflammatio non timeatur.

Agenda circa locum affectum.
Si vulnus sit angustum.
Si vulnus sit dilatatum.

Circa autem locum affectum hoc erit agendum: primum observabimus an vulnus latum sit vel angustum, si enim angustum erit, ita ut sanies collecta non possit effluere nec exitum habeat, ac vis medicamentum non possit ad nervum pervenire, tunc opus est ut dilatemus vulnus per sectionem carnis & cutis usque ad nervum ipsum, ita ut appareat nervus. Si vero vulnus sit latum per se vel dilatatum etiam, debemus inspicere ad symptomata, ut si adsit dolor, statim mitigandus est: Quæ autem faciunt ad mitigationem.

rigationem doloris, plurima sunt, sed primo illa, quæ anodina vocantur: secundo ea, quæ causam doloris auferunt: tertio, quæ stuporē inducunt, vnde mitigandus est dolor, vel ex anodinis, vel ex auferentibus causam doloris, vel ex inducentibus stuporem. Aduertendum tamen est, quod in hoc casu stupefaciētia hæc non conueniunt: quoniam maxime sunt refrigerantia, ad quæ deuenire non debemus, vt sunt opiata: quoniam ea refrigerantia maxime lædunt ipsos neruos, vt sunt folia solani & mandragoræ, quæ stuporem inducunt. Hinc est, quod vsus olei & aquæ, hydrelæ scilicet, quamuis faciat ad mitigationē doloris & leniētia sint dolorē, tamen malus est ex Galeni sententia in vlncrib. neruorū, quoniam refrigerant: omnia enim frigida in hoc casu mala sunt, vnde etiā lac, licet dolorē leniat ac midget, tamen quia in eo etiā sunt aliquæ partes frigidæ, nō debemus eo vti in vlncrib. neruorum siue eorū dolore: quare nōs monet Gal. vt vtamur iis, quæ leniant, sed locū fouendo, vt si foueretur locū fomētō factō ex oleo: sciatis enim, quod hæc ratio præstatissima est, & est medicamentum propriū, quo tamen nos vtimur hunc in modum: calefacimus oleum, & in eo imponimus membrum cum parte vulnerata siue pub̄ta: quoniam statim cessat ac quiescit dolor. Sed aduertendum est, quod aliquantum extracta parte ex oleo, statim iterum insurgit dolor, quare tunc & vos iterum partem in ipso oleo infundetis: nam ex iteratis infusionibus cessat denique. Sed dicet aliquis, nonne, est Hippocratis sententia, quod oleum inimitetur neruis, imo & vlncribus etiā, quoniam habet vim emolliendi ac humectandi? at nerui ipsi maxima indigent siccatione, quomodo ergo hic probatur? Et ego quidem miror quandoque: quoniam seruauī interdum partem heruosam, punctam duos vel tres dies in oleo, & nullum successit incommodum, quinimo maxima succedebat doloris mitigatio, vnde ad instantiam ego responderem, quod bene verum est, quod oleum habeat vim humectandi & emolliendi, tamen nos eo vtimur in hoc casu propter symptoma, dolorem scilicet sedandum: præterea oleum diutius ac sæpius incalefactum recipit & acquirit ex hac crebra incalefactione vim siccandi, & hoc fit per longum vsu, vnde dicatis vos, quod quando Hippocrates dicit, quod oleum nocet vlncribus, & præcipue neruorum, intelligit quo ad regiam sanationem vlncri, non autem quo ad mitigationem doloris: quoniam ratione mitigationis doloris conuenit oleum, quamuis ratione vlncri non conueniat. Sciendum tamen est, quod non omne oleum conuenit, nec bonum est. omphacinum enim ex oliuis immaturis malum est, cognoscitur autem hoc oleum crudum à colore viridi, quem detinet: sed quoniam etiam adstringens est, malum est: quoniam omnia adstringentia vitanda sunt in huiusmodi vlncribus. Eligendum itaq; erit oleum maturum ac vetustissimum: & ideo oleum illud ex Apulia optimum est, quod sanum est: quoniam ex oliuis fit optime maturis: præstantissimum ergo erit illud, quod est luteum, subtile, acre & acutum ad odorem ac pungens nares.

Sed si casu non haberemus tale oleum, nec possemus habere, accipiat is illud, quod haberi potest & illud parum coquatis, & cum eo etiam folia sambuci, coquatur vel cortex ipsius vel cæpalliorum alborum, & sic eo vtendum pro sedando dolore. Sedato autem dolore debemus imponere medicamentum opportuna, quæ hac ratione inuestigari debent: nos habemus substantiam nerui frigidam & siccam, debemus ergo vti medicamentis calidis & siccis: siccis quidem vt conseruent propriam temperiem nerui ac insitam: calidis vero, vt tollant frigiditatem superuenientem: erunt ergo talia medicamenta robustissima siccantia, moderate tamen calefacientia.

Notandum est autem, quod illi, qui sunt puncti in neruo, pars eorum puncta neruosa potest perferre oleum etiam feruentissimum, in quo ego non possem digitum tenere. & miror: vnde colligo, quod sensum exquisitissimum neruus non habet, sed exquisitum tantum, vnde quia habemus sensum hunc saltem exquisitum, qui non potest quodlibet medicamentum tolerare, ideo omnia medicamenta debent esse immunia ab omni asperitate & acredine. Quia vero substantia nerui dura est: ideo medicamenta sint tenuia, & ita tenuia, vt possint penetrare. Quarto obseruandum est, quod si sanies colligatur in fundo vlncri vel ichor, & ibi detineatur, est veluti venenum, ac dolorem excitat: ideo medicamenta hæc non solum habere debent vim siccandi ac calefaciendi, sed etiam educendi & attrahendi ichorem à profundo in superficiem.

Hæc autem medicamenta distinguuntur: nam vel simplicia sunt vel composita: simplicia quoque distinguuntur in leuia & robusta: leuia autem sunt hæc, primo omnes resine, vt est abietina, terebinthina ac laricina, præterea gummi, elemi, oleum de terebinthina, quod non fit acre cum quaque destillarum, ac etiam oleum ex resina abietina cum aqua etiam destillarum. Hæc enim omnia habent vim siccandi & roborandi atque extrahendi à profundo. Robusta autem medicamenta simplicia sunt hæc, pix liquida abluta,

*Simplex sententia
Sagunda.*

*Las malum in
vlncribus de
ire.*

*Galeni appropinquat
propter
neruorum ad hoc
refrigerantia de
ire.*

*Cur sit in his
doloribus frigiditas, cum
tamen sit in
neruorum sensu.*

*Uti amari
oleum.*

*Melius propinquat
vlncri oleum, si
appropinquat habet
vlncria pignora.*

*Nervus quoniam
sensum habet.*

*Resina multo
citius regreditur.*

*Simplex in
vlncri.*

*Simplex in
vlncri.*

naphtha, hoc est, oleum petroleum omne, vel alba vel nigra, vel lutea, sagapenum, opopanax, laser medicum, id est, assa foetida: quoniam Cyrenaicum non habemus, sulphur viuum, calx non extincta & euphorbium. Hæc enim etiam habent vim siccandi, moderate calefaciendi ac extrahendi.

Notandum circa
populaceum
medicamentum
vini in punctis
na.

Sed aduertatis, quod dicebam, quod medicamentum debet habere vires, quas dixi, sicuti collegi ex dictis Galeni, vnde cum hæc robusta sint, acris, mordacia ac nimis calida, non videntur conuenire, cum sint præter methodum iam positam: ideo vos moneo, ut ipsa tantum imponatis robusta in partibus exterioribus, illa vero, quæ sunt leuia, infundantur in ipsum vulnus: quoniam sic faciendo, quamuis illa robusta acris sint, non tamen ita facile eorum vis penetrat: quoniam leuia in vulnus imposita impediunt transitum acrimoniarum robustorum. Est & aliud notandum, quod in arctis nervorum vulneribus siue puncturis fugiendum est ne imponatur linamentum: quoniam prohiberet egredi saniem, & sic excitaretur dolor intolerabilis, quare infundantur illa leuia in vulnus.

Euphorbium præ
feratur in casu
arctis vulneris
ritum.

At in exterioribus alio modo etiam vtimur istis robustissimis ac calidis medicamentis: nam istis vtentes mitigamus feruorem illorum, & sic Galenus miscebat hæc robusta cum oleo vel cera, & ita vos facietis. Sciatis autem, quod quamuis multa connumeraui, inter illa omnia, principem locum tenet euphorbium, quod ego sacram anchoram appello, ac semper ipso vtor: quoniam nunquam decipit Medicos, neque frustratur suo fine.

Nota remitti
de vasa an
phorus.

Bene verum est, quod euphorbium eligi debet proratione affectuum ac corporum: vnde robustum ac recens eligatur in robustis corporibus, ac in altis & profundis vulneribus: sed in corpore non ita robusto, ac in vulnere superficiali eligatur vetustum euphorbium. Sed notandum est, quod raro inuenitur bonum euphorbium. Bonum autem euphorbium illud est, quod est recens ac in exterioribus est veluti resina nigricans, & hoc in corporibus vtimini. Vetustum autem euphorbium est in exterioribus flauum ac rubens, & hoc vtamini in leuibus corporibus. Sed quia diuisi hæc medicamenta in simplicia & composita, ideo transeamus ad composita cum de simplicibus egerimus. Composita ergo medicamenta, quibus in simplicissimo nervorum vulnere ac dolore ego vtor, sunt hæc, sed primum est hoc:

Medicamentum
pro simplicibus
vulneribus & do
lore.

℞. sagapeni

opopanax. an. ʒj.

terebinth. ʒj.

ol. vetusti ʒij. Misce, fiat medicamentum, quod in exterioribus ponatur. Si vultis robustius, fiat sic:

Alud robu
rum.

℞. assæ foetidæ ʒj.

ol. vetustior.

pic. naual. frict.

cerae an. ʒss. Misce, fiat linimentum, quod ponatur super vulnus.

Si vero vultis adhuc robustius, fiat secundum hanc formam:

Alud robu
rum.

℞. sulph. viui ʒj.

ol. vetustissimi quantum sufficit, vel loco olei communis accipio

oleum sambucinum, oleum scilicet, in quo incocta sunt folia sambuci, q. s. Misce ad mellis consistentiam, ita vt fiat medicamentum, quod ponatur super vulnus. Quod si ista habere non poterimus, accipiat calx viua & misceatur in mortario cum oleo vetustissimo, & supra vulnus ponatur. Apud recentiores autem habemus oleum hypericonis magistrale, & etiam oleum hyperici rubeum dictum completum, quod est optimum. Illud autem quod magistrale vocatur, componitur secundum hanc formam:

Quam hyperi
conis magistrali
te.

℞. terebinth. claræ ʒij.

ol. de terebinth. ʒjss.

ros. compl. ʒiij.

vermium terrestr. lotor. cum vino maluato ʒjss.

rubiz tinctor. ʒiij.

sem. & fl. hyperici M. j.

rorism.

centaur. ma.

millefol. an. M. ss.

Alud robu
rum.

sulph. viui ʒss. tritis terendis, incisisque incidendis hæc misceantur

addito vino maluatico, ac bulliant parum, deinde addantur semina ac flores hyperici ac coquantur ad vini consumptionem, tandem exprimantur, & in vas reponantur, quod deinde

deinde in sole diebus canicularibus exponatur, in tempore autem noctis seruetur in domo, ne refrigetur ab ambiente frigido, tandem transactis diebus canicularibus seruetur ad vsus; & hoc vocatur oleum hypericonis completum magistrale, quo ego vtor in exterioribus. Sed quoniam dicebam, quod inter medicamenta, quæ applicantur puncturis nervorum præcipuum est euphorbium ac omnia superat, ego hoc vtor, utique dum vinam. Sed aduertendum est, quod ego ipsum non vno tantum modo sed variis compono, ut etiam Galenus facit: quandoque enim ipsum compono cum oleo, quandoque cum cera, quandoque cum resinis, & aliquando cum populeone, ac Galenus lib. 6. meth. cap. 2. hoc modo ipsum componit:

10 \mathcal{L} . euphorb. \mathfrak{z} ij.
ol. cômum \mathfrak{z} xij.
cera \mathfrak{z} iij. Misce, & fiat medicamentum molle.
Vel hoc hoc modo misceatur, cum idem facit:

\mathcal{L} . ceræ
colophon.
ol. an. lbj.
euphorb. \mathfrak{z} ij. misce.

Sed si corpus sit tæctum & molle, addit euphorbii \mathfrak{z} j. s. vel hoc alio modo conficiet, \mathcal{L} . ceræ, euphorbii an. \mathfrak{z} ij. misce. Et ut videris Galenum interdum miscere, cum emplastro, quandoque cum vnguento, quandoque miscet mediocri quadam substantia, ita ut etiam tenerrimum sit medicamentum vel emplastrum ratione multi olei, vel sit mediocre vel durum, ut facit idem Galenus. Dum autem miscemus, monet Galenus, quod dum coquitur in eodem lebece, addatur parum aquæ, ne comburatur. vel fiat ac paretur hoc medicamentum in duplici vase: quoniam preciosus est modus hic, & tum non indiget aqua mixta, imponetis ergo hoc medicamentum donec cesset dolor & caro crescat, terminus enim impositionis huius medicamenti est donec mitigetur, ac cesset dolor, secundo quod crescat caro, tertio etiam donec obducatur cicatrice vulnus nervi, hic enim est terminus.

De Nervis sc̄tis siue casim vulneratis. CAP. XXVI.

30 Si autem nervus sc̄tus ac casim vulneratus sit, tunc videndum est, an ipse nervus sit sc̄tus nec ne, quamvis ut plurimum, quando resecus est, videtur, quia dum incisus est nervus, necessario magnum est vulnus, in quo (vulnere) hoc est agendum, primum est secanda vena, ut in punctura: secundo si adest dolor, datur indicatio, ut foueamus locum cum oleo calido: si vero non ad sit dolor nec spasmus, non est deueniendū ad oleum: quoniam superfluum est, quin etiam fugienda sunt omnia relaxantia, sed deueniendum est ad siccantia, sed quæ careant omni mordicatione, inter quæ præstantissima in hoc casu est pompholyx abluta: calx etiam viua decies lota sub diebus caniculæ. Præterea medicamenta, quæ sunt ex pompholyge, videlicet vnguentum diapompholygos dictum descriptum ab Actio, similiter diachalciteos, quod dicitur diapalma, si abluatur oleo mastichino vel
40 ol. hypericonis prædicto: præterea est vnguentum de matresylua optimum in eodem casu & vnguentum de melle, quod variis modis describitur: nam ab Actio vno modo describitur in lib. 1. c. 127. & alio modo in lib. 15. c. 14. sed hoc vltimum est magis cōpositum, primum enim conficitur ex melle, lithargyrio, cera & oleo, secundum vero magis cōpositum tale est:

\mathcal{L} . litharg.
ol. an. lbj.
colophon.
cera

50 axungie veteris
mellis an. \mathfrak{z} xx. primum accipiatis axungiam, oleum & lithargyrum & coquantur donec non inquinent, deinde in fine reliqua addantur, tandem emollatis medicamentum manibus & seruetis ipsum, quoniam opportunum est maxime.

Aliud vero Nicolai est hoc modo cōpositum:

\mathcal{L} . litharg.

cera

olei an. lbj.

terebinth.

mellis Attici

adipis porcini an. \mathfrak{z} vj. misce. Sed in hoc etiam non est contemnenda

Pafilli Papy-
di.Pafilli Papy-
di.

Androni.

De charta
combusta.An metalla
contineant in
se.

dum præceptum Galeni, ut scilicet semper abluantur istæ resinz, quæcunque sint, & ego
semper eas abluo cum aqua betonicæ, ut amittant omnem acredinem, & utamini illis in
molliorib. corporibus. In robustioribus vero ac duris corporibus vitur Galenus pastillis
Polyidæ, qui tamen non sunt illi, qui describuntur ab Actio, lib. 9. cap. 49. sed sunt illi, qui
describuntur à Galeno lib. 5. de compos. med. sec. gen. cap. 11. & ibi sunt duæ descriptio-
nes, parum tamen inuicem discrepantes, quare quacunque uti poteritis: aliquando ve-
batur Galenus pastillis Andronis, vel Pasionis, vel de charta, quos dissoluebat in sapa &
imponebat. Pastilli autem Pasionis describuntur in lib. 5. de compos. med. per gen. cap. 14.
sed dicuntur ibi troscisci Pasion, non autem Pasionis Pauli, quicquidem describit & appel-
lat Pasionis: hos etiam Myrepsius describit, sed descriptio illa mihi non placet. Actius et-
iam cap. 50. lib. 14. eos describit & optime. Pastilli autem Andronis describuntur, lib. 5. de
compos. med. per gen. & ab Actio, lib. 14. cap. 5. & à Paulo lib. 7. cap. de pastillis & omnes
diuersimode ipsos describunt, sed ego magis probo descriptionem Pauli quam cæteror-
um. Pastilli autem de charta combusti describuntur à Galeno lib. de comp. medie. per
loc. cap. 1. & lib. 5. de compos. med. per gen. capit. 14. & ab aliis etiam diuersis in locis: sed
quoniam hi pastilli fiebant ex papyro, quam nos non habemus, ideo ego loco papyri, qua
caremus, vtior typha, quæ est illa planta, quæ vulgo dicitur pauiera, quam ego credo ha-
bere eandem vim cum papyro antiquorum, ac vires easdem penitus obtinere: ideo ego
vto typham & compono eo modo in reliquis. Sed quoniam hæc omnia accipiunt metalla
robustissima, vt arsenicum, æruginem æris etiam, quæ acerrima sunt, & crustam pos-
sunt inducere, ideo videtur, quod non possint conuenire in nervo detecto, neque pro ta-
li casu sint opportuna, nec etiam in corporibus purissimorum rusticorum cum nervi sem-
per sentiant, quinimo si Galenus consulit, ut euitemus euphorbium in nervo detecto,
quia mordicat, multo magis ista acerrima erunt euitanda. sed cum per corpus robustum
ac durum duo possumus intelligere, nempe corpus rusticum ac duri habitus, & corpus du-
rum subiectum, videlicet pars subiecta dura, vt sunt ligamenta; si intelligamus non solum
corpus durum siccissimi rustici, sed etiam duram subiectam partem, vt sunt ligamenta di-
cta, Galenus erraret, & sibi non constaret, ideo in nervis mollibus vtetur medicamentis
primo descriptis in libris dictis: in ligamentis autem corporum duriorum vtetur istis ro-
bustis medicamentis cum sapa tamen liquefactis. Sed primo ex Galeni iussu abstergatur
sanies gossipio in sapa madefacto, vel etiam cum sputo, non autem sicco gossipio, ne dolo-
re pars afficiatur: quoniam si madefiat corpus, fit magis æquale, & ita sine dolore fit deter-
sio: fugiatis tamen aquam ne refrigerentur nervi. Partes vero circumpositæ semper inun-
gantur oleo chamomillæ vel lumbicorum, vt tollatur dolor.

De Contuso nervo cum cum cute, tum sine cute.

CAP. XXVII.

Si nervus sit
contusus cum
cute.Medicamenta
pro nervo con-
fusa.Nervus succi-
dit.Si contundatur
sine cute.

Si vero nervus contundatur vel solus vel cum cute contunditur; vnde si simul nervus
cum cute contundatur, neque tamen appareat nervus detectus & sanguis erumpat
per anastomosin, indicatur primo, ut siccemus partem contusam ac impediamus, ne
materia egrediatur è nervis per anastomosin, & ea, quæ iam egressa est, digeratur: ideo
medicamenta sunt siccantia digerentia ac obturent, etiam aliquantisper adstringant, ne
exeat sanguis. Cum autem temporibus Galeni istæ contusiones essent frequentes in athle-
ticis ludis, ideo habebant athletæ illi quædam medicamenta familiaria ac emplastra con-
fecta ex farina fabacea & oxymelite, ex quibus faciebant opportunum medicamentum,
quia digerit ac attenuat sanguinem egressum, vnde quandoque etiam ipsi componebant
emplastrum ex farina orobi & oxymelle, & addebant aliquando pulverem iteos, vel sole-
bant conficere fomentum ex vino mulso, vel sapa & modico aceti ad penetrationem, vt
dicit Actius lib. 6. cap. 10. Sed quoniam ex Galeno talia debent aliquantulum adstringe-
re, ideo probarem ego quod semper permisceatis vinum austerum. Ego autem habeo in
vso alabastrina duo, alterum magistrale, quod in principio statim est opponendum; reli-
quum vero est luminaris maioris, quod secundo loco accipimus & apponimus, quia ro-
bustum est. Si vero succedat dolor, foveatur locus oleo valde calido cum spongia, deinde
veniendum est ad medicamenta dicta.

Si vero contundatur nervus sine contusione cutis, quod tamen raro accidit, nec vn-
quam ego vidi, foveatur cum aliquo oleo calido, vt cum anethino vel rutaceo, & secetur
prius vena ac evacuetur corpus, ne aliqua sequatur influxio. & hæc dicta sufficiant de vul-
neribus partium nervosarum.

CAP. XXVIII

Vulnera, quæ globulo illo plumbeo fiunt, noua esse vulnera aliqui attestantur, atque antiquioribus ignota, quia nouum sit instrumentum, quo fiunt, cum tamen mihi videatur hoc genus vulnere antiquissimum, atque consequenter antiquis notum esse, cum ipsi antiqui quodam instrumento vterentur, quod catapultam vocabant, qua glandes plumbeas proiciebant, hinc est, quod Celsus libr. 7. cap. 6. de glande plumbea loquitur, & de vulnere ab ea facto, modumque ipsius curandi tradit. Bene verum est, quod non credo, instrumentum illud, quo his temporibus glans eicitur, esse antiquum, sed nouum ac non vnius generis, sed multiplex esse: quoniam aliud est leue, aliud grauius, aliud grauius, quæ etiam nomine vario sicuti & eorum glandes vocantur, quod genus instrumenti vtinam tollatur ex orbe, cum nullum hoc sit instrumentum peius, ac sic subito interficiens hominem. Sed de vulnere ab eo facto agentes dicimus, quod quinq; nobis videnda considerandaq; veniât capita: primo quid sit huiusmodi vulnus, secundo quæ eius causa, tertio quæ differentia, quarto quæ signa, quinto quæ modus curandi.

Quotique ad primum capit, dictum non esse vulnus simplex: quoniam in eo non solum adest solutio continui, sed etiam adest cavititas, & deest caro, ideo est vulnus compositum, quàm rem obseruantes antiqui dixerunt hoc esse vulnus cum contusione, attritione, fractura atque veneno, ideo volunt esse vulnus compositum, & quidem compositum est: nam adest contusio & reliqua dicta, sed de duobus extremis, videlicet fractura & veneno dubium est, an adsint in tali vulnere, cum aliqui velint, quod in hoc vulnere sit exitio, vnde vocant ipsum vulnus exustum variis de causis atq; rationibus mori, & primo quia adest eschara, siue crusta, quæ est proprium signum visionis, secundo adest modus exitionis, qui talis est, vt primo incipiat, deinde sensim ac sensim maior fiat, vnde videtis quod adusta vsque etiam ad nonum diem crescat, vt etiam sit in hoc vulnere, ergo cum visione est hoc vulnus, cum videamus, quod indices magis semper crescit vsque ad nonum, tertio quia accidunt his vulneribus symptomata propria visorum corporum, vt erysipelas vltum & huiusmodi. Quarta ratio est à causa efficiente: quoniam hæc vulnera fiunt ab instrumento ignito, quod est glans plumbea, quæ per maximam attritionem quam acquirit ex violentia, qua ex instrumento eicitur, ignitur: præterea cum ad spatium aliquod eiciatur, atteritur in motu, quem habet in aere, ideo ignitur, quod autem ex aere possit igniri, testis est Aristoteles libr. de celo, & alibi dicens, quod quandoquæ sagittæ plumbæ liquescunt ex aere: ergo hæc vulnera vlti sunt. Quinta ratio sumitur ab ipso effectu, quia videmus in parte anteriori horum vulnere maior esse eschara, quæ deinde sensim ac sensim ad posteriorem partem vulneris desinit, ex quo indicatur glandem esse ignitam, quæ dum primo carnem tetigerit, fortius adurit, & tandem vltra procedens extinguitur à carnis humiditate, & sic leuius adurit. Sexta ratio est: quia hæc vulnera sentiunt & patiuntur eadem symptomata, quæ sentiunt vlti.

Alii vero tenent non adesse visionem nec escharam, quorum ego sententiam teneo & affirmo, & ratio est: quoniam si interrogetis aliquem à sclopeto vulneratum, asseret nullum vnquam percipere ac sentire calorem ab ipso vulnere, imo multos ego vidi vulneratos, atque etiam traictos ab ipsis glandibus, qui vix crediderunt esse sibi solam perforatam cutim: quare cum non sentiant sensum visionis, nec etiam calorem, possumus dicere non adesse visionem. Secundo si huiusmodi glans esset ignita, nonne viret notabiliter quodlibet corpus? quod tamen non facit, cum nec pannos, quibus tegitur vulneratus, vrar: nec tamen credo inesse in ipsa glande vim fulminis illius, quod peculiariter eliquat in marsupio ipso manente illæso, vt Albertus Magnus inquit. Præterea vel valde ignita esset glans vel parum, siue vel visio ista parua esset vel magna. Si valde ignita esset glans, statim dissiparetur in frusta, quod tamen non fit. Præterea si accipitur globulus cereus, & inuoluatur cum stappa, deinde proiciatur ex sclopeto, non eliquabitur, sed adhærebit sic solidus corpori supra, quod proicietur, imo & stappa illa, quæ erit inuolutus illa, sa manebit, ergo globuli isti nec fiunt igniti nec inducunt crustam. Et quando dicunt isti, quod globus ille non incalescit à sclopeto, sed ab aere, dico quod non incalescat ab aere, nec isti recte obseruauerunt: quoniam tanta sit contusio & denigratio in illis vulneribus, quæ facta sunt eminus, & à propinquo instrumento, qualis & quanta fit à longinquo, seu in vulneribus longiori spatio factis, nec vlla est differentia. Præterea

si plumbum igniretur, sequeretur, quod statim percipiens illam humiditatem carnis dissiparetur in gta, ut patet experimento. Præterea si fieret crusta, non daretur, neque fieret fluxio sanguinis: quoniam crusta illa supprimeret sanguinem, videmus tamen in his vulneribus maximas fieri fluxiones, ergo nec eschata nec ystio adest, sed fit quedam contusio denigrata.

*Ad hoc vuln-
eris causa
est remota
propter
hanc.*

Altera dubitatio est, an huiusmodi vulnera sint venenata nec ne. Et dicunt aliqui quod sic, rationibus his persuasi: primo, quia pulvis sclopetorum est venenatus: quoniam habet mixta illa, quæ ratione suæ caliditatis sunt venenata, ut nitrum & sulphur, quæ sunt calida in quarto gradu. Secundo arguunt isti, quod omnes, qui conficiunt pulverem istum, habent præceptum in eo conficiendo, ne comedant allium ac cæpas, quod etiam præceptum est illis, qui timent venenum, ne ista acria comedant. Tercio quia pulvis iste cum ignitur, in motu acquirat quandam malam naturam, ideo fit venenatum vulnus, & inde sequuntur mala symptomata.

Hinc est dicunt isti, quod si globuli isti, dum formantur, extinguantur in oleo, cum sunt igniti, acquirerent maiorem malignitatem. Et hæc sunt rationes affirmantes talia vulnera esse venenata. Sed nisi habeant alias rationes, istæ non concludunt nec probant.

*Rationes in quæ
pervenit.*

Primo, quia plumbum æsetrum, ex quibus fiunt hi globuli, non sunt venenata: præterea sulphur conceditur, & datur in asthma, & aliis morbis, & ego vidi puerum comedissem libram sulphuris, nunquam tamen aliquod incommodum passus est; & in scabie sulphuris usus est frequens, nec venenat aliquem. Nec citæ pulvis iste potest esse venenatus ratione carbonis: quoniam videmus pueros multos comedere carbones absque læsione. Modus præterea componendi pulverem istum nihil venenati continet. Præterea multis insiguntur grana pulveris istius in cute, carne & facie, & ibi sæpe numero consolidantur ac sanantur vlcera permanentibus granis, & aliqui gestant hæc per plures annos, nihil tamen veneni succedit, cum tamen si esset venenatum corrumperet illam partem: imo quando milites ac iuvenes, isti luxuriosi patiuntur vlcera ac caries in pudendis, inspergunt illa pulvere isto bombardico & sanantur. & certe nisi maximum ac tantum excitaret dolorem, esset preciosum medicamentum. Ergo arguitur ex his non esse venenum in pulvere, nec venenata esse vulnera à glande plumbea facta ex sclopeto proiecta.

*Ad rationes in
oppositum.*

Ad rationes vero adductas, quando dicunt isti, in his vulneribus adeste escharam, negandum est: quoniam id, quod ipsi credunt esse escharam, est potius caro confusa, quam vlcus communiter escharam vocetur.

Quando vero dicunt, crescere vsque ad nonam, ut faciunt ystiones, dicatis, quod talis est mos corporis confusi, ut semper increseat antequam separetur, & cadat confusio: id autem quod comburitur, crescit, & ad nonam, & etiam plus & minus ratione corporis, comburetur: at in hoc casu crescit ratione contusionis.

De erysipelate autem dico, quod etiam insequitur aliquando ad contusionem etiam. Ad id vero de sagittis plumbeis eliquatis in aere, dico, quod hæc verba sunt ad Ephesios, & falsum esse: quoniam si hoc esset verum, igniterent etiam nunc, & his etiam temporibus eliquarentur, quod non fit; ergo, &c. Ad quintam rationem dicatis, quod in principio est contusio, in fine vero adest laceratio: quoniam globulus penetrando amittit vires, & in principio est maior resistentia. Ad sextam vero de dolore, dico, quod idem est dolor, ut in combustis. Ad septimam, quod illi, qui conficiunt pulverem istum bombardicum, præceptum habeant, ut non comedant allium nec cæpas, dico, quod hæc prohibent, ut isti dicunt, non ratione veneni, sed ne palatum habeant siccum, cui facile adhereret iste pulvis: ne itaque eis exiceretur palatum & gula, & non, quia susciperent de veneno aliquid, prohibent acria. Colligendum est itaque vulnus hoc esse cauum, confusum non venenatum: non tamen sine mala quadam qualitate putrescibili & maligna ab illa contusione inducta, atque à confusa carne fomentata.

*Causa, species
& differentia.*

Causæ vero horum vulnerum parent, quod prima est sclopetus, mediata tamen, glans autem ipsa immediata. Species etiam ac differentia patent, quia alia ab hoc, alia ab illo sunt instrumento.

Signa.

Signa etiam manifesta sunt, nigredo, confusio, dolor, & quia etiam hoc haberi potest clarum à strepitu pulveris: credo enim, quod nunc sint de pulvere illo, quod strepitum non faciat, falsum enim esse credendum est, posse eodem impetu eici glandem à sclopeto onerato pulvere non edente strepitum. poterimus itaque etiam signum sumere à strepitu pulveris istius. Veniamus modo ad curationem, in qua videndum est primo, an glans sit retenta vel non: si sit retenta, indicat sui extractionem, quæ extractio de-

bito ac certo tempore fieri decet, ac debito instrumento & modo, & ita dicendum est de partibus foricæ, id est, annulis ipsis ac partibus etiam vestis & huiusmodi quæ secum sunt ista glans sæpe feriendo ferre. Tempus autem extrahendi glandem est ipsa ac eadem dies, si fieri potest, qua infixæ fuit: at si non possumus ipsam eodem die extrahere, ego sum istius sententia, quod non debemus tentare extractionem vsque ad septimam, nisi fuerit ipsa glans in summa quiete & superficiei, quia tunc & prima & secunda die extrahi potest.

Si vero lateat in intima parte, non est extrahenda ante septimam, nisi prima die extrahatur: cur autem sic prima die tantum? quoniam in prima die sensus partis est obtusus ac corruptus, vnde extractio fieri potest sine dolore, at in secundo die & reliquis reuiuiscet sensus & periculum est inflammationis, si proritetur locus in extractione, ideo differenda est vsque ad septimam.

Modus extrahendi est, vt semper collocetur æger in eo situ, in quo erat, quando fuit vulneratus: vnde si vulneratus erat eques tempore vulnetis accepi, collocetur in sella equi ad inueniendam glandem: cum autem fuerit inuenta, extrahatur, vel per eandem partem, vel per oppositam, vt monet Celsus loco citato, & ego pluries extraxi, & extrahere sum solitus per partem oppositam quam per eandem.

Instrumenta autem, quibus extrahi debent, plura sunt, alii enim quibusdam hamis seu rampinis vtuntur, alii quodam annulo, alii forcipe ansetino, & rursus aliqui instrumentis alphonfino vocato, quod mihi non disciplet. Aliquando autem opus est dilatazione: ideo in ea facienda syringæ modo solemus vt recentiores autem habent fistulas quasdam, in quibus latent gladioli: imponunt enim gladiolos in syringa latentes, & tandem manubrium eorum stringentes faciunt, vt gladioli è syringa exeuntes vulnus dilatent.

Si autem traiectum sit corpus, aliqui accipiunt acum ferreum, & imponunt filum ex materia aliqua molli, vt bombyce vel simili, & per vulnus traiciunt, vt seruetur rectitudo partis vulneratæ siue vulneris, vt possit educi sanies, aliter intumescuntibus musculis clauderentur meatus illi & non possent egredi sanies, & hoc mihi potissimum placet, quando vulnus penetrat à superficie ad superficiem.

Quandoque vero cum adsit fluxus aliqui accipiunt filum madefactum albo oui, alii vero accipiunt ferrum ignitum, & sic traiciunt vulnus. Ego vero consulens & dolori & fluxioni sanguinis, ratione doloris attendo maxime conuersioni, quæ nescio quid maligni secum ferr. Aliqui autem fluxioni sanguinis attendunt per leuem quandam vstionem infundendo portionem Ægyptiaci puri Mesues, & ego reuera quandoque sum vsus, & cessauit dolor, & inducitur leuis quedam crusta, quod quidem mihi etiam non displicet. Alii vero per oleum calens sanguinem sistant iniectum bis vel ter, & maximo cum successu, accipiunt enim oleum liliorum alborum & calefaciunt, donec candescat, & impositis linamentis bis aut ter tangunt partem vulneratam, donec persentiat calorem, & sic sanguis sistitur & sedatur dolor: aut etiam vtuntur hoc medicamento:

26. capitelli sibi.

theriacæ sibi.

succi solan. hortens. vel sonchi sibi. hæc mixta optime cõseruentur sub sole diebus canicularibus, donec fiat medicamentum, quod imponatur in huiusmodi casu. Aduertendum est tamen, quod eo vti debemus moderate, in quo theriaca additur ratione veneni, sed siue addatur siue non, ego non curo, cum vulnus venenatum non sit, solati vero succus additur, vt retundat vim capitelli. Ego autem vtor oleo chalcanthi, vel Ægyptiaco puro, quod conficio cum albo oui pondere æquali, & relinquo vsque ad alteram diem: tunc postea incumbendum est parti contuse, vt possit auferri. Solent isti vti tetraphatmaco, alii ol. amygd. dulc. alii oleo ex vitellis ouorum, quo illinunt funiculum illum traiectum, alii butyro, alii terebinthina.

Sed ego quædo possum traicere filum, non curo, si hoc vel illo illinatur: si vero non possemus traicere funiculū, vteret semper oleo amygd. dulc. vel de vitellis ouorum: sed quia relaxat nimis ac mollit, ideo admisceo portionem syrupi ros. vel mell. ro. Cum autem videritis crustam esse ablatam, vtamini his, quæ carnem gignere possunt, atq; deinde etiam cicatricis inducere valent. Si vero transacta septima non extrahatur glans, & adhuc permanserit & sentiantur adesse, tunc ego nro dilatationem vulneris cum medulla milii nigri, vel cum spongia vel alia re simili. Vulneri autem dilatato extraho glandem. Si vero post septimam non sentio glandem, neq; ego rento amplius extractionem, sed agglutino, & si mundum sit vulnus, ipsum comprimō fascia vel plumaceolis superposito barbaro.

In vulneribus autem bombardarum sæpe non datur locus neque tempus medendi, sed quid sit spes, secetur pars, & imponatur Ægyptiacum, ne succedat gangrena, & sic Ægyptiacum quod habeat chalcanthum: & ideo vos moneo, ut hoc vitamini, donec induatur eschara: quia ibi quandoque adsunt magna vasa, quibus dilaceratis fit magna fluxio sanguinis: ideo opus est valido etiam medicamento. Facta sufficienti crusta vitamini tetrapharmaco ac concoquentibus, ut eschara cadat, & tandem procedatur cum illa cura, quam sanantur reliqua vulnera, ut dictum est superius. Et hæc facis sint dicta de omnibus vulneribus cum vniuersalibus tum particularibus.

FINIS TRACTATUS SEPTIMI,

DE VULNERIBUS.

GABRIELIS FALLOPPII MV- TINENSIS MEDICI AC PHILOSO- PHI PRÆCLARISSIMI, DE VULNERIBUS

PARTICULARIBUS.

TOMI II. Tractatus VIII.

De Tinea.

CAP. I.



VETERES chirurgi, ut Haliabbas, Guido ac Ioannes de Vigo de tinea scribere, enumerantes tantum aliquot eius species, quarum primam melleam vocarunt, eo quod ex ipsa emanans humor similis sit mellis. Secunda species ab ipsis vocatur ficiosa, quia continet materiam similem granis fici, de qua loquitur Paulus lib. 3. cap. 5. Tertia species vocatur humida vel aquosa, quæ est tumor ulceratus tenuissimis foraminibus, ex quibus egreditur humor aquosus. Quarta vocatur ruberosa, quæ est genus tumoris ac referens figuram papillæ, & est tumor cum rubore cutis, ex quo emanat humor sanguinis similis. Quinta species vocatur lupina, eo quod habeat similitudinem cum seminibus lupini. Sexta vocatur furfuracea, quia squamas habet similes furfuribus, de qua institutum nostrum est loqui, cum sit ea, quæ ut plurimum gra-
satur.

Est ergo tinea furfuracea vlcus capitis rubicundum, quandoque siccum, quandoque humidum & emanans & habens frusta & squamas crassas, & plerumque est cum capillorum desuoluto: de qua loquitur Guilelmus Placentinus chirurgus, & nullus alius inter modernos. Galenus vero eam vocat *ἐξέρχουσα* capitis, & Paulus etiam, ac veteres Græci *ploram* vocant, Avicenna vero *sapharum*.

Causæ autem furfuraceæ tineæ sunt humores quandoque tenues, & aliquando crassi, qui faciunt cortices crassos; interdum solet esse ulceratio capitis, quæ facta sit scalpendo ungibus, quam exulceratione sequitur fluxio. Quandoque vero sordes propter raram capitis lotionem, in cute capitis existentes solent esse causæ huius tineæ furfuraceæ, sed plerumque contagiū est in causa huius tineæ.

Signa vero sunt crustæ capitis crassæ velut cortices, quæ quandoque sunt inæquales, & tunc hæc inæqualitas crustarum est signum non confirmatæ tineæ: aliquando vero æquales sunt & sunt signum confirmatæ tineæ.

Curatio semper difficilissima est, & quandoque etiā impossibilis. Tinea autem confirmata hoc efficit, ut plerumque elephantiasin inducat. Methodus tamen curandi tineam hanc est, ut primum euacuetur materia, deinde locus corroboretur, & deum effluens materia prohibeatur. Quando tamē provenit tinea ob sordes vel contagiū, non fit multa fluxio. Si ergo sit tinea eum fluxione, primum euacuandum est corpus cum pilulis cochiis, vel pilulis de fumo terre. Post purgationem autem totius ad capitis euacuationem deueniendum est per masticatoria, mandendo mastiche vel pyrethrum. Facta capitis euacuatione ad loca procedendum est, quæ habeant vim inieciendi & alterandi materiam, ut in hallitum verratur, quæ præterea discutiant & repellant. Sed quoniam aurescenda est ipsa crusta,

sta, & vt auferatur, prius emollienda, ante omnia auferendi sunt capilli non tonsura neq;
pilotro, sed pileolo intincto pice nauali. Facta hac auulsione capillorum deueniendum
est ad emolliuionem crustæ hoc modo, vt ipsa optime emollita sensim, ac sensim cadat: emollienda autem est ablutioe & inunctione: ablutioe quidem, si sæpe ac sæpius abluatur caput lixiuio tonforis, deinde hoc decoctio: ʒ. ss. melliloti, chatomillæ, fol. maluz, *Crusta circa*
rad. altheæ, chelidoniz maioris an. M. j. sem. fenugr. sem. lini an. ʒj. misce, & decoq. in *plumbea emollienda.*
lixiuio, quo deinde abluantur crustæ. Post ablutioem autem siccantur ipsæ crustæ, & *Emollita crassa.*
deinde inungantur hoc linimento: ʒ. pingued. gallinæ, anseris, vrsi, butyri an. ʒ. ss. ol. lil. alb. ʒ. ij. misce, & hoc inungantur crustæ vsque ad eorum casum, qui ad summum erit in-
fra quatuor dies. Cum autem deciderint crustæ, abluatur caput & exiccetur optime, post-
ea fricetur ac scarificetur, aut applicentur hirudines aliquot, post medicamentum hoc ap-
ponatur: ʒ. niri ʒj. oxymell. ʒ. j. ss. misce. Possunt etiam crustæ vel caput fricari hoc me-
dicamento: ʒ. alum. ystu ʒj. aceti q. s. misce & fricetur. vel: ʒ. salis ʒ. ss. aceti scillitici q. s. misce.
At quoniam plerumq; apud infantes fit morbus quidam capitis squamosus, qui lactumen
siue lactimen vocatur, differens a tinea, quoniam lactumina sequuntur ætatem infantium,
præterea in lactumine nunquam cadit pili, ac etiam crustæ inæquales sunt & colore sub-
uidentes in tinea vero crustæ sunt albissimæ & capilli cadunt in quacumque parte vlcerat-
as & si qui extrahuntur, apparent radices eorum crassæ ac redundantes humore quodam
viscoso conspissatoque ideo distinguendum est an sit tinea vel lactumen, & aduertendum
maxime, ne lactumen pro tinea capiatur.

Cum itaque superata erit tinea supradictis medicamentis, cognoscetur primo, quo-
niam cutis fiet æqualis, secundo reddetur pura ac munda; si vero hæc non apparent, post
dictorum vsum repetenda, ac replicanda erunt medicamenta ac auxilia priora, vt est ca-
pillorum euulsio, squamæ detractio & materiæ venenose vel scarificatione, vel hirudini-
bus educio. His autem peractis consolidanda sunt vlcera abstergentibus & siccantibus
medicamentis, qualia sunt hæc: ʒ. pingued. sullæ, ol. sem. lini, ol. lil. alb. an. ʒ. ss. myrrhæ ʒ. j. ss.
cineris chelidoniz quantum sufficit, misce omnia in mortario ad consistentiam vnguen-
ti mediocris, & eo inunge locum vlceratum bis in die, vel hoc alio simili vtere: ʒ. lardi
veteris lbj. ss. olei laurini ʒ. ss. oculorum populeonis, fol. fabinæ an. M. j. tritis terendis opti-
me misceatur, ac per tres dies macerentur, deinde adde aceti acerrimi lbj. bulliant vsque
ad aceti consumptionem, & his inungito locum.

Cum autem quandoque tinea his superari non possit, ideo deueniendum est ad for-
tiora iuxta veterum descriptiones, cuiusmodi est medicamentum illud, quod vocatum est
troicisci de charta combusta, vel deueniendum est ad vesicatoria, vt est hoc: ʒ. cantharid.
purgat. ʒ. ij. sulphur. ʒ. ss. myrrhæ ʒ. j. ss. mellis, aceti an. quantum sufficit, misce, fiat vesica-
torium, quod extentum in petia capiti applicetur, ac tam diu duret & maneat, donec vesi-
cas excitet, quibus materia copiosa educatur. Post casum autem vesicarum deueniendum
est ad vlcera consolidanda per ea, quæ superius dicta sunt.

Tinea vero humida illa dicitur, in qua squamæ aut crustæ non sunt, ad sunt tamen
cætera omnia symptomata dicta in squamosa tinea, vt sunt capillorum defluxus ac exul-
ceratio & huiusmodi. Curationis autem methodus huius tinea talis est, vt prius corpus
purgetur, deinde materia à capite per masticatoria euacuetur, vel per apophlegmatismos
dictos, deinde superficies tinea exiccetur, & si leuibus non cedat, ad fortia necessarium
est accedere, vt sunt troicisci Andronis; vel ad medicamenta alia, cuiusmodi est hoc: ʒ.
scoriz ferri, eretz, aceti an. q. s. misce & inunge caput. Troicisci etiam de charta combusta
valent in hoc casu, vel vesicatoria.

Sanato autem capite ac cicatrice obdusta curandum est, vt pili renascantur, pro
quo ablundum est caput sæpius cum lixiuio, in quo decocta sint varia medicamen-
ta, quorum sylum ex variis autoribus colligere potestis. Si autem confirmata sit alope-
cia, illius medicamenta non sunt, quibus vinci possint, & hæc de tinea sufficiant.

De affectibus aurium, videlicet de destillatione, de vlcere, de purulencia, putredine,
vermibus, carne supercrescente & ossis corruptione.

CAP. II.

Purulentæ sunt ac dicuntur aures, ex quibus materia emanat, quæ quidem materia aut
continetur in canali ipsius, aut in auricula ipsa cum partium vlceratione, quod vt plu-
rimum infantibus euenit ac succedit. Excremeta autem illa, quæ effluunt, sunt excremen-
ta.

ta materiz, ex qua formatus est infans. Quare cum hoc modo vicerantur in infans aures, ita ut fluat aliqua materia ex ipsarum canali, non est statim sistenda, sed investigandum est, an fluxus ille sit sine vlcere, vel cum vlcere, ex signis, quæ mox dicentur.

Signa vlceris in auri.

Si itaque erit vlcus in auri, materia manabit saniosa, rubore aliquo intincta: secundo factior magnus erit ratione putredinis: tertio cognoscitur per impositionem bombycis cum stylosi enim bombyx sanguinem tingatur, certum est vlceris signum: quarto, si dolor insignis aderit.

Secundo non si signa auri sunt.

Signa vero contraria vlcus non adesse significant, & tunc sistenda non est fluxio, quoniam materia illa fluens deuenit a capite, & natura per canalem aurium tentat eam expellere, quæ si intercipiatur ac prohibeatur, eius euacuatio multa poterit infirmo afferre incommoda: Acrius autem in his vlceribus solet instillare medicamentum prohibentia fluxionem, ut sunt gallice, mysi, alumen & reliqua huiusmodi. Sed ego sum huius sententiz, ne fiat fluxus hæc in infantibus, sed adhibeatur maxima diligentia in expurgandis foribus auriculæ, ne materia compacta euit auri exulescat, ea autem, quibus abluenda erit auricula intincto bombyce dicentur infra. In adultis vero sunt huiusmodi affectus propter defluxum materiz a capite, & tunc est cura necessaria, quoniam natura pellit materiam catharralem existentem in capite per canalem auri, tanquam per viam excrementa corporis excipientem, sed in aliud locum diuertenda est hoc pacto. Primo torum surgitur, ac etiam optime caput euacuatur per nates & per palatum, præterea deriuationes admoventur, ut cauteria in brachia: deinde ad locum affectum deueniendum est cum medicamentis propolis ab antiquis, quorum quedam instillantur, quedam vero insperguntur: & hæc diutius inoram trahunt in loco cui insperguntur, unde magis operantur: instillata enim facile fluunt. Antiqui autem faciebant pulueres ex adstringentibus & siccantibus robustissimis: sed in his aduertendum est, ne robusta illa sint repellentia, ne suppriment materiam statim fluentem ad locum. Antiqui autem solebant accipere gallas, cortices mali puilici, alumen, myrrham & hypocythidem, hæc simul imponendo in linleo & exurebant, deinde puluerem conficientes ipsum in purulentam auriem inspergebant, ubi tamen non adesse vlcus, hoc modo: ℞. fol. absinthii, ros. scabiosæ, agrimoniz, gallarum ana. ad libitum, vini q. f. Misce, fiat decoct. qua abluatur vicerata auricula non existente, postea inspergatur cum pulueribus prædictis.

Totum de capite purgatum.

Tractatio lvi.

Si non adfuerit vlcus.

Infans vero si habeat purulentas aures, magnam vitendum est diligentia in his purgandis: eo tamen modo ne fluxus aurium sistatur, sed id medicamentis leuioribus fiat, ut est illud descriptum à Paulolib. i. cap. 7. vel vino mullto aut decocto betonicæ, & aliquando aqua stillaricia ipsius, quæ vim habet detergendam absque mordicatione & adstrictione hoc modo: ℞. mellis, myrrhæ ana. Misce, & per alembicum educatur aqua, qua abluantur aures, hæc enim detergit & siccatur moderatissime: aut etiam abluatur auris lotio puerili calido, canalis ipsius scilicet.

Quod modum auri sunt purulentæ. Causa purulentæ.

Fiunt autem purulenti meatus aurium aut simpliciter aut cum vlcere, vel cum vermibus aut cum carne superflua, aut cum osse corrupto: Horum autem omnium cause sunt aut declinatio acris declinans ad canalem auri, aut inflammatio suborta, ad quam succedat abscessus, aut aliquod instrumentum impactum vel infixum auribus. Si itaque fiunt purulenti canales auriculæ, ratione destillationis aut ratione inflammationis, incipienda est curatio vniuersalis, ut scilicet torum prius purgetur, deinde ipsum caput. Postea vero sunt abstergenda cum his quæ sunt abstergentia atque siccantia sine acredine parti affectæ applicanda: nam si quæ est pars, quæ robustissimis indigeat siccantibus, est auricula, quoniam omnes illæ partes, quæ obsecrum habent sensum, talibus medicamentis indigent, non tam sunt acris. Talia autem sunt glaucium, opium, acetum, spodium, myrrha & sarcocolla: hæc enim omnia habent vim siccandi & detergendi, & in summa tota curatio consistit in metallicis, ut est bistriges, cadmia, tutia Alexandrina. sed hæc omnia lota sint. Ac cum his uti vult aliquis, semper cum aceto misceantur vel passo, addito momento pulueris olibani aut myrrhæ.

Medicamentum recentiorum.

Si accidit purulenta mater.

Recentiores autem hoc habent in vsu: ℞. pomum granatum dulce coctum in vino, & exprimat succus, deinde adde ipsi mel rosatum & terebinthinum cum paucis oleo. fiat medicamentum, quo vtuntur in hoc affectu satis felicit. Cum autem sæpe accidat, ut in hoc affectu putredo fiat, tunc ideo hoc erit agendum, ut scilicet accipiantur troisci Andronis vel Musæ, qui dissolui in aceto aut passo putredini applicentur. Recentiores vero vtuntur Egyptiaco vel præcipitato, cum melle rosato tamen. Cessante autem putredine deueniendum est ad curationem per medicamenta supra dicta. Quandoque vero vlcus auriculæ fit cum vermibus, qui plerumque nascuntur ratione superabundantis humiditatis.

De vermibus aurium.

miditatis, quæ cum putrefacta fuerit incalefcens modicum vermes generat, qui satis magni fiunt. Cognoscuntur autẽ vermes quandoq; visu ipfo, si tamen fit canalis auris latus, at quandoq; ex relatione infirmi cognoscuntur, quia ille motum sentit & corrosione, quandoq; vero eosdem cognoscere possumus immisso stylo in auriculam, ac stylum ipsum hinc inde mouẽdo, si enim ad sint vermes, exagitantur, ac infirmo dolorem maximum parant. His autem cognitis exponatur auris soli, vt dilateur speculo canalis, deinde vollella capiuntur vermes & extrahantur. Sed quoniam actio hæc fit cum magno dolore, præcipue si vi extrahuntur vermes, ideo melius erit, eos prius interficere procedendo cum illis medicamentis, quæ sunt amara ac vim siccam obtinent, vt est succus polii montani & succus absynthii, quæ liquida sunt in auriculæ canalem instillanda. Interfecti autem vermes modo deinde dicto sunt extrahendi, postea ratio vlcæris curandi eadem sit, quæ supra dicta est ac posita. Si vero fiunt hæc vlcera cum carne supercrefcente, quæ polypus aurium dicitur, ratione nimis humiditatis, curatio est, vt auferatur medicamentis exulcerantibus, vt sunt myli, chalcanthum, alumen, ægyptiacum compositum cum chalcantho. Aut formetur fistula plumbea, in quam possit ingredi illa caruncula, deinde ℞. ol. chalcant. aut sulphuris, & in eo madefactum gossipium carni applicetur: quoniam hic modus optimus est, non possunt enim subiectæ particulæ lædi à medicamento exedente. vel etiam eidem carni applicetur præcipitatum mixtum cum alumine. Ablatâ vero carne, obducatur vlcus cicatrice. Si vero fiat vlcus cum osse corrupto, quod visu quandoq; cognoscitur, quandoque veroper odorem, qui percipitur expurgata auricula, quoniam pessime foetet: tertio cognoscitur ex sanie egrediente nigra ac fetida: vltimo cognoscitur specillo argenteo imposito, statim enim specilli color immutatur, vel ad nigrum vel ad plumbeum aut etiam ad purpureum, quare in hoc casu hoc modo procedendum est. primo danda est opera, vt os corruptum educatur, quod primo fit per sectionem factam supra os dilatando plagam, deinde os scalpere oportet, aut deueniendum est ad medicamenta remouentia os corruptum, vt est oleum chalcanthi vel oleum sulphuris. Quod si non succedat hæc ratio, tunc ad vitionem veniendum est, quæ erit ac fiet iuxta præceptum Archigenis, vt si erit faciendâ in parte anteriori auriculæ, tutissima esse potest. Si vero in superiori parte auris os sit corruptum, tunc caute procedendum est, ne communicetur nocuentum vitionis auriculæ ipsis. Facta autem exustione, abradendum est os, & vlcus cicatrice obducendum, vt diximus; obseruando tamen, ne meatus auditorius carne obducatur, quoniam sic æget fieret surdus, ideo vt hoc euitetur, fiat fistula parua plumbea, quæ semper imponatur canali auditorio obducta vnguento de thutia vel alio aliquo simili, ac eam detinendo, donec consolidetur vlcus. Et hæc de affectibus vlcærosis aurium.

De Vlcæribus oculorum, cum in vniuersali, tum de omnibus eorum speciebus, de inficiis in oculis, & de fluxione. CAP. III.

Omnia oculorum vlcera deueniunt aut ab intemperie constituta, aut à causâ procatartica: omnia tamen curatu sunt difficillima variis de causis: primo ratione motus oculorum, qui facit curationem difficillorem: secundo ratione sensus exquisiti, qui nec leuia tolerat, nec etiam acuta, vnde oportet oculis læuigata applicare ita, vt sensu vix percipi possint: tertio sunt difficillia ratione nobilitatis & præstantiæ partitis, quoniam oculi constant arteriis, venis, neruis ac membranulis, quæ faciunt nobilitatem particulæ. Harum autem partium vlcera quædam maligna sunt, quædam vero benigniora, quæ etiam distinguuntur in aliquot species: nam quædam angusta & profunda sunt, quædam vero lata & superficialia, quædam autem lata ac profunda cum procidentia vix membranæ.

Prima autem species à Græcis dicitur *βλυστα*, à Latinis fossula, à Serapione bathion, & est vlcusculum profundum, patuum, angustum siue arrectum, consistens in cornea & præcipue in illa parte, in qua nigrum oculi continetur habens puncti angustiam. Secunda species vocatur à Græcis *καύματα*, à Latinis vero cauitas, ac etiam cucumer, & in cornea. & est vlcus paruum sine sorditie, & cauum, non tamen ita profundum vt fossula, & accedit vsque ad tertiam laminam corneæ: quoniam cornea habet laminas, quæ connumerantur sic: prima, secunda, tertia, & quarta ex hac enim distinctione inuenire possumus vlcærum differentias: quoniam in fossula pertingit vlcus ad quartam laminam, in Kslo mate vero ad tertiam tantum laminam deuenit vlcus. Tertia species vocatur epicauma ab Aetio, & fit in albo oculi ac in parte corneæ, aliquando tamen in oculi albo inuenitur & fit vlcus sordidum, ac habens escaram siue crustam, fitq; etiam dolorosum, profundum ac erodens sensim partes adiacentes, & vocatur à Latinis adustium vlcus: à Serapione vero alcumpe,

4. Fiant etiam vlcera quædam in oculorum parte superficiali, quorum prima species vocatur ab Aetio tuberculum, à Serapione vero Alufine, ab Auicenna Catamus, & est vlcus in parte nigra oculi, estque proprium vlcus corneæ, non profundum sed latum tantum superficiali oculi exulcerans, coloris subnigeri, visionem etiam auferens. Quinta species dicitur ab Aetio Nephthio, à Serapione verò diaphilon, & est vlcus proprium corneæ aliquantisper profundum, tamen inter lata vlcera connumeratur & coloris est subalbidi.
5. Sexta species vocatur ab Aetio Archemon, à Serapione vero Algimen, ab Auicenna autem interprete coronalis vocatur, quia fit in corona iridis, & est vlcus non proprium corneæ nec albæ membranæ, quia utramque occupat, & eius duo sunt colores, alter rubicundus, qui fit quando occupatur corneus, alter albus, quando occupatur album oculi, fit etiam vlcus hoc latum profundumque.
6. Septima species vocatur ab Aetio epithauma, quæ differt ab epithauma Pauli: nam epithauma Pauli est vlcus profundum, hoc vero Aetii latum, & à Serapione vocatur althase, & est effectus similis lanositati: quoniam eius locus videtur quasi flocci lanæ impacti oculo & à recentioribus vocatur ramosa exulceratio, ab Auicennæ autem interprete lanosa seu adustiva species vlceris, & est vlcus proprium nigræ partis oculi, quæ est cornea. Fit autem in hoc vlcere superficies partis inæqualis, ut appareat in membranis re aliqua acti perfusus, ut esset lixiuium, ex quo sapo conficitur. Videtur species horum vlcerum est, quando ita exulceratur locus, ut etiam substantia ac oculi ipsius contenta exeant, & vocatur vlcus cum procidentia vuez, & huiusmodi vlceratio fit aut in pupilla oculi aut in ipsius iride: si fiat in pupilla, fit cum egressione humoris aeris, ac etiam cum visus corruptione. Si autem in iride fiat incipiendo à parte interiori aut exteriori depascit & exulcerat lamine corneæ, quibus per exulcerationem à latari sequitur procidentia vuez, & hæc vlceratio dicitur prothesis, quando verò tota corneæ membrana exit, egreditur humor albus oculi.

Est autem duplex procidentia vuez siue prothesis ipsa; altera quando totus oculus elabitur ex sua sede, de qua Aetius lib. 7. cap. 2. 4. altera vero, quando ipsa tantum vuez procidit, de qua Paulus & nos hic tractamus. Hæc autem procidentia fit quatuor modis, primo quando elabitur in paucam quantitatem, veluti caput muscæ vnius, & tunc dicitur myocephalus. Signa autem eius sunt tuberculum nigrum vel cæruleum in circui albedinem habens, ita ut candida sint vlceris ipsius labia. Quandoque verò sunt callosa labia vlceris, semper tamen ab vlcere corrumpitur habitus pupillæ; & hac ratione quandoque elabitur vuez per vesiculas quasdam, quæ (vesicula) cognoscuntur: quoniam in illis non corrumpitur pupilla, nec eorum labia sunt alba neque callosa, neque per ipsas corrumpitur visio ipsa, quemadmodum in myocephalo, color autem vesicarum fit niger, non tamen est secundum caput muscæ. In hoc autem affectu Arabes diligentissime notarunt has differentias, primam formicalem, secundam muscalem, tertiam granalem: omnes tamen hæc prominentiæ sunt parvæ, quarum tamen in prima formicalis dicitur, maior vero muscalis, ac maxima granalis; quartam vero vesicalem dicunt omnium maximam. Secundo modo accidit, ut vuez promineat, ac procidat ex oculo propter affectum illum, quem Græci vocant *επιβλεφαρις*, quod duplex est, quorum primum ab Aetio describitur lib. 7. cap. 2. 5. quando eroditur cornea, & propter eius erosionem egreditur tota vuez alterum est, quando pars tantum aliqua vuez egreditur. Tertio modo fit prominentia vuez propter symptomata illud, quod dicitur malum: quoniam mali magnitudinem præ se fert vuez in hoc casu; & cognoscitur hoc genus: quoniam in eo palpebra claudi non potest, & vocatur ab Auicenna vesicalis oculi affectus: quoniam videtur quasi vesica magna.

Causa autem horum vlcerum quandoque sunt tuberculum & pustula ortæ in oculo & eadem male curata, quandoque causa est fluxio humorum, quæ facit protuberationem & ophthalmiam seu oculorum inflammationem. Præ sagii vero ratio habenda est, ita ut nunquam proponatur certa spes salutis: quoniam semper difficilis est actus, & quandoque omnino impossibilis.

Curatio autem hinc est auspicanda, ut primo conspiciamus, an causa præsens sit, & an vlcus factum sit ab internis vel ab externis. Si enim causa sit præsens, ut si aliquid impactum sit oculo, statim remouenda est per extractionem infixi: sæpe enim incidunt in oculos, vel paleæ, vel grana, vel puluis & huiusmodi. Si autem impactum sit corpus durum, auferatur hoc modo, primo claudatur oculus sanus & læsus remaneat apertus: quoniam tunc illud corpus impactum oculo sensum prouenit cum lachryma ad angulos ipsius oculi, & sic tunc extrahi potest, ac extrahatur. Secundo modo potest hoc extrahi, si accipiat palpebra superior oculi læsi & trahatur inferius: tunc enim fit res impacta oculo ipsius palpebræ pilis adhæreat, & sic conspiciæ ac facile extrahi possit. Sed quoniam quandoque

adeo impinguntur res oculo, vt his modis extrahi non possint, ideo nunc Medici accipiunt quosdam lapillos, qui nascuntur in fundo fluminis ciuitatis Gallie Granopolis dictæ, & hos imponunt sub palpebra, & sic felicissime res succedit, vt illa, quæ sunt impacta exeat. Si vero fortissime oculo impacta sunt corpora aliqua, tunc ad detergen tia deueniendum est, vt est multa infusa; sed ego in tali casu hoc vtor medicamento atq; familiari admodum remedio.

℞ mucilag. fœnugr.

psyllij an. ʒ. ss. misce, & coque ad spissitudinem, & huius gutta in-

fundatur in oculum, quoniam maxime succedit. Si vero impacta fuerit oculo calx vel cinis vel aliud simile, tunc in tali casu sic procedendum est, vt contemperetur qualitas ipsoru hoc pacto: abluatur oculus copiosissima aqua, deinde affundatur mucilago psyllij. Aetius vero iubet affundi copiosum oleum, sed quoniam facit dolorem, ideo magis eo laudo mucilagines.

Abluto iam oculo primum claudatur palpebra ipsa, deinde lana intincta in rosaceo ponatur super clausam palpebram ad prohibendam inflammationem; & quamuis lactuca sit oculo inimica, attamen ipsa calce præcipue existente in oculo optimum ex remedij. Sic etiam albumen oui, & oleum rosatum ductum in mortario plumbeo in hoc in adfectum gossipium imponatur oculo. Generale tamen præceptum est, vt semper secetur vena, si atas & virescunt, deinde ad alia deueniendum, vt ad syr. sol. Si autem acetum fuerit oculo impactum, statim aqua copiosissima iniciatur cum magna vi ac impetu in oculum, sed omnia alia, quæ faciunt pro calce, faciunt etiam pro aceto.

Si autem a fluxione fiat vlcus, tunc Aetius lib. 7. c. 15. iubet nos esse diligentes in coercenda causa, quæ est ipsa fluxio, vt dicam in sequenti capite.

De Cura fluxionis facientis vlcus in oculo. C A P. IV.

Si vlcus oculi prouenit a fluxione, tunc iubet Aetius in lib. 7. ca. 15. quod sumus admodum diligentes in coercenda ipsa causa, fluxione scilicet, quæ quidem coercetur per institutionem victus ratione. In omni enim vlcere oculorum facto ab humoribus debemus tenuissimum vti victui. Aer etiam multum habet vim in his viceribus, quoniam sunt quædam loca quæ habent adeo putissimam aerem, vt ipse solus satisfaciat pro cura vlcis. Morus quoque ratio habenda est in corporibus laborantibus viceribus, his oportet. n. vt tales infirmi sedendo circumducant aliquid cruribus, vt esset rota figuli, vt corpustantum & inferiores partes moueantur, non autem caput. Frictio quoque & lotio frequens partium inferiorum maxime facit hoc modo: ℞ lactucæ, rad. salicis, florum ros. capitum papau. albi an. q. s. decoq. & hoc decocto crura lauentur. Sternutatio v. & clamor magnus fugiantur, neque æger vnquam cap. deprimat aut cõprimat. Somni quoque habenda est ratio, vt longus non sit nimis, sed potius repetatur sæpe, iaceat tamẽ æger supinus, vt fiat retractio materie ad partem posteriorem. Faciunt quoque est habenda ratio, quoniam si costringatur aluus, augentur vapores ad caput; ergo sæpe vitendum est clysteribus aut leniente aliquo medicamento. Venus fugiatur animiq; affectiones. Dieta vero instituitur contemperans corporis habitum. In omni autem vlcere oculorum, vt aliquid magnum vel maius malum impediatur, secunda est vena vel in brachio, vel in malleolis, & imponantur hirudines mariscis: præterea posteriori parti capitis ab asis pilis applicentur cucurbitulæ, & post ipsas imponantur hirudines, & deinde post aliquod spatium applicentur etiam hirudines post auricularas, & educant copia magna sanguinis; quoniam nullum erat periculũ: aluus etiã subducatur: postea veniendum est ad pharmaca soluentia, quæ tamen non sicca sint sed humida, vt est cassia vel syr. ros. sol. cum quo cætera sunt semper miscenda. Sicca autem fugienda sunt ac catapotia, quoniam ista diu contenta in ventriculo emittunt vapores, qui ascendentes offendunt oculos infirmos, non admodum laudantur in hoc casu, quamuis multi his vtantur. Peractis autem his caput euacuandum est, cuius euacuatio fit tripliciter: primum per medicamenta masticatoria, secundum per attracta per nares: tertio per vesicatoria. Quoad primam rationem, sunt mastiche & terebinthina: hæc enim masticata in ore spumum ac saluam ciunt; sed huiusmodi medicamenta nostris non placent, quæ s. mansa sputum ciunt, quoniam in masticatione musculus temporalis cū aliis venis multum agitur, ex qua agitatione postea magis irritatur fluxio & attrahitur ad locum affectum. Si tamen deueniendum est ad educationem saluæ vel retrahendum fluxum, illis vitendum est, quæ non per masticationem, sed sua virtute sponte eiant, vt est Pyrethrum, staphylagria, & huiusmodi: hoc tamen seruato in educatione sputi, ne vtamur odoratis, vt est Zingiber & caryophyllus,

Si calx vel cinis oculo impactum.

Generale præceptum in oculorum viceribus.

Vitum.

Aer.

Morus & ratio.

Somnus.

Alii lenis.

Venus & passionis natura.

Capitis euacuatio quæ modis fit. Masticatoria.

quoniam inflammarent oculos. Secunda ratio euacuandi capitis est per nares, quam rationem solent etiam nostri timere, quoniam locus est propinquus oculis: præterea cauendi est ab omnibus illis, quæ prouocant sternutationem, quoniam ipsis maxime irritatur fluxio: videndum ergo est errhinis non cientibus sternutationem compositis ex omnib. succis acribus, neq. sunt illinendæ nares in partibus superioribus, sed inferioribus ac infimis.

Errhina.

Vesicatoria.

Tertia ratio euacuandi capitis fit per vesicatoria, quorum apud autores diuersos varia est etiam compositio. Ego tamen habeo aliqua mihi familiaria & feliciter succedentia, quorum primum constat ex substantia cantharidum, aliud ex flammula lousi vel ex foliis elemtitidis alteræ: contusa enim herbarum folia applicantur, post quorum foliorum applicationem vesicæ durant per octo dies.

*Cantharida
quæ modicè
sunt in her-
bas.*

*Quædæ nō
conueniunt
cantharida.*

*Medicamē-
tum pungen-
tissimum super
scuturum
panni.*

*Puluis ad-
stringens.*

*Medicamē-
tum adstrin-
gens pos-
sum.*

*Tribularia
vicia.*

Si autem his rationibus fluxio non auertatur, deueniendum est ad appositionem cauteriorum in posteriori parte colli. Quæ cauteria sunt dupliciter: vno modo cum setone, altero vero cum caustico. Sciendum tamen est, quod quando fit obstructio nervi optici, non sunt tentanda huiusmodi caustica, quoniam nihil aliud afferrent nisi passionem infirmo & dolorem, in aliis vero intrinsecis passionibus, vel, ut melius dicam, fluxionibus, per hæc tentanda est euacuatio. Peracta autem tali euacuatione deueniendum est ad ipsum locum affectum hoc modo curando, primo constipandæ sunt venæ coniuncto ut prohibeatur fluxiones, ad quod efficiendum empirici habent in vso scutetum vocatum, q. est frustum panni vel corii magnitudine vnius scutati, in quo imponunt medicamentum adstringens & siccatum, cuius materia est pix naualis & colophonias an. q. f. postea commiscet quartam partem pulueris adstringentis, qui conficitur ex sanguine draconis, bolo armena & ceteris huiusmodi, & cum gutta terebinthinæ efficiunt medicamentum quod applicant super supercilium loci affecti.

Ego autem vtor medicamento habente vim adstringendi ac spissandi ipsum frontiam temporibus applicando; neq. laudo in hoc casu albumen oui in hoc casu applicatum cum lana vel alia re molli, quoniam dum siccat, maxime attrahitur: quare fiat hoc unguentum, q. sepius remoueatur ac iteretur neq. in loco permittatur ad exiccationem usq., & fit hoc modo:

℞ ol. ros.

viol.

citon. an. zij

bol. orient.

terr. sigill.

sangu. drae.

puluer. ireos an. ℥ij misce, tritis terendis tamen antea.

Post hoc autem deueniendum est ad vlcus: circa quod obseruandum est, an vlcus fordidum sit nec ne: si enim fordidum non est, sunt ei imponenda medicamenta siccantia, tenuia ac suauia, qualia sunt medicamenta metallica optime præparata, ut cadmia, thutia Alexandria, cerussa, scoria plumbi, lichargyrum, stibium siue antimonium: Cum his tamē sunt miscenda medicamenta vim habentia sedandi doloris & leniendi siccitatem metallicorum: talia autem sunt apium, mucilago psyllii, albumen oui, gummi quodcumq. aqua dissolutum. collyria etiam antiquorum optima sunt, ut est collyrium libianum vocatum, Astor, pepron & c. quæ describuntur à Paulo, Galeno & Aetio. In nostris etiam officinis est collyrium syeph album sine opio vocatum. Sed notandum est, quod antequam his vtamur, prius in cute fricanda sunt, vt fiant subtilissima & tunc oculo imponantur iuxta necessitatē. At si fordes affuerint, tunc cum collyriis admiscenda sunt medicamenta abstergentia, vt est decoctum fenugreci, non autem mucilago, quæ fit ratione corticis: decoctum enim fit ratione medullæ grani ipsius. Si autem opus sit robustiori, vt possumus succo oleoxelini. Si vero robustissimum requiratur, accipi potest mel crudum. Habetur etiā in officinis syeph de thure, q. etiam abstergit. Facta autē expurgatione deueniendum est ad puluisculos supra descriptos, deinde vlcus pertractetur procedendo cum medicamentis habentibus vim exiccandi cum aliqua adstrictione, inter quæ sunt collyria antiquiora, vt est illud, q. vocatur collyrium Cleonis. Sed notandum est circa vsum horum medicamentorum, vt statim imposito medicamento oculus claudatur, deinde supra clausam palpebram imponatur medicamentum cum gossipio inflammationē coercens, vt est posca, vinum adstringens & similia. Si autem infirmus non poterit pati gossipium, imponatur ossa panis humectata in prædictis medicamentis.

Collyria.

*Si vlcus sit
fardidum.*

De reliquis vlcum oculorum speciebus.

CAP. V.

Cum autem proeidentia vix tunice habeat quatuor species ut dictum est, quarum duæ vocantur maiores, altera quarum possumus dicitur, reliqua vero chilos, q. non curatur per phar-

maciam,

maciam, sed per chirurgiam; sciendum est, quod reliquæ dux, quarum altera dicitur caput muscæ, reliqua vero acinōs sine curā manuali possibīle, vt per pharmaca curentur. Curatio autem talis est: obseruentur illa omnia, quæ superius de vlcēribus ab humorū effluxu factis diximus, demum ad localia deueniendum est, quæ tamen distent aliquo modo à supra dictis: nam in his casibus requiruntur adstringentia & exiccantia quæ villam asperitatem inducant, intelligendo per asperitatem superficiē inæqualitatem, quoniam hæc opportunā non essent, quoniam facta istæ qualitate superficiē maximum incōmmodum sequeretur, nempe difficultas retrōcessionis carnez: opus est ergo summā diligentia in inueniendis huiusmodi medicamentis. Inter hæc autē est stibiū, alumen scariolæ dictū, chalcanthū
 10 Romanū, aloë, succus omphacil & acacię, succus præstantissimus est polygoni, myrobalarum citrinorū succus, ex quibus omnibus vel aliquibus eorū componi possunt medicamenta vlcēribus his aptissima. In maioribus verō procidentis præstantiora non habentur medicamenta metallicā vřto ac biphřigē vřto. Inter compōsita verō sunt etiā valentiora, vt est collyrium vocatum Theodoricū narditum & Olympiacū, quæ sunt petendā vel ex Paulo vel ex Galeno vel ex Aetio. Si autem fuerit procidentia vucæ callosa vel vocata malum, sciendum est, quod hæc non cedunt pharmacis, sed potius in illis deueniendum est ad chirurgiam, hoc tamen prius seruato, quod si illa procidentia habeat exquisitum sensum, res & cura non bene se habet neque bene succedet, quoniam auferendo ipsam excitabitur maximus dolor, & huius testis est natura, q̃ vřio oculo dolēte cōpatietur
 20 & alter: quare optime aduertendū est ac timendū in hoc casu, ne infirmus ex crucietur.

Medicamentum est collyrium maius.

Medicamentum est collyrium maius.

Si callosa sit procidentia.

Sciendum circa sensum existēte in procidentia.

Modum amputandi callosam procidentiam.

Si autem in tali procidentia sensus non adsit, procedendum est chirurgia hoc modo: accipiantur dux acus, per quarum aurículas traiciatur duplicatum filum, deinde apprehenso callo prominentiæ oculi transmittatur vna acus à parte inferiori ad superiorem dissecindendo filum in illa commissura quam facit auricula acus; tunc enim aderunt duo fila, deinde aliam acum transmittens à parte dextra oculi ad sinistram, & huius quoq; filum dissecitudo, ex quo etiam fient duo alia fila, quorum vnum ligabis in parte oculi superiori, aliud vero in inferiori, & hæc ligaturā successu temporis cadet eminentia seu procidentia: & hæc erit rita amputandi ratio: nam si cum ferro perficere velles, sequeretur magna sanguinis perfusio. Facta autem hæc amputatione vlcus sanandum est rebus supra dictis.

30 Post vlcēis vero sanationē remanebit cicatrix, quæ plerūq; facit, vt miseri ægri videre nō possint, ergo erit huiusmodi cicatrix remouenda vel attenuanda aliquo ex his à medicamentis valentibus in hoc casu, vt sunt collyria ex anagallide, & fœniculo & ruta; item oleum vetustissimum, pinguedo humana inueterata. Videtur etiam in his cicatricibus, attenuandis linctū, vt f. oculus lingua lābatur, hoc tamen seruato, vt qui oculū lābere debent, prius mandant aliqua oculū corrobantia, vt est fœniculū, eruca ac semen fœniculi, vt lingua aliquo modo aspera facta possit detergere rebellem cicatricem.

Collyria pro remouenda cicatrice.

De Fistula lachrymalis. CAP. VI.

40 Requens autem morbus oculis proueniens est fistula lachrymalis dicta, non quod ex ipsa continuo lachrymæ mixtæ cum sanie effluant, sed quia est passio canalis illius, qui apparet in angulo oculi: in orbita enim, id est, cauitate illa, qua oculus cōtinetur, est quoddam foramen definens in nares habens membranā facientem sinum cum quadam glandula vocata caruncula, quæ si casu auferatur, facit perpetuum fluxum lachrymarum. Si autem exulceretur in ipsis viis lachrymalibus, facit vlcus dictū fistula lachrymalis, q̃ plerūque habet meatū angustum ac satis profundum. Cognoscitur autem hæc fistula, quia dum comprimitur pars illa, in qua est sinus lachrymalis, statim egreditur sanies, cuius saniei habenda est ratio, quoniam sæpe corrumpitōs.

Ratiō enim.

Unde oriatur fluxus lachrymarum.

Signa fistule lachrymalis.

50 Est autem hæc fistula duplex, vna quarū dicitur ab Auicenna Algarum, ab Aetio vero & aliis Græcis *αλγάρ*, quæ cognoscitur, quoniam non exulceratur nec perforatur in eacutis, sed tantum sanies emittitur per lachrymalia ipsa. Altera dicitur *αριδα*, per hanc vocē intelligendo apud Græcos primo tuberculum, secūdo fistulam ipsam cum perforata cute, erit ergo differentia inter antilopem & ægilopem, quoniā in illa emanat sanies per lachrymalia, in hoc vero perforatur cutis, & adhuc distinguitur fistula in illam, quæ fit cum ossis corruptione, & alteram, quæ fit absq; ossis corruptione. distinguitur tertio fistula; nā quādoq; fit cum ossis detectione, quandoq; sine ea.

Fistula lachrymalis duplex est.

Signa fistule lachrymalis.

Signa fistule lachrymalis.

Signa fistule lachrymalis.

Signa fistule lachrymalis.

Signa fistule lachrymalis.

Signa fistule lachrymalis.

Signa. negliguntur, faciunt fistulam hanc. Signa vero huiusmodi fistulæ sunt primo sanies egrediens, cum qua si fecerit adit, signum est ossis corrupti; si etiã compresso loco fistuloso lentitur foramen declinans ad nares signum est detecti ossis. Cognito autem morbo, natura ac signis habitis, deueniendum est ad curationem. quæ tamen varia est respectu diuersorum fistulæ generum; sed si erit fistula anrilops dicta, in qua non est assumpta cutis, procedendum est, ut diximus de vlcibus oculorum: primum enim corpus euacuandum est per venæ sectionem, ac humores expurgandi peccantes per pharmaca conuenientia: instituatursq; etiam victus ratio optima, demum ad localia deueniẽdo imponenda sunt medicamenta, quæ siccant validissime, repellant & adstringant, cuius ratio est, quoniam debemus siccare vlcus natura sua humidum, & materiam repellere fluentẽ ad locum laxum.

Curatio. talia autem sunt ut cochleæ terrestres contrusæ, quibus addatur aliquod faciens ad penetrationem, ut est myrrha, opopanax & huiusmodi. Verum quandoq; ad fortiora deueniendum est, ut sunt myrobalani citrini, balaustia & chalcitis; quandoq; vero hoc medicamentum procedendum est. 2. conchas marinas quæ contritæ dantur minutim, deinde adde aloes, croci. an. q. s. misce & impone non auferendo donec per se cadat. est adhuc fortius medicamentum scoria ferri mixta cum aceto, quandoq; vero addimus opopanax & imponimus. Antiqui autẽ in hoc casu utebatur farina erui cū melle, item itercore columbino cū pice.

Medicamentum antiquissimum. Aduertendum est autem, q; reperitur herba quædam vocata ægilops quam comburimus & cum melle imponimus feliciter, item alumen & chalcantidũ addito puluere mastichis.

Si sit fistula cum perforatione cutis. Semper tamen in huiusmodi fistulis vtendum est erithinis. Si autem sit fistula lachrymalis cum perforatione cutis, per quam sanies egreditur, primo videndũ est, an os detectũ sit & an corruptum, q; vario modo cognoscitur, ut per stylum argenteũ impusitum, & colorem eius mutatum aut aliis diuersis modis & inuentio nibus, ut alias dictum est a nobis.

Signa ossis corrupti. Si itaq; os corruptum sit, auferatur: si detectum, faciendum est ut squamam emitat & sic locus carne implebitur. Si autem nec os corruptum sit, nec detectum, siccare oportet fistulam & carne vlcus, implere postea ipsum ad cicatricem perducere. Ratio autem quæ hæc omnes actiones perfici possint, hæc est: primo dilatetur vlcus ipsum spongiola aut radice gentianæ: sed hæc duo non sunt adeo opportuna, quoniã primum sanguinẽ irritat, secundo vero inflammationem excitant, quare potius ex mea sententia dilatetur aut substantia cucurbitæ siccata, aut substantia napi siccata.

Dilatatio fistule lachrymalis. Dilatato autem vlcere si os corruptum sit, tractandũ est illo modo, quo in aliis vlcibus diximus. quod sit tripliciter, aut per inundationem olei sulphuris vel per oleum chalcæthi vel ferro ignito. Sed quoniã periculum est in exustione ossis, ne caro etiã exuratur, ideo rutilius procedẽdo hoc faciendũ est per canalẽ ex metallo aliquo confectũ. Obseruandum tamẽ est, ne id agatur, q; sit in aliis partibus os corruptũ habẽtibus, in quibus fortiter corrupto ossi ferrũ ignitũ imprimimus, & cum hac impressione morã aliquam pertrahimus; quoniã in hoc casu hoc faciendũ non est, quia os tenuissimũ est: vnde si morã pertrahatur cū ferro ignito, non tantum q; corruptũ est, sed etiam viuũ os exuri potest: altera est ratio, ne si in hac mora fumus exhalans exustione super nares exurat pelliculam internũ narium, q; dum caderet, relinqueret os palati detectũ in actione tali, quare optime aduertendũ est, ut talia euitentur incommoda. Sed quoniã inter recentiores est controuersia de instrumẽto, quo fieri debet exustio, quale esse debeat, vel ex quo metallo paretur, aliqui enim eligunt autẽ propter metalli nobilitatẽ, quidam vero argenteũ, reliqui æneum. Ego autem sum huius sententia, q; sit ex chalybe vel ferro: aurũ enim & argentũ mihi non placent, quoniã si foriter igniatur, liquecẽt; ut vero medioctiter igniatur, nihil efficiũt, ac chalybea vel ferrea instrumenta potentissime exurunt, & si squamam relinquunt, illa nullius erit momenti.

Si os tantũ detectum sit. Si autem os tantum detectum sit, & non corruptum, primo ipsum (os) eradere opus est, si fieri possit: si autem deradi non potest, imponantur illa medicamenta; quæ squamam ossis detrahere possint, quæ eadem sunt cum iis, quibus succurritur ossi corrupto, ut est oleũ sulphuris, chalcantidũ & ferrum ignitum. Aliqui vero volunt in cura harum fistularum, ut fundum & os fistulæ perforetur, quoniã fistulæ istæ sunt inter illa vlcera cõnũmeratæ, quæ non facile curantur, & si curentur, sepe redeunt. Quando autẽ perforaretur os & fundum ipsius, tunc humor ille, si aliquis afflueret, euacuaretur, & sic os ad consolidationem perduceretur, non autem exulceraretur obductam cicatricem, quoniam per nares ipsas tantquam locum vicinum & patentem deflueret. Ego autem non consulo, ut os perforetur, quoniam nos habemus canalem ipsum à lachrymali ipsa ad nares tendentẽ, cuius euidentis signum est, quoniam dum aliquis flet, magnam quoque lachrymarũ partem per nares solet emittere: non est ergo opus, ut perforemus, sed semper relinquatur os fistulæ, cætera omnia sua methodo perficientes, incarnando, exiccando ac cicatricẽ inducendo.

Si autem

Si autem ad fistulam, in qua nec os detectum sit nec corruptum, hoc modo procedatur: si
 addit callus remouetur, si fordes detergantur. Pro callo autem eximendo, ego vtor vnguen-
 to Egyptiaco: vel, si robustiori opus sit, ad precipitatum deuenio. Ablato autem callo, opus
 est cauitatem carne implere, quæ tamen rarda erit ac difficillima operatio, propter loci no-
 bilitatem, sed, vt rectius dicam, humiditatem ac propter materiam excrementosam sæpe
 fluentem, opus ergo procedere siccantibus robustioribus quam in aliis vlceribus, vbi sunt
 squamæ lotæ ac præparatæ. Quandoque verò ego solitus sum tentare cûram istam per
 agglutinationem: ablato enim callo ac sanie detergâ dilato vlcus aut spongiola aut
 substantia napi sicci, & hanc dilatationem facere soleo, donec intumescit locus circa fistu-
 lam existens: dum autem tumor successerat, deueniebam ad agglutinantia: imponens me-
 dicamentum siccans, vt est diadictamnium Galeni, vel barbarum in mollioribus, aut sacrû
 in durioribus, vel vtrumque mixtum in mediocri carnis existentibus. Sed quoniam ag-
 glutinationi quandoque non succedebat prima vice, tunc ipsam reiterans dilatabam, tum o-
 rem excitabam & agglutinantia imponebam. Quod si secunda vice non succedebat, ter-
 tia quoque vice idem tentabam, neque ulterius progrediebar, quoniam vltra tertiam vicem non
 facillit ne succedit negotium. & hæc satis sunt de fistula lachrymali.

Pro callo fi-
 stula cancri-
 da.

Pro carno
 generanda
 in fistula la-
 chrymali.

Curatio per
 agglutina-
 tionem pro-
 pria.

De vlceribus narium.

CAP. VII.

Nares quoque vlcerantur propria vlcerum specie, quæ non vna tantum est, sed multiplex.
 quoniam illarum vlcera quandoque sunt leuia, quandoque vero grauiora, tota autem
 summa vlcerum narium distinguitur in mitiora & grauiora, quæ ozenæ à Græcis nuncupantur.
 Grauium autem horum quædam sunt, quæ serpunt exeduntque, atque putredinem habent,
 ratione cuius dicuntur ozenæ quasi malo odore abundantia: huius enim fetoris causa est
 puredo in vicere contenta.

Diuisio vlc-
 erum narium.

Alia vero sunt grauia, quæ serpunt, non tamen habent malum odorem. Tertium ge-
 nus horum vlcerum est illorum, quæ habent additam & excrecentem carnem aliquam,
 vt est polypus.

Causa horum omnium vlcerum est fluxio & destillatio facta ab ipso capite, quæ ta-
 men communicetur capiti ab aliis partibus corporis excrementosis. Cum autem fluxio i-
 sta ac destillatio non sit semper vnius & eiusdem generis, ideo diuersarum etiam specierum
 facit vlcera: quia dum enim humores acres ac tenues destillant, qui faciunt vlcera benignio-
 ra, quoniam qualis est fluxio, talis sit vlceris materia. Si autem non tantum sit acris & tenuis
 fluxio, sed etiam putrescens, facit vlcus serpens: in hoc enim exeduntur membranae & car-
 tilagines narium, sine tamen fetore aliquo.

Causa vlc-
 erum narium.

Signa autem & primo vlceris serpentis, sunt, quando exeduntur membranae & carti-
 lagines narium. Ozenæ vero signum est, quando adest fetor insignis. Cognoscitur autem
 cito supercrefcens, polypus narium dicta, quandoque visu ipso, quandoque vero coniectu-
 ra, cum sit impedimentum spirationis. Curatio autem talis indicatur, quod in quocunque
 narium vlcere ab interna causa orto indicatio curatiua est, vt primo intercipiatur fluxio:
 primum itaque tenui & attenuante victu vitandum est, iubentes vt caueant zgri ab illis, quæ
 caput implere possunt, vt à mora sub sole, somno longo & huiusmodi motus corporis præ-
 stantissimus, dummodo quiescat caput. Venis inimicissima est, & præterea huiusmodi
 vlceribus laborantes caueant à morbo gallico, quoniam per ipsum attracta materia copio-
 sior ad caput fient narium vlcera praua ac etiam cum ossis corruptione.

Signa.

Curatio vlc-
 erum à causa
 interna.
 Purgatio.

Post institutam victus rationem ad pharmaca deueniendum est. Primum ergo alius
 leniatur, humores preparantur cum proportionatis syrups, postea expurgentur cum me-
 dicoamentis, in quibus ingrediatur agaricus vel hiera, cauendo ab his, quæ recipiunt esse bo-
 rum ac colocythidem, quoniam deterrima sunt in hoc casu. Expurgato corpore, ad capitis
 euacuationem deuenire oportet, quod fieri debet per partes longinquas aut per palatum i-
 psum & per ethina, & alia quæ in nares imponuntur, quæ tamen non probantur in hoc casu,
 quoniam attrahunt materiam, qua attracta adhuc maiorem loci affecti exulcerationem fa-
 cient. Potest etiam fieri huiusmodi euacuatio per cauteria facta in occipitio vel ceruice,
 vel in commissura coronali cum vitione. Aduertendum tamen est quod cum ego multoties
 magnum incommodum & periculum fieri percepissem ex cauterio in occipitio, ideo ipsum
 reprobare dimisi semper. Sed quoniam necessario semper cerebrum huiusmodi excreme-
 tantibus communicatis humidum est, ideo opus est, vt succerit ipsum caput, cuius artificii
 varia sunt instrumeta, vt stillicidium aquæ siue naturalis aut arte paratæ, sunt etiam emplastra,
 quæ debent & possunt capiti applicari. Sed si adest aliqua caliditas capitis, timendum est ab

Totius ex-
 purgatio.

Capitis eu-
 acuatio.

An ethina
 conueniant.

An cauteria
 in occipitio
 conueniant.

Excursio
 capitis quæ
 modo fiat.

exiccantibus, ne caput deducatur ad aliquam inflammationem; talia autem emplastra sunt ex sinapi, ex Thapsia, stercore columbino, quamuis Galenus his vtatur in euacuando excrementoso capite, sed his vitur, quamuis aliquam incalificentiam & inflammationem capitis imminere videat, quoniam videt materiam illam in capite congregatam destillare in pulmones & phthium facere, ideo Gal. eligens ex duobus, malis minus occurrendo phthi morbo immedicabili, non curat capitis calefactionem: in hoc casu agendum non est, quoniam tale non imminet periculum.

Si caput sit frigidum & humidum.

Si autem caput sit frigidum & humidum, ratione materię resolutis a visceribus, tunc correctis intestinis vtendum est huiusmodi medicamentis exiccantibus, quale est supradictum emplastrum. Siccidia etiam facta ex calefacientibus & exiccantibus conueniunt.

Exci assidi tractare.

Facta autem expurgatione totius per alui lenitionem, sanguinis missionem, humorum preparationem & ipsorum expurgationem, ac etiam capite euacuato ab excrementis locum affectum exulcerantibus, deueniendum est ad vlcis curationem: circa quod vtendum est his quę vim habent siccandi & adstringendi.

Metallica leuia.

Notandum est autem, quod illa vlcera, quę leuiora sunt, leuiora etiam requirunt medicamenta, qualia sunt metallica leuia sua natura, vt cerussa, lithargyrum, scoris ferri, cadmia artificialis, spodio, lapis hamatites, addendo repellentia, vt gallas immaturas, myrrham & malicorium. Huiusmodi autem medicamenta tripliciter applicari possunt, primo modo, si fiant medicamenta arida, vt sunt pulueres, ipsos per cannulam in nares iniiciendo: secundum modo si fiat liquidum medicamentum, vt si pulueres ex metallicis dictis cum melle misceantur, & tunc huiusmodi medicamenta gossipio stylo intoluentes accipimus, & loco affecto ac exulcerato illinimus: tertio modo preparantur medicamenta liquidissima, quę iubemus ægrum per nares ipsas attrahere.

Pro asserendo crusta vt erit munda.

Cum autem huiusmodi vlcibus sæpe crustę etiam innascantur, neque possint dictis medicamentis auferri, tunc accipimus vinum cum melle mixtum, & iubemus hoc ægrum per nares attrahere.

Si vlcera sunt serpentina.

Si autem fuerint vlcera narium serpentina, opus est deuenire ad robusta medicamenta à Galeno descripta, vt sunt troisci Andronis, Pasionis, Polydæ vel Prusæ, qui dissolui cum aceto impohantur loco exulcerato.

Exteriori ap plicanda.

Sed cum non satis sit huiusmodi tantum medicamenta infra ponere, sed etiam extra sit opus nares medicamento exiccante oblinire, tunc conueniet gypsum dissolutum cum aqua fabrili.

Si pessima sunt vlcera.

Si autem sint valde pessima vlcera, non est vtendum fortissimis medicamentis, vt sunt dicti troisci, quoniam ex vlcis malignitate & ex medicamentorum vi fortissima locus affectus deueniret ad prauam & canerofam dispositionem, vtendum ergo erit leuioribus, sed cum summa diligentia, quę siccent & adstringant, qualia sunt metallica: vnde in hoc casu ego sum solitus vti puluere corallorum, spodio, puluere scabiosę, tormentillę & agrimonię: vel etiam vti soleo aqua scabiosę & tormentillę vel separatim vel mixtis: & ex his maximum succellum conserui vtidi infirmos his itaque & vos vti poteritis in casu tali: & hæc satis sunt dicta de narium vlcibus cum leuibus tum serpentibus & etiam malignis: sequitur vt agamus de vlcibus palati.

De vlcibus palati, erosione gingivarum & affectibus quibusdam dentium.

CAP. VIII.

Dispositio horum vlcium.

Causę.

Exulceratur palatum variis vlcibus, & aliquando gallicis, de quibus hoc in loco non est nostrum loqui, de his enim nunc agere instituiamus, quę non sunt à morbo gallico & vocantur à gręcis aphthę, quasi palati vlcera, per palatum intelligendo non solum causatam sed & omnia in ore contenta. Sunt autem hæc vlcera dupliciana aut sunt excoarationes cum carie gallica, aut excoarationes tantum tertio aut loco adduntur gingivarum erosiones.

Causę autem horum omnium sunt fluxiones, licet quandoque fieri possint à causa procatartica, quoniam sunt sæpe vlcera palati exustione à ferulis facta: sed quoniam illa facile sanari possunt, hic ergo de illis tantum agamus, quę ab humoris effluxu proueniunt.

Interdum itaque destillat humor acris & amarus, qui facit excoarationem ipsam, quandoque autem pituita salsa destillat.

Signa.
Cur in adultis pueris mæxi mi sunt aphthę.

Signa autem horum sunt, cum apparent in ore vlcuscula aut subalbida aut ruhea: hi n. colores sunt ratione mixtionis materię fluentis. Huiusmodi autem vlcera aphthę vocantur ætate puerilis plerumque propria esse solent, quoniam in illa ætate abundant excrementa cerebri, quę sæpius ac fere semper erumpere solent per lactimina, & si per lactimina exade non effluant, semper faciunt aphthas. Pro ratione autem materię defluentis sunt vlcera palati.

si magna aut parua, quotū medendi ratio facilis est, dummodo non sint ex lue gallica. Tertia species horū vlcerū, quæ est erosio gingiuarū, non est curatu facilis, quoniā vlcera hæc sūnt solida carne, & fluxio erosionē faciens cōtinua est, ideo difficultatē curationis facit.

Curatio autem horum vlcerum consistit in duobus scopis, quorum alter est, vt auferatur fluxio ratione dicta in superioribus, videlicet per venæ sectionem, lenitionē alui, humorum præparationem & expurgationem ac capitis euacuationem. sed non semper hoc scopo vniat, quoniam si fuerit levis fluxio, sola victus ratione corrigi potest. Sed si adsit erosio gingiuarum, à primo scopo semper erit incipienda curatio, quoniam hæc fluxio huiusmodi erosionem faciens diuturna est & assidua. Alter scopus curandi vlcera hæc perficitur per localia, quæ omnia vim habere debent siccandi & adstringendi, qualla sunt gallæ, resus obsoniorum, cūperosa, oleum sulphuris temperatum, oleum chalcēthi temperatum. Quandoq; vero hæc vlcera sūnt adeo maligna, vt cogamur in his puro sulphuris oleo vel etiam chalcēthi vi, aut aqua fortis dicta, quæ quidem fortissime exiccat. Ego tamen moneo, vt euitetur aqua hæc in his vlceribus, quoniā sepe post huius vsū succedit aut nomen aut gangræna, quare loco huius aquæ vtamini potius aliquo ex dictis oleis. Si autem adsit tertia species vlcerum palati, quæ est gingiuatum erosio, sciendum est, quod erosio gingiuatis dentium radices solum obduci vel topico quodam vel etiam forde, vnde tunc habēda est diligens cura dentium, vt semper putæ præstentur ac candide radices ipsorum, q; sit ab aliquibus instrumento ferreo. Sed ipsum ego non laudo, quoniā fertum est inimicissimū dentibus, vnde si topici aliqui adsunt in radicibus ipsorum, tunc ex frequentissima ferri frictione magis indurantur, & ita vt nunquam postea remoueri possint, vnde est igitur in hoc casu puluere pumicis: sed opus est, vt huic pulueri addatur materia erodens topiū, vt est oleū sulphuris: ideo ego in hoc casu accipio stylym, cuius apicē gossipio obuoluo, & in oleo sulphuris intinctū postea puluere pumicis in spargo. hoc semel in die faciens, quoniā ex hoc præstentur dentes à topico & candidi fiunt. Si autē fiat erosio gingiuatū ita vt dētes anteriores sint agitabiles, tunc opus est, vt manu intrudatur in sedē suam: sed hoc nō satis est, quoniam oportet semper decoctū habere, quo os abluatur vim habens siccandi & repellendi: vnde ego vtī soleo decocto radices cyperi vel decocto acoti vel nucum cupressi, vel rhoes, quod sumach dicitur. Habemus & alia robustiora, sed iis non adremus vtī, quia denigrant dentes. cum his autē decoctis solemus admiscere parū myrrhæ, quia facit ad agglutinationem ac regenerationem gingiuarum. Si autem accidat, vt dētes aliqui cadat, opus est, vt rursus in suam sedē ponatur, præcipue si vnus ex inferioribus sit, & siliō aliquo collatetalibus alligetur: aut si ille, qui cecidit, haberi non potest, alius similis qualiscunque sit vel etiam obore factus alligari potest, & ita imponatur: natura enim dentium talis est, vt cadente vno cadant, & reliqui propter reclinacionē, & sic vox vel loquela ipsa impeditur necessario. quare si dens aliquis, vt diximus, cadat, necessariū est pro vocis ac loquē formatione, vt repellantur in propriam sedem vel iidem, vel similes, vel arte facti.

De Vlceribus papillarum vel mammillarum capitis.

CAP. IX.

HAbent & papillæ mammillarum sua vlcera, quæ etiam graua, molesta ac frequentia sunt. & sunt duplicia, quorū prima exedētia & phagedænica sunt: alterū genus horū quæ facta sunt per longitudinē papillæ, & hæc in phagedænica facile vertuntur: Phagedænica enim habent secum coniunctam putredinem, & eam ita acrem, vt aliquando exedat & absumat papillam.

Causa horum est fluxio, quoniā non possunt fieri hæc vlcera maligna, nisi ex fluxu materię acris: isti autem humores acres facientes papillarum vlcera, miscentur quandoq; aut cum lacte, aut cum pituita demandantur vero aut ab hepate aut à liene.

Sunt autem curatu difficillima hæc vlcera pro ratione subtilitatis māmillarum, q; cum sit molliissima ac glandulosa, leuibus in diger, quibus non cedunt hæc vlcera. Secundo fit cura difficilis, quoniam sepe in his casibus vocantur ad curam imperitæ mubercule, quæ nec loci naturam nec morbi nec remedium inuenire sciunt, vnde ipse applicant solam cetam cittinam, quæ digetit: cum tamen vlcera exicatione & adstrictione indigeant, & ideo sepe reddunt hæc vlcera ex leuioribus maligna vel phagedænica. Nobis ergo intentio erit, si hæc vlcera sanare volumus prohibendi fluxionem: quare primo prohibeatur lactatio pueri, quoniā lac & papillæ alterantur à puero ratione suctionis: secundo reuertatur lac ipsum, quod fit per exicationem: imponentur ergo mammillis emplastra confecta ex farina otizæ cum puluere rosarum. Et etiam in hoc casu pronocanda sunt mentrua, sine tamen aliqua incalesctione, quod fieri potest per sectionem venæ in malleolo.

inter omnia autem siccanda hoc præstantissimum est medicamentum, quo nostri chirurgi uti solent. ℞ rhab. el. mumiz an. ℥j. fiant pilulæ 2. quarum vna vno mane detur, altera altero vel post duos dies, & post assumptionem pilulæ superbibat mulier patiens multam aquam plantaginis, nam his cohibetur absq; dubio fluxio.

Cohibita atque fluxione ac lactis generatione veniendum est ad vbera ipsa, quæ aut sint phagedanica aut alia, semper in ipsis indicatur exsecatio & adstrictio: quoniam habemus patrem & substantiam partis satis siccam: constat enim mamma cum multis glandulis tum nervis, inter quas lac generatur ac defertur per nervos ad ipsam papillam. Cum ergo talis sit constitutio mammillæ ex membranis duris ac nerveis, opus erit in his vlcibus medicamentum exiccant & adstringente, observando tamen, an vlcus mundum sit aut immundum: si enim immundum sit, tunc siccantibus etiam mel rosatum admisceri debet: si autem non adsit sordes, solis siccantibus utendum est. vnde ego hoc soleo uti medicamento, quod pluries expertus sum: ℞ oleum ex nucibus iuglandis & simul incoquens squamam ferri vlcera inungo. Aetius vero describit medicamentum optimum ad hæc vlcera accipiens rhois coriariorum, vel si haberi non potest, loco rhois folia terebinthi vel pilularum cupressi lib. j. (per rhoe autem intelligenda sunt folia ipsius plantæ, dum enim scribitur rhoe coriariorum, semper ipsius folia intelligenda sunt: quando vero scribitur rhoe culinariorum, intelliguntur fructus herbar ipsius) gallæ immaturæ lib. j. s. vini austeri lib. x. tritis terendis macerentur in vino per biduum, deinde coquantur ad medietatis consumptionem agitando materiam totam ligno cupressi viridi, postea excoletur, deinde coquatur ad mellis consistentiâ, & servetur in vase vitreo ad usum. Quando vero ipso uti volumus, applicetur papilla hoc modo: Inungatur papilla medicamento dicto, deinde accipiat tecta nucis bene excavata, & imponatur vnguentum de thuria & applicent, & alia etiam vim siccandi habentia & adstringendi optima sunt. Sed quandoque abluenda sunt huiusmodi vlcera decocto ex rosis vel scabiosis vel aliis huiusmodi. Et hæc de papillarum vlcibus satis sint.

De vlcibus sedis. sed potissimum de fistula ani cum occulta, tum manifesta, cum recta, tum obliqua, quo ad eius naturam, causas, signa atque præagium.

CAP. X.

Sedes infestatur variis vlcibus, inter quæ connumerantur rhagades primo, secundo vlcera callosa, tertio vero fistulæ, de quibus nunc loqui instituiamus, cum scripserit Hippocrates librum specialem de fistulis & Aetius lib. 14. cap. 11. & Paulus lib. 7. cap. 78. quibus ex locis omnibus colligimus non vnam esse fistulam ani, sed plures: at dicamus primo quod quo ad quid rei, fistula anæst vlcus angustum, longum collocatum in substantia intestini vel musculi. Exulceratur autem sedes hac fistula variis modis: nam quandoque exulceratur ita, ut fiat fistula manifeste patens, quandoque vero non patens. Manifestam autem illam appellamus, quæ habet orificia sua extra sedem: occultam vero, quæ fit in cavitatē intestini ipsius. Hæ autem fistulæ variant rationibus, nam quandoque licet immunda cavitatem sint, tamen perveniunt ad sedem ipsam, ac illam perforant: per sedem intelligendo cavitatem illam circa analem recti intestini existentem, & quoties fit fistula non excedens quantitatem trium digitorum perforat sedem ipsam, quandoque vero procedit ad musculum extremum, quandoque autem usque ad intestinum ipsum. Alia est varietas: nā quandoque rectæ, quandoque vero intortæ sunt, ita ut non possit earum ductus investigari: quandoque vero sunt multæ simul contortæ & coniunctæ, habentes tamen vnum tantum orificium.

Sunt etiā alie pertingentes ad articulum coxæ: Et hæc sunt species fistularum sedis, quæ rectius hoc modo diuiduntur, quod scilicet aut sint rectæ aut intortæ, aut penetrant aut non penetrant, aut sanabiles sunt aut insanabiles.

Causa autem fistularum vna tantum est procatarrctica, id est, extrinseca, & est tuberculum huiusmodi in sedem: nam quoties deuenit ad suppurationem, facit vlcus, quod contracto callo efficit fistulam. Tuberculorum vero causæ sunt primo contusiones illarum partium sedis, ut sæpe contingit equitantibus; secundo est sedes continuata in locis frigidis, ut supra marmore aut glacie: cum enim languidæ factæ sunt illæ partes, attrahunt humorem, ex quo tubercula proveniunt, quæ postea sunt causa fistularum, cum ex tuberculis fiunt fistulæ. Internæ vero causæ plures sunt, ut vlcera, rhagades, hæmorrhoides tumentes & male curatæ. Causæ vero remotiores fistularum sunt fluxiones ipsæ: nā cum sedes ipsa sit tanquam cloaca, in quam concurrunt multa excrementa, habet enim se-

*Mammilla-
rum impe-
rit.*

*Sedens im-
mundum sit*

*Medicamen-
tum Aetii
exiccant.*

*Fistula ani
quid.*

*Quæ medi-
ca sedes cor-
ruptur fistu-
la.*

Differentia.

*Causa ex-
terna.*

*Causa tuber-
culorū fistu-
larū præce-
dentium.*

*Causa in-
terna.*

des multas venas, per quas excrementa feruntur, non est itaque mirum, si fluxionibus subleuiantur.

Signa fistularum sunt primum orificium, quod si appareat, non est, ut quæramus aliud signum. Sed quoniam sæpe variant; aut enim penetrant, aut non penetrant; aut sunt rectæ aut intortæ: ideo si erit recta, cognoscitur per impositionem specilli; Si enim recta procedit vel etiam prouenerit ad fundum fistulæ (cuius signum erit durities; fundus enim cuiusvis fistulæ semper durus est) signum erit rectæ fistulæ. Interna autem fistula cognoscitur per impositionem candellæ: si enim specillo cognosci non possit, qualis sit fistula, ita ut parua quantitas specilli in ipsam ingrediatur, ac etiam puris vel saniei magna effluat copia, signum est maiorem esse fistulam, quam specillū indicet: quare tunc fit exploratio fistulæ per candellæ impositionem, quæ, quoniam flexibilis est, nobis facile potest ostendere. Si autem plures sint fistulæ vñ tantum habentes orificiū, cognoscuntur cū per specillum, tum per magnā saniei copiam effluentē: præterea ex historia infirmi: sæpe .n. euenit, cū facta fuerit vna fistula: quod successu temporis ex materia ibi copiosa vel diutius fluente plures fiant fistulæ, quarum signum sit tuberculum exortum, & deinde aliud & aliud tuberculum circa fistulæ locum. quod si illa tubercula non rupta saniem aut suam suppurationem emittant & intumescant; signum erit illam materiam ad orificium fistulæ esse conuersam, & si locum illum exulceratum fieri fistulam; quare quot prouenerint tubercula, tot etiam enumerabuntur fistulæ ad vñ tantum orificium materiam emittentes.

Si autem penetret fistula, cognoscitur per impositionem specilli, si recta sit, vel candellæ, si fit intorta: præterea imponimus digitū in anum, & inuestigamus exploratoria illa, quorum si acumina percipimus in ano, signum est fistulam penetrare. Imponimus etiam aliquando loco digiti in anum aliud specillum, quo etiam acumina eadem cognoscere possumus. Cognoscitur præterea penetrans fistula per intestina ab excrementis per ipsam fistulam exeuntibus, aut à foetore maximo saniei, vel cognoscitur per decoctum aliquod introductū in fistulam; si .n. penetrat fistula, decoctio per intestinū rectum effluet. Cognitis autem fistulis prælagiū tale est, ut distinguamus primo fistulas illas in perniciosas & non perniciosas, sanabiles & non sanabiles: præterea in sanabiles & non perniciosas, & in insanabiles & non perniciosas. Perniciosæ fistulæ sunt illæ, quæ perforat & exulcerant intestinū rectum. Sanabiles vero sunt illæ, quæ pertingunt tantū ad musculum sphincterē per quantitatem duorum vel trium digitorum. Insanabiles vero sunt illæ, quæ pertingunt ad intestinum rectū, vel ad musculi superficiem. Sanabiles & perniciosæ sunt omnes dilaceratæ ac multos cuniculos habentes. Insanabiles vero non perniciosæ sunt desinentes in intestinum prope musculum sphincterē, vel etiā in superficiē ipsius musculi. Cutatio autē fistulæ ani quoniam maxima indiget diligentia & tractatione, ideo in hoc subsequenti capite eam pertractabimus.

De Curatione fistularum ani. CAP. XI.

Curatione fistularum dimissis illis, quæ sunt incurabiles, varia est; accipiamus itaque fistulam manifestam sed sanabilem: indicationes curationis ipsius etunt partim communes, partim singulares. Communes v. indicationes sunt, quoniam cum istæ fistulæ fiant ex defluxu, necessarium est ipsum sistere. & quoniam fluxus fit per venas mesenterii, erit ergo sistendus per euacuationem, cuius hoc præceptum seruetur, quod quamuis resulet materia ab vniuerso corpore, non tamen teneatur euacuatio totius corporis, quoniam materia per illum locum affectum fluens irritabit magis fistulam; non est igitur vitendum pharmacis ab vniuerso corpore trahentibus, sed euacuandum est per frictiones tantum & alia huiusmodi. Exhibeatur itaque pharmacum venas mesenterii tantum euacuans, quale est cassia, cauendo ab his in quibus aloë ingreditur, quo modo sedē maxime irritat aloë. Cum autem euacuatio non in solo pharmaco existat, sed etiam in venæ sectione, erit ergo secunda basilica eiusdem lateris, postquam euacuationē cum necessaria sit contemperatio, ideo optima instituatur victus ratio. Si quis autem siccat & adstrictæ sit alui, danda est opéra, ut fixæ educantur per clysteres constantes ex decocto maluarum, oleo & butyro. Instituta autem victus ratio optima & peractis communibus per euacuationem, deinde ad locū affectum deueniendum est. Accipiamus itaq; duas fistulas curandas, quarum altera sit illa, quæ perforat, reliqua vero, quæ non perforat pro curatione illius, quæ perforat, statim deueniendum est ad sectionem fistulæ; in qua sectione diuersi sunt chirurgorū modi. quoniam aliqui secant super specillū, aliqui super lignū, aliqui v. imponunt calprū & secant, quæ omnes rationes secandi bonæ sunt, sed illa, quæ fit syringotomo optima est. Facta autem sectione auferatur callus, in quo omnes non conueniunt, quoniam aliqui vult, ut medicamēto call⁹ auferatur, alii scalpro, quidā v. vngue; mea autē fert sententia, ut quomodocumq; auferatur callus tanq̃ corpus præternaturale, quod impediatur consolidationē, nihil referat, dummodo auferatur.

Indicatio
vniuersalis.

Ad conseruandum phar-
maca à toto
trahentia
in his fistu-
lis.

Vena secata.

Pillaratio
Loco affecti
tractatus.

Quæ modū
fistula secat-
ur possit.

*Ablatio cal-
li fistula.*

Bene verum est, quod omnes monent, ut auferatur post sectionem, quamvis ego sim solitus ipsum auferre ante sectionem: sed si est vngue aut scalpro auferendus, auferatur post sectionem: si vero medicamento auferri debet, auferatur ante sectionem. Et quamvis omnes velint, ut Auicennas & reliqui, quod auferatur medicamento forti exedente, ego tamen per dilatationem id facere consuevi: cum enim dilatatur, resoluitur, ac leuissimum postea medicamento exedente eradicatur. Dilatatur autem spongia aut substantia tucurbitæ sicca: Medicamenta vero, quæ ego impono pro calli eradicatione, duo potissimum familiaria habeo, quorum alterum est vnguentum Ægyptiacum simplex in molliori callo: at in duriori (callo) vsus sum Ægyptiaco composito. Alietum vero medicamentum pro eodem callo erit præcipitatum; aliquo enim ex his duobus dilatatum callum semper imbuti & feliciter succedit.

Bellio fistula.

Ablato autem callo secunda est fistula; quoniam aliter non agglutinaretur nec incarnaretur: fecetur ergo per syringotomum. Facta sectione perducatur vlcus ad cicatricem epulotico aliquo, ut in mollioribus diapiompholyge: in robustioribus vero iside: in mediocribus autem utroque mixto.

Epulotica.

*Sisti fistula
non perforans.*

Si autem sit fistula non perforans neque penetrans ad intestinum aut superiorem musculi partem, pro ipsa secunda accipiat syringotomus acutam habens aciem, quoniam duo sunt syringotomi, vhus quo secamus perforantem fistulam habens aciem sphericam: alter vero, quo secamus fistulam non perforantem habens aciem acutam: hunc ergo accipimus & facta sphæcula cerea in eius acumen ipsum imponimus, & in ipsam fistulam intro mittimus; & cum perueherit instrumentum ad fundum fistulæ, preminimus fortiter, ita ut perforetur globulus creus, qui est super aciem, & fundus etiam fistulæ simul, deinde digito adiutore ipsam aciem syringotomo per anum educimus, donec fecetur fistula ipsa. huc autem facimus, quoniam alter eiusmodi fistulas sanare non possumus.

Forma autem syringotomi, quo secatur fistula perforans, est hæc.

*Syringotomus pro
se-
canda fistula
perforante.*



A est spherica acies siue habens globulum obtusum:
ab A ad B est rotunditas læuigata.
à B ad C est pars acutissima, qua incidimus:
à D ad E & F est pars obtusa.

39

Forma vero syringotomi, quo inciditur fistula non perforans, est hæc.

*Syringotomus pro
se-
canda fistula
non pen-
etrante.*



A est acies acuta, in qua vel supra qua ponenda est sphæcula cerea.
ab A ad B est rotunditas læuigata.
à B ad C est pars acutissima, qua inciditur.
à D ad E est pars obtusa.


Quamuis autem hæc duæ formæ videantur sufficere pro sectione fistulæ cum penetrantem etiam illius, quæ non penetrat, nihilominus duæ aliz habentur in vsu; & quidem satis idoneæ pro sectione vtriusque fistulæ: nam si fistula non perforat, ad ipsam aperielidam, aliqui vtuntur syringotomo quodam, qui in apice habet aciem cum pungentem cum etiam incidendum, qualis ostenditur ab hac forma.



A est acies acuta super quam potest poni sphæcula cerea.
B est pars rotunda læuigata.
à B ad C est pars acutissima, qua fit incisio.
à D ad E est pars obtusa.

Quarta autem forma syringotomi, quo vtitur in perforante fistula, habet aciem obtusam sed depressam vel etiam rotundam vt libet, & in acie summa habet foramen, per quod trahitur filum, quo filo trahitur acus plumbeus siue stilus plumbeus, quæ acus siue stilus imponitur in fistulæ foramen vel orificium externum, & postea acus illa traiecta per foramen fistulæ internum educitur ac extrahitur per anum, & sic per extractionem acus ingreditur syringotomum incidens & aperiens totam fistulam, & est secundum hanc formam.

A est



A est acies obtusa perforata.

B est pars depressa ac obtusa.

à B ad C est pars incidens acutissima.

à D ad E est pars obtusa ac non incidens.

F est foramen aculei, per quod traicitur filum, quo annectitur ipsa ac aciei syringotomi.

Si quis autem vellet eiusmodi fistulas sanare absque sectione, ea ratione tentanda est curatio talis, ut docet Hippocrates in libro de fistulis, nempe per agglutinationem imponenda medicamenta siccantia & adstringentia, quæ ipsam fistulam ita coangustabunt, ut sese parietes ipsius vicissim tangerent, facta ex ipsis glande, ad quam perficiendam utimur linimento duro, ut barbaro, aut emplastro sacro, quam glandem postea oblinimus aliquo siccante molliori, & imponimus in fistulam.

Medicamentum curandi fistulas absque sectione.

Sed hic oritur ambiguitas quædam sanandarum fistularum ani, quoniam quidem cum viderint aliquem laborantem fistula in ano, monent, ut non assumatur cura, quoniam, dicunt ipsi, hoc est emissarium nature, per quod sibi noxium humorem expellit. Præterea aliam rationem adducunt experientia praxique ducti dicentes, quod multi laborantes variis intestinorum morbis superueniente fistula liberati fuerint ab illis morbis: Quod si non desierunt & liberati sunt ex toto, saltem mitiores facti sint.

Dubium an curanda sint fistulae ani, nec non.

Ego autem sum huius sententiæ, quod omnis fistula sanabilis sit sananda, neque villo modo relinquenda in loco tam periculoso. Eueniunt enim sæpius diuersa symptomata miserum ægrum affligentia. Si autem eueniat, ut quis laboret aliquo intestinorum morbo, & ipsi supetueniat tuberculum in sede, quod suppuretur, & egressa sanie fiat fistula, ex qua mitiores reddantur illi morbi intestinorum, tunc adiuuatur natura ut reliquum materiæ pellere possit, ac tandem cessante morbo intestinorum fistula etiam sanetur, si sanabilis existat.

Fistula in sanabiles & non perniciosæ.

Cum autem distinxerim in sanabiles, insanabiles, sanabiles & perniciosas, & insanabiles non perniciosas, atque de sanabilibus iam dictum sit, sequitur nunc ut de insanabilibus & non perniciosis agamus. Hæ autem duplices sunt, altera, quæ desinit in intestinum prope musculum sphincterem, altera vero partem superiorem musculi sphincteris perforans. Si enim perforat ipsum per quantitatem duorum vel trium digitorum, sanabilis est: sed si perforat ipsum per quantitatem quatuor digitorum, tunc insanabilis red dicitur.

Fistula quæ de sit sanabilis in & quando non.

Cum autem cura fistularum sectione perficiatur, in hac sectio periculosa esset, quoniam si secemus musculum sphincterem transuersaliter, fiet relaxatio ipsius sedis, unde subsequetur inuoluntaria stercoreum emissio. Cum itaque ad manus Medici deueniunt huiusmodi fistulæ: hoc modo tractentur: primo vniuersalia dicta petagantur, deinde circa locum hoc agemus: primo seruetur fistula semper aperta, secundo seruetur sine callo: ut autem seruetur aperta, imponatur semper in cavitatem fistulæ tenta siue penicillum, quandoque vero imponi potest cannula plumbea.

Quomodo fistula seruetur aperta.

Si autem pertingat fistula ac perforet musculum sphincterem in parte superiori, ego adhibeo molliissimum linimentum, quo tentam obduco, quæ debet esse tantæ longitudinis, ut pertingat ad orificium superius fistulæ: uti etiam aliquando consueui cannula ipsa, sed quando excrementum aliquod excernitur per fistulam ac cannulam, tunc eam ita latius efficio, ut vix aut vi magna in fistulam imponeretur. Præseruatur autem à callo fistula hoc modo, utendo si linimento deterforio: quod si leuius requiratur, utendum est vnguento isidis: si vero potentius, utendum est ægyptiaco simplici, aut hoc modo conficiatur medicamentum.

Quomodo præseruetur à callo.

Adiapompholyg.

vngu. ægyptiaci an. 36. Misce.

Si autem supetuerit callus, remoueatur cum præcipitato mixto cum melle rosato, quo ablato seruetur fistula sine callo & sine exulceratione.

Remotio calli.

At quoniam illa, quæ habent vim siccandi, plerumque exuleant, ideo ego consueui imponere decoctum ex aqua, in qua decocta esset betonica & scabiosa, decoctum hoc iniiciendo quotidie, ut abluantur optime interiora eiusdem fistulæ, & tandem imponentes tantam præseruamus fistulam non perniciosam.

At si perniciosa sit fistula, non est proritanda acribus medicamentis, sed primo peractis vniuersalibus ad locum affectum deuenientes non acribus uti debemus medicamentis.

si fistula sit perniciosa.

Sed quoniam huiusmodi fistulæ sæpe solent esse gallicæ, ideo tunc primo curetur lues gallica, & tandem ad fistulam veniemus. Si autem lues gallica non addit, oportet ut modice siccemus sine calefactione: per os itaque accipiat decoctum salis, quoniam exiccat, ad-

si fistula sit gallica.

Notandum
circa aquas
thermales.

stringit & contemperat; at vt ex mea sententia consulam, aquæ thermales siccantes optime sunt vt sunt aquæ Patulnæ illæ, quæ B. virginis dicuntur; robustiores vero sunt Calderianæ, quæ habent vim contemperandi & siccandi sed quoniam labefaciunt ventriculum, ideo illis non sunt exhibendæ, qui habent frigidiorum ventriculum. Per exterius autem non est deueniendum ad acria medicamenta, quoniam irritant fistulam sed sunt tentanda leuia: vnde ego in his fistulis vt consueui cannula, quoniam plumbum ipsum exsiccat, & non sinit fistulam coarctari, vel abluatur fistula semper decocto aliquo vim siccandi habente modicam, vt cum decocto plantaginis, scabioſæ vel tormentillæ. Hoc ergo modo palliandæ sunt fistulæ pernicioſæ ac miseri præseruandi, donec velint & possint, quoniam postea grauissimis symptomatibus ortum quandoque à fistulis ducentibus succum. 10

Ratio vsus
cannulae.
Ductum
medicæ sunt.

De Rhagadibus. C A P. XII.

Rhagades siue rhagades sunt fistulæ vel rimæ per longum in externa sede ad coneuientem terminantes, quæ contracta sede non ita apparent.

Causa.

Causæ autem harum sunt duplices, quarum prima extrinseca est, & solent esse stercorea dura in sede contenta, quæ, dum excernuntur, solent huiusmodi rimas facere: causa harum etiam frequens est clysteriorum vsus & applicatio, quoniam excoriatur locus ille à cannula ænea, & efficitur rimas istas. Causa autem interna est fluxus humorum atque confluxus illorum vitioſorum, vt sæpius affluentes ad locum affectum concreſcunt in ipsa sede, & fissuras efficiunt. Notandum tamen est, quod non solum huiusmodi materia effluens solet rimas has efficere, sed etiam humor quidam acris, qui cum stercorebus sæpius effluere consuevit. 20

Species.

Species harum rhagadum sunt, prima recens & non callosa, altera vero vetus & callosa. Recentes cognoscuntur ex historia infirmi; veteres vero ex dolore, vel sensu potius obtruso. Præterea cognoscuntur etiam ex aliis signis contrariis recentium rhagadum. Facilius vero rhagadem à fluxione cognoscimus per hoc, quoniam est humida semper & profunda. Illæ vero rhagades, quæ sunt ex dilaceratione, non sunt valde humide, neque profundæ. Solent etiam quandoque huiusmodi rimæ provenire à morbo Gallico, quæ cognoscuntur ex historia infirmi, dum dicit, tunc eas obortas esse, cum & persensit cætera symptomata Gallica. 30

Præſagium.

Præſagium autem sit de facili curatione, exceptis illis, quæ à morbo Gallico proueniunt: veteres quoque rhagades non ita facile sanantur & præsertim illæ, quæ habent obtrusum sensum.

Curatio.

Silique curanda sit rhagax facta à causa intrinseca: vt si proueniat à stercore sicco, primo lubricanda est aluus cum victus ratione emolliente, vt ex multis generibus olerum, tum etiam per frequentem vsu in cassiæ. Enema etiam quandoque iniiciatur ex oleo & butyro, vt facilius dissoluantur sterora dura. Circa locum autem affectum, quoniam solet in huiusmodi fissuris esse inflammatio, ideo imponatur medicamenta siccantia, sed inflammationem prohibentia, vt gummi tragacanthi, gummi Arabicum & huiusmodi, quibus admisceantur metallica sua natura leuia, vt ceruilla, scoria ferri, bolus armena, lapis hæmatites, lapis specularis & huiusmodi, quæ habent vim siccandi & refrigerandi simul. 40

Si rhagades
sint doloris.

Si autem dolorosæ sint rhagades, tunc sunt stupefaciendæ per impositionem vnguenti refrigerantis; vnde ego vt vnguento populeonis, ipsum modicum eliquans, & postea instincta in ipso penna non solum fissuras illino, sed etiam loca circumiacentia.

Curatio rhagadum
involuntariorum,
ex fluxione
salarum.
Localia.
Si calli
sint rhagadibus.

Si autem sint rhagades ex causa intrinseca, id est, fluxione ipsa, vel sint inueteratæ, tunc ab vniuersalibus cura incipiendæ est, vt diximus in ani fistulis, postea ad localia deueniendum, quæ debent esse refrigerantia, exiccantia & adstringentia, vt cadmia lota, spodium lotum, pómpholyx lota, squama ætis, & vsu lotum &c. Sed contemperentur hæc metallica aliquo medicamento liquido, vt vnguento de thutia. Quandoque vero & his addi conuenit bolus orientalem lapidemque hæmatiten. Si autem adiunt calli in rhagadibus remoueantur non sectione, vt dictum est in fistulis ani, sed medicamento aliquo exedente, quale est Ægyptiacum mixtum cum alumine rochæ vsito. 50

Pro auferendo
de callis.

Antiqui veto Medici in remouendis rhagadum callis utebantur trocisco ex charta combusta. Ego vero in ablatione calli durissimi vt pulnere arsenici præparati & loti. Ablato callo perducatur vlcus ad cicatricem lotionibus & medicamentis, quorum omnium superius facta fuit mentio.

Fiunt quoque in sede vlcera alterius generis siue excoriationes prouenientes ob multas causas, quorum cura iisdem perficitur medicamentis, abluitionibus, inunctionibus, & huiusmodi aliis, vt videbitur perito iudicio chirurgi. Et hæc sunt satis de rhagadibus.

Vlcera autem, quæ sunt in planta pedis vel calcaneo ob multam ambulationem, sanari possunt sola ablutione facta cum vino austero, in quo quandoque etiam possunt incoqui rosa, plantago & alia huiusmodi. Et hæc sufficiant de vlcerebus omnibus particularibus post vniuersalia. Deoque Opt.

Max. sit laus.

F. L. N. I. S. Tractatus Oculi.

TRACTATIVNCVLA SIVE POTIVS LECTIO, DE TVMO- RE BILIOSO, QVAM BENIGNVS LE-

Et ad doctrinæ Tom. primi de Tumoribus præter naturam
caput 18. quod de erysipelate est, referte

potest.



Cum Galenus in lib. de tumor. præter. nat. egisset de his tumoribus, qui oriuntur à sanguine, statim eos subdit, qui à flaua bile oriri solent, huius ordinis rationem reddens in lib. 14. meth. c. 1. ubi ait maximam esse similitudinem inter erysipelas & inflammationem ratione caloris acuti & symptomatum. Verum symptomata, quæ sunt in inflammatione, ea multa sunt in erysipelate; & ideo libro 2. ad Glauc. sub genere phlegmorum vel inflammationum tractauit de erysipelate. Cum ergo hoc sit, merito explicatis tumoribus, qui à sanguine ortum ducunt, debemus & nos deducere ad biliosos: & ideo primo de erysipelate loqui, qui potissimum tumor oritur à bile.

Verum ut factum est in sanguine antequam explicaremus tumores ab ipso prouenientes, determinauimus quid esset sanguis, quorū eius differentie: sic etiam antequam dicamus de tumoribus, qui à bile dependent, dicamus prius quis humor biliosus dicatur, & quæ eius sint differentie. Galenus in libr. de tumor. præter. nat. capite 9. loquens de bile vel cholera dicebat, quod Medici vocent bilem humorem colore pallidum vel flauum, gustu amarum, & est bilis naturalis recentiorum, non naturalis veto secundum meam sententiam: nam in corpore humano triplicem tantum bilem cognoscimus, vnam non naturalem, aliam naturalem, & tertiam præternaturalem: sicut etiam cognoscimus triplicem esse sanguinem, naturalem, non naturalem & præternaturalem.

Per bilem naturalem intelligimus quæ tam partem totius massæ sanguinis, quæ quæta pars habet temperaturam calidam & siccam, quo autem colore gustuque prædita sit, ignoramus, cum nec oculis videri nec gustu gustari possit: sed si cõiecturis hoc assequi vellemus, dubio procul si esset in actu & non refracta, coloris esset ex rubro flauus, gustus ex dulci amari in hoc bile est idem sapor, qui est in melle aliquid tostus, quia bilis ista est veluti sanguis tostus; sanguis in se est dulcis; sed si torreatur, in amarum declinat, & sic esset coloris rubri flauescens & saporis dulcis amarescentis, si videri posset atque gustari: sed ista nec tangi nec videri ac conspici potest bilis, causa est, quia continetur in potentia & refracta in tota massa sanguinea. In massa enim sanguinis sunt quatuor humores in potentia, non autem in actu; & dicuntur isti humores naturales duplici de causa; primo quia perficiunt naturam corporum; secundo quia sunt materia subministrata naturæ propter alimentum & conseruationem corporis. Quod perficiant corpus, patet; nam totum corpus diuiditur ab Hippocrate & Platone in partes continentes, contentas ac impetu ruentes: per contentas interpretantur humores, per continentes partes solidas & vasculosa, & per impetu ruentes ipsos spiritus: ergo illud contentum continetur inter illa, quæ perficiunt nostrum corpus; si enim homo esset sine sanguine, non nutrietur: si absque spiritibus, non viueret, ideo isti humores naturales dicuntur, quia perficiunt naturam hominis: dicuntur etiam naturales, quia sunt materia pro conseruatione & alimento; nam ex massa illa a-

luntur omnes partes, id eo iste humor biliosus naturalis dicitur, & si hoc non esset, falsa esset sententia Hippocr. probantis hominem constare ex quatuor elementis ex hoc, quia constant & nutriuntur ex quatuor humoribus, qui iunt in sanguinea massa: iste autem humor est refractus in massa cuius materia est ex chylo; nam etiam q. homo non pasceretur nisi lactuca vellâde vel frigida qualitate alia materia, nihilominus gigneretur chylus, ex quo massa sanguinis gignitur & bilis, q. est quarta portio sanguinis: & nisi gigneretur hæc bilis, hydropes corripereur homo, quare opus est, ut sanguis generetur, qui mixtâ bilē habeat. hæc est naturalis bilis, q. quidem recentiores non appellant naturalem, sed dicunt esse non naturalem, quæ non facit morbum per se, quia non est in actu; sed si fit morbus, est à tota massa, & ideo sanguinea dicitur.

Non naturalis.

Secunda bilis est, quæ à nostris non naturalis dicitur, ut distinguatur à mala illa & præternaturali: sed dicitur à me non naturalis, quia primo non perficit corpus humanum, secundo, quia non est materia apta pro alimento, imo ineptissima existit, & si pars aliqua corporis hæc bilem recipiat, aut corrumpitur aut corrupta marcescere peris: & hæc est bilis illa, quæ est in vesica felle quæ non est inter contenta, quia non perficit corpus inam si nihil sit illius bilis in corpore nostro, erit perfectissimum corpus: vñ demus, quod euacuetur, & nō gignatur per assumptâ cibaria, nihilominus corpus erit perfectissimum: præterea non alit aliquā partem, ergo non pars corporis, & est ea, quæ apparet in corporibus animalium vel excreta per lotium, vel per fæces, vel per vomitum, nunc transfusa ad coriū apparet faciens morbum regium, qui describitur à Galeno loc. citato, & ex ea videmus faciem infectam vel oculos: nam hic color provenit ab hac bile, & est hic humor colore pallidus vel flauus sapore amarus, unde postea vulgare dictum exurgit, quid aliud est amarus felle vel bile: quoniam insignis est amaritudo. Sed vñ notate, quod in ista non est acrodo, non acuties, nam talis est in præternaturali, non autem in hac non naturali. Nam si acrodoinem haberet, sciat, quod continuo eroderet: Omnia enim acria habent vim erodendi: sed hæc bilis non erodit, ideo actis non est. Et hoc est verum, quod omne quod erodit, est falsum vel acre, & præter hæc nihil aliud erodit. Probo autem, quod non erodit, quia continuo excernitur per lotium, non tamen erodit vesicā nec renes, continetur & excernitur per fæces, & tamē non erodit intestina: Præterea videmus homines corripī morbo regio & sunt veluti statua aurata, ut vtar verbis poetæ, & nulla sit erosio in cuti, si item in oculis: Ergo huiusmodi bilis non erodit quoniam acris non est. At dicet quis, nonne huiusmodi humor est ille qui est factus ad detergendum capillamenta venarum metatarsarum, si chylus possit transire ad hepar, ut fiat sanguis, & ut detergeret ac proricaret intestina ad excretionem? maxime ergo

Retinendum.

acris est succus? nego hanc consequentiam, quoniam detergentia sunt trium generum, imo quatuor, si volumus ea recte distinguere: primo sunt acria, quæ habent maximam vim detergendis: secundo sunt nitrofa; tertio sunt falsa, quæ omnia detergent; quarto sunt amara, quæ tamen vim minorem habent detergendi. & quia natura moderatam deteriorationem requirebat, hac ratione bili addidit qualitatem illam amaram, non acrem, ratione cuius amaritudinis detergit. Huiusmodi bilis, si quæzatur, in qua parte fiat, sciatis quod fit duobus in locis: in hepate scilicet ex parte excrementosa chyli; & solet etiam fieri in venis ex sanguine tenuiori & calidiori. In hepate, ut dixi, fit ex parte excrementosa chyli, in quo triplex est excrementum & aliquando etiam quartum: est primum aquosum (excrementum) ex quo conficitur lotium attractum à renibus, q. dependet à potu aquæ, vini vel iuris, quod assumitur ad diluendum cibum, quod humidum fit veluti vehiculū sanguinis, quod manens aquosum acquirit vestigia caloris in epate per admixtionem nitrofae materię, & ideo aqua epota si excernatur, falsa est, quia fit calidior. Secundum excrementum est quedā materia cruda, quæ non alteratur ab epate & est pituita, quæ aliquando attrahitur ab epate & effunditur per vniuersum corpus, sed non est excrementum epatis, quia ante gentia est.

Detergentia quatuor sunt.

Hepar quatuorplex habet excrementum.

Tertium excrementum est pars chyli calidior, quæ non est apta conuertere in sanguinem, sed alterata & concocta conuertitur in bilem, & hic humor biliosus non naturalis vocatur, si in venis ex sanguine tenuiori ac calidiori, quando æstuat ac effuerunt omnes venæ siue omne genus venarum & incalefcit calore præternaturali, si quis est sanguis, & potest verti in humorem biliosum, qui quidem natura sua amarus est, non acris, & habet colorem flauum vel pallidum. Ista bilis solet facere morbos, tumores præter naturam, vesicas, ampullas, solet diffundi per vniuersum corpus & corrumpere colorem, & inducit morbum regium atque tum vocatum: hæc est secunda bilis dicta non naturalis, quæ facile permeat per meatus corporis, detergit & aperit oscula venarum & proricat intestina ad excretionem.

10 *Bilis præternaturalis.*
 15 *Bilis præternaturalis diuisa.*
 Victima bilis est illa, quæ præternaturalis dicitur: hæc autem à recentioribus vocatur non naturalis, sed à me præternaturalis; nam naturalis est illa, quæ facit ad alimentum; non naturalis, quæ inutilis est & non lædit corpus; hæc vero præternaturalis inutilis est ac semper lædit corpus, ideo præternaturalis dicitur. Sed quia omne præternaturale aut per se est tale vel per accidens, hoc est, per causam aliam: eadem ratione diuiditur bilis hæc in bilem præternaturalem per se & eam, quæ per accidens est: & sic bilis est præternaturalis aut per se, id est, non admixta aliquo humore alio: vel per accidens, hoc est, per admixtionem alterius humoris. Præternaturalis ergo bilis est, quæ dicitur bilis adusta per putrefactionem, & est bilis flaua, quæ ratione putredinis in aliquo loco acquisiuit acridinem & calidior est effecta atque tenuior, & ista præternaturalis dicitur, quia si est in venis conculcata, facit febrem: Si extra venas & non discutitur, semper facit vlcus erodendo, si erit plurima, facit vlcus & tumorem. Et miror quomodo inepti medici non naturalem appellarint, cum rei non naturalis sit natura sua, ut iuuare & non nocere possit. Sed ista præternaturalis siue pauca siue multa sit, semper nocet corpori. videte modo, an non naturalis possit dici. Altera est præternaturalis, quæ non gignitur per putrefactionem, sed veluti torretur & coquitur ad vltiorem concoctionem in hepate secundum recentiores, qui volunt quod bilis vitellina aliquando torreatur & exuratur quodammodo in hepate & ita conuertatur in bilem porraceam & æruginosam, & ista est bilis præternaturalis, quia non potest consistere in partibus sine corruptione, quia semper facit aut febres aut vlcera erodendo. Et ista bilis dicitur præternaturalis in se & per se, quia non est talis per admixtionem, sed per coctionem: quamvis dogma Gal. videatur secedere ab hac sententia, ut ex lib. de fac. natur. habetur. ubi videtur velle, quod huiusmodi bilis sit potius collocanda inter humores corruptos factos ex prauis succis, veluti ex herbis & malis edulibus: sed quicquid sit, sat est, quod est bilis præternaturalis per se. Altera est præternaturalis, quæ fit per admixtionem aliquot humorum, qui reddunt eam malam, & hæc multiplex est: nam est vna, quæ cholera citrina vocatur quæ habet aliquid phlegmonis tenuioris & aquosioris in se, quo fit, ut huiusmodi bilis inutilis sit ad deterfionem & proritatem, sed potius facit ad obstructionem, ideo dicitur præternaturalis. Secunda est, quæ habet phlegma viscosum admixtum, & dicitur bilis vitellina, & etiam præternaturalis, quia inepta est ad vsus naturæ, scilicet apertionem & deterfionem, sed facit magnas obstructions. Tertia est illa, quæ vocatur bilis adusta per admixtionem, quia habet admixtam alteram bilem adustam: ista ita præternaturalis est, ut semper dum in corpore existit, faciat agritudinem maximam in vasis: Et si extra vasa est, semper crodit. & hæc est illa, quæ caneros exulcerat, & facit vlcera omnia melancholica, & sic dicamus, quod omnis bilis est aut naturalis aut non naturalis, aut præternaturalis. naturalis latet in sanguine & non potest oculis humanis videri, & est quartum elementum in sanguine, cuius saporem, odorem & colorem non nisi coniectura cognoscimus, & fit ex omni chylo etiam frigidissimo, dummodo ex eo chylo fiat sanguis. Secunda bilis non naturalis est & dicitur excrementum biliosum, flauum, pallidum, gustu amarum, quæ bilis colligitur in vesica fellis, ut detergat intestina & proritet ea ad excretionem, & ut venas detergat & aperiat, & proritet transitum chyli ad epas: & hæc bilis fit partim in epate, partim in venis ex sanguine calidiori. Tertia est præternaturalis, quæ duplex est, vel præternaturalis per se & pura, vel per accidens per admixtionem: pura iterum duplex est, vna per putrefactionem exusta vocata, quæ acris est & erodens partes, ubi est, non solum amara: altera præternaturalis est per coctionem, quia tosta & vsta est non putrida, & fit ex bile vitellina, & aliquando porracea, aliquando æruginosa vocatur: altera est præternaturalis per admixtionem, quæ iterum triplex, altera citrina vocata, altera vitellina, & altera adusta per admixtionem humoris melancholici. Tot sunt species bilis, à quibus possunt oriri varia genera affectuum, sicuti inferius dicemus. Et hæc de bile flaua.

GABRIELIS FALLOPPII MV- TINENSIS MEDICI AC PHILOSO- PHI PRÆCLARISSIMI; DE SCIRRHO ET RE-

LIQVIS TVMORIBVS OMNIBVS, CVM VNI-
uersalibus tum particularibus, qui libro eiusdem in Tomum
Primum relato defunt.

TOMI II. Tractatus IX.

De Scirrho. CAP. I.



*Puls scir-
rhus nomen
habet.*

*Quid scir-
rhus ex A-
uicenna.*

*Quid scir-
rhus ex Ga-
leno.*

*Causa effi-
cientis scir-
rhi.*

*Causa ma-
terialis.*

ΚΙΡΡΟΣ vel *κίρρος* vel *κίρρος* Græcis id significat, quod ab Auicenna fen 3. lib. 4. tract. 2. cap. 4. vel 12. vocatur Sephiros, & à modernis ac barbaris durities, quamuis Græci per hanc vocem *κίρρος* & *κίρρος* significent etiam quancumq; duritiem absq; tumore. *Κίρρος* autem est ex illis morbis & inter illos connumeratur morbos, qui symptomata morbi explicant, siue nomen recipiant ab aliquo accidente vel natura affectus nō autem partis, nam à duritie nomen habet, quia durus est hic tumor atq; omnino tactui renitens. Cum vero hæc nomina reperiuntur apud scit-
ptores, scirrhus, durities & Sephiros, eandem tamen morbi speciem significant. Auicenna autem fen 2. lib. 1. doct. 1. cap. 1. sic ipsum describit: durities est apostema quietum & sedatum, id est tumor præter naturam non habens symptoma vllum infestans. subdit postea, sensum destruens sine dolore & permanens in membro in eodem statu: non enim crescit cum ad statum suum peruenit nec declinat, nec dolor adest, cū in eo non existat calor vllus, sed hæc descriptio seu definitio est aliquo modo bona ac explicat scirrhum secundum aliquas partes, quia est descriptio scirrhi exquisiti, non autem vniuersalis, quare est definitio peculiaris: aliqui enim sunt scirrhi, in quibus adest sensus: nam in scirrho nō legitimo atque non exquisito nō est destructus sensus, est tamen scirrhi species. Gal autem in lib. 5. de simpl. med. fac. cap. 9. & in lib. de tum. præ. nat. sic nobis scirrhum describit: Scirrhus est tumor durissimus ac indolens: & hæc definitio communis est omni scirrho, quoniam de natura scirrhi est, esse sine dolore: Si enim adfit dolor aliquis, inclinatur in cancerum, quare non continetur tunc sub natura scirrhi. Aduertendum est autem, quod inter tumores omnes à materia ortos nullus est ita durus, vt scirrhus, sed tumores ossium sunt duriores scirrho.

Causæ scirrhi efficientes sunt omnes causæ aliorū tumorū, extetnæ aut internæ: extetnæ vt contusiones, calefactiones, appositiones medicamentorum calidorum ac etiam refrigeratoria maxima. Cum enim duo genera scirrhi habeamus, alterum quod incipit per se, alterū, quod fit per transmutationē ex alio tumore, vt ex erysipelate, in quo per refrigerata applicita fit scirrhus: Scirrhus purus incipit semper pro causa habet refrigerationem maximam: & hæ sunt causæ extetnæ. Causæ vero internæ efficientes sunt laxitas partis recipientis & aptitudo ad recipiendum ratione situs vel imbecillitas: præterea caliditas existens in parte, quæ attrahat: præterea fluxio in humoribus crassis ac viscosis cum suis causis, vt expultrice valida, membrorum calore maximo ac motu agitationeque humorū scirrhi. Mala etiam victus ratio multum facit ad hanc fluxionem, quod sæpe contingit in pauperibus, propter malam viuendi rationem, vt testatur Galenus de regione illa pauperrima. Addatis quod tales humores crassi ac viscidī generantur etiam ex licentis & hepatis affectione, aut ratione intemperiei aut obstructionis, hinc est, quod quandoq; desinente quartana, contingunt tumores scirrhi, aut intrinseci aut extrinseci. Addatis suppressiones purgationum naturalium, vt per vomitum vel per hæmorrhoidas aut per menses, & potissimum hæmorrhoidarum ac menstruorum suppressiones, quæ sunt in causa generationis horū malorum humorū, vt sæpe contingit mulieribus præcipue monialibus, quæ cum crebro patiantur menstruorū suppressiones, tunc illa materia ascendit ad mammæ & facit scirrhum, quod etiā fieri potest ex mala curatione Medici, qui tumores superflue refrigerant quandoq; & tunc sunt scirrhi vocati per transmutationem.

Causæ v. materiales sunt humores ipsi, in quib. Græci à recentiorib. d.fferunt recentiores enim dicunt esse atram bilē vel succum melācholicum, qui & ipse diuiditur in naturalem & non naturalem: vnde cum atræ bills vatiæ sint species, hinc scirrhorum tumorū

varia

varia succedunt genera. Sed cum præcipue duplex sit atra bilis: altera quæ hypostasia siue
 subfida aut fecalis dicitur; altera vero superfluens, excrementitia & non naturalis.
 Primam autem naturalem Galenus vocat sedimentum sanguinis & succum melancholicum
 vel faciem sanguinis, quæ transmittitur ab epate ad lienem, ac decidit ex sanguine vt
 ex vino fæx crassa dum mustum coquitur, & est melancholia naturalis cuius tamen secun-
 dum istos vna pars fertur ad nutriendum corpus cum sanguine ac frigidas partes, altera vero e-
 ius pars ad lienem demittitur, ex quo postea ad ventriculum demandatur vt appetitum ex-
 citet & faciat: ac dicunt, quod huius sapor sit medius inter dulcem & acerbum, & ipsam
 subdulcem vel ponticum appellant, & ex tali succo dicunt ipsi, generatur exquisitus, vo-
 10 tus & syncerus scirrhus. Secundum dicunt quod ex melancholia non naturali fiunt scirrhi,
 qui sunt in quatuor differentiis, secundum quod quatuor dicunt esse species non natura-
 lis melancholiz: prima species est quando fæx sanguinis aduritur, ex qua fit scirrhus non
 legitimus: Secunda species est quando melancholia exusta fit ab aliis humoribus præter
 quam à melancholia: Tertia species est, quando per refrigerationem aut propter nimiam
 exiccationem redduntur humores crassi, puta ex medicamentis quæ species contradi-
 20 cimus: prima species naturalis melancholiz: Quarta species non naturalis melancholiz est quan-
 do melancholia admiscetur aut sanguini aut bili huiusmodi: & ex his ellicuntur diuersas
 scirrhi species secundum diuersitatem specierum melancholiz: nuper enumeratarum.
 Verum Galenus non ita disponit materiam huius tumoris, sed tantum dicit, quod scirrhus
 30 habeat materiam crassam, viscidam & lentam, quæ in partibus collecta ita illas reddit, ac
 si essent lapideæ: postea illam tripliciter diuidit, alia ex pituita, alia ex sola melancholia pura,
 tertia ex melancholia admixta alii humori: ex quo colligimus duplicem esse scirrhum,
 vel syncerum scilicet vel non syncerum: & talis distinctio non fit ratione materie subiectæ,
 quia ex materiis enumeratis omnibus potest fieri scirrhus verus & non verus, sed di-
 stinguuntur per suas proprietates scilicet vt habent vel eantem symptomatibus, vt adest vel
 deest durities, vis huiusmodi, & vt est participes & experti sensus & doloris: additur tertia spe-
 cies & est, quando aliquis alienius humor admiscetur melancholiz, & tunc effectus fi-
 40 xus, vt de aliis tumoribus supra (in Tomo primo) diximus, qui affectus varijs nominibus for-
 tiuntur secundum varietatem humoris admixti, vt infra accuratius dicemus. Sed prius
 dicamus, quod his suppositis non est mirum, si Auicennas & moderni accusant Galenum
 aliter sentientem: cum ipse velit, quod hæc fæx non nutriat, cum sit excrementum, neque
 per totum corpus cum sanguine feratur, sed distinctum sit à sanguine ac alimentis partium
 solidarum: quando enim dixit Galenus sanguine nutrire membra, intelligit de tota
 massa: quando vero dixit in qua est succus melancholicus, non intelligit de hac fæce, vt
 credit Auicennas, quam ipse naturalem appellat: quoniam hæc non vere naturalis di-
 50 citur, sed naturalis est illa, quæ est quarta pars massæ diuersa ab ista fæce: nam sicut in vino
 fit fæx, flos & vinum, ita sanguis medius est inter faciem vel succum melancholicum ac bilem
 ipsam, tamen adhuc in ipso sanguine sunt quatuor humores proportionati, & fæx illa
 est excrementum, neque per se fit apta lienem nutrire nisi complicitur cum alio sangui-
 60 ne, quod patet ex multis arteriis delatis ad lienem, à quibus sanguis defertur pro eius nu-
 trimento. Melancholia autem non naturalis à modernis diuiditur in non naturalem per
 admixtionem & per exustionem vel refrigerationem melancholiz: per admixtionem
 70 Melancholia autem per exustionem quadruplex est, prima quæ fit ex bile flaua vsta,
 & est cinis ipsius bilis flauæ: Cum enim ira exuritur flaua bilis, vt renes eius partes exha-
 lent & crassæ remaneant, hæc acres sunt, amara & exurentes siue exulcerantes, & ex GALE-
 NO est vera atra bilis, & quamvis Auicennas velit hanc esse tantum amarâ, tamen etiam
 acris est. Secunda vero est illa, quæ fit ex pituita adusta. Sed irridendi sunt recediores, quoniam
 80 non fit ex pituita adusta atra bilis, sed si pituita crassa & viscida: & hanc vocat Galen.
 lib. 1. de simpl. med. fac. cap. 9. pituitam ressecatam, quæ nisi improprie melancholia dici
 non debet & volunt hanc esse saporis austeri, acris & salis: & tertiam melancholiam, quæ
 fit ex sanguine exusto, inclinare in dulcedinem, quod tamen reuera ego fatcor me assequi
 non posse. Quarta melancholia est illa, quæ fit ex succo melancholico & est præter natu-
 90 ram omnibus animalibus infestissima, acris & acida vt acetum, terram fermentans atque scer-
 da & mufcis inimica, de qua etiam loquitur Galenus, & est illa fæx, quæ fit ex bile flaua ex-
 usta per refrigerationem vel ex sanguine refrigerato & exiccato, vel exiccata & refrigerata
 bile. Melancholia vero non naturalis per admixtionem est vel cum sanguine vel bile vel pituita.
 Cum itaque tot sint species melancholiz, dicunt isti à melancholia naturali fieri verum
 scirrhum, phlegmosum ac sine dolore. Ab atra vero bile non naturali per admixtionem
 vel per refrigerationem fieri scirrhum per complicationem vel per transmutationem dictum. A

4. Species
 melancholiz
 non natu-
 ralis.

10. Species
 melancholiz
 non natu-
 ralis.

Melancholia
 per exustionem
 quadruplex.

11. Species
 melancholiz
 non natu-
 ralis.

materia vero melancholica per exultionem fieri scirrhus cancerofos ac malignos. Ab illa quidem per refrigerationem scirrhus per transmutationem ex aliis tumoribus atque humoribus & illis compositis, ut sunt phlegmonosi, erysipelatosi, oedematosi. & tot sunt melancholici & scirrhi ex recentioribus.

Galenus autem tot species scirrhi non ponit, neque vult tantum à melancholica materia fieri, sed cum scirrhus sit tumor durus & sine dolore, actus à natura rei ac experientia rei ductus vult, quod omnis congestio materiz viscidæ ac crassæ scirrhum possit facere, quare duo sunt genera humorum scirrhum generantium; quorum primum est cruditas, de qua diximus, pituita scilicet crassa, non tamen viscida: secundum est materia vitrea, vel phlegma vitreum, crassum ac tenax. Quod autem tumores duri fiant etiam ex pituita, patet ex gummatibus gallicis, in quibus apertis apparet materia pituitosa alba crassaque, unde libr. 5. de simpl. med. fac. cap. 6. & in lib. de tum. cap. 6. & lib. 14. meth. & libr. 2. ad Glauc. semper duplicem scirrhorum materiam proponit, pituitam scilicet & melancholiam, & utrumque humorem exiccatum, id est, denudatum à proprio ichore, à materia aquosa, ita ut sola dura ac terrestris pars remanserit partim impacta. Omnis enim succus in corpore, quamvis etiam excrementum sit, habet partes aliquas tenuiores, quibus resiccatis, vult Galenus, necessario, si à pituita & melancholia fieri debet, dari tumores, qui duri sint ac sine dolore. quare due sunt species scirrhi, melancholici & pituitosi. Scirrhus materia melancholica est tumor cancerofus nec cum emollientibus curandus, quoniam irritabitur atque magis concitabitur ex libr. 1. de simpl. med. fac. Scirrhus autem à pituita emollientibus curari potest, quoniam his potest & emolli et discuti præterea scirrhus à pituita est mitis ac sine aliquo dolore, quia habet materiā ita in nervis impactā, ut sensum abstulerit ac reliquerit. Ex hoc autē symptomate duas species scirrhi habemus à pituita facti, quarū altera est exquisitus scirrhi, in quo nullus in parte sensus adest: altera vero scirrhi species est illius, qui adhuc sensum in parte retinet ac dolorem aliquem habet.

Notandum est autem, quod si loquamur de scirrho à materia melancholica, licet Galenus ipsum diuidat, ut diximus, ego tamen sum dubius nūquid distinguere debeat in exquisitum & non exquisitum: nunquam enim ego vidi nec vidisse fateor cancerofum tumorem absque dolore ac punctatione intercurrente, quoniam hæc certū significant à esse scirrhum cancerofum. Sed si vellemus distinguere, dico quod possemus dicere, scirrhum cancerofum, exquisitū esse illum, qui fit à melancholico succo benigniori ac seculēta materia pura benigna ac sine calore, qui potest ita impingi in partē, ut non sentiat ab ipsa. dico autem sine calore, quoniam omnis atra bilis per adulationem, licet frigida sit, partes tamen calidas & acres habet, ratione quarum fit erosio & sensus seruat, quare atra bilis exulta nunquam facit scirrhum exquisitum ac sine dolore. Materia autem scirrhi faciens per transmutationem semper fere ipsos exquisitos facit, ut cum ex erysipelate vel inflammatione fiunt scirrhi.

Compositi
scirrhi.

Compositi autem scirrhi vel fiunt à pituita pura vel à melancholia, vel ab horū utroque mixto vel cum sanguine vel cum bile flaua vel cum pituita dulci ac tenui, unde fiunt scirrhi compositi exquisiti & non exquisiti. & ita saluatur definitio Galeni etiam in scirrho canceroso, in quo non est exquisitus ac continuus dolor si dicatis, quod scirrhus dicitur, quia tumor durus sit, & in eo non adsit dolor perpetuus, sed per vices quasdam intercurrēs, unde non dolorosus dici possit. Habemus præterea scirrhus compositos & factos per refrigerationem. Quare colligitur, scirrhum aut ex pituita esse viscidum ac cruda resiccata vel à pituita vitrea: & hunc esse vel exquisitum vel non exquisitum aut ex melancholia etiam, qui cancerofus est, quique ut plurimum exquisitus non est: raro enim exquisitus est, quoniam semper dolorem adiunctum habet; quoniam exquisitus est scirrhus, qui dolorem non habet non exquisitus vero qui dolorem habet. Scirrhum præterea ex transmutatione dari ex materia mixta simul & variā iuxta varietatē humorū, ex quibus fit & compositus est, quoniam sepe materiā pituitosa cum atra bile miscetur, & facit scirrhum. Unde sciendum est, quod tunc si pituita est in maiori copia fit scirrhus oedematofus, si autem atra bilis copiosior est, fit cancerofus scirrhus.

Dubitari
an à pituita
mixta cum
melancholia
faciat scirrhum.

Sed hic etiam dubitatur, quomodo mixta pituita cum melancholia faciat scirrhum, cum inter se sint contrariæ: nam pituita est mollis, melancholia vero dura, unde proprietas oedematis, quod sit ex pituita, est mollities; scirrhi vero, qui fit à melancholia, durities: ad hoc respondendo, quando Gal. dicit, quod pituita admisceatur, intelligendum est, quod illa pituita est tenax & crassa, sed hæc tertia species secundum placita Galeni non est admittenda, ut supra diximus; quia cum scirrhus semper sit durus, non potest dici oedema, cum pituita non possit cum melancholia inuicem misceri.

Signa autem scirrhi pituitosi ac veri sunt primum color cutis non immutatus in parte reliqua: & ratio est, quoniam hic scirrhus solet vt plurimum oriri circa chordeas, nervos, periochia & ligamenta: raro autem in cute: vnde non est mirum, quod cutis proprium seruet colorem. Secundum signum sumitur à loco, quoniam oriuntur scirrhi circa viscera & circa partes netuosas, in quibus raro accidit tumor, qui scirrhus non sit. Tertium est durities tactui renitens, & scirrhus exquisitus ille est, in quo sensus ablati est neque etiam ex compressione dolor excitatur, nec fit fouea. Ex recentioribus autem est aduertendum, quod duo tantum proponuntur signa, durities scilicet & priuatio doloris, quæ sunt vere inseparabilia signa scirrhi: vnde si ad compressionem scirrhi cum digitis sensus non adest, tunc ille scirrhus est confirmatus. non exquisiti autem scirrhi signum est dolor aliquis, quod signum sæpe apparet, præcipue in liene.

Cognitis his sciendum est, quod ad prælagium, quod in exquisito scirrho & confirmato non est suscipienda curatio, quoniã talis scirrhus eam non recipit, & præcipue cum accidit circa articulos, vt circa genua & talos & alias iuncturas: vnde tallum curatio est relinquenda: nec debet Medicus ipsius prouinciã suscipere. Si vero scirrhus non sit exquisitus, nec declinet ad cancerum, difficilis est curatio, quoniam in materia primum resiccata, deinde in parte impacta frigida timenda est longitudo ac difficultas morbi. At si declinet ad cancerum, non est tentanda curatio, nisi dolor vtgeat: quoniam si sunt cancri occulti, quos melius est non curare teste Hippoc. in aph. præcipue circa partem affectam, in reliquis vero aliqua possumus exhibere. Vnde in scirrhis, qui habent sensum, loquendo de scirrho non cancroso, non est despetandum, quoniam quandoq; curantur: vnde non est prætermittenda curatio. Et tales duplici modo curantur, vel per resolutionem scilicet vel per maturationem aut concoctionem, vel abscessum.

Aduertendum est tamen, quod semper debemus prius tentare resolutionem, quam maturationem, & ratio est, quia scirrhi transientes in abscessum, raro euadunt, quin transierint in fistulam.

In scirrhi autem curatione eodem tres scopos seruare debemus eademque capita, quæ seruanda esse diximus in aliis tumoribus: & primo debent omnia attenuare & subiliare. Aer itaque est attenuandus ac subiliandus pro posse, quia multum confert, quod possunt testari ii, qui Piliis degunt, quorum plurimi corripuntur scirrhis internis propter aerem & aquam.

Cibaria bona sint, coctu facilia ac boni succi: crassa fugiantur ac pituitosa, fugiantur etiam omnia olerum genera, caseus ac cetera pituitam multiplicantia, præcipue brassica, legumina omnia & carnes bubulæ: vnde eligendæ sunt carnes auicularum montanarum, vituli & similia.

Conuenit etiam vinum purum ac potens, nisi scirrhus fiat ex adustione, quoniam tunc vinum est diluendum aqua.

Exercitiorum habenda quoq; ratio est, & motus conueniunt, & præstans est motus, nisi pars læsa afficiatur: sit tamen ita moderatus, vt non sit coniunctus cum sudore maximo ac spirituum dissipatione: quicquid autem extenuat sine resiccatione, præstantissimum est. Somnus moderatus sit. Excrementorum quoque habenda cura est, aluum lubricando ac leniendo aut elysteri aut aliquo consimili alternis saltem diebus. Venus animique perturbationes fugiantur: Venus enim inimicissima est huic morbo, quia refrigerat partes ac pituitam generat.

De Purgatione totius & tractatione loci affecti in scirrho. CAP. II.

Quo autem ad secundum caput, quod versatur circa habitum totius corporis, considerandum est, cum peccet humor crassus, an sit exustus, an non exustus: vnde Auicenna ait, quod vult, quod quando venæ extuberant, mittatur sanguis, & optime succedit & rationabiliter, quoniam cum humor hic non possit nisi difficulter præparari, debemus humores minueres sectione venæ, dummodo cetera indicantia concurrant, & potissimum ætas & virtus. Sed notandum, quod multi in venæ sectione confundentes curationem scirrhi cancerosi cum hoc errant: sed quando loquimur de scirrho non exquisito à pituita, non est secanda vena, nisi adit plenitudo vel inflammatio cum scirrho.

Cum autem necessaria sit expurgatio per euacuantiã materiã pituitosam, leniatur prius aluus comuni lenitione, deinde attenuetur ac præparetur materia cum potentissimis, non tamen nimis exiccantibus, quæ maxime attenuant. Sic itaque pro attenuatione viremini sem, forniculi anisorum, pulegio, origano, calametho ac hyssopo: acetum autem scilliticum

Notandum
tunc si cum
simplicium
excitantur.

omnia superat & mel quomodocumque administratum. Sed dubitatur in exhibitione horum simplicium, quoniam cum materia crassa sit, rescicata & assata, pars eius quidem attenuabitur, sed alia magis assabitur & magis inerasabitur, quare hæc exhibeatur cum aliquo reudente vim eorum excitantem; ut si coquantur cum his borraginem, liquiritiam, semina fenugræci, melonum & cucurbitarum. Vnde ego quasi semper mado, ut fiant decocta in iure carniū ad humectationem & præparo materiam ac humorem ipsorum pituitosum cum syr. de betonica, Regis labor, de fumaris cum decoctione melissæ, borraginis, fumariz & similibus in iure carniū, addendo cochlearia duo vel tria dictorum syruporum.

Pilularum
fendacæ
quæ.

Præparatis humoribus sunt euacuandi cum cortice ellebori nigri infuso in sero aut myrobalanis vtor cum electuario in dosi maiori cum senna, lapidibus lazuli & armeno. Sed ego vtor istis lapidibus, lotis, ut iubet T. Rallianus, nouies. conuenit etiam coëctio hamech. Sed quamuis multa sint pituita educenda, duo tamen tantum ego familiaria habui semper, pilulas C. fortidas, quæ ratione gummi contendorum maxime euacuant etiam à remotis partibus, ac vim habent detergendi neruos. Alterum vero medicamentum, quo vtor pro euacuatione huius materiz sunt pilule de hermodactylis, quæ etiam ratione ipsorum gummi, colocynthidis & hermodactylorum iuuant maxime: & si opus sit repetita fiat euacuatio.

Loci affecti
tractatus.

Facta euacuatione totius deueniendum est ad locum affectum, circa cuius tractationem materia crassa ac impacta emollienda est, ut facilius euacuari ac resoluti possit, quoniam eger euacuatione propter tumorem, & euacuatio debet esse insensibilis, vnde sit medicamentis calidis & ficcis. Sed dubium est nunquid conueniat calida & exicca, ne reddatur morbus incurabilis, nec etiam videntur humectantia conuenire, quoniam talia augent fluxionem agendo humorem peccantem. quid ergo agendum? Galen. nos docet, ut agamus eo modo, quo agit sol in rebus liquabilibus: nam cetera apposta soli sensim liquefit, vnde si emollientia id faciunt, faciunt non caliditate sed mollietate sua tantum vnde calida debent esse medicamenta in actibus, temperata vero in passibus, quæ à Gal. proprie masticata dicuntur & emollientia, de quibus Galenus agit in lib. 7. de compos. med. per gener. circa prin. & in lib. 5. de simpl. quare calida actu & potentia non conueniunt nec per se iuuant; his calida sint actu & potentia cum substantia humida.

Qualia me-
dicamenta
requirat
scirrhus.

Adipi.

Horum autem medicamentorum triplex est genus; & in primo sunt medullæ, pinguedines & mucilagines inter medullas autem principatum obtinet ceruina & vitulina, quæ calida est & humida. Inter adipem principatum habet adeps leoninus, cuius loco possumus uti asinerino aut vrsino: possumus etiam uti adipe anatis, gallinæ, tauri, capræ & hirci & hi sunt gradus caliditatis in modo procedendi: verum hi tres vltimi non ita emolliunt, quoniam hicciores sunt. Sed notandum est, quod cum proposuerim adipem leoninum & vrsinum, his maximo cum successu testor me pluries usum fuisse: & in horum numero continetur etiam adeps pardalinus. Præterea adeps Taximelis dicti à Plinio, & etiam adeps anguillæ, qui potentissimus est in emolliendo; præterea adeps Themali piscis, qui maxime etiam penetrat. Inter olea sunt oleum ex cera, ex thure, ex viciellis ouorum. Inter gummi est bdellium ac mastiche oleo dissoluta ac etiam thus oleo dissolutum: hæc enim per se ita res valent similiter ammoniacum, styrax alba & calamita dicta &c. Inter mucilagines autem ex feminibus ut fenugræci, & lini ex radicibus autem, ut altheæ vel eius feminibus, ex quibus omnibus varia componi possunt: nam primo decocta confici possunt, in quibus pars scirrhi affecta imponatur hoc modo; accipiendo sem. lini, fenugr. sol. malū, rad. alth. & hæc coquendo cum capite veruecis in multa quantitate aquæ faciendo balneum, in quo tumida partem æger detineat, vel accipiat horum decoctum & pauco odorato vino addito fiat fomentum cum spongia. Notandum autem est ex Galeni monitis, quod vel sint fomenta vel balnea, semper aliquid cum emollientibus miscendum est faciens ad penetrationem. quoniam emollientia ut plurimum indigent aliquo penetrante, ut sunt rad. cyclaminis vel briognizæ albeæ aut nigre vel cucumeris alini in parua tamen copia, vel his deficientibus deuenimus ad semina actia, ut feniculi, anisum & huiusmodi. Si vero pinguedinem admiscearis, imponatis oleum resolutorium ad penetrationem, vel decoctis in pauco aceto ista medicamenta dicta. Vnde Galenus monet, ut infundamus partem affectam in oleo anodyno, imo potius in oleo antiquo & rancio, postea inungamus partem pinguedinibus, postea addimus gummi illa, donec locus reddatur mollior, ut est galbanū, bdellium, ammoniacū, mastiche ægyptiaca & huiusmodi mixta cum superioribus. Cum v. nobis indicatur quod materia sit digesta, imo facta emollietione aliqua, licet non appareat, materię euacuatio per discutientia fiat, vnde Gal. dissoluēbat ammoniacum cum aceto & superponebat scirrhi: vel viamini oleo resolutorio in lib. 14. meth. cap. 5. de scripto partem inungendo; postea viamini diachylone cum gummis, quia conuenit optime. Quod si non succedit, debemus de nouo ad emollientia reuert-

Olea.
Gummi.

Mucilagi-
nes.

Balneum.

Notandum
enim fomenta
& balnea.
Facientia
ad penetra-
tionem.

Quæ res
sunt.

Facta emol-
lietione quæ
agendum.

Resolutio.

reuerſi & illis per interualla uti ne materia, cum ſit rebellis, indureſcat; nam talis materia nõ poſteſt vnica vice euacuari & reſolui. Ego vero vtor medicamento Galeni ex lapide pyriti-
 de, qui ſulphurarius, eſt ipſum calefaciendo, imo etiam igniendo ter & quater, & igneum
 ipſum proiciendo in acetum, & ſic ſuper illud acetum partem deſcendendo affectam, vt va-
 porum inde eleuatum ſuſcipiat locum ſuſſumigando, quia materiam iſtam attenuat ac diſci-
 pit. deinde fiat ceratum ex ammoniaco in ſuſulo in aceto & ſuperponatur, vel fiat ceratum
 ex lapide pyritide, quod diapyrites dicitur, quo ego vtor etiam in ſcrophulis optimo cum
 ſuccoſſu, ſed non apertis. Galenus autem lib. 7. de comp. med. per gen. multa ad hanc ma-
 teriam conferentia proponit, ſed cerato illo ex pyritide uſus ſum perſepe & vidi mire ſuc-
 10 cedere pro reſolutione vltra concoctionẽ in maximis tumoribus, nõ dicam duriffimis ſed
 valde duris. Et quoniã mentionẽ feci iam de ſcrophulis, notandũ eſt, quod ſemper in ſcro-
 phulis apertio eſt fugiẽda, imo reſolutio tenenda, q̃ mihi ſepe ſuccceſſit à principio cũ mol-
 litiõis ſupra narratis, poſtea cum ſuſſumigiis ex lapide pyritide, & etiã cum emplaſtro eiuf-
 dem lapidis, vel elus loco admixcemus lapidẽ pulueriſatum cum diachylone cum gummis.
 Quarto loco quo ad ſcirrhofam partem medicamenta applicentur ex alto ducentia ac diſci-
 entia, vt ſi vtamur cerino emplaſtro vel oxycroceo ſolo cum emplaſtro ſacro. Paulus
 autem facit medicamentũ ex ſandataca Græcorum, quo etiam ego vtor in omni ſcirrho ſe-
 liciter. Sed aduertendũ eſt, q̃ cum uſum attenuantiũ per tres dies continuaueritis, iterum p̃
 quinque & ſex dies vtendũ ſit emollientibus, deinde vero iterũ reſoluentibus, & ſic vicibus
 20 cõmutatis, vt ſupra etiã dixi, & vt habetur ex li. 3. de compoſ. med. per gen. & li. 7. de comp.
 med. ſec. loc. ita tamen vt maius ſpatiũ ſit, in quo emollientibus vtimini; nã hoc modo ſcite-
 ri etiã duriffimi ſuperantur. Notandũ eſt etiam, q̃ per interna ſuccedit emollio & eua-
 cuatio huius materie; vnde ego quẽdã propria habeo familiariaq̃ medicamẽta, quibus v-
 ſus ſum, à nemine in hoc caſu poſita, inter quẽ primum eſt ſalſa parilla, q̃ ſepe tophos maxi-
 mos diſcuſſit ac fere lapideos & ſaxeos. ſecundũ medicamentum eſt decoctũ guaiaci, q̃ ta-
 men non ita bene ſuccedit, vt ſalſa, niſi in tumoribus gallicis. Tertiũ eſt radix ruſci & aſpa-
 ragorum ſiccata & in puluerẽ exhibita quotidie cum melle vel maluanco vino p̃ 40 dies.
 Quarto in loco habeo duo valida diſcutientia, quorum primũ eſt lachryma terebinthi cy-
 prij vel lachryma noſtræ terebinthinæ, quæ eſt reſina larinica noſtra; Secundũ vero eſt am-
 30 moniaci lachryma, quã cum ſtyrace ſepe ſolitus ſum exhibere. Ad ſcirrhos vero hepatis &
 lienis nunquã ego adinueni melius medicamentũ chalybe, ſi ipſius limatura maceretur in
 vino, vel extingatur ferrum ignitum in vino, ita vt fiat chalybeatum. & hæc de pituitofiſ
 ſcirrhis ſatis ſint dicta.

*Atenira
quandã de
ſcrophulis.*

*Emollio
& reſolutio
per interna
medicamen-
ta propria.*

*Ad ſcirrhos
hepatis &
lienem.*

*De Cancro quo ad varia eius nomina, definitionem, differentias, ſigna, cauſas & pro-
gnoficum. C A P. III.*

Scirrhus autẽ melancholicus dicitur à ſucco craſſo & melancholico, qui de genere can-
 40 cerum eſt, & dicitur à Græcis *καρκίνος* vel *καρκίνος*, à noſtris vero cancer à ſimilitudine
 pedis cancriationis vel marini, quia habet venas circumquaque diſpoſitas tumentes, vt ſunt
 pedes cancriationis cuius ſimilitudinis *καρκίνος* dictus eſt ex libro decimo meth. capitulo
 ſecundo, & ex libro ſecundo ad Glauc. capit. 10. & ab Auic. ſen. 3. libro quarto capite prop̃t.
 & à Paulo & Aetio vocatur cancer, quia locum ita arripit quandoque, vt inde diuelli mi-
 nime poſſit ſine partis corruptione ac mortis periculo, quod propriũ eſt cancri fluuiatilis,
 cum chelis ſuis aliquid arripuit. Tertiõ dicitur cancer ab Aetio lib. 13. c. 46. vel lib. 16. c. 43.
 quia aſper ac durus tumor eſt, vt eſt verus cancer ille gammarus dictus, qui teſtam in equa-
 lem, duram ac aſperam habet.

Cancrorum autem duo ſunt genera ex ſect. 6. aph. 38. vbi Hippocrates monet, vt oc-
 culti cancri curacionem dimittamus. Gal. enim ibi diſtinguit cancerum in occultum & ma-
 50 niſeſtum. Occulta autẽ ea genera morborum dicuntur, quorũ vel locus affectus vel cauſa
 ignoratur, vel quia oriatur in partibus abditis: & hoc tertio modo cancer dicitur occultus.
 Aetius vero lib. 16. c. 43. partes has abditas eſſe dicit, inteſtina ſ. vetriculum, lienem, hep̃,
 palatum, ſinũ mullebre, vterum ac viſcera omnia.

Sed cancer dupliciter occultus dicitur; vel ſcil. quia ſit in parte intima ac abdita; vel
 quia licet ſit in parte maniſeſta & extrema, non ſit tamen vlceratus, vt ſi ſit in glandula
 mammillæ, non tamen vlceratus, quia tunc cutẽ tegitur, ideo occultus dicitur. Sic etiam
 dupliciter maniſeſtus dicitur, vel ſcilicet quia ſit in extrema parte, vel quia ſit vlceratus; vn-
 60 de colligendum eſt cancerum poſſe eſſe & occultum & maniſeſtum ſimul. Si enim ſit
 cancer in viſcere vlceratus, erit occultus, quia in parte abdita eſt; erit autem maniſeſtus,

*Atenira
quandã de
canceribus.*

*Diſſiſſe can-
ceri ex Gal-
eno.
Occulti mor-
bi partes que
ita dicuntur.
Partes oc-
cultæ.*

*Cancer du-
pliciter oc-
cultus dici-
tur.*

Quotiesque
atra bile fa-
cit tumorem
cancerosum.

quia est ulceratus: sic si in mamilla sit non ulceratus vel etiam potest esse omnibus modis occultus, ut si sit in abdita parte & non ulceratus; & etiam potest esse omnibus modis manifestus, ut si in mamilla ulceratus. distinguitur etiam cancer ratione materię, quoniam cum atra bilis multiplex sit, quamvis quęcunque bilis faciat tumorem cancerosum, tamen non sunt omnes vnius generis, quoniam alii benigniores sunt, alii maligniores. Si enim fiat ex atra bile, quę est succus melancholicus, siue fœx sanguinis, rŭc benignus erit: si vero fiat ab atra bile seu à melancholia atra bile proprie dicta ac exusta, erit malignus: si vero à melancholia refrigerata, benignus.

Præterea si commisceatur pituita cum aliqua istarum, retunditur earum malignitas, vnde benignior fit. Quare possunt distingui tumores cancerosi, siue ulcerati sint siue non, in benignos ac malignos. In benignis autē nulla sunt seua symptomata, & nisi irritentur tumores isti, non valde homines afficiunt, quia non adest dolor; vel si adest, parvus est, & ita quandoque ulcerati sunt benigni, & adeo benigni ut p multos annos durent absq; multa noxa; quandoque enim per duodecim & plures annos durant: omnes tamen maligni sunt, sed aliqui magis, aliqui minus.

Canceri beni-
gni signa.

Notandum
circa venas
cancerorum.

Signa mali-
gni.

Cui mali-
gnus cancer
datur noli
me tangere.

Causa effi-
cienti can-
cri.

Causa ca-
cri fac-
ticia.

Causa ma-
terialis.

Benignus autem cancer pro signis primum habet corium nigrum vel liuidum ratione humoris peccantis, qui est succus atrabilaris: secundo nullus adest calor ad tactū aut Medici aut ad ægri sensum: imo quandoque potius refrigeratio aliqua sentitur, quia vel à materiā melancholica, vel à pituita fit, quę sunt frigida. tertio venę apparent circumquaque subnigre tumentes non multum. Notandū est autem, & hoc quæso obseruetis, meū enim est, quod scilicet venę hæ ab omnibus pro signo ponantur, non sunt tamen signum certum, quia ex centum canceris quatuor non habent ipsas, & si reperiuntur hæ, maxime patent, quando potissimū sunt in mamillis hi tumores. Sed magis fidendum est duritie ac materię efficiēti, quoniam si cognoscetis materiā atrabilem ac duritiē, certo pronuncietis cancerum, licet non ad sint symptomata seua, quia potest esse cancer benignus. Hęc autem materiā cognoscitur à colore loci sub nigro ac liuido: & si etiam adest durities, pathognomonicū fit signū. Præterea cognoscitur ex pcedētibz, ut ex victus ratione pgressa vel ex aliqua suppressa euacuatione vel ex habitu corporis. Signa autem maligni canceri sunt primum tumor ingens ac durus. magni enim tumores nunquam mites sunt. Secundum signū est, quod visu videtur vnus tumor, tactu vero videtur alius: visui enim cutis perlucida est ac mollis apparet, tactui vero omnia dura sunt: ulcerationem enim hæc indicant ac partis corruptionem. Tertium signum est inæqualitas tumoris, cum enim tumor rotundus est, parvus, æqualis, lævis ac sine symptomatibus, benignus est, ac inæqualitas certum est signum malignitatis, licet nec dolor ad sit. Quartū signū est, si pertinaciter hæret radicibus late extensis: duplex enim est cancer, auulsius scilicet & non auulsius siue hærens: auulsi canceri sunt illi, qui si manu colligantur ac dimoueantur, non sentiuntur hæreere partibus subiectis, & inter hærentes nullus fere sanatur, inter auulfos autem aliqui tolluntur. Hærentes enim quandoque sunt ossibus & musculis ligati, & ideo in his sanitas sperari non debet. Quintū signum sunt venę exprimentes pedē cancro rŭi utrigidæ ac varicosę, & hoc distinguo plurimū, signis, quia cancer malignus ab istis dicitur noli me tangere: quoniam si suscipiatur eius curatio, cum ipso cancro homo etiā interficitur, quare maligni nunq; suscipiendum est onus, si mali Medici nomen subire nolis. Sextum signū est color subcineritius cum quodā nigrore addito ac etiam splendore quodam in superficie. Septimum signum est dolor pungitiuus: referunt enim ægri se sentire veluti gladium acutum vel clauum percurrentē per tumorem, quod prouenit à vapore acri maligno ex materiā melancholica orto, quę incipit putrefcere. Hęc autem puncturę indicant etiam cancerū in partibus intimis. Octauum signum est calor aliquis ab ægro vel Medico perceptus ad tactum acris ac pungens, quod signum est maxime malignitatis. Si vero cum canceroso tumore coniungatur inflammatio vel erysipelas, fit malignus ac maxime perniciosus.

Causę autem canceri efficiētes sunt fluxio humoris atrabilaris, quoniā solum in hepate ac bene per congeltionem potest fieri tumor hic, quoniam ibi generatur hic humor. Reliqua autem omnia loca si cancerum patiantur, patiuntur ex fluxione: fluxio vero fit vel à robore transmittentis, vel à quantitate materię vel ab acredine ipsius stimulante: causa vero attractionis est imbecillitas partis vel dolor vel calor: huius autem fluxionis causa est cacochymia, quę fit ex malo victu, ut ex lentibus, rapis, olenibus, carnibz, vaccinis, asininis, ac bubulis, raphanis, cochleis, salamentis ac omnibus acribus, vel etiam ex suppressa euacuatione aliqua consueta, vel ex varicibus suppressis quę prius distrumpi solebant, vel etiam causa cacochymicę ex lib. 2. ad Glauc. cap. 10. est calidus aer & siccus.

Materialis vero causa cancerosi tumoris est atrabilaris succus, qui est aut humor melancholicus.

lanchoicus & fæx mitis, ex qua etiam mitis fit cancer, vel est atrabilis materia vera & adusta, quæ cum maligna sit, ex ea etiam maligni fiunt cancri, vel est atra bilis cum pituita mixta, & est benigna materia, ex qua fit cancer mitis: vel est admixta atra bilis cum sanguine, & tunc fit cancer phlegmonodes: vel cum bile est admixta, & fit erysipelatosus, & istæ omnes materiae vel sunt cum putredine vel sine. Si putrescit materia, facit canceri ulceratum: nulla enim alia est causa ulceris, quam putredo, ad quæ necessario sequitur vlcus, ut patet in bile flaua delata ad corium in iætero & in congestione melancholicæ in liene vel ventriculo; quæ materiae nisi putrescant, non faciunt vlcus, ut præterea patet in euomentibus bilem vitam & acidam, quæ etsi detineatur in corpore non erodit, quia non iam putrefacta est, & sic pituita.

Omnes autem cancri occulti, id est, non ulcerati in partibus externalis, si benigni sint, indicant spem & sanitatem, vel mitigationem saltem per medicamenta vel per manuum applicationem, vel saltem promittunt prolongationem vitæ sine noxa. In occultis vero ac malignis, quamuis extrinseci sint, pauca est spes, & si adest aliqua, est in sola excisione tumidæ partis. Cancræ autem occulti in intimis partibus non sunt curandi, quoniam impossibile est ut sanentur, neque etiam sunt irritandi, sed demulcendi ac leniendi tantum: restor enim ego, me vnum tantum sanasse in palato, qui etiam paruus erat. Cancræ ulcerati idem indicant, quoniam benigniores, & aulsi indicant aliquam spem in refectione, non autem in medicamentis: si vero sint in partibus intimis, nulla est spes.

De Curatione cancri.

CAP. IV

Curatio Cancræ tribus capitibus continetur: primo in recta victus ratione; secundo in medicamentorum exhibitione; tertio in tractatione loci affecti. Quo itaque ad primum, eligatur locus, in quo sit bonus aer, bona aqua ac boni cibi: aliqua enim loca sunt fouentia cancos, ut est Pisanus aer quia siccus est. Motus opportunus eligatur, somnus moderatus sit animi angustia abigatur, quoniam hæc solæ quandoque inducunt cancos; alius semper leniatur per clysteres fæces saltem educentes. Victus tenuis sit quantitate, sed qualitate humidans ac refrigerans, non attenuans, unde carnes molliissime esse debent ac ova etiam conueniunt & ex lacte omnia præter caseum vetustum. Olera optima sunt, maluarum folia in iure cocta, fructus refrigerantes & humidantes, ut sunt cæralia, pepones & persica in moderata tamen copia, ne ex succo illo fiat seruos ac putredo: panis sit parum salutus, vinum dilutissimum sit vel aqua vitatur, caueat ab aceto maxime, quoniam ex 3. de rat. vict. in acut. acetum magis fermentat atram bilem adustam; quare non exhibeantur acetaria, vel si admittantur, fiant cum aceto miti & aqua diluto cum saccharo & passulis, quoniam acetum facillime diffunditur per habitum totius corporis, unde penetrat ad partem cancerosam illam stimulat, & inde dolores augentur. Idem etiam dicatur de omnibus acidis, ut cæralis acidis, moris nigris & similibus; & hæc quoad victum.

Non est tamen abstinendum à medicamentis recipientibus acetum in parandis humoribus melancholicis, ut est syr. acetosus & oxymel. Loquitur enim Hippocrates de clibus in magna copia, unde exhibeatur syrupus cum 3. ss. oxymellis, quoniam parua erit quantitas aceri.

Omnes autem probant sectionem venæ, viribus tamen consentientibus etiam absente plenitudine, quoniam primo morbus magnus est quia magnos effectus edit; secundo rato sit, quin sanguis ater in venis non abundet, quare secunda est vena, ut crasso ac malo sanguine remoto, frigidiori ac mediocri impleantur tertio ut obstructions tollantur. Ut autem fiat perspiratio totius corporis mittatur sanguis à loco opportuno & in quantitate debita. semper. in cancro necessario sunt extrema venarum obstructa aut constipata officia.

Secunda autem vena si suppressa sit aliqua euacuatio consueta, prouocetur: ut si hæmorrhoides sint suppressæ, apponantur hirudines, si turgæ hæmorrhoides: si vero non sint turgidæ, fricentur primo cum linteo aspero vel folio ficus recentis, ut aperiantur, non enim hoc fieri debet tunc per hirudines. Si autem suppressi sint menses, menstrua prouocentur, si ætas consentiat.

Facta hac euacuatione humores præparentur per attenuantia, incidentia ac etiam discutientia ut acetum & oxymel, aliquid tamen semper humidans admiscendo, ut passulas, decocta liquiritiz & huiusmodi, syrupos de pomis, & de fumaris.

Præparata materia fiat euacuatio per hieram Galeni descriptam ab Aduarso & Aetio, quæ constat ex triginta duobus medicamentis: cochicæ pilulæ cum veratro optimæ sunt, ut & confectio hamech. Gal. autem exhibet epithymi 3. ss. cum lactis caprini. præterea folia

*Vini chaly-
beati.*
*Medica-
menta dis-
cutientia
per interiora.*

*Antidota
qua ratione
agant.*

*Agentia sua
natura.*
*Quales can-
cri fluuiati-
les et inno-
uant.*

*Familia
Fallop.*

*Virga aurea
duplex.*

*Expurgatio-
nis sui in
canceris.*

senæ cocta cum epithymo in sero lactis. Aliqui autem vtuntur vino chalybeato, quod humores melancholicos feliciter educit: & præcipue à liene & hepate. Facta euacuatio-
ne deueniendum est ad medicamenta discutientia, inter quæ primo sunt illa ab antiquis
proposita, vt theriaca, troisci viperini, sales thetiacales, quibus vtébantur puris, quia val-
de discutunt: at ego soleo hæc exhibere in hoc casu cum succo borraginato vel rosato vel
violato, quibus caliditas eorum contemperatur, & tamen discussio non retunditur neque
aufertur. Præterea antidotum ex sanguinibus præstans est, antidota autem maxime faci-
litate viperarum ingreditum in ipsa, quæ maxime discutunt. Quæ vero sua natura a-
gubrin cancerum, sunt cancri fluuiatiles cocti in lacte vel caprino vel asinino, ita vt bibatur
lac illud, ac etiam cancri vna cum lacte sumantur, quoniam ventrem soluunt ac viscera ro-
botant, decoctum autem potest fieri in sero lactis vel aqua. Aduertendum est autem, quod
per caneros non sint intelligendi cancri illi, qui dicuntur vulgo gaimari, sed intelligendi
sunt teneriores, vt sunt marini rotundiores, qui præcipue habentur in Heuricia ac Marehia
Anconitana, nec sunt in usu, nisi apud pauperes, quoniam gustui sunt valde suauis. Aliqui
vero hos comburunt ac puluerem eorum cum melle miscent electuarium facientes. Ego
autem experimento adiuueni, aquam stillatitiam ex virga aurea inane exhibitam atque
sumptam ad quantitatem ʒiij, omnia superare, quia dolores mitigat & adeo discutit, vt ni-
hil magis: sed herbam istam accipio, dum flores habet, & deinde destillo: virga autem aurea
est planta chymica & duplex: alia, quæ folia habet lara & subrubra, alia vero quæ firmetor-
sa est ac virgultosa habens flores spicatos prorumpentes Iulio mense & Augusto, quæ ego
vtor, quoniam hanc veram virgam auream esse censeo, & est optima. His peractis post ali-
quot dies iterum corpus per pharmacum expurgandum est, quoniam tanta est vis purga-
tionis medicamenti in canceris, vt Galenus lib. 2. ad Glauc. cap. 10. vel indicat, se sola expurga-
tione & victus ratione plurimos caneros incipientes sanasse. Si autem cancer ex his nõ de-
litescat, quiescendum est vsq; ad ver vel autumnum, quibus temporibus corpus expurga-
ndum est quocumq; auxilio, quoniam sic cancri benigni seruantur, ne saltè augeantur ac mali-
gni fiant. Quandoq; vero ego dedi decoctum falsæ parilæ & præcipue in canceris mam-
illarum non vlcerales cum felicissimo successu.

Post horum autem omnium ad ministratio nem deueniendum est ad loci affectu tra-
ctationem, circa quem quoniam plurima sunt agenda & aduertenda, ideo in sequenti ca-
pite omnia peragam exquisitissime.

*De Tractatione cancri quod ad locum affectum per medicamenta, & etiam per manuales
operationem.* CAP. V.

*Qualitate
necesse est in-
cipienti can-
cro.*
*Meducria
repellentia.*

*Emplastrum
Fallop.*

*Linimentum
Fallop.*

*In augmen-
to cancri
qualia con-
ueniant.*

Circa locum affectum ac cancerosum plurima quidem sunt agenda ratione diuersorū
temporum cancri, vnde Galenus in lib. 14. meth. cap. 4. in incipiente cancro vtitur
repellentibus mediocribus, quoniam debilia nihil faciunt in materia crassa: fortissima ve-
to materiam magis durant, vt discuti postea non possit: primum autem in modeste me-
dicamentum sunt succi rosarum, polygoni, plantaginis, endiuiz, lactucæ, foliorum pap-
albi: mucilagines sem. psyllii, sem. cydon. & succus ex radice symphyti expressus: hæc e-
nim moderate repellunt, refrigerant scil. & adstringunt, si his linimenta madesant & im-
ponantur, vel micam panis madidam his succis imponamus, vel accipiendo ol. ros. vel ol. ci-
ton. vel ol. nenuphar. & cum medulla panis emplastrum fiat. Ego autem solum sum ac-
cipere carnem citoniorum coctam sub prunis, & addito pane & oleis dictis vel fatina hor-
dei facio emplastrum: vel linimentum facio ex oleis dictis & succis ductis in mortario
plumbeo per duas horas, vt hoc modo: ʒi succi solani, ol. ros. complet. an. ʒi misce & in
mortario plumbeo per 1. vel 2. horas ducantur, & superponatur tale linimentum in prin-
cipio tumoris.

In augmento autem repellentibus admisceantur discutientia, quæ sunt ea medica-
menta metallica, quæ discutunt absq; calefactione, id est, quæ attenuant & sicant absque
calefactione, ne materia illa ferueat & tumor fiat malignus, imo malignior: vnde cū emol-
lientia calida sint, his vti non possumus, quoniam etiam calefacere mus: quare cum cancer
est in augmento, due sunt indicationes, discussio s. per exiccantia sine calefactione & etiam
repulsio: sciendum est enim, quod licet ex his durior fiat tumor, tamen melius est affectum
duriores reddere ac minorem, quam tentare discussionem regiam & calefaciendo inter-
ficere. Medicamenta ergo metallica sint, sed exusta ac optime lora, vt sunt omnia genera
cadmix: sed cum nos habeamus tantum cadmiam fossilem, quæ vulgo dicitur gelamina,
quæ effoditur in Bergomate agro, quo vtuntur illi ad tingendum res album lorum d. ætum:
secun-

secundam eadmiam habemus factitiam ex Alexandria delatam, quæ thutia alexandrina dicitur: sed optima cadmia est illa, quæ ex Germania defertur, vbi sunt fodinæ æris. Præterea spodii generis omnia, quæ habentur ex agro Vicentino ac etiam ex aliis locis, vbi sunt fodinæ argenti & ferri vel accipitur spodium ex cadmia, cui æs tingitur & lauetur optime: Præterea pompholyx quæ Mediolori fit, vbi æs albi conficitur, vel vbi sunt bellica tormētalia sive artelariæ ipsæ: ibi enim copiosissima est pompholyx & laudabilior, quæ colligitur in celo illo ex fumo. Habetur etiam in officinis, vbi liquatur plumbum & argentum: sed ego in affectibus oculorum vtor illa ex Mediolorano. Biphriges præterea probatur, per quam duo intelligimus, vel scilicet sedimentum æris, vel lapidem pyritidem eliquatum & exustum, qui Vicentiz copiosus habetur, & illo primo caremus. Est præterea omne genus lithargyri, ut est scoria plumbi, quæ dicitur vulgo ghetta, quæ habetur à figulinis ipsa venteribus locoplumbi vlti ad vitrandam vasa, & est præstantissimum medicamentum. Est præterea lithargyrum aureum & argenteum in officinis. Cerasa quin etiam optima est, æs vltu cum sulphure, quod duplex est: vel per se, quod est album: vel cum sulphure, quod est nigrum & præstantius. Præterea omnes squamæ, ut argenti, æris & ferri, quæ omnia superat. Hæc autem metalla primo vruntur, deinde ter vel abluantur, postea macerentur aquâ rosacea sub sole caniculari vel vino: tertio aquâ rosacea iterum, vel vitamini diapompholyge: semper tamen continuatis euacuationibus. Si vero tumor crescat, exulceretur ac sæuos dolores faciat, eradicandus est ac extirpandus: tunc enim spes non est amplius in medicamentis.

Cum autem extirpatio possit vel caustico vel excisione fieri, posita est spes in abscissione. Sed aduertendum, quod actio chirurgica laudatur tantum in manifestis canceris, in occultis enim ac interius omnino fugienda est manualis actio.

Præterea non omnis cancer externus hanc sectionem admittit, sed conditiones multæ requiruntur ad sectionem & auulsionem canceri faciendam: prima est, quod sit vlceratus, vel saltem imminet vlceratio, aliter nunquam est tentanda. Secunda, quod sit auulsus, vel talis sit, ut vnde quaque auelli possit: si enim vlcus habeat radices, non est tentanda dissectio, quoniam nihil efficitur: tertia, ut non sit nimis magnus, ne imminet in dissectione mortis periculum, cum vlcus maximum necessario fieri debeat in tali sectione: quarta, quod tale sit corpus, ut per ferre possit actionem: si enim corpus delicatum sit, non conuenit: Quinta est, quod cancer sit in loco, in quo vasa non sint nimis magna, ne maxima fiat sanguinis fluxio ac mors sequatur. Sectio autem magis tuta est, quam vltio, quoniam per vltionem inducitur qualitas sicca consolidationem impediens, quod etiam per causticum medicamentum, vnde fit vlcus malignum & iterum cancerosum: Quare ego ex præcepto Galeni libr. 14. meth. c. 10. ac omnibus Græcis laudo sectionem ipsam. Recentiores autem in sectione semper relinquant radicem canceri, quâ postea ferro ignito exurunt & exicant: sed hoc agendum non est, quoniam nisi ad sit necessitas, nunquam ad vltionem veniendum est, ut facit Gal. qui necessitate coactus venas illas exurit ut sanguis sistatur.

Sectio itaque melior est, quoniam minor est dolor excitatus ab ea, secundo qualitas mala sicca ex ipsa non inducitur ut ex vltione. Sectio autem dupliciter fieri solet, primo secundo cutim diductam in glandulis curandis ad folium myrthi: & hæc necessario ita fit, quoniam cutis ita super tumorem cancerosum extensa est, ut extracto tumore & glandula cutis fiat rugosa, neque vnam consolidari possit: & ideo foret pars cutis secata ad myrthi folium. Sectione hac facta apparet statim glandula cancerosa, & tunc sensum nonacula cutis scarificetur & separetur glandula cancerosa ab ipso cancro & etiam omnes membranas auferendo. Sed statim aperto loco digito perquirendum est, an remanserint glandulæ paucae canceratæ, siue radices cancri, quoniam omnes sunt eradicandæ, quare fluxionem neque timentes vsque ad libras duas & perquirendo an cancro magno adiaceat alius aliquis cancer paruus, membranae omnes & glandulæ sunt extirpandæ, imo sanguis à secto loco optime est exprimendus.

Glandulis ita excerptis & sanguine expresso ac fluxu ego soleo uti posca vel aqua frigida ad sanguinis suppressionem, nec inde discedo, nisi fuerit prius sanguis suppressus: nam statim oportet consuere cutim illam sectam, quoniam intumescit, ita ut nisi tunc consueatur, sequenti die consui non potest: sed si consueatur, non fit cicatrix deformis. Consuto vero loco sectionem hanc tracto ut vulnera cruenta agglutinanda, & sic conseruationem cutis habeo.

Secundo modo solet secari cancer in alijs partibus, vbi non cruatur turpitudine cicatricis, ut si sit in mammilla, per transuersum secamus nonacula corium & cancerum subiectum ac radices, quas prius omnes digito tentare opus est, deinde exprimere sanguinem etiam à remotis: eius fluxionem minime timentes vsque ad duas vel tres libras, habita ta-

men ratione virium; nam ex copiosissima sanguinis fluxione exoneratur maxime natura. Facta sectione, album oui imponitur & alia facientia ad sanguinis suppressionem, deinde deuenimus ad cicatrizantia, vt vnguentum de thutia vel magistrale vel non magistrale, vel ad diapompholygem.

*Notandum
circa secti-
onem mam-
mellarum.
Si agri sint
tumoribus se-
ditos.*
*Vbi per me
dicamenta.*

Ego autem vos monitos velim, quod nunquā deueniatis ad sectionem in mammillis plenā ac crassā, sed tantum in gracilibus: nam ego, vt verum fatear, tres hac sectione sanauī. Cum vero quandoque agri secandi timidi sint nec velint secari, tunc ad vitionem veniendum est, quā vnicum est remedium. Recentiores autem videntur ferro ignito, sed est actio nimis dolorosa, vnde qui non tolerant sectionem, multo minus hanc tolerabūt vitionem, quare medicamentis potius fiat vstio quam ferro. Solent autem recentiores vtere per trociscum de minio descriptum in tabella cauteriorum, impositum in cancro prius perforato. Vstio autem ex toto cancro deueniunt ad escharotica, sed si cancer non sit vstus ex toto renouant ac replicant trociscum, vel etiam videntur trociscis à Ioanne de Vigo descriptis, & postea deueniunt ad escharæ casum. Alii factā exustionem fecant & casum escharæ procurant. Alii vero capiunt argentum sublimatum ol. amygd. dulc. emollitum, & in medio cancri imponunt, & hoc robustum est, neque mihi displicet, quoniam robustissima medicamenta conueniunt, vt capitellum, arsenicum crystallinum vel sublimatū. Alii v. accipiunt arsenicum crystallinum & rubeum & ætuginē æris an. partes æquales & terunt & cum axungia faciunt medicamentū, quo vlcus explent & hoc etiam ego quādoq; vtor, quoniam dolores non facit ingentes sed tolerabiles & dantes inducias, quoniam substantia tenue est, quā penetrat per totum cancerum, & si quid incommodi habet, id est, quia percutrit per cancerum, cum sit liquidum medicamentum.

*Vbi pro-
pria ex Fal-
loppo per
medicamen-
ta.*

Ego autem in vrendis cancribus per medicamenta ita facio, si cancer est auulsus, ipsum laqueo excipio, cum tenui tamē filo circa radices cancri, deinde accipio causticum ex caprifico, vel ex alia materia & dissoluo, & ipso lata linamenta imbuo, vt est digitus minimus & impono circumquaque radicem cancri ligatam, deinde fascia tenuissima primo medicamentum super cutim, & per sex horas relinquo, donec scilicet exulserit, & hoc medicamentum non exurit cancerum sed radices tantum, quibus exustis cancer cessat & dolor tollitur, imo testor mihi semper successisse vitionem hanc: impono autem fasciam illam, vt si laqueus disrumpatur à caustico, adsit aliquid coarctans ac continens, 30 medicamentum super cancri radices. Loco autē capitelli quandoque imposui illud ex arsenico vel sublimato, quo imposito deinde oleum rosatum cum vino adstringenti super cancerum ponebam, ac relinquens etiam partes circumpositas. Facta vero vitione sensim ac sensim secabam sine dolore cutim exustam, semper tamen aliquid crustæ relinques hæere parti sectæ. Sed notandum est, quod quandoque sed semper & nunquam hæc facta esse volui, quod non solum sanguinem per venam sectam brachii mittebam, sed per biduum ante sectionem copiosum sanguinem emittebam. Quibus actis maturationem crustæ tentabam ac eius casum & carnis generationem & vltimo loco sarcoticis frigidis cicatricem inducebam. Notandum autem est, quod qui passi sunt cancerum, ac secti sunt, nisi recta victus ratione vtantur, & bis in anno secetur ipsis vena, vel corpus expurgetur 40 bis, incidunt iterum in cancerum saltem post duos vel tres annos, vel in eadem vel in alia parte; quare per tres vel quatuor annos bis in anno corpus purgetur, & saltem in vena secetur, aliter succedet recidua. Sed aduertendum est, quod aliqua ego dereliqui in hac tractatione & curatione cancri ex memoriæ defectu: inter quæ primo est quædam difficultas ex Hippocrate circa oculos cancores dicente ipsos curationem non admittere, imo si curentur, morti tradi ipsos ægros, quare satisfaciendum est huic difficultati & auctoritati. dicendum est itaque quod cum duplex sit genus oculi cancri, latens scilicet & non latens; latens quidem, vt in sede, palato, vulua, intestinis & huiusmodi dictis, quæ loca sunt inepta ad curationem per ignem, si ferro aut medicamenti cedere non velit cancer.

*Difficultas
ex Hipp. an
cancri cura
sit tentan-
da, necne.*

Præterea loca hæc plurimis sunt excrementis destinata, quæ impediunt curationem, quare de his intelligit Hippocrates. Cum vero dicithos non debere curari, dicendum est, quod curatio duplex sit, altera locum affectum respiciens, altera vero pertinet ad causas fouentes; vnde non loquitur Hippocrates de curatione vniuersali ac pertinente ad causas fouentes, sed de curatione per locum affectum, quæ succedit: nam ego assero plurimos me vidisse ex his cancribus vel sectione vel medicamento saltem mitiores factos esse, vnde intelligit ipse de eradicatione per ferrum vel ignē, sed pallescit curatione ac tractatione. Circa vero sectionem venæ cum pauca dixerimus, dico modo, quod si vires non obstant vel cruditas, semper vena secetur non obseruantes rectitudinem aliquam partis, quoniam experi-

experimento ego obseruavi pluries, ex sectione venæ eiusdem lareis in cancro statim alios canculos suboriri, & etiam priorem peiorem fieri, quare nunquam seruetur reditudo, sed bene copiosissimus sanguis mittatur. Circa præparationem autem notandum est, quod semper aliqui iuris ex carnibus vel liquetis vel huiusmodi humectantibus imponendum sit in præparantibus, ac siccitas maxima existens retundatur ac tollatur.

Circa euacuationem autem notandum etiam est, quod maximam ego reperi vim ad discutendum cancerum in theriaca temperata & in troicis viperinis quotidie exhibitis ad ʒj. Præterea solitus sum ut salibus theriacalibus in quibuscunque cibis. Præterea vidi sæpe vsusum guaiaci non cōuenire ut aliqui volunt, imo obseruavi pessima causasse symptomata in cancro maligno, quoniam lignum illud videtur ex propria quadam natura cancerum protitare: quare nihil facit, etiam quod cum cancro adfit morbus gallicus. Quare vtor ego in tali casu decocto salseparillæ, & huic maxime confido. Quod si forte non succedit, deuenio ad decoctum radices chinæ, quod miraculosum in hoc casu esse affirmo, & præcipue sicum cancro sit morbus gallicus. Præterea est etiam aqua villæ, qua quandoq; vltus sum & felici cum successu. Circa locum autem affectum repellentia conueniunt, quoniam supposito cancro incipiente materia adhuc putrida non est, neque putrescit, ideo tuto repelli potest. Symphytum autem conuenit pro repellente in principio cæchi, intelligendo de symphyto priori aut minori dicto, quæ malus maximam habeat vim adstringendi: diximus enim in cancro incipiente repellentia ac reprimētia mediocriter conuenire, & ideo symph. maior non conuenit, cum nimis adstringat, & ideo pro repellente vtor hoc. *ʒol. ros. vel citon. vel myrthini vel omnia hæc tria simul, deinde addatur pars lithargyri auri vel cerussæ lotæ & in mortario plumbeo per spatulum duarum horarum emplastrum fiat infundendo semper aliquem ex dictis ibi succis, ut solani, endiuic, nenupharis, plantaginis & huiusmodi, donec linimenti consistentiam acquirat.* Quo autem ad metallica, quæ in augmento conueniunt, sciendum est, quod lota optime esse debent, ut acredo eorum auferatur, vnde prius aceto acerrimo sunt attenuanda, postea aqua limpida diebus canicularibus sunt abluenda ita ut acridinem amittant. In statu autem sola discutientia conueniunt, quæ erunt metallica pura mixta cum aliquo oleo resolvente, ut cum oleo resolutorio vel cum aliqua pinguedine tenui ac rancida. Cum autē rarissimi cancri sanentur, hæc ratione curentur, ideo oportet deuenire aut ad eradicationem ipsius aut ad palleationem.

Notandum est autem, quod etiam cancri occulti palleari possint ac palleantur, quoniam quamuis non sanentur, tamen non eruciant, vnde bis in anno expurgerur æger, vterq; & autumnum valida expurgatione, & singulo etiam mense aliquid expurgas accipiat, ut serum vel lac caprinum, in quo infusum sit epithymum. Circa locum autem vtatur vnguentum diapomphol. dicto, quoniam dolorem lenit, siccitatem repellit, vnde medicamentum est magis, quod est descriptum apud Aetium & etiam Dioscoridem. Circa conditiones requisitas ad sectionem faciendam in cancro, tertium ibi dixit ego addo, quod si sepe exemplo cancer in mamilla tum radice, quia tunc sumus prope thoracē nimis aut costas siue musculos, non est tuta sectio, neq; visio in tali casu. Circa medicamenta autem imponenda super locum affectum ego habui à quodam monacho ex ordine prædicatorum medicamentum mira faciens, ex duobus tantum constans medicamentis, quorum alterum est arsenicum crystallinum sublimatum, cuius natura hæc est, ut applicitum parti, si ipsam lint oleo applicetis, ita cuti adhaeret, ut amplius auferri non possit, nisi etiam simul carnem à medicamento visam suppositam auferatis, vnde ratione huius signi deueni in cognitionem illius medicamenti, quod Monachus ipse propalare volebat: sed cum vidit me cognouisse medicamentum ex hoc signo, manifestauit illud. Alterum medicamentum ingreditur est radix dragunculi Dioscoridis siccata & in puluerem redacta, & cum arsenico illo mixta, & hoc pro maximo secreto vobis patefacio atque experientia pluries à me comprobato.

Sed si cancer fuerit in reget & non exulceratus, ipsum scarifico cortice arundinis tenuiori exteriori, postea medicamentum hoc impono: scarificatur autem cancer, vnde hæc est medicamentum. Sed notandum est, quod si medicamentum hoc sine moderatione applicetur & apponatur, nihil facit, vnde si solum ponatur arsenicum, importunum & inutile erit, siue risa gallum, quoniam non penetrabit ad fundum: si vero puluerem solum imponatis, quamuis penetret ad fundum, tamen tantam vim non habet, vt possit cancerum auferre: sed simul hæc mixta mirum in modum faciunt. Hæc autem volui dixisse & posuisse ad dictamenta pro supplemento curationis cancri, quæ non fuerit à me dicta in eius tractatione ex memoris

defectu.

Elephantiasis erat ignota ante triumphum Pompeii Magni de Aegypto, in quo triumpho delatus est hic morbus & grassatus breui tempore, sed deinde superatus fuit & in exilium missus, post quem morbus gallicus succellit, nunc vero reuiuiscit, non tamen est ita communis, ut erat tunc, quoniam xenodochia, quæ nunc morbo gallico sunt constituta, illi constituebantur. Vulgares hanc vocant lepram, ut etiam vocant interpretes Arabum.

Lepra duplici.

Vnde lepra dicitur.

Cur lepra vocetur elephantiasis.

Qui lepra vocetur leoniasis.

Cur dicitur saryriasis.

Cur morbus Herculeus.

Quid sit lepra ex Auerroene. Quale intemperies sit in lepra.

Notandum circa causas faculas.

Cur lepra dicitur cancer.

Duplex autem est lepra, altera Arabum, altera vero Græcorum, de qualibro quinto de comp. med. sec. loc. agit Galenus, & Paulus libro quarto capite secundo & Aetius libro 13. cap. 134. & est species scabiei promens squamas & cortices, ne dum pustulas ac furfures, & lepra dicitur a squama, qua obducitur, quoniam membra crustosa fiunt, de qua non loquimur nos in hoc loco. Arabum vero lepra est illa, de qua loquimur, Græce autem dicitur ita, quia frequenter cancer iste mitigatus a medica mentis in lepram Græcorum inclinatur, sed interpretes satis indocte morbum hunc lepram vocant, græce vero dicitur *elephas*, & differt ab elephante Arabum, quoniam Arabes per elephanta intelligunt tumorem scirrhusum ac diuturnum totius pedis & eruris: at Græcorum de quo loquimur, est morbus totius corporis: vocatur etiam elephantiasis vel elephantiasis ex lib. 2. Meth. cap. 2. ob similitudinem cum elephante animali, quod maximum est. Notas autem morbi huius cum elephante explicat Aretæus in 1. de caus. morb. primo, quia hic morbus est maior omnibus, nam totum corpus inuadit, ac eius partes omnes intimas ac extimas organicas & similes secundo leprosi sunt horribiles, quia tumores patiuntur per totum corpus inæquales, atrotes, concauos, pilisq; decidentibus in toto corpore, ut in elephante: tertio aures habent hirsutas ac subulatas ut elephantes. Vltimo hic morbus superat omnes alios in longitudine, sicuti elephas superat omnia animalia in longitudine vite: & ego inquam testor, aliquos vidisse hoc morbo natos, & aliquos alios passos ipsum per sexaginta annos. Vocatur hic morbus ab Aetio libro decimotertio caput. 120. leo & leoniasis: Auicennas vero vocat leoniam fentertio, libro quarto, tra& 3. capite propr. Ita autem dicitur, quoniam tales patiuntur tubercula in fronte, vnde dilatatur frons, ex qua dilatactione ac prominentia cooperiuntur fere oculi ac supercilia exerta fiunt, ut in leonibus: præterea leones hac affectione laborant ex Auicenna. Præterea sicuti leo violentissimus est & ferocissimus, ita hic morbus, cum aliquem corripuit, ipsam non dimittit. Galenus in libro de tumoribus vocat hunc morbum saryriasin, quoniam sicuti saryri pinguntur ridentes, ita isti habent os ita diductum, ut videantur ridere, & semper manent diductis buccis ac malis. Præterea sicuti saryri pinguntur cum malis rubris, ita ista malas rubras habent; præterea sunt isti insatiabiles in venetum, ut saryri. Hercules etiam morbus dicitur hic quasi insuperabilis & maximus.

Lepra ex Auicenna est corruptio ac permutatio complexionis & formæ omnium partium totius corporis. Quod autem laborent in hac partes omnes intemperie, habetur in libro tertio de loc. affe& capitulo septimo, & in libro de inæqual. in tempe. capite primo, quæ intemperies ex Auicenna est tendens ad corruptionem & destructionem vite ac caliditatis innata, ideo est intemperies frigida cum summa siccitate. Sed dubitatur nam in his videtur adesse potius calor cum siccitate non in igni: primo quoniam isti dicunt se sentire ingentem calorem seu caliditatem; secundo calor ad tactum sentitur; tertio ad est pruritus ac tumor totius; quarto facies & totum corpus rubrum est, quare calor adest. Quod autem non addit tanta siccitas, patet ex plurimo excremento manante ex viceribus ac pustulis manantibus in ipso corpore. Ego tamen dico hæc apparere ratione materiæ peccantis & abundantis ac putridæ facientis caliditatem & ruborem & excrementum in viceribus. Sed habitus totius frigidus est & siccus, & non solum habitus, sed viscera quoque sunt tali intemperie affecta, vnde ex Aretæo fiunt grandinosa & tumida, ut patet in subus aliquibus, in quibus grandinosa apparent hæc carnes, quæ malæ sunt ac contagiosæ, & malum hoc generant in ipsas comedentibus. quod etiam dicit Auicennas & Aetius. Dicit præterea Auicennas hunc affectum immutare compositionem & formam dupliciter, vel scilicet exulceratione vel tumore: primo enim incipiunt tumores, deinde confirmata lepra omnes partes patiuntur tumores leprosos, duros, scirrhusos & callosos, & per consequens cancerosos, qui a materiâ melancholica sunt & formam compositionis destruunt, & ideo dicitur cancer totius corporis: dicitur etiam morbus sancti Lazari, quoniam morbum hunc patiebatur Lazarus mendicus.

mendicus ex Euangelio: Secundo vero exulceratione sua formam corrumpit pluribus de causis, quia primo rimas facit, secundo cancerosa vlcera, tertio lichenica, quarto phagedenica, artus etiam ac vsque ossa corruptentia: quare definitio Auicennæ optima est, quod sit corruptionis complexionis & formæ. Ego vero addo hunc esse morbum ex illis, qui inuadunt à tota substantia, vt est morbus gallicus: ratio est, quoniam morbus contagiosus est, ac vt plurimum morbi contagiosi consistunt in tota substantia potius, quam in aliqua qualitate. Quod contagiosus sit, experientia probat ac patet etiam ex testamento veteri, vbi Deus præcepit leprosos abigi: præterea sunt testes Christianorum antiquorum institutiones, qui instituere xenodochia ad hos tantum vsus, vt ab aliis leprosi separarentur.

10 Præterea morbus ignotus erat Italix & per contagium deductus est ex Ægypto in Italiam. Præterea dicit Aetius, quod habitus & vlcetum excrementa communicant aliis affectum hunc. Galenus etiam in libro de subfiguratione empyrica hoc dicit: quare dicendum est esse morbum in tota substantia definitum in intemperiem illam ac in aliam compositionem, quia substantia quædam aeri communicetur, quæ deinde hærens vel attracta ab alio, est veluti fermentum morbi huius.

Inter causas autem efficientes lepræ ex libr. 2. ad Glauc. capitulo octauo est aer calidus & siccus præter rationem & modum; frigidus vero est ineptus: ac frigidissimus hunc morbum etiam efficere potest ex Aetio; quoniam sicuti calidissimus facit humorem melancholicum plurimum & ad cutim trahit & morbum hunc facit, sic frigidissimus re-

30 frigerat ac constipat sanguinem & ipsum sæculentum facit sua siccitate ac frigiditate nimia.

Aer vero frigidus & humidus tempore Galeni non erat causa huius morbi, sed his nostris temporibus fit etiam in aere frigido & humido, vt in Germania & Gallia; quamuis ego potius crediderim in his regionibus non ex ære oriri, sed ex vinctu, vt ex aromatibus plurimis, quibus vtuntur, & vino potenti. Bene verum est, quod aer lepræ contagiosus, vbi est copia leproforum & exulceratorum, à quibus aer inficitur, est causa lepræ ex Aetio & Aretæo, vnde miserabilis est huius morbi conditio, quia omnes hos relinquit, ne ipso torripiantur & etiam patres ac matres ipsos relinquant.

Præterea causa est inter causas efficientes huius morbi, vt est bibete ex eodem vase, vt vestibus iisdem, ac præcipue vt Venerè cum leproso. Additur præterea hæreditas, quia hæreditarius est ex Auicenna, vnde quandoque serpit per familias, & licet, dum pueri sunt, non appareat, cum tamen sicciore sunt, vt in adolescentia, manifesta sit hæc affectio.

Quarta causa est conceptio tempore menstruorum: semen enim conceptum tunc attrahit malam naturam à menstruis. Quinta causa est nimius motus corporis ex Aetio & Galeno, quia maxime corpora siccant ac viscera ac sanguinem exurit, vt patet in aliquibus, quos ego vidi, qui etiam ex morbo gallico propter nimium exercitium in lepræ vestigia inciderunt.

Intetææ vero causæ efficientes lepræ sunt, primo sexus ætasque, nam magis viri, quia sicciores atque calidiores sunt, & qui in consistenti ætate degunt, hoc morbo afficiuntur. Præterea hepatis intemperies calida & sicca humores adurentes intetio caliditas & siccitas totius corporis. Item lienis obstructio, ex qua causatur ipsius imbecillitas, quia succum deinde melancholicum trahere non potest, & sic ad totum transmittitur & lepram facit. Addit Auicennas viscerum intetionum maximam imbecillitatem, vt nequeant expellere succum melancholicum, vnde intipiunt ipsa fieri grandinosa, deinde communicatur toti corpori. Præterea ex Galeno suppressiones euacuationum solitarum, quæ tres sunt præcipue, vel scilicet varicum, vel hæmorrhoidarum, vel mensium, addit Auicennas omnium cutis meatuum obstructionem, ex qua prohibeatur transpiratio: si enim rara est cutis, exhalat hæc materia: si vero obstructa, ea (materia) vel

40 putrescens facit febrem; vel, si non facit febrem, causat lepram, tuberculum faciens.

Inter causas autem materiales primo est victus plurima excrementa generans crassa & exusta, vt sunt cibi melancholici, ex quibus succus sæculentus fit, ex quo deinde lepra. Addit Auicennas victum generantem pituitam vitream & crassam: quod mihi placet, non quia pituita vitrea sit materia lepræ, vt vult Auicennas, sed quia ex resiccata vitrea fieri potest melancholia exusta.

Quod si non concedatur ex pituita vsta fieri melancholiam, ab his tamen cibis vitrea generatur, quæ mala est, quia obstruit ac feruorem facit & vitione, ex qua postea fit lepra: quare dicit Galenus, quod in Alexandria & Ægypto vagatur hic morbus, quoniam vtuntur

maximè farina elixa ac polenta generante pituitosam materiam lentam ac viscidam: vnde non est mirum, si in montibus, vbi viuunt incolæ polenta miliacea, abundat lepra. Præterea cochleatum carnes, quia spurcissimæ sunt, causant ipsam: item fungi & talia crassum sanguinem generant, vt testudines, salita omnia, lentes, carnes bouinæ, in quibus tota peccat Europa, falsè omnes carnes tam quadrupedum, quam piscium durorum hanc materiam subministrant: & in summa omnis victus generans sanguinem crassum est huius causa. Ob id ex lacte viuentes non patiuntur lepram: & hinc est, quod in Scythia non fit hic morbus, quoniam lacte vescuntur.

*Consequens
medicæ.*

*Diuisio le-
præ in tres
materias.*

Causa autem immediata lepræ est humor melancholicus, diffusus tamen in totum corpus, quoniam si transmittitur ad aliquam partem, facit carbunculum vel cancrum: si autem ad totum corpus, facit vel febres melancholicas vel lepram. Si vero melancholia hæc sit succus feculentus purus vel melancholia ex bile flaua ad totum transfusa, fit elephantiasis nigra dicta à colore nigro. Si autem in isto humore sanguis misceatur, ex libro de atra bile capitulo quarto fit lepra subrubra, quia sanguis retundit materiam illam melancholicam. Si autem materia hæc sit cum phlegmone crasso ac viscido ex Plinio libro vigesimo quinto capite quinto dicitur alba. Auicennas autem distinguebat elephantiasin ratione materię, quæ semper tamen est melancholica, & triplicem ex hac materia lepram oriri dicebat: vnde si lepra oriebatur à melancholia facta ex flaua bile adusta, ipsam appellabat feram & incurabilem: si vero fiat ex melancholia facta ex sanguine visco, benignam vocabat lepram illam.

Si vero sit ab exusta melancholia, hanc mediocrem esse dicebat, vnde ratione materię lepra alia est benigna, alia mediocris & alia fera. Quoniam autem signa lepræ requirunt aliqualem diligentiam, circa eorum inuentionem & inuestigationem, ideo optimum fore duxi caput distinctum ponere signorum cum incipientis, tum progressæ & confirmatæ lepræ: ideo in sequenti capite hoc aggrediar.

De Signis lepræ cum incipientis tum confirmatæ.

CAP. VII

Signa lepræ duplicia sunt: alia enim sunt signa incipientis, alia vero iam factæ lepræ. Incipientem autem lepram non debet intelligi illa, quæ in primo insultu est, vel quæ per actos dies tantum durauerit, quoniam hæc cognosci non potest, sed per lepram incipientem intelligimus, quando viscera tantum infecta sunt, non autem eorum adhuc attiguerit: per antiquatam vero, quæ eorum etiam ipsum attingit, quæq; incurabilis est, nam illa incipientis curationem suscipit, & non admodum difficulter curari potest.

*Signa lepræ
incipientis.*

1. Cum itaq; viscera tantum affecta erunt, primum signum erit ex Aetio, segnitudo quædam superueniens in signis ac præter naturam & consuetudinem patientis, quoniam tunc incipit intemperies illa pessima frigida & sicca, ex qua substantia spirituum animalium ac substantia tota corporis dissipatur. Secundum signum est difficilis respiratio, dum modo non ad sunt tubercula in thorace, nec de stillatio, nec pectoris angustia, quæ respiratio prius fuerit calida: si raucem tarda, quoniam dissipatis viribus ac facto homine tegni, musculi etiam dilatantur.
3. Thoracem & partes respirationis, torpidi sunt. Tertium signum est motus tarditas ad actiones omnes, quæ cum primo signo concurrit. Quartum signum est suppressio alui præter causam manifestam, quoniam excitatur maximus feruor corporis, à quo feces siccantur, licet calor naturalis dissipetur, ratio etiam est, quod cum omnia membra segnia fiant, etiam intestina segniora sunt. Quintum signum est lorium subiugale ac turbidum, quod semper tale remanet citra vllum affectum circa renes vel vesicæ & febrem: & hoc signum est certum, quoniam alii affectus sine febre non faciunt tale lorium absque affectu vel vesicæ vel renum, quoniam dissipatur calor naturalis & præternaturalis viger, vnde non potest fieri bona coctio ac segregatio malorum humorum in corpore à bonis. Sextum signum est etiam respiratio foetida, quod tamen aduertendum est, quoniam quandoque fit ab vlcere faucium vel pul-
7. moni vel narium vel ex materia resiccata in faucibus. vel ex vlcere dentium aut palati, vel ratione materię exiccatæ contentæ in ore, vt ego vidi iam in quadam moniali, quæ talem fetorem in respiratione emittebat ratione bilis crassæ resiccatae oblitæ palato. quare de his omnibus interrogandus est æger.
8. Septimum signum est odor corporis totius foetidus ac sudor foetidissimus, loquendo non de sudore à sordiditate facto, vt sub alis & in pedibus, sed de sudore causato ab humoribus corruptis: cum enim malus sanguis generetur & foetidus, serum eius, quod per cutem educitur, foetidum quoque fit necesse est. Octauum signum est eructatio perpetua eleuata à melancholia & ructus molestissimi; quia, cum mala fiat coctio, ac copia melancholice

*Fœtiditas
sputi
a quibus
pro-
ducitur
foet.*

adfit, quæ feculenta est, ab hac fiunt flatus ac vapores, qui per vulnus educuntur, adest tamē appetitus obtusio. Nonum signum est apertio inexplabilis ad venetem: tentiginem enim semper patiuntur hi; quod tamen signum, si luveni superueniat, non est ob id dicendum esse lepram. Decimum est raucedo faucium sine læsione manifesta & præter consuetudinem, & ut dicitur, loquela in naribus, quoniam cum lepra sit cancer intusus pulmones afficere incipiens, afficit etiam asperam arteriam, ex qua siccata vel humectata sic raucedo & vox aspera. Vox enim, meo quidem iudicio, fit in capite asperæ arteriæ: vel aspera sit ipsa vox vel rauca vel canota: fit autem talis vox vel ob siccitatem vel humiditatem: in lepra autem credendum est fieri ob siccitatem. Vndecimum signum sunt mores melancholici, quia abundat plurima melancholia, vnde veluti hypochondiaci melancholici fiunt. Duodecimum sunt somnia grauia, turbulenta ac melancholica.

Decimum tertium est incubus, quem in somnis fere continuo patiuntur ratione spirituum dissipatorum; vnde si tria vel quatuor horum signa adfuerint, non dubitatis de principio lepræ. Decimum quattum est suspicio aliqua, quod conuersus sit cum aliquo infecto.

Lepræ autem confirmatæ primum signum est corruptio, deformatio ac conturbatio faciei, primo enim malæ intumescunt, inæquales ac rubræ fiunt; atto tamen rubore & etiam oculi, frons amplior fit ac tuberculis repletur, & inde palpebræ cadunt, oculi absconduntur, & sic totus intuitus faciei leoninus fit, mentum intumescit tumorebus duris, scitiosis & cancerosis, totaq; facies rimosa fit.

Dicit autem Auicennas, sternutationem superuenire in multis vel ratione phatmalicuius vel ratione vaporum vel perturbationis cerebri ab ambiente vel à sole. Fit autem sternutatio in istis ex vaporibus elisis à toto corpore ad caput. Tertio addatis narium constrictionem internam vel à destillatione factam, vel quoniam membranz intrinsecæ narium patiuntur tubercula, vnde semper isti ore aperto expirant & loquuntur quasi per nates.

Quarto adest pilorum extenuatio, cum tamen antea fuerint duri, cutis plæc spissi, quia calor dissipatur & excrementum non est ita calidum & siccum ut possit tales pilos formare. Præterea cum omnia languida sint, cutis non potest ita bene ali nec etiam pili, & ita omnes tandem cadunt. Ex Arethæo autem hoc est præcipuum signum lepræ confirmatæ, quoniam in morbo gallico capilli tantum cadunt, sed in lepra omnes, ut axillarum & aliorum omnium locorum. Quinto lingua grandinosa fit tota ac plurimis referta tuberculis & aspera, & etiam venæ sub lingua turgidæ sunt, quoniam tubercula hæc cutim exasperant. Sexto oriuntur in toto corio vniuersa tubercula inæqualia dura & aspera, quæ corium totum exasperant. Oriuntur etiam timæ, sunt vlcera, deinde squamæ quedam nigre eleuantur, & partes extemæ prius vlcérantur, ut ungues & extremi digiti, dummodo hæc non fiant ex scabie vel psora, deinde exulcerantur partes ita, ut omnes artus absumentur otrophagedæna ipsa & morbo lupæ, quod tamen ego nunquam vidi nisi in naribus ipsis.

Præterea nares exeduntur ab vlcetibus, ac intra contrahuntur, veluti si delirescerent, quoniam internæ particule exeduntur, vnde insequuntur interiores erosiones; imo ego quandoque vidi ablatis nares ex vlcetibus cancerosis & malignis. Præterea quandoque ita siccatur aspera atteria, ut vox omnino amittatur & vix respirare possint ac aerem attrahere miseri infirmi, quod fit vel ratione maximæ debilitatis musculorum qui attolli non possunt ad attrahendum aerem. Præterea pulsus sunt pigri, tardi ac debiles ob cordis refrigerationem; timidi sunt ægri, fugiunt ac odio habent homines, sanitatem desperant, ac melancholici fiunt. Et hæc de signis satis sunt.

De Curatione lepræ & primum de præsignio. CAP. VIII.

Cognita lepra, cū sit cancer totius corporis ex Arethæo, difficillimum est inuenire medicamentum ita validum, ut morbum hunc superare possit, tamen quandoque sanatur. Et ego quidem testor me aliquos vidisse sanatos & præcipue presbyterum, qui lepra etiam confirmata detinebatur: vnde si lepra sit in vlcetibus tantum, id est, sit incipiens, potest tolli difficulter: attamen ex lib. quos & quando purgare oportet & ex libro de subfugur. empyr. cap. 11. & ex lib. 11. de simpl. med. fac. cap. de carnib. habemus quod plures sanauit Galenus partim sectione venæ, partim pharmacis, partim viperarum vsu.

Si vero sit confirmatus morbus & cum vlcetibus, impossibilis est curatio: sed nisi facta sint vlcera, potest tolli, cum maxima tamen difficultate. Sed cū semper possumus lenire sal-

tem morbum hunc, non est omittenda eius tractatio in omnibus ex Auicenna, sed nulus est eger sine auxilio relinquendus.

*Lepra in
que differt
a cancro.*

Differt autem lepra à cancro particulari, quia cancer particularis non est medicandus, quia irritatur à medicamentis; at lepra quamvis sit cancer totius, non irritatur tamen ex validis medicamentis; & ratio est, quoniam in cancro particulari materia multa aggregata est, quæ si proritat, caderet supra partem sanam: at in lepra mitior sit affectus; materia enim est expansa per totum corpus, quare non imminet periculum, quod materia deridat supra partem sanam, cum omnes affectæ sint. Præterea si lepra à pura melancholia sit, benignior est, & potest sanari ex Auicenna; si vero ex atra bile exusta vel ex bile adusta, leniri tantum potest, non autem ex toto sanari. Si autem lepra fuerit in visceribus tantum, vel vix incipiat apparere in cuti, nondum tamen confirmata signa ad sint, sperantes de salute aggredi debemus curationem, quæ est difficillima sit, possibilis tamen est. Si autem confirmata sit, aggredienda est etiam curatio, quoniam, etsi non speretur sanitas, tamen vira producit, cum robustissima ferat medicamenta sine periculo.

*Curatio quo
ad aerem.*

Quo itaq; ad aerem, leprosi transferendi sunt ad locum vires contrarias habentem, ut si leprosus sit in aere calido & siccato, transportetur in frigidum & humidum ex Archægo, quoniam tum proderit aer digestionē & evacuatione sua. Præterea cum natura oblectetur continua mutatione aeris, ideo optima est peregrinatio: semper tamen leprosi fugiant vrbes ac præcipue repletas & palatia alta, quoniam aer ibi non est ita perspirabilis nec ventris expositus: maneant ergo ruri, ubi aer semper spirat, fugiant maritimas vndas siue oras, præcipue palustria ac lacustria loca, quoniam ab his vapores crassi eleuantur. Somnus diurnus pessimus est, ut etiam vigilia nocturna. Motus est præstans, dummodo sit sine labore & molestia: quies verò mala est: equitatio, saltus curius & omne genus exercitii, & si violentus sit, dummodo à corpore feratur, maxime iuuat, quia, quamvis atrenuet, magis tamen digerit ac resoluti: copiosus sudor optimus est, quia materiam euacuat & extenuat. Sed post illa exercitia matutina hora facta extingatur sudor: & purissimis ac candidissimis induantur ægri: post cenam etiam per longum spatium conuenit ambulatio, quoniam in istis ita paritur ventriculus, ut post concoctionem etiam difficulter cibaria descendunt, ex pigritia in omnibus partibus introducta: vnde ventriculus non bene chylum excernit, ideo per quatuor horas post cenam & prandium inambulant ad deicienda excrementa & à ventriculo cibaria. Excretiones fecum curentur quotidie, vnde singula die exhibeatur aliquid laxans alium, vnde antiqui coquebant olèra in prima mensa pro emollitione fecum, ut betam, attriplicem, maluam & lactucam ac iuscula faciebant ex ostræis, quandoque etiam ostreas crudas exhibebant ad lubricandam alium, quæ tamen incepta sunt in lepra pro cibo, quia pituitam crudam generant; sed cum descendunt & pertranseunt, cætera etiam descendere faciunt, ideo non nocent; quam ob causam illis etiam salsamenta dabant.

Excretio.

Olèra.

*Medicamen
tum optimu*

*Notandum
circa solutio
nem.*

*Possunt in
melissina
lepra.*

*Motus ani
mi.*

Nos autem sine errore dare possumus caricas & passulas. Auicennas autem his non iuuantibus per 40. dies continuos dat medicamentum ex melle & myrobalanis, quod optimum est: possumus etiam dare saccharum rosatum cum rhab. vel cassiam vel poinatam vel aliud leniens. Sed notandum est, quod non est soluens aliquid. idem est exhibendum tribus vel quatuor diebus continuis, quoniam natura assuescit illi, ita ut postea non operetur: quare hodie vnum, cras vero aliud exhibetur medicamentum vinum habens solutoria, & tertia die aliud. Si pharmaco id non fiat, clysteria infundantur.

Venus est inimicissima lepræ, & ideo, qui non videntur Venere, nunquam leprosi sunt, quia semine non abundant ut eunuchi, quoniam semen est radix & fomentum lepræ: vnde remedium acerbum quidem, sed proficuum maxime inuenitur est, quod, si leprosi castrentur, sanantur: Sed curatio hæc nimis violenta est. Ego autem vt verum fatear, nõ credo semen esse fomentum lepræ, sed bene Venereim nocere, quia vel coitus siccit, vel cum lepra capiatur per contagium, coitus potest huius esse causa: sed coitus conceditur pro liberorum generatione quamvis oriantur leprosi, ideo melius esset, ut non orirentur. Græci autem volunt, quod tales non oriantur filii, si purgato corpore & venis existentibus mundis, licet corium infectum sit, leprosi Venere videntur.

Animi passionēs melancholicæ eulentur, bis in die comedant, quamuis sint affecti comedere semel; quoniam ventriculus non rolerat tantam ingestionem cibi vnica vice assumpti, nec corpus ferret ieiunium illud longum, quo exiccatur. In prandio autem sumant rectam partem cibii vespertina autem hora duas alias tertias. Inter cibos autem lac preciosum est, ipso itaq; vescantur optime cocto ad dita etiam aqua, & si quis vellet solo lacte nutrir, concedatur. Secundo lac exhibeatur coagularum & oxygala appellatum & melcha.

Antiqui

Antiqui enim concedebant lac acidum quod Græci vocabant *ἰθύναι*. Romani vero vo-
cant melcham, de qua in libris methodi & parabatur hoc modo ex Constantino Cæsa-
reo libro de cultu rustico. Ollam aceto repletam calefaciebant. hanc calefactam acetoque
proiecto lacte explebāt, per noctem ita relinquebant, & deinde hac utebātur. Boinz etiā
conceduntur & iuncatz, non tamen ex lacte vaccino, quia nimis crassum est: dentur itaq;
omnia ex recentilacte, vt cibaria ex lacte & ouis tenera facta cum aqua. Carnes ouium
laudabiles sunt & aliorum animalium. Laudat etiam Arethæus carnem suillam. sed for-
tasse intelligit de syluestri siue aprina, non autem de nostra domestica, quæ viscidior est.
ambæ tamen suspectæ mihi semper fuerunt. Carnes leporum coctu faciles & iuuenū lau-
dantur, capreolorum, auium montanarum, pullorum tenellæ & fœdiniæ sunt optimæ, vt
etiam vitulinæ.

Pisces saxatiles conceduntur, sed mollis carnis, vt barbi, capitones, temalitrutæ ve-
to non ita bonæ sunt nec tinnæ, nec lucii, nec ranæ, nec omnes pisces lacustres.

Fructus horarii optimi sunt, id est, qui in diebus canicularibus maturantur. quia cum
frigidiores sint, temperant feruorem humorum: laudantur pyra in mullâ, ficus & vuz
maturæ, ac & citronia ac cæteri fructus similes: reliquos v. vituperat Auicennas. Ego au-
tem cum Arethæo laudo maxime Pepones & melopepones, quoniam temperant ac
per lotium euacuant, humectant & corpus expurgant: quare possunt dari etiam in magna
quantitate, per pepones nostros intelligendo, non autem antiquorum, qui nostros non ha-
buerunt. Præterea ceraasaridata, non tamen valde, quoniam valde arida fermentant me-
lancholiam, dulcia vero optima sunt, vt & omnia dulciaria, vt Marci panes & bellaria.
omnia, quia per cutim corpus euacuant & aluum leniunt. Passulæ etiam optimæ sunt, quia
maxime iuuant epas in quacunque eius intemperie exhibitæ in maxima quantitate: idem
dico de amygdalis, de pistachiis, de pineis nucibus.

Vinum bibant secundum Aetium album, tenue, non vetustum; ex Arethæo vero &
Galeno dulce nec admodum potens, quoniam in leprosa massa sanguis est crassa ac nutri-
tioni inepta; vinum vero dulce statim nutrit, quoniam facile transiit ad hepatis & venas. A-
qua non probatur propter corporis frigiditatem. Sirvictus ratio exquisita. Et hæc satis sint
quo ad primum caput.

Quo autem ad totius euacuationem, omnes concedunt sectionem venæ, præcipue
in incipiente lepra, quoniam ex Arethæo semper malo & crasso sanguine repletæ sunt ve-
næ, quæ male postmodum nutriunt corpus, vel etiam non nutriunt.

At in fecanda vena notandum est, quod si adsit cacochymia vel abundantia sangui-
nis; tunc, si adest abundantia sanguinis, Arethæus in quatuor locis venam secat, venas scil.
vtriusque cubiti & vtriusque malleoli magnas, vt sanguis crassus in toto corpore contentus,
cum superioribus, tum inferioribus partibus educatur, quoniam si tantum in superiori-
bus secaretur, non euacuaretur ille, qui in inferioribus reperitur, & econtra, quia san-
guis non est fluidus. Aetius autem in duobus tantum locis euacuat, cubiti scil. at Auicen-
nas venas magnas secat, per quas intelligit venas cubiti vel malleolorum, vel poplitei. qua-
resententia Arethæi optima est. Sed notandum est, quod non affatim hoc facit, sed inter-
posito vno aut altero die vel nocte etiam quod ego etiam maxime laudo. Si vero non adsit
tanta copia sanguinis, neque vires sint adeo fortes, secetur venæ minores cum cucubitalis.
Venæ autem præstantiores secandæ sunt illæ circa nares & frontem, quæ maximo cum lu-
uamento eum capitis, tum corporis totius aperiuntur, & hic sanguis euacuatur etiā in ma-
gna quantitate, spatio tamen interposito, vt sensim bonum alimentum reponatur.

Secunda autem vena statim cibaria dentur boni succi & cito alentia, vt oua forbilia, ossa
ex vino puro & maluatico, contusum etiam ex carnibus & vinum optimum & similia,
quæ conuertuntur in optimum succum & sanguinem tenue & purum generant. Si
vero casu non possit fieri sectio venæ, deueniendum est ad pharmaca: vnde primo leuiss-
imaluus cum electuario lenitiuo, cum sero caprino, cum cassia vel diacatholicon, vel
syr. ros. sol. vel viol. sol. Diacatholicon autem laudatur maxime, quamuis validius sit,
quoniam in tali morbo rebelliora remedia sunt debiliatâ ferocitate enim mor-
bi remittitur vis & potentia auxilii. Facta lenitione præparentur humores viscidii,
crassi, pituitosi ac melancholici per attenuantia, incidentia & detergentia, vt fumariam,
cichorium satiuum & syluestre etiam, chondrillam, betonicam, ceterach, capillum
Veneris, radices rusci & asparagorum. acetum omnia superat, sed in pauca quan-
titate, quoniam acetosa fermentant melancholiam; ex his autem decocta & syrapi pa-
rentur admixto buglosso, borragine, melissa & cæteris lenientibus siccitatem, ac cor-

*Enervatio
per lenia.*

di conferentibus, vt mel rosatum, syrupus byzantinus, syr. de pom. simpl. de pomis sapor. Facta præparatione expurgandum est corpus medicamentis aptis, quorum aliqua lenia, alia vero fortia sunt: inter lenia sunt folia fenæ, epithymi & agaricus, quibus pituita & atra bilis educitur.

Robusta.

Robusta autem medicamenta tria sunt, elleborum nigrum, lapis lazuli, & colocynthis: vnde medicamenta illa quæ hæc recipiunt, optima sunt, & ideo Arethæus & Galenus recurrunt ad hieram, vt est illa hiera Galeni constans ex 32. medicamentis, ab Aetio descripta lib. 3. c. 153. quæ hæc omnia recipit. Quandoque vero vitium confectione hamech, diacathol. cum elleb. nigr. electuar. Indo ac pilulis cochiis cum veratro, in quibus ego maxime fido, vt etiam in hieia illa exhibitâ ad pondus ʒij. Sed notandum est, quod in officinis to pilulæ hæc variz sunt secundum varias descriptiones: sed pro lepra ex Curtio qui primus fuit instituens medicamentum hoc, ita paratur: primo accipimus pilulas cochias compositas cum speciebus hieræ Rhafis, quas, vt cum veratro paremus, ad duas vncias pilularum coch. sumimus ʒj. corticum rad. elleb. nigr. præparati, id est, cocti in malo citoniorum in furno: vel elixentur hæc radices in succo citonii, vel oleo amygd. dulc. & sic fiant ʒij. mixturæ: vel admisceatis aliquid de lapide lazuli. Brassaulas autem, qui fuit præceptor meus, dabat confectionem anascot. cum lapide lazuli vel armeno vel cyaneo: & mira faciebat.

*Pil. coch. cu
Veratro cum
positis ex
Curtio.*

Facta prima expurgatio aliqui dant purgantia per intervalla, vnde Aetius, quem ego quandoque sum secutus, dabat serum in maxima copia, vt facta prima expurgatione post quinque dies vel sex deueniendo ad serum à libr. ij. vsque ad quinque, à tribus scil. heminis vsque ad quinq.

*Differentia
inter virtutes
ponderales
& mensu-
rales.*

Sciendum autem est, quod nouem vnciz mensurales sunt fere duodecim ponderales. Aetius vero dabat serum asinum, sed ego exhibeo caprinum, quoniam asinum difficilime potest haberi. sed primo soleo coquere serum cum endiua vel alio contempera te hepat, deinde miscebam medicamentum purgans, & Aetius miscebat duos obolos scammonii cum vno ellebori nigri: sed ego dimittens scammonium incoquebam tantum ʒj. vel ʒij. ellebori nigri in primo cyatho ratione corporis, vnde postea miscebam quandoque syrupum rosatum solutionum ad ʒij. vel de pomis vel de fumo terræ compositum: & ita hunc primum cyathum sericum his paratum exhibebam. Hoc autem primo epoto quiete interposita aliquali, alios cyathos puri seri paulatim exhibebam, & ex hoc presbyterum illum, optime sanant. aliquando autem vti soleo syrupo Montani, quem ipse describit in tract. de morbo Gallico: sed quoniam descriptio illa in tractatu Mohtani est corrupta, ideo accipiat descriptio nem illam, quam ego posui in tractatu meo de morbo gallico. Verum hæc non sufficiunt, sed deueniendum est ad elleborum album, sine quo factum est nihil ex Arethæo, Aetio & Paulo: quia hoc est medicamentum proprium lepræ, licet fortissimè sit, ornatum tamen illo vtuntur: vt autem illò rite vtantur per aliquot dies, primo vt per duos vel tres dies ante affuscat æger ad vomitum post cibum, vt radícula vel oxymelle, deinde detur virtus ellebori albi, ultimo puluis ellebori albi, quamuis vt ingenue fatear verò, nunquam ausus sum ego aut virtutem aut puluerem exhibere, quoniam neque Galenus eo usus est. Dum enim Hippocrates laudat potionem dulcem ellebori albi, Galenus fateatur se nescire, qualis sit illa portio: quare ego soleo exhibere cum oxymelle vel radícula tantum, quam Galenus nunquam transcendit: vnde ego perforata radícula imponēbam fistulas ellebori albi, & deinde illam dabam comedendam, ad substantiam autem ellebori albi ego nunquam deueni: sed porius intingendam esse radicem ellebori albi in radícula dico, & illam cum oxymelle exhibendam: fateor enim me vidisse sæua admodum symptomata successisse ex decocto ellebori albi. Cum autem cerebro & capitis partibus hæreat affectus hic ex Anieenna post totius purgationem, caput quacunq. via expurgandum est, quoniam cerebrum læditur maxime in hoc morbo, quo facto ad locum affectum deueniendum est.

*Ellebori albi
virtus &
potius propo-
natur.*

*Modus exhi-
bendi ellebo-
rum album
ad cruen-
dendum.*

De Curatione lepræ per loci affecti eradicationem.

CAP. IX.

*Locum affe-
ctum duplex.*

Locus autem affectus in lepra duplex est, internus scil. & externus: internus autem, videlicet viscera ipsa, requiritur, vt materia, quam generant, discutiantur, & secundo quia morbus hic super calorem naturalem, refocillandus est, ac viscera alteranda & roboranda. Hoc autem duplici medicamentorum genere fieri potest: altero, quod sui natura id faciat, altero vero, quod qualitatibus manifestis, inter quæ multa proponuntur, vt Cædria ac laserpitii lachryma: sed quoniam hæc non habemus, dimittantur.

*Agentia sua
natura.*

Inter facilia autem paratu primo sunt raselli millipede dicti, orientes sub fundo vasorum capti ad quinq. vel sex numero, terantur & bibantur cum hydromelle, quoniam sua natura

- natura faciunt, actota eorum substantia agunt in lepra. Secundo in loco est trifolium bituminosum vetum, cuius foliorum vel seminum succus expressus exhibitus per 40. dies mane maxime iuuat. Tercio eboris atq; cornu ceruframēta sumpta plurib. diebus cochlearis quantitate; maxime enim digerunt, roborant, ac euicunt; malignæ materiz sufficitate resistunt. Quarto est succus calamenthi montani, quem ego sumpsi quandoq; pro lotio prouocando & mariscis; roborat enim viscera & sudorem discuit ac suam naturam calorem insitū conferuat & roborat exhibitus per 40. dies ab 3j. s. ad 3vj. Quinto sunt pastilli squillitici, quorū vsus est in theriaca dati quotidie ad 3ij. & sunt præstantissimi, saltem quia ad est difficultas respirationis, quæ iis tollitur si cū succo ros. vel borraginato exhibeantur.
- 10 Præterea sunt medicamenta sumpta à serpentibus, quæ maxime digerunt ac sua natura faciunt. Inter omnes autem serpentes vipera optima est, cuius multa exempla habentur lib. 11. de simpl. med. fac. cap. de carne. & ipsi omnes Medici vtuntur. Sed cum non solum vipera sed alii omnes serpentes hanc vim habeant, semper à lenioribus est incipiehdu, inter quos primo est anguis ille angelicus dict. vel angelus & caprimulgus veneno carens, quo aliqui quandoq; vsi sunt hoc modo parātes: seruant ipsum p 40. dies in arca lignea cū fursurib. & follis inuolutū, quotidie ipsum extra arcam educēdo, & aquæ frigidissimæ apponēdo, vt bibat si velit: cū autē per duas horas extra arcam manserit & biberit, iterū in arcam recodūt, & sic p 40. dies faciūt, & hæc actio ab ipsis dicitur purgatio, deinde angus occidūt, & in frustula secāt & coquūt in aqua cū cichorio, endiuia, chodrillā, soncho & agrimonia
- 10 in multa copia aquæ, donec caro à spinis cadat, deinde ius hoc colant ac vespertina & matutina hora per 4. horas ante cibū, bis s. in die de hoc iure colato dant ad 3vj. vel viij. Alii dant carnes coctas istorū angulū in esu. Sed sciendum est, q. non solum iste, sed omnes carnes elixæ verentū non venenatorum optimæ sunt. Est præterea anguis ceruinus dictus, ab antiquis vero epidaurius draco & anā vulgo: coloris lutei ac longior homine & crassus ad brachii virilis instar, cuius carnes elixæ sunt in maximo p̄cio & ipsis ego vsus sum quādoq; facis feliciter. Præterea sunt viperæ ipsæ, quæ omnes superant ac variis modis exhibentur, quoniam m̄scētur vel in antidotis vel in trociscis viperinis, vel in salibus theriacalibus: vel damus ipsas in sale cū saccharo rosato vel borraginato dando salis cōmunis ad 3j. ad summum cū sacch. ros. vel borraginato ad 3j. quo sale ego quidē mulierē ab incipiente lepra sa-
- 30 nauī. Dantur etiam viperæ coctæ in iure albo abscisīs capitibus ac caudis ipsarū. Hasc eadē carnes solemus etiā elixas cum anetho vel fœniculo cum aceto & oleo exhibere, in quarū exhibitione notat Auic. q. finis exhibendatū harum carnū est constituendū à natura, cū s̄ncipit tumescere homo; signū enim est tum, q. materia mouetur & incipit actuari, & q. natura tū incipit pugnare. Sed sciendum est, q. de hac tumescencia nisi Arethæus, nemo loquitur. Ego autē nunquā hoc vidi, vnde credo dictū Auicennæ esse verum in locis tantum calidissimis, & hoc symptoma expectandum esse tantum in Aphrica & Ægypto, quoniam ibi venenosissimæ sunt ipsæ viperæ. Possūmus præterea vipersas cum antidotis, in quibus reperiuntur, exhibere, vt est theriaca, quæ superat omne genus medicamēd, & verum est antidotum lepræ: & hæc per interna.
- 40 Per externa vero circa corū superficiem infinita sunt agenda. Sed notandum, quod tubercula cutis vel vlcerata sunt, vel nō: vnde si non sunt vlcerata tubercula, duplicem habemus scōpum, primo euacuationis huius materiz, secundo emollitionis eiusdem: nō potest enim digeri, nisi incidatur materia illa: Emolliri autē non potest nisi p calorem balnei actualē & mollientē cutim vel per calorem solis in defectu hypocausti vel per medicamenta, vt anseris, gallinæq; pinguedinib. suis recentis, mucilagininib. sem. lini, althææ & ol. amygd. dulc. & etiā, follis maluz aliisq; huiusmodi coctis in iure, & fiat medicamentū, quo tubercula illa molliora redduntur, si eo sub sole inungatur æger, sub quo vel sub hypocausto cū fuerit per horam, & molliora facta sint tubercula, deueniendum est ad materiei discussione- nem. Euacuatur autem materia per sudorem facta frictione, vt si post emollitionem fricetur æger & iterū redeat ad calorem illū & iterū fricetur, nā postea aucto calore augetur sudor. Secundo vtī possūmus medicamentis digerentib. & attenuantib. vt lapathi radicibus ac farinis amaris, vt orobi & lupinorum. Præterea omne genus saporis optimum est, & præcipue Neapolitanus dictus. addatis omne genus niri fossitium vel fassitium vel apricatum; addatis sulphurebus vltos & ignem etiam expertos: Præterea sandaracam Græcorum quæ vltimum locum habet in euacuanda hac materia. Pro sacra anchora postea est ellebori nigri radix & cucumeris asinini & etiam ellebori albi & agarici fungus, quæ qualitate digerunt & per propriam vim humores hos attrahunt. His igitur interpolatis vicibus vtmini mane post balnei calorem vel postquam in balneo vel sole fuerit fricatus æger & illitus bis dictis. Ratio autem parandorū horū medicamentotū est, vt accipiantur

Anguis angelicus

Anguis angelicus

Anguis angelicus

Anguis ceruinus

Viperæ

Agenda circa corū superficiem

Emollitio

Olei vipers.

*Oleum vip-
perinum pa-
ra videtur.*

farinæ illæ vel polenta ex ipsis vel mucilagines & aliquid sulphuris vel aliorum huiusmo-
di addatis, non autem omnia simul ponentes, & æger spatio vnius horæ vel duarum fri-
cetur & liniatur, deinde abluatur in aquis thermalibus sulphureis, aluminosis vel ferreis,
si adsint, quia præstantissimæ essent, si minus, in alia aqua. Sed oleum viperinum maxi-
mum decus mihi parauit, quod continuo paratum apud me detineo, & vtor in crustis vel
tuberculis admixto seuo hircino vel pinguedine vrsi vel taxi vel alia inungendo partes o-
molliendas, quo etiam oleo ego soleo vti in lepra Græcorum, psora scilicet cum crustis siccis
ne duris; paratur autem oleum istud hoc modo: ʒ. olei oliuarum libr. x. & duas vipers
vivas integras dissectas, in oleum impone, & ad solem in diebus canicularibus relinque
donec subructum acquirat colorem, si non adsint vlcera: Si vero sint vlcera, tubercula
& articuli extremi, vtor ego medicamentis herpeticis ac malignis vlceribus accotumod-
atis. Quamuis autem analogia veller, vt palleantibus vteremur, quia canceri naturam
sapiunt hæc vlcera, tamen autoritas Auicennæ & experientia docet posse imponi maxi-
me proritantia ac siccantia & adstringentia, quia non proritatur ab his, vnde deuenire
possumus ad arnoglossam, sumach, cortices granatorum, troiscos Andronis, Passionis &
ad squamam æris & omnes squamas & ad lapidem pyritidem vel diphrygem exustum &
lorum, & in summa ad totam materiam metallicam. Si vero proritarentur hæc vlcera, de-
ueniendum est ad leniora metalla maxime lora, vt ad vnguentum de thutia & similia. So-
lebant antiqui exurere diuersas partes corporis, vt dicit, Paulus, Auicennas & alii, præterea
alii castrabant homines, quoniam in his abundat semen acre ac putrescens, quod feruat ac
fouet hunc effectum, sed hæc non laudo, nec ipsis vnquam vsus sum, sed tantum metho-
do supra dicta. Et hæc facis sint de lepra.

*De Glandulis illis, quæ nodi dicuntur seu naphtha vel abscessus cum fol-
liculo. C A P. X.*

Abscessus qualescunque sint, vel sunt cum folliculo vel sine eo: sed quoniam iam actum est
de abscessibus sine folliculo, modo conuenit vt agamus de illis cum folliculo.

Abscessus itaque cum folliculo ab Auicenna dicitur Halsela, quam vocem nostri in-
terpretantur Nodum, barbari vero recentes glandulam vocant ex fen 3. lib. 4. apud Auic. 30
sed proprius vocantur nodi quam glandulæ, cuius nomen commune non habent Græci.
Celsus lib. 7. c. 6. hos diuidit in duros & renitentes & in molles ac laxos, omnes tamē folli-
culum habentes: Græci v. distinguunt ratione materiæ cōtēntæ; nam de *trachyma* vocant tu-
morem illum, cuius materia fit melli similis: *A. Symplocis* vero, cum materiâ putriculæ similem
habet: *Enema* autem, cum est similis lardo; quare ex lib. 2. meth. c. 3. morbi quodque ad si-
militudinem nomen habent. Quamuis autem Græci tres hastantū species abscessuum pro-
ponant, non tamen dicunt aliam non posse reperiri materiā in abscessibus, vt sunt pili ma-
xime in brutis, carbonēs, ossa, vermes & huiusmodi: vt plurimum tamen abscessus ex tri-
plici illa materia constant.

*Materia ho-
rum absces-
suum.*

*Causa effi-
cacior.*

Causa autem horum abscessuum prima efficiēs ex lib. de caus. morb. ca. 6. est fluxio
humorū ad partē affectam, cuius causæ alias dictæ sunt; ego autem credo etiā congestione
esse in causa huius abscessus; quoniā video in his ea esse, quæ in aliis adsunt tumorib. ex cō-
gestionē factis, vt est tarditas generationis, tarde enim incipiunt & crescunt quandoq;
non fit in tumoribus à fluxione, qui cito crescunt. Sed cū ex lib. 14. meth. c. 17. & 18. aliquis
fit tumor, in quo non fit generatio nouæ materiæ, vt in erysipelare & inflammatione, alius ve-
ro in quo noua fit substantia, vt in tumoribus varicosis ac verrucis siue callis, in hoc secun-
do genere ponitur abscessus: nam in eo primo gignitur folliculus quidam, in quo continetur
materia substantia solida habens proprias fibras, quate est hic morbus in numero sit-
iam, quia aliquid naturale oritur, quod est præter naturam ratione numeri, cum hoc nō fit
in aliis tumoribus, sed in his tantum abscessibus augetur numerus partium. Causa vero ef-
ficiēs folliculi ex lib. 14. meth. c. 1. est materia; quia dum incipit fluxio vel congestio, sen-
sim dilatatur pars, & sic fit folliculus qui dem callosus dilatata parte. Sed in li. de caus. morb.
c. 8. addit causam esse facultatem formatricem superantem materiam, quoniam tunc, si
materia bona sit, format partes perfectas, sed auger numerum, vt cum facit sextum digitū.
Sed si materia mala abundat, natura non potest integras partes generare, sed si potens est
natura, facit hos abscessus cum folliculis, in quibus illas diuersas materias facit, quæ solent
fieri à natura non errante. Sed quia materia non est apta, fit vt aliqua ex parte erret, quare
præter fluxionem & congestionem additur hæc tertia causa, virtus scilicet formatrix potens a-
gens in materiam non aptam, vnde fit morbus in numero.

*Causa effi-
cacior follicu-
culi.*

Causa

Causa autem materialis non ita certa est, quoniam lib. 14. meth. med. cap. 12. ipsam non satis explicat: dicit enim vnumquemque tumorem fieri à materia specie diuersa: tamen non explicat à quo humore fiant hi tumores. Auicennas vero fen 2. lib. 3. doct. 2. ponit suum nodum in rer. apothematata melancholica, quod confirmat Aetius lib. 6. cap. 68. vbi de meliceride in capite agit, in quo serum cum epithymo exhibet. Auicennas præterea fen 3. lib. 4. loquens de his sub nomine nodi addit phlegma: & sic fen 2. lib. 1. ac etiam fen 3. lib. 4. dicit, quod continent aliquid melancholiz & phlegmatis, quare ex ipso materia duplex est, phlegma scilicet maiori ex parte cum melancholia ipsa, quod etiam probatur: quia ibi exhibet colocynthidem. Quare dico ego & plurimum materiam horum tumorum
 10 phlegmaticam esse & melancholicam, & ratione diuersæ materiz diuersos fieri abscessus: vt si fiant assa, pili & carbones, materia est melancholica, si atheroma, pituita. Meliceridis autem materia est pituitosa cum aliqua bilis portione, vt patet ex colore.

Cognoscitur autem folliculus, si apponatur manus, & cutis tantum accipiat, quæ si
 deducitur à tumore tanquam quid diuersum ac diuisum, signum est folliculi. Secundo à
 motu: quoniam reliqui tumores raro mouentur de loco ad locum, vt faciunt isti. Tertium
 est, quod si comprimantur ac tundantur, sine dolore sunt, cum alij dolores sine abscessus
 ab inflammatione orti, si percutiatur dolor habent ex Celso. Quartum est ratione loci:
 quoniam hi abscessus loca peculiaria habent, in quibus oriuntur: non enim in quacunque
 parte oriuntur: loca autem ipsi subiecta ex Celso, Paulo & introductorii autote c. 15. ac 16,
 20 sunt caput, facies & præcipue circa aures, palpebras, ceruicem & guttur, axillarum cauita-
 tes, cubiti iuncturas, genuum articulos ac pedum. Cum itaque hæc aderunt, procul dubio
 tumor erit vel meliceris, vel steatoma, vel atheroma.

Meliceris autem cognoscitur ex apertione, si fluat materia veluti mel vel alba, vel fla-
 ua, dummodo compacta sit, vt mel. Cognoscitur vero antequam aperiatur: quoniam tu-
 mor erit cum folliculo & humor circumfluit tangendo ipsum, etiam mollis ac materia ced-
 dit digitis: præterea si apponatur manus, tumor subsidet tanquam esset laxum corpus ac
 spongia compressa. Præterea tat de diffunditur comprimendo, & ablata manu statim re-
 currit. Præterea si apponatur lumen ex altera parte luciditas apparet in tumore, quo exi-
 stente licet eius materia aliquando sit tenuior quam mel, tamen est aqua crassior, iudicetis
 30 esse meliceridem.

Atheroma vero cognoscitur & ab alijs distinguitur primo per eruptionem: quoniam
 materia fluens est veluti pultracea vel panatella ex pane grattato. Cognoscitur autem an-
 tequam aperiatur, quia mollis est tumor, sed non ita, vt meliceris: præterea vltra laxitatem
 & mollietatem, si lumen apponatur non lucet, vt meliceris: præterea tactui materia crassior
 apparet, quam materia meliceritis. Steatoma vero cognoscitur per apertionem: quoniam
 materia est similis lardo. Cognoscitur autem antequam aperiatur, quoniam habet duritiem
 coniunctam, dummodo non sit glandula: durities autem illa vel est tophacea, vel non ad-
 modum dura: si tophacea, erunt gummata gallica, quæ etiam continentur in suo follicu-
 lo: si vero leuis erit durities, qualis conspicitur in lardo, erit steatoma. Tertio quando pate-
 bit esse abscessum cum folliculo, nec esse gumma gallicum, apparebunt radices maiores
 ac duriores ac latiores, quam in alijs duabus speciebus, in quibus sunt radices breues &
 strictæ. Præterea appposito lumine nihil lucet: vltimo cognoscitur per relationem siue col-
 lationem ad reliquos tumores: quoniam in isto cutis facilius deducitur, quam in alijs. Sed
 notandum est, quod quamuis hæc tres species habeant proprios folliculos, tamen sunt et-
 iam alij tumores habentes folliculum, vt strumæ & gummata gallica, & tamen non sunt
 ponendi inter abscessus.

Quo vero ad præfagium, si cum aliquo horum trium coniunctus fuerit calor & rubor,
 tunc minatur suppurationem. Secundo si adsint in capite, & multum hæreant ac diurni
 sint, præfagendum est etiam de corruptione ossis. Si vero sit circa guttur ac caput asperæ
 50 atteriz, difficulter curatur ac ferme nunquam. Si vero erit in reliquis partibus, certa erit
 salus, dummodo obediat æger Medico.

De Curatione abscessuum cum folliculo in speciali, & primum de meliceride.

CAP. XI.

Quo autem ad curationem, quoniam meliceris humidior est alijs, ab eo est incipien-
 dum. Si itaq; sit meliceris ingens, & in loco alicuius momenti ac periculum aliquod
 secum ferens, vt in palpebris, ex Actio primo ad sectionem venæ deueniendum est, si fieri
 potest: quoniam licet de se non sit morbus magnus, tamè ratione loci est alicuius momen-
 ti, dicit Aetius.

Ego autem dico sectionem venæ conuenire duplici de causa; altera ratione minuendæ materiæ, altera ratione impediendi fluxionem. Si vero non sit meliceris in loco periculofo, fuperuacanea eft feftio venæ. At fi habitus patientis fit cacoehymicus, vt vel biliofus, vel pituitofus, vel melancholicus, totum corpus eft purgandum per medicamentum conueniens, lenita prius aluo ac materia præparata & inftituta optima victus ratione inflammationem refpiciente. His conftitutis, circa locum affectum ex lib. 1. 4. meth. med. c. 12. & lib. 10. meth. med. c. 12. tripliciter procedendum eft, primo per refolutionem digerendo; fecundo per putrefactionem; tertio per chirurgicam actionem. primo tamen digeftionē tentare debemus. Digefit autē fit, fi benignus, paruus ac molliffimus fit tumor & perlucidus. Si vero oppofito modo fe habeat, nou eft fperanda digeftio, quia materia illa craffa digeftionem non admittit.

Medicamenta autem ad digeftionem ex lib. 2. ad Glauc. cap. 1. 2. in primo loco funt diachylon fimplex, admixto puluere iridis, & pro fbj. diachylonis addit ʒj. vel ij. iridis, vt hoc modo: ʒj. diachylon. fimpl. ʒ xij. pulu. iridis ʒ j. vel ij. mifce. Secundo in loco deuenit ad diachylon magnum, & ad diachylon cum gummis, cum puluere eodem; tertio in loco eft diachylon magnum Mefuz cum multa quantitate pulu. ireos & ariftolochiæ. Ego autem quandoque deueni ad emplaftrum de ftercore caprino vel canino diffoluto in oxymelle: quandoque ad aliquod medicamentum antiquorum, vt ad illud deferiptum lib. 6. de comp. med. per gen. emplaftrum Alexandri dictum, quod hoc modo fiti

ʒj. falis Armeniaci vel Hifpani, vel noſtratis

lithargyrii

ceruffæ an. ʒj.

galbani

opopanac. an. ʒ iij.

fem. linap. ʒ ʒ.

ol. vereris ʒ iij.

cer.

terebinth. an. ʒj.

aceti q. f. mifce, & decoq. ad confumpt. acetī, fiatque emplaftrum

maxime difcutiens.

Quandoque vero vfus fum emplafro Democrati ex falib. dicto hoc modo confectio:

ʒj. falis comm. ʒj.

ceruffæ ʒ ij.

Galbani

propol.

ariftol. rotund. an. ʒ iij.

ol. vetufti ʒ iij. coq. oleum, ceruffa & fal fimul, donec non inquit,

het, deinde pulueres iniciantur.

Si hæc non difcutiant, deueniendum eft ad emplaftrum facrum, vel diapalma, vel tertio ad emplaftrum cerine, quod maxime difcutit, & primo cum oxycocco mifceas, vel fecundo in loco folum applicetis, & alia infinita habetis apud Galenum ibidem.

Si modus hic non fuccedat, ad putrefactionem materiæ deueniendum eft. Putrefactio autem multipliciter fieri poteft, vel fcilicet per cauftica ac putrefaciencia materiā illam; vel per fuppuratoria medicamenta putrefaciencia, & materiā & folliculum: fed nos primo loquamur de putrefaciencia folliculum. Putrefcit autem folliculus, vt materia contenta putrefcat & acris fiat, vnde erodat ipfum folliculum, vt deinde aperta cavitare omnia contenta educantur, & etiam in fimul folliculus ipfe. Cum autem in medicamenta maturantia duplicia fint, alia prohibentia vaporum egreffum & conferuantia tantum calorem ac obſtruentia; alia, quæ non tantum obſtruunt, fed etiam calefaciunt, & calefaciendo calorem augent; ſciendum eft, quod prima nihil fere faciunt in hoc cafu; quare ad ſecunda deueniendum eft, quæ funt emplaftra. Vnde Galenus lib. 2. ad Glauc. cap. 7. facit emplaftrum ex caricis cum mica panis & aqua affufa contufis & fimul coctis: vel imponatur diachylon magnum cum gummis admixta recenti pinguedine gallinæ, quod concoquit, corrumpit ac fuppurat: vel deueniendum eft ad vnguentum bafilicum minus. Ego autem hoc vtor cum ſucceſſu ex Rhafi ſumpto:

ʒj. furin. fem. lini ʒ ij.

fœnugr. ʒ ʒ.

pulu. fem. caul. ʒj.

mucilag. althææ q. f. mifce, fimul omnia cruda, & fiat emplaftrum, quod

quod supra loco sinatur, donec per se cadat. Vltimo loco soleo accipere caricas crudas optime confusas in mortario, deinde addo vnam cochleam viuam integram simul contundens, & cum cortice cochleæ applico & relinquo supra loco, donec per se cadat, & sanemira facit. Facta sanies euacuanda est, prius cognito folliculo maturato ex vesicula putrefacta, quæ cognoscitur: quoniam, cum ante medicamentorum impositionem cutis crassa sit, post ipsorum casum cutis illa renuissima fit ac mollis, & quasi materia aquosa ad tactum apparet. Præterea ex ipsa tenui, vesicula aliquid exudat, quando corruptus est folliculus. Præterea non potest separari cutis ab abscessu, cum tamen antea sequestrabatur, neque deduci de loco ad locum ratione materiae, quæ ad eum peruenit, nec amplius
 10 adest folliculus. Hoc cognito, vel expectanda est cutis descriptio per se, vel secunda in modum crucis, quando præcipue tumor magnus est: si vero paruus, vna tantum sectio per transfuersum fiat. Et duplici de causa aperitur cutis: primo vt vndeque euacuetur abscessus, secundo, vt possit conspici fundum abscessus. Ex hac autem apertione ac sectione primo liquor contentus effluit, quod euacuato folliculus est extrahendus. At si adsit fluxio sanguinis, albo oui vesica imbuitur. Si vero non adsit fluxio, obseruandum est, an aliquid folliculi remanserit, quia non fuerit maturatus ex toto, vnde si remanserit, recentiores dicunt, tunc esse implendam cauitatem totam caustico medicamento, vt Ægyptiaco simpliciter vel composito, vt erodatur folliculus, & ita auferatur: sed ratio hæc mihi non placet, sed magis approbo rationem Celsi, qui dicit, quod remanente folliculo iterum perfectæ
 20 concoctioni incumbendum sit, non impediende fluxione sanguinis: vnde sunt imponenda concoquentia per tres vel quatuor dies. Cum vero per aliquod tempus maturantibus vñ fuerimus, ad detergentia deueniendum est ac concoquentia, vnde ego aperto vlcerẽ vt consueui tercinthina cum oleo mastichino: vel misceo mastichinum oleum cum abietino, vel loco mastichini, vt or ol. amygd. dulc. Quandoque vero album oui, & vitellum etiam miscendo vomica his implere consueui. Cum autem per duos vel tres dies vñ fuerimus his, nec tamen per se cadat folliculus, sed pars ipsius remaneat, tunc non ad robustissima deueniendum est, sed medicamento tantum lisdid vel præcipitatu, vel vnguento absterfuo, vel præcipitatu admixto alumine rochæ combultæ cauitatem implendo, & per duas dies in loco relinquendo folliculum auferre tentabimus: quoniam hoc
 30 absque inflammatione facit. Transacto secundo die ego educo præcipitatum: quoniam secum folliculum etiam trahit vel deuenio ad squamam æris præparatam eodem modo applicitam, vel ad Ægyptiacum per se, vel etiam præparatum cum ol. ros. & cera alba tantundem.

Folliculo veto extracto expleo carne vleus ac cicatrice cum epuloticis alias dictis, & hoc est primum genus putrefactionis.

Sed notandum est, quod raro succedit per medicamenta putrefactio hæc, quare ex recentioribus ad caustica deueniendum est, quæ etiam ratio a me maxime laudatur, quoniam optime succedit, quando volumus cito sanare, & præcipue si folliculus sit in loco, in quo non timemus turpitudinẽ cicatricis, quæ sit a causticis. Quare circa faciem vel frontem non est his causticis vtendum, sed in aliis tantum locis. Causticorum vero materia alias propõita est, vt capitellum ex lixiuio vel ex salibus confectum, vel aliud simile, quod possit tumorem cum folliculo exurere, quo exulto butyrum imponatur ad escharæ casum, deinde expleatur locus carne, ipso tamen prius mundato, deinde cicatrix obducatur. Tertius vero modus educendi folliculum est per sectionem, quæ ab Albucasi, Auicenna, Aetio, Celfo, Paulo & omnibus laudatur ex lib. 14. meth. capit. 1. 2. vnde prius expurgato ac præparato corpore cutim folliculo superpositam per transfuersum secamus, optime aduerterentes, ne in hac sectione folliculus pungatur aut rumpatur, vel incidatur, sed integer extrahi possit: quoniam si integer & totus extrahi non potest, tunc causticis vtendum esset: sed si paruus sit folliculus, vnica sectione ad folium myrthi vtimur cutim duplicatam vol
 40 sella arripientes & sectionem ad folium myrthi similitudinem facientes: hoc facto apponantur hamuli cuti vtrinque, vt distendatur & sensim digitis ac ambabus manibus in cauitatem positus folliculum a circumstantibus partibus ac subiecta carne separatim, labia scilicet sectionis diducendõ, donec appareat folliculus, & cutim deinde ab ipso liberetur. Et quamuis Aetius & alii etiam dicant, gladiolo folliculũ extrahendũ esse, ego tamen laudo magis, quod manib. extrahatur, si fieri potest. At quoniam aliquando partes illæ difficillime separantur, & nisi sit expertus chirurgus, tunc nouacula folliculum a subiecta parte dulsemus fibras secando aduerterentes, ne folliculus pungatur: præterea ne nervus pungatur aliquis, sed potius per transfuersum excidatur, & sic de venis & arteriis, quæ potius distrahendæ sunt, si opus est, quam pungendæ, deinde folliculus educatur. Cum vero folliculus ali-

culus est momenti, totus extrahi debet cum eius radicibus: si enim aliquid relinquantur, potest reuerti. Quare si adsit radix, paulatim eradicabitur & extrahetur.

Cum autem quandoque accidat, ut disrumpatur folliculus, & aliquid radices relinquantur, tunc est imponendum præcipitatum cum alumine rothæ, ex quo in duabus tantum vicibus eradicabitur. Si vero ad os hæreat, deradatur os vsque ad medullarium. Educto folliculo labia vulneris conuantur: deinde glutinatoris sanentur. Si autem cutis rugas faciat, ne turpitudine fiat, amputanda est. Si vero magnus sit tumor, secetur in crucem, extrahatur folliculus, deinde consuatur & cicatrice obducatur, & ante consuetudinem, si cutis in magna sit quantitate, ut decidat ac rugas faciat, ut accidit quandoque in fronte & facie, tunc ab utroque latere labii vulneris forcipe secare oportet partem pelliculæ, & postea confluere.

Cum autem præcipue melicerides in capite puerorum oriantur: quoniam plurimum crudo sanguine abundant, unde in his non solent fieri à purissimo melleo liquore: sed ut plurimum in his inflammata sunt: & ideo quia variata est eorum materia, vario etiam nomine donantur à recentioribus: nam si meliceris in capite oriatur, talpa, topinaria, testudo & talparia vocatur. Nascitur vero quandoque in palpebris, & tunc dicitur nodus palpebrarum, vel lupia palpebrarum, & tunc per sectionem potissimum curatur inuertendo palpebram, & cutem ipsius internam secando & folliculum extrahendo. Secatur autem cutis interna palpebrarum, quoniam si externa secaretur, excideretur etiam musculus per transversum claudens oculum, & maxima fieret turpitudine. Si sub lingua nascatur, ranunculus dicitur vel tanula, vel batrachia, vel batrachos, & tunc non per chirurgiam, sed per digestionem vel putrefactionem curatur, mandantes ut æger in ore decoctum caricarum & passularum detineat, donec mature scat. deinde materiam extrahimus, & postea locum implemus melle rosato. Si circa testes oriatur, dicitur hernia aquosa, quæ curatur suo loco, ut infra. Si fiat hic tumor in folliculis ac contineatur in vesica propria, curatur maturantibus & sectione, concocto folliculo. Si vero non habeat proprium folliculum, sed contineatur in seroto, incurabilis est affectio: & hæc de meliceride.

De Atheromate. CAP. XII.

Atheroma est tumor grauior, malignior ac deterior omnibus nodis, quoniam habet in se diuersitatem humorum, & diuersam materiam ac inequalē contentam: nam habet humores aliquos impactos, ut pulicula, præterea habet materiam serosam partes erodentes habentem & acres, quæ dicuntur serotæ: quoniam similes sunt sero lactis, quæ partes subiectas erodit, unde ossa, membranae ac panniculi putrescunt & eroduntur, ideo raro accidit, ut atheromate aperto non reperiatur os cancerosum vel denudatum vel cariosum factum ac foraminibus plenum & erosionibus repletum. Atheroma autem ut plurimum in capite oritur, rarissime autem in alijs partibus, & dicitur talpa vel testudo, vel talparia à barbaris.

Curatio huius est in iisdem capitibus meliceridis, unde quo ad victus rationē, eodem modo procedendum est, item quo ad euacuationem: & multo magis secunda est venain atheromate, præsertim capitis: postea proposita materia pituitosa, ut plurimum ac melancholica euacuabitur per medicamentā dicta in meliceride. Circa locum affectum Gal. lib. 14. meth. med. c. 12. tria capita ponit, primo digestionē materię, secundo putrefactionem, tertio sectionem, quæ omnia in meliceride conueniunt, sed in atheromate duplex tantum ratio conuenit, putrefactio scilicet & excisio: non enim cōuenit digestio propter materię crassitiem: quoniam cum particula in atheromate duplici genere humoris constet, per resoluentia partes tantum tenues puliculae resoluuntur, crassior vero in latum cōuertetur, & magis in crassabitur & tephacea etiam fiet. Putrefactio autem materię dupliciter fit, vel scilicet cum cōcoctiois, vel cum causticis, prius tamen ad concoquentē putrefactionem est deueniendum, quæ perficitur cum dictis in meliceride. Si autem hæc non succedat, veniendum est ad caustica dicta in ipso. Facta autem putrefactione, aperiat vulnus vomica, educatur materia, maturetur folliculus ac detergetur ac consolidetur.

Alteratio ratio erat sectio, in qua eadem est ratio seruanda, ut in meliceride, ut scilicet secetur cutis ad foliū myrthi vnica sectione, si mitius ac minus sit atheroma, in maiori autem ac seuiori in modum crucis, deinde separatim est folliculus, membranae & ligamenta, & extrahendus vnā cum materia, deinde locus consolidandus cum barbaro vel simili dicto in meliceride.

Sed cum sæpe folliculus atheromatis ita ossi hæreat, ut non possit de loco ad locū deduci, necesse facit excoriari aut auelli ab ossē vel panniculo subiecto, in hoc casu dimittenda

tenda est auulsio folliculi integri, sed superandus est caustico medicamento, quod tamen ego non laudo, nec approbo, sed magis probo putrefactionem materię, deinde vti soleo præcipitatio cum alumine rochæ combusto, vti in meliceride.

Cum autem raro fiat, vti in atheromate capitis os detectum non sit, ac corruptum folliculo etiam auulso, præcipue si antiquatum sit atheroma, ideo recentiores inueniunt, vti obseruetur, an corruptio ossis magna sit nec ne. Et si os non est corruptum, omni artu aueliendus est folliculus, postea os abradendum diligentissime, & cum puluere cephalico aspergendum, vti est pulvis iridis, aristol. rot. peucedami & orobi amari an. partes æquales, quibus postea aspergatur os.

Si vero denigratum & corruptum sit os & cariosum, inueniunt Guido & Rogerius, vt videamus an pars corrupti ossis multa sit, vel parua: si enim sit parua, abradatur os vsque ad medullam, vel partem sanam, deinde illis pulueribus carne vlcus explendo ipsum sanemus. Si vero magna sit corrupti ossis pars, tunc perniciosum esse dicunt, & ipsius curam aggredi non consentiunt, sed volunt medicamento pallescente tractandum esse, vt siccantibus medicamentis moderatis. vel est talis cura aliis dimittenda, quia perniciosa est admodum.

Alii vero audaciores, vt Petrus ab Argillata & Ioannes de Vigo ferro etiam ignito os vtrū aut deueniunt ad ipsius denudationem, quando ipsum corruptum esse vident: sed ego dico talpas has nunquam esse tam suas, vt sit opus tali curatione, vt patet in gummatibus gallicis, in quibus corruptio quandoque deuenit vsque ad membranas, nec tamen vnquam aliquem mortuum fuisse vidi: quare dico ego, quod, si os corruptum est, videndum sit, an corruptio sit profunda nec he; & si non sit profunda, deradenda est ac siccanda; & deradendo vsque ad partem sanam, deinde imponendo puluerem isidis, donec tegatur carne. Si vero magna sit ac profundior ossis corruptio; neque vltio, neque pallescentia curatio laudatur à me, quia facit, vt morbus grassetur, progrediatur & seuiat, & totam etiam caluariam quandoque corruptam, quod accidit in morbo gallico, in quo casu nisi pallescentia curatione vtuntur hi. Nec etiam mihi placet vltio: quoniam ea semper timenda est in capite, licet antiqui quādo exurant, nunquam tamen, vt rem ingenue fatear, ausus fui ego hoc facere, nisi in affectibus frigidioribus: quoniam facillime membranz subiectæ inflammantur. Qua-

res corruptio profunda sit, & vsque ad cauernulas ossis penetrans, non est ex mea sententia abradendum os: quoniam sic detegeretur membrana: sed totum os sum solius detegeretur corruptum, etiam quod dimidia caluaria esset corrupta: & venio ad magnam ossis exlocationem per robustissima medicamenta exiccantia vt os abscedat, vt oleo chalcanthi vel sulphuris ipsum permittendo vsque ad profundum cariei penetrare, vel aqua sulphuris, vel vsum aqua magistrali ex alumine os ipsum tangendo alternis diebus gossipio aqua dicta madefacto, cuius aquæ descriptionem videre potestis in tractatu de morbo gallico, cum qua & aliis dictis semper pro attemperatone soleo miscere aquam rosaceam, & quotidie etiam mane hoc ostangere consueui, deinde totum os inspergere cephalico arido vel non arido, vt puluere iridis, deinde tego vnguento isidis totum vulnus. Exteriora vero cooperio diapalm. mixto cum linimento simplici: nec est timendum in hoc casu, nisi ingens refrigeratio. Aliquando vero aperto atheromate os separatum conspicitur, quod volfella extrahendum est: quoniam quando os ita corruptum est, vt eius corruptio ad membranam veniat, natura tunc ipsum sequestrat, & loco eius carnem generat pro tegumento membranz. Ablato osse videndum est, an circumpositæ partes ossis detectæ sint, nec ne, & si detectæ sint, licet non labatur, ramen pars illa ossis detecta separabitur. At si non apparet os, quod deberet apparere, sed carne sit tectum, carnem illam specillo comprimere sum solitus, & tentare an laxa sit, & bene ossi hærens. Quod si bene hæret ossi caro, quod cognosco, quia specillum non cedit, ac specillum ad os peruenire non potest, sanum est os. Si vero specillum ad os peruenit, & caro cedit ac laxa est, signum est quod abscedet

caro & corruptum os illud separabitur, quare tunc ablato ego partem illam decocto betonicæ, iuxta aristol. rot. & simili: quo facto super membranam medicamentum siccans pono, vt ceratum ex pipete, vel vnguentum de matresylua, vel vnguentum de gummi elemi, vel lebetonica dissolutum cum cerato rosato vel ol. rosato, vel ad isidem cum diapompholy: et tantum deuenio, cum his membrana tegitur.

Si vero caro adest super osse, quæ bene non hæret, eam absumo eum aqua aluminis magistrali, vel oleis aluminosis, vt sulphuris vel chalcanthi. Sed aduertendum est, ne aqua perueniat ad membranam: ideo primo tegenda est cum supradictis, vt non tangatur: & sic caro hæc eximetur ac consumetur. Os autem detectum manens pulueribus dictis inspergatur, donec abscedat. Si vero corruptum est, extraho, quanquam etiam in magna quan-

titate detecta esset membrana. Si vero abscissum non est os, ablucis dictis decoctis, & medicamentis dicta impono. Quod si vero caro illa rubicundior sit, aliqui imponunt unguentum de plumbo, vel de pipere: sed ego laudo ea, quæ iam dicta sunt in principio huius, in eam postea cicatricem pono gossipium, eamque expleo: & hoc modo procedo etiam in puerulis etiam si valde sit detecta ipsa membrana.

De Steatomate. CAP. XIII.

Steatoma vero ab Avicenna dicitur nodus, & à recētoribus natha, & à Græcis *Στεάτωμα*, Squilardo materiam in folliculo similem habet, & hoc peculiare habet, ut ad insignem magnitudinem crescat, ut quandoque ad xi. vel xij. libras deueniat.

Soler autem crescere præcipue circa ceruicem in parte gutturis anteriori, ita ut faciat herniam gutturis, quæ *Στεάτωμα* dicitur: præterea circa humeros, circa ceruicem posteriori, rem, & in axillis, in poplitibus etiam, in articulo cubiti, ac in omnibus fere locis, in quibus meliceris & atheroma oriuntur.

Signa huius tria sunt illa dicta. Curatio etiam tribus continetur capitibus. Quare videtur eadem circa cibum & sex res esse debet. Secunda est vena, ne coaceruetur materia in loco steatomatis, quæ ad venas deferatur, præcipue cum insigne erit: quoniam sit, ut ceteri tumores à natura non etiant, & est veluti nouum membrum additum: quoniam venas habet proprias alentes, quare nisi secetur vena, id conspici posset, quod ad membra rescindenda solet subsequi, nempe spuma cruenta, fluxus sanguinis & huiusmodi, quia non potest absumi copia sanguinis, cum desit membrum illud, in quo est.

Præterea alietur materia pituitosa crassa, à qua sit steatoma per medicamentum ex colocynthide, vel aliud pituitum euacuans: quoniam in hoc non est speranda resolutio ratione crassitie materię: quoniam panniculi non possunt resolui. Nec curatio succedet per concoquentia & maturantia: quoniam non adest humor in steatomate: ad hoc enim ut fiat putrefactio, requiritur necessarius humor. Sed materia steatomatis est materia ad corpus contrarium lardo simile. Per putrefactionem autem factam per caustica curari potest, si non sit valde magnum: sed curatur, si continuo ac continuo manibus moderate atteratur, donec mollis fiat, postea compressione digitorum tantum sanatur: materia enim illa liquefacta expellitur ad partes circumpositas, & ita discutitur. Per caustica autem stricte ligando partem cum trociscis de minio Ioannis de Vigo perforando steatoma, & vnum ex dictis trociscis in ipsum imponendo: hoc enim modo putrefiet, & per se cadet, vel imponendo micam sublimati præparati cum ol. amygd. dulc. quod impositum vter. Si vero radices aliquæ in fundo maneant, ut solent, præcipitato ac alumine rochæ vsto hauriantur. Si vero hoc modo curari non potest, curatur per chirurgiam, ut meliceris, quæ etiam curatio est melior aliis omnibus.

Si itaque steatomata sint magna, ut plurimum pendet, & cum pars illa, à qua pendet, soleat esse tenuis & subalis, in quibus pendetia maxime oriri solent, ut cucurbitæ videantur, tunc vel nouacula, vel forcepe acutissimo vno tantum ictu steatoma totum vsque ad radicem ac pediculum, à quo pendet, amputatur, nec dubitandum est de sanguinis fluxu, imo permittendum est fluere maximam copiam sanguinis, respectu tamen virium: deinde imponenda sunt illa, quæ sanguinem supprimant, & radices, si quæ erunt, præcipitato ac alumine rochæ combustæ eradicabuntur: deinde curetur vlcus & cicatrice obducatur, ut in melicetide. Si vero non pendeat, sed radices latas habeat, non est tuta sectio, præcipue circa guttur: quoniam vel non sanantur, vel semper relinquitur aliquod vlcus, quod postea conuertitur in fistulam: non possumus etiā abscindere, quia locus est maxime periculosus & sensibilis: nec etiā vi possumus causticis, nec ferro candente ratione loci, & quia nescimus, quousque deueniant radices, neque quousque vis caustici sit defensus, deinde periculum est ne vranrur membranae subiectæ vel muscoli, & fiant inflammationes perniciosissimæ, ut angina. Quare sectio non est tuta, si sit in loco momenti. Ego tamen aliquando deueni ad sectionem steatomatis circa scapulam ipsum secans per transuersum, & dimidiâ illius partem relinquebam in loco, sed caustico deinde sæpius applicato, quia pars illa lardacea non sentit, & ita vltimo abstuli folliculum, quo educto vsus fui cura vlceris.

Aliqui vero incipientia steatomata dissipant cum lamina plumbea, sed non succedit, nisi sit in illo primo principio: sed in atheromate & melicetide sæpe succedit. Alii solent dissipare steatomata recensia & digitis dissipare. deinde imponere laminam plumbeam actum frigidâ prius tamen fricato tumore, quæ lamina sit crassa & excavata parum, ita tamen, ut (lamina) ipsa non tangat partes vicinas sanas. Sed hæc curatio succedit tantum in steatomatibus circa glândulas & chordeas: ideo melius est curare ipsum modo dicto, & hæc de nodis.

De Tumore illo, qui aneurisma vocatur, & inter tumores materiam collectam habentes refertur. CAP. XIV.

INter tumores materiam collectam habentes est aneurisma, quod est affectio arteriarum, quasi dilatio arteriarum, quia dilatantur ita, vt tumorem præter naturam excitent: barbari emborisma corrupta voce nominant, vnde posteriores etiam ita vocarunt. Ab Aui-cenna autem vocatur mater sanguinis & arteriarum, quia ibi crassiores sunt arteriæ, vt dicunt interpretes.

Si naturam huius quæramus, est tumor blandus tactu, digitis cedens, concolor cuti ex sanguine & spiritu factus, plenus acurgens cum pulsatione arteriarum addita. Et hæc est natura eius & definitio.

Causæ autem potissimum geminæ sunt, fractura scilicet vel vulnus arteriarum, pro prima ex Paulo & Actio: quoniam pars in hoc tumore primo patiens est arteria, quando scilicet cutis percuitur, non autem per interius, vel si consolidata sit, iterum rumpitur. Altera causa est anastomosis, id est, apertio arteriarum, quando scilicet per se aperiuntur ipsarum oscula, ita vt exultet sanguis, & sibi parer cauum callosum & abscellum. Huius autem dilatationis arteriarum variz sunt causæ, quarum prima est violentia & diuturna spiritus retentio, vt accidit in mulieribus difficulter patientibus, in his præcipue, quæ per spatium duorum vel trium dierum fetum emitteere conantur: secunda est mollities ac laxitas arteriarum, tunc enim crescit & extenditur in molem maximam, quæ postea sanguine sensim & copioso fluente impletur: tertia est clauis magna ac violenta vociferatio. Maior tamen pars aneurismatum solet euenire ex vulnere, vt patet in phlebotomia, quando confor venam pun gere credit, & arteriam secat.

Causæ autem internæ sunt primum sanguinis arteriosi ac spumosi acidos. Secundo spiritus intensio, quibus fit, vt arteria vel rumpatur vel aperiatur, clamores magni, contusiones, concussiones, obstructions, quæ vt plurimum sunt causæ internæ aneurismatum. Qui enim patitur obstructions in liene, raro est, vt non patiat etiam aneurisma in arteriis mesenterii ad lienem deuenientibus, & ita deinde communicatur hæc affectio per omnes arterias eiusdem lateris, & ita durum fit aneurisma hoc, quod crescit ac dilatatur per omnes arterias eiusdem lateris etiam minimas, quæ deinde sunt osses, vt ego testor me vidisse in quadam muliere: quoniam sanguis ille exultus non poterat euaporare, vnde etiam arterias capitis osses causaui tratione contusionis, quæ fiebat ab arteriis in ossibus circumpositis ac neruis, & ideo acquisuerunt illam duritiam, vt patet in manibus rusticorum. Causa præterea est abundantia spiritus melancholia in arteriis ac sanguinis spirituosus, melancholici tamen, contenti in arteriis: sicuti ego habeo exemplum de quodam bibente decoctum guaiaci, qui cum bibisset per tres vel quatuor dies tale decoctum, & eadem ad vinum soluens deuenisset, neque tamen per sudorem nec aliqua alia via potuisset solui, sanguis ita exultus fuit, vt aneurisma subsequeretur, illudque satis insigne. Quare duplex tantum est aneurisma, alterum scilicet dilatio arteriæ sine fractione vel apertione arteriæ, quod proprie varix arteriarum dicitur ac aneurisma: quoniam sicuti varix dicitur venarum dilatio, ita dicitur arteriarum debet. Alia est species, in qua aneurisma est extra arteriam, vt quando vulnere arteria, vt accidit, dum imperiti chirurgi secant ita profunde venam, vt etiam arteriam pungat, & sic venæ vulnus cito agglutinatur, vulnus vero arteriæ tarde ob ipsius motum & substantiam, vnde sensim ac sensim sanguis coaceruatur, & ex arteriis percolat & cavitatem sibi parat aneurisma facit, qui sanguis factus callosus facit sibi folliculum extra arteriam. Materia autem aneurismatis per dilatationem facti est sanguis spirituosus. Materia autem facti per vulnus est materia sanguinea in grumum conuersa: vnde quamuis in vtroque eadem sit materia, differunt tamen substantia: quoniam in aneurismate per dilatationem sanguis est in proprio vase, & ideo tenuis est & eliquatus, in aneurismate vero per vulnus facti grumofus est, quia continetur in folliculo, ac cavitatem extra proprium vas: & tunc non est arteria, quæ facit aneurisma, sed materia, quæ percolatur ex arteria.

In quocunque autem loco oriuntur tumores hi, sed præsertim in capite, & qui habent aneurisma in capite, videntur habere caput obuolutum galea ignita: quoniam maximum feruorem percipiunt: & si casu itascantur vel vino percussantur, non possunt ob feruorem consistere. Suboritur etiam circa mentum & crebro, ac circa malas inferiores in arteria anteriori ad dentes percurrente: tertio in faucibus & circa collum & circa ceruicem, in axillis, in inguinibus, circa articulos, vt in flexura cubiti vtriusque, in poplite etiam quandoque.

Præterea mesenterii arteriæ huc subiiciuntur, & circa lienem, & tandem omnia lo-

ca, in quibus sunt arteriæ insignes, quæ vel pertundi vel dilatarî, vel laxari possunt. Frequenter autem oriuntur in abdômine, in hypochondrio sinistro, & in his, qui sunt habitus melancholici, ut ego vidi in quadam vetula, in cuius arteriis pugnum immittere poteram & immisi.

-10A

De Signis aneurismatum.

CAP. XV.

Cognoscitur autem aneurisma in genere primo ex tumore cum eodẽ colore, quo scaturientorum corpus, vel simulatur color, mutatur in liuidum vel nigrũ, vel purpureum, vel puniceũ, vel rubrum sine inflammatione, & hoc est secundum signum; tertium signum est, quod si comprimamus, nullus adest dolor vel parvus, & dum comprimitur, evanescere videtur tumor, ac materia in profundo delitescit, sed ablatis digitis iterũ reuertitur materia; & crescit tumor: quandoq; tamen excitatur ex compressione dolor, nec facile materia eliditur, ut in his quæ magna sunt ac insignia, in quibus maximi etiã sunt dolores: quoniam cum multa sit materia sanguineaeducta ex arteriarum cavitatibus, si comprimatur violenter, dilatarî arterias adiacentes, quoniã ob copiam nõ potest in ipsis recipi, unde fit veluti solutio continuũ & dolorosus effectus: quare quamvis dicant scriptores nõ adesse dolorem, loquuntur ut in pluribus. Præterea non omnia aneurismata sunt mollia, sed dura, vel ita tensa, ut dura videantur, ut plurimum tamẽ mollia sunt, ideo eam sitis. Quartum signum est pulsatio, sed quandoq; fit tumor in ceruice ac struma, in qua pulsât arteria glândulæ hærens magna, ratione cuius videbitur pulsare tumor, non tamẽ erit aneurisma, quare ad alia signa deveniendum est. Vnde cum tumor est concolor cuti cum pulsatione, nisi sit inflammatio nec ferrior, erit aneurisma; dico autẽ pulsationem adesse in aneurismate in genere: quoniam in aneurismate per dilatationẽ pulsatio adest per se: in aneurismate autẽ per vulnus adest pulsatio, quia cum arteria dilatur, sanguis copiosus effluit ex ipsa & recurrit in folliculum, cum vero constringitur, iterum recurrit ad arteriam sanguis, unde cadit aneurisma, & ita fit hæc pulsatio. Vltimum signum est, quod si casu pungatur aneurisma absq; cognitione ipsius, sanguis egreditur per saltum vel insultum, ut ex arteria apertã.

Significatio
anurismi
& primo dicitur
per dilatationem.

Quoad species autem aneurisma per dilatationem cognoscitur ratione situs ac loci: quoniam erit tantum in partibus penitioribus ac profundis corporibus, rarõ autem in superficie: paucæ enim partes extimæ, quæ habeant arterias patentes & conspicuas. Loca autem tales habentia arterias sunt taliẽpora, summus venter, corpus: vnde cum arteriæ sint in profundo, nõ possunt contundi aut vulnerari: quãdo verõ fit per vulnus, fit in superficie & locis dictis. Secundum signum est, quia est mollior tumor, quam qui fit per vulnus: quoniam in illo per dilatationẽ materia est veluti spongia, quia sanguis tenuis est: in factio vero per sectionem grumosus est sanguis. Terrio adest quidam laxitas quandam veluti spongiosam materiam referens. Quarto est longitudo, longum enim est illud aneurisma vel intortum siue capreolare: quoniam talis est eius figura arteriæ: in illo vero per vulnus apparet per plurimum rotunditas. Quinto si comprimatur, videtur materia delitescere cum quodam strepitu, veluti si esset flatus, sed ego hoc negas dico, id potius in alio vidisse, quoniam strepitus ille non potest fieri, nisi ex materia absorpta ex cavitatibus in cavitatem, quæ laboratur per meatum angustum, ut est in illo per vulnus: at in aneurismate per dilatationem non fit ista elisio: quoniam arteria contrahitur, & sic sanguis colligitur, non autem eliditur, sed sensim per poros plurimos egreditur in cavitatem arteriæ. Præterea in illo per vulnus est sanguis inæqualis & grumosus, ex quo eliso fieri potest strepitus & rugitus ob inæqualitẽ sanguinis elisi ex cavitatibus in arteriam. Penultimo cognoscitur aneurisma ex dilatatione per arteriã pulsantem: illud vero à vulnere non pulsât, vel parum pulsât: quoniam sanguis ex grumosus factus, & ideo durus est tumor & quandoq; callosus, vnde non potest fieri magna pulsatio, sed illa quandoq; delitescit ad manus impositionem. Sed notandum est, quod quandoq; ita plena est arteria, ut non peticiatur pulsatio, ut accidit in axillis & mento, in quibus quandoq; ego pulsationem non peteci, sed iticillationem tantum: quoniam plena erat arteria, vnde pulsare non poterat. Vltimo vero cognoscitur ex causa efficiente: quoniam si fuerit in brachio, sciatis esse ex vulnere, præcipue cum præcesserit venæ sectio, eum vero si à magno conatu, per dilatationem est.

Quibus signis
distinguitur
aneurisma per
dilatationem
ab eo per vul-
nus.

De Curatione aneurismatis.

CAP. XVI.

Aneurisma autem quodcumq; dupliciter tãtum sanari potest, aut scilicet medicamentis aut chirurgiã: sed non omne aneurisma duplicem hæc curationem admittit, quoniam magna illa aneurismata ac ea, quæ sunt in magnis vasibus ac in partibus penitioribus, & circa magnas arterias, ut quæ in ceruice sunt circa colli arterias, & in axillis, & in inguinibus

nibus poplitibusq; manualementem non admittunt: quoniam spiritus exirent, & vna cum sanguine vita. Aetius autem lib. 15. cap. 10. dicit, quod aneurismata capitis sunt lethalia, & ideo non esse manu tractanda: at Paulus lib. 6. cap. 18. oppositum dicit: quoniam inquit posse tractari aneurisma capitis etiam ferro. Ego autem utramque hanc sententiam & veram & falsam esse dico, si simpliciter intelligatur: quare distinguendum est: nam in capite duo sunt genera aneurismatum, sicut etiam duo sunt genera artieriarum: sunt enim artieriarum propagines cum internæ tum externæ; vnde si sit aneurisma in artieris per tempora discurrentibus ac iuxta aures, quia possunt ligari, possunt etiam ferro secari; ideo de his loquens Paulus, vera dicit. Si vero aneurisma sit in artieris ex profundo ab osse capitis deuenientibus ac disseminatis per duriorem ac internam cerebri membranâ, & vocatur *venæ puppis* ac geminæ dictæ perforantes ossa capitis, vbi est lambdoides sutura, tunc non est tanta chirurgia: quoniam ratione ossis non potest aneurisma filo ligari commodè ac rectè: præterea sanguis, qui solebat educi per aneurisma, regurgitabit ad intra, & ita suffocabitur, vnde si sanetur aneurisma in partibus externis per excisionem, excitabitur maius in internis, ad quod respexit Aetius, cum dixit sectionem non conuenire. Si autem aneurisma fuerit in flexura cubiti, in mento & alia parte capitis, in carpo, vel brachiis vel cruribus, omnia commodè possunt per chirurgiam tractari, quæ actio magis quàm medicamenta laudatur ab omnibus.

Quoniam autem debeat tractari per chirurgiam ex Paulo lib. dicto, & ex Aetio lib. 15. cap. 10. à quibus accepit Albucasis, oportet distinguere, an per dilationem sit aneurisma, an vero per vulnus: nam si sit per dilationem, exempli gratia, in flexura cubiti, vnum modum proponit Paulus, alterum vero Aetius: sed modus Aetii tutior est, quamuis difficilior. Pauli vero periculo sior, etsi faciliior. Aetius autem vult, ut infra alani per spacium quatuor digitorum tangamus arteriam pulsantem, & ibi faciamus sectionem per longum totum aneurisma à cute separantes, ac arteriam detegentes, deinde filo aneurisma ab utriusque eiusdem partibus siue capitibus vinciamus, ne sanguis, dum secatur aneurisma, maxima copia fluat & actionem impediatur: quare ponatur illud filum duplex cum acu, & ei nodus addatur, postea ad locum affectum venientes in medio horum nodorum siue deligationum aneurisma scindamus, ut tota repleatur carne arteria illa, ideo non tantum *pungi*, sed per longum totum aneurisma secari debet, postea manna thuris cauitas imploretur, & aloë, ut vulnus sanetur, his vtentes vsque in finem, donec vincula cadant. Et carne repletus sit locus & cicatrice obductus. & hæc tutissima est actio, sed nimis molesta ob duplicem sectionem: ideo Paulus est contentus vnica sectione, quod scilicet vinciat utrobique arteria, postea in loco affecto solum secetur, deinde pulvis manna thuris inspergatur, & aloë vel pulvis myrthi cum aloë, semper tamen locum obuoluendo fascia vino austero vel posca madido.

Si sit aneurisma per vulnus, nullo modo debet secari cutis, sed modo staphilomatam sanetur arripiendo digitis aneurisma totum quantum potest, postea accipiat acus cum gemino filo, & ipso traiciatur aneurisma inter manum & digitum, ut perforetur radix ipsius, deinde secare filum, ut cadat acus, postea filo relicto radicem constringere cum vno scilicet apice filii ex vna parte & cum altero ex alia & validissime stringendi ita ut optime ligetur.

Ego autem traicio acu ipsum aneurisma, quamuis sine traiectione fieri posset deligatio, quoniam ex hac traiectione non est periculum, ut dissoluatur deligatio, ut si ligetur absque traiectione: si enim in exteriori tantum parte vinciremus, periculum esset, ne fugeretur radix aneurismatis, ideo traiciendum est acu.

At quoniam sæpe vinculum vnum cum illis duobus filamentis satis non est, ideo monet Paulus, ut altero gemino filo traiciamus radicem, per contrarium tamen primæ traiectionis & iterum ligemus, deinde secandum est aneurisma & sanguis ille educendus, postea imponenda manna thuris & aloë, & obuoluendum panno madido vino & oleo ros. oleo quidem ad leniendum dolorem, vino vero ad prohibendum fluxum, his vtendo à principio vsque quo locus expleatur carne & obducatur cicatrice, & vincula cadant supra dicta. Ego autem quandoque curationem tentari per caustica imponens digitum super aneurisma & totum ipsum circulariter secans, & imposito caustico Galeni ex manna thuris sanauit aneurisma, & hæc actiones in magno aneurismate & corpore robusto faciendæ sunt, quia minori cum molestia sunt quam deligatio Aetii supra dicta.

Sed quoniam aliqua aneurismata sunt ita parua, ut non sit opus chirurgia, quin ligari non possint, & alia sunt ita magna, ac in vasculis amplis, in quibus medicamentis hoc agendum est: itaque dilatata sit arteria, comprimendus est sanguis, & locus in quo colligitur, ad-

stringendus & siccandus, quare vas constrictio & repulsio materię contentę in cauitate arteriarum conueniens, sed cum sanguis sit grumosus, non facis est vt medicamenta repellant & adstringant, sed opus est digitis emollire sanguinem grumosum. Sed si esset magnum aneurisma, hoc non esset vtile, quare medicamentum habere debet vim discussoriam & attenuantem.

Cum autem aneurisma per vulnus magnam curationem non admittat, parua tantum curanda restant per modum dictum experientia ante pluries confirmatum: vnde ego primo emplastrum ex fusturibus & oxymelite acutiori vel nouam quantitatem aceti addendo acrioris vtebar ponens super aneurisma per duos dies, deinde digitis atterebam grumum sanguinis & ad latera arterias propellebam, deinde medicamentis adstringentibus & exsiccantibus vtebar imponens medicamenta stricte, ne iterum sanguis rediret in aneurismate, sed protruderetur ad interna, non fiat tamē nimis stricta deligatio, vnde id, quod fieri debet per vnā deligationem strictissimā, fiat per quatuor laxas, quę neq; dolorem excitabunt.

Quamuis autem medicamenta plura sint, quibus vti possumus, ego tamen in hoc casu duo tantum habui in vsu familiaria, quorum alterum est ex Aetio lib. 15. cap. 19. ex foliis vitentibus cupressi, quę ligentur, super aneurisma moderate comprimendo, & sit molle ac tenue, neq; moueatur nisi post tertiam diem, & sic tertio quoq; die renouetur: imo ego loco foliorum vtebar potius nucibus ipsius cupressi teneris, quoniam magis adstringunt. Constrictio autem sit æqualis, vt scilicet omnes partes arterię tam laterales quam superiores & inferiores ligentur: ideo ego accipiebam duos puluillos, & ad latera arterię apponebam eos optime imbuens medicamento dicto: puluilli autem sunt filo coniuncti tribus in locis, in vtroque scilicet capite & in medio, vt non dilatetur ac cedat in se ipsum, sed equaliter constringat: postea ponebam tertium puluillum eodem modo factum supra arteriam: hoc enim modo fiebat constrictio equalis. Si autem sit magnum aneurisma, non est facienda nimis stricta deligatio in puluillis: quoniam maximus excitaretur dolor. Secundum autem medicamentum, quo vtebar, est ex recentioribus, ex bolo armena communis, & bolo orientali, & terra sigillata, & argilla communian. partib. æq. postea parum pulu. ros. ac santalorum vtrorumque addebam an. partes æq. deinde puluis gallarum immaturarū ac nucum cupressi, & hæc dissolvebā cum aqua subtili, vel vino in quo aliquid gummi esset dissolutum, vel aceto austero, & super aneurisma ponebam, ita permittens donec per se cadebat, quod fiebat post tertium diem. Medicamenta vero alia ab omnibus laudata, & quibus etiam quandoq; vsus fui ego, & feliciter, sunt bolus armena vera lutea, bolus armena vulgaris, bolus armena orientalis, creta ipsa, terra sigulorum, & precipuos lutum collectum circa præterea rosę, santali, puluetes cupressi, gallarū, nucum vitentium & siccatarum, hypocyttis, & eius succus cōcretus, cortices pomī granati & flores eorū balaustrā dicti, quibus ego vtebar admixto sumach & myrthillis. Præterea ceratum barbarū quod dolores mitigat, disciunt & siccant & similia, quę imponi solent in vlnetibus cruentis: ex hoc autem cerato facere consueui laminam quam super aneurismā pono, & super laminam postea linamentum madidum aliquo siccō, vt vino austero vel acetum ad maiorem penetrationem, deinde ligabam, vt dictum est & scilicet, quia lamina prohibebat inflammationem, quamuis de hac nihil dixere antiqui: cætera enim medicamenta siccantur nec locum timent ab inflammatione.

Hæc autem in incipientibus aneurismatibus facienda sunt, quoniam magna aneurismata sunt potius prognostico relinquenda, quam vilo modo tractanda.

De Bronchoceli seu aneurismate in gutture.

CAP. XVII.

Inter aneurismata autem est etiam *Βρονχοcele* circa guttur ita a Græcis dictus, vel bronchocelos, a nostris vero Bocellū, vulgus autē Gocium vocat, sed quādo fit ex aneurismate, id est, ex arteria dilatata, insanabile est, vt diximus, ratione loci. Cum autem fiant bociæ in gutture, quę sapiunt naturam vel meliceridis, vel steatomatis, vel atheromatis, vel carnosū tumoris, etiam de his agamus. Isti autem tumores sūt partim per fluxionē, partim per cōgestionem; materia vero est inæqualis, frigida & vt plurimum pituitosa, & differt à carnosā substantia: quoniam hæc caro addita fit ex sanguine pituitoso. Efficientes autē causę duæ sunt, aut hæc hereditaria consequens, aut aer ambiens & aquę ipsę. Signum autem huius est, quia aliqui, si ex loco recedunt, in quo bocio laborare cœperunt, sanantur ratione mutationis aeris, cibi & potus: quoniam cætera possunt vbiq; esse eadem. Cur autē potius tam aquę quam vini faciat ad huius generationem, causa est solum ipsum, quod frigidum est, vnde

unde inficitur aer, aquæ, plantæ, & omnia quæ aluntur in illo solo. Sed cū bociæ hæc oriuntur tantum in gutture, dicendum est causam efficientem esse solam frigiditatem, quia non magis in lingua quam in faucibus, palato & aliis locis oritur, quare est potius qualitas in tota substantia respiciens partem hanc, quoniā scilicet ex illo solo oritur halitus, qui tota sua substantia afficit guttur medio aere, cibo & potu. Sed quis dicere posset esse intemperiem frigidā & humidam, vt per medicamenta calida & siccā sanentur tales tumores. Ego autē dico sanari quidem, quia discutiunt hæc, tamen non sanant illam malā naturam: quoniā si patientes bociū stent in loco, in quo natura oriuntur tales humores & medicamentis his vtantur, nunquam ob id sanabuntur, quare causa efficiens est occulta qualitas agens in aërem, aquam & plantas, quæ cum attrahantur vel deuorentur, agunt in guttur & faciunt tales tumores.

Causa autem diuersæ materiæ bocii est humor abundās in corpore. Cum itaq; duæ sint causæ efficiētes bociæ, recentiores dicunt duplicem esse, bronchocelerā aliam naturalem, vā non naturalem: naturalem insanabilem esse dicunt, vt est hæreditaria, non naturalis vero potest curari, sed difficillime. Cum autem chirurgi viderint difficultatē curationis horum tumorum, triplicē modum curationis inuenerūt, quorum primus est per incantationē, secundus per chirurgiam, tertius per artē & medicamenta. Vnde quo ad primum aliqui accipiunt iuglandē arborem paruā, quæ nondum fructus ediderit, & eius radices integras accipiunt minutim in eis: sed dū incidunt, semper canont pater noster vsq; in finē, deinde accipiunt 200. grana piperis & magnā copiam vini simul coquētes ad consumptionem mediū semper cantantes, pater noster vsq; ad finē, sed qui cantāt, sunt illi, qui laborant bocio, postea matutina hora exhibent istius decocti ad 3 iij. semper cantantes, & ante & post assumptionē per 30. cōtinuos dies pater noster, & hoc est medicamentū compositum ex arte & susurro illo, in quo medicamento sunt valide siccantia & discutiētia; sed transeant hæc. Relinquitur curatio aut manu, aut medicamentis: aliqui autem ad chirurgiā veniētes excoriant guttur, & sunt ita audaces, vt educāt partes illas carnosas, postea tentant consolidationē. Ego autē dico, quod nunquam bocium sanatur per chirurgiā, nisi sit pendulum, quia non potest auferri folliculus ex laringe nisi maximo cum periculo, quo non ablato non sequitur sanitas, præterea quandoq; est aneurisma, in quo tūc nō est vtendum chirurgiā, vt diximus. Tercio quandoq; ita magnus est, vt maximum immineat periculum, ideo semper fugiēda est chirurgiā. Per medicamēta autē non succedit, nisi per caustica, quæ etiā ego sum expertus, non tamē cum successu: quoniā succedit fistula, quæ quasi semper subsequitur, quā nisi abhorreat æger, ad caustica deueniri potest, neq; ratione est abhorrenda, quoniā fistula est minus malum quā bociū, quæ deinde semper teneatur aperta, & hæc est ratio curandi per caustica. Alia vero ratio per medicamēta digerētia & discutiētia imposita super locum affectum, quæ tamen aliqui sub palatum & linguā ponunt, & si est meliceris, optime curatur ab his discussoriis, quæ dicta sunt in meliceride: sed his validis vtmini: quoniā discussoria præter quā in meliceride nihil agunt. Sed sciēdum est ex mea sententia, quod vera curatio bocii est educio multæ pituitæ, saliuæ scilicet ac sputi, ideo cōueniunt quæ sub lingua derinentur, quoniā per sputi emissionē siccantur fauces & sanatur locum: hæc autē rationē recentiores quamuis opportuna proponūt ad hoc medicamenta, vt aqua marina exhibita quotidie hora matutina ad 3 ij. vel aqua salta, qua crebro, vt ter & quater in die abluarur, quia pituitā educit ac partē illam expurgat, vel hæc deficiente fiat aqua marina ex aqua & sale simul cōctis: inter medicamenta hoc proponunt recentiores remedium quotidie exhibēdum matutina hora palatum colluendū:

2℥. rad. cyclam. virent,

verbasc.

polypod.

sol. beton.

rad. acanth. vel branc. vsq; an. part. æq. cum vino bulliant, & fiat decoctio, cuius 2℥. 3 iij. & quotidie detur matutina hora, & ipso ter & quater in die os abluatur. Præterea dant puluerem quandam sub lingua detinēdum vesperti cum æger it dormitum, hoc modo confectum:

2℥. rad. bryon. vtriusq; id est, nigræ & albæ,

cyclam.

rufci

polypod.

asparag.

aristol. rot.

de effecti
bus intempe
rat, vt quæ
dam accedat.

disco
bri
naturam.

Quæ medi
camentis
discutit.

Quæ per
cantationem.

Quæ per
manu ad
composi
tione.

Quæ per
caustica.

Quæ per
discutiē
tia.

Disco
bri
naturam.

Disco
bri
naturam.

cucum. asin.
serpentar. min.
verbas.
spong. marinæ vst.

paleæ marinæ vstæ, id est, algæ an. q. s. misce, tundantur in puluerem tenuissimum, qui cum melle misceatur, & fiat elect. cuius portiuacula sub lingua tenentur, quando itur dormitum, quia sputum educit, siccât & validum est, quod etiam faciunt omnia gargarismata sputum aduentia, hoc modo:

℞ pulu. pyrethr.

pipet.

caryoph.

staphisagr. an. ʒj. cum sale & aceto, fiat linimentum, quo illiniantur partes palati inferiores, & sub lingua, quando æger dormitum vadit, quia mira facit: vel accipiat radicem pyrethri & mundar, quia maxime facit. Ab Actio autem proponitur multa, lib. 15. sed hæc tantum à me sunt approbata experientia.

De Tumoribus glandularum, qui strumia seu scrophula dicuntur.

CAP. XVIII.

Solent glandulæ tumores pati nunc calidos, nunc frigidos, nunc laxos, nunc vero frigidos. Sac duros, ut sunt *scrophule* à Græcis dictæ, sumpta similitudine à petris & saxis strumosis ac inæqualibus maritimis tales redditæ ab undis maris, quique scopuli dicuntur. Strumæ vero vocantur à nostris: quoniam plurimos patiuntur parvus & tuberculi: raro enim suboritur vna struma, quin multæ deinde oriuntur ab ea: vel strumæ dicuntur, quia in omnibus partibus glandosis corporis oriri solent. Præterea dicuntur scrophulæ, quia scrophæ hoc genus morbi potissimum patiuntur. Scrophulas has ætas potissimum infantilis frequenter admodum patitur, ut nihil frequentius, sed ita difficilis curationis, ut fere nil difficilius.

Celsus lib. 4. cap. 28. dicit, scrophas esse tumores scirrhusos ac duros glandularum, in quibus adest folliculus, & vera est definitio.

Causæ huius: & prima est congestio humorum in glandulis: congestio vero causa est fluxio materiæ ad locum; fluxio vero vel attractio, vel expulsio, vel motus concitatus in humoribus: horum autem causa est congestio in corpore, congestio iterum mala victus ratio & lapsus particularum ac imbecillitas, unde Galenus sect. 3. aph. 26. dicit pueros huic morbo maxime subiectos esse, quia mala victus ratione vtuntur, & plurimum ingerunt, unde plurima excrementa coaceruant, & cruditatibus abundant. Strumæ autem ex loco citato sunt ex materiâ, quæ calida non est, & quæ sponte ad suppurationem venit, quare erit phlegma collectum ex malo victu. Auicennas vero fen. 2. lib. 1. dicit strumas esse propaggines melancholicas. ego autem dico, veram esse utramque sententiam, sed Galeni verior, quæ potest confirmari ex causa efficiente, si ætas puerorum consideretur, in quibus sunt ut plurimum: quoniam pro vno viro, qui laboret strumis à materia melancholica centum sunt pueri laborantes à pituitosa, quæ sunt excrementa primæ concoctionis: quoniam hepar optime se habet in pueris. Præterea Auicennas idem fen. 3. lib. 4. in curatione strumarum medicamenta euacuantia pituitam proponit, quare etiam ipse vult esse pituitosam materiam: sed cum dicit esse propaggines melancholicas, loquitur de strumis cancerosis, quæ conceduntur ac dantur, ut fit quandoque in senibus, quamuis posset etiam dari tertium genus strumarum à materia mixta, tamen ut plurimum sunt à materia pituitosa.

Fiunt autem hoc modo strumæ, quia primo incipit fluere materia ad vnâ glandulam, & fit tumor laxus, deinde fluit ad aliam glandulam, in qua similiter fit mollis tumor, sed illa prima fit durior, postea ex secunda fluit ad tertiam, in illa facies tumorem mollem, sed secunda durior fit, & sic ad plurimas transit: sunt autem duræ primum, quia pars tantum materiæ fluit, quæ tenuis est ac serosa, cuius merito mollis erat tumor, crassa vero remanet & facit durum. Potest etiam fieri alia ratione, ut scilicet materia simul fluat ad tres vel quatuor glandulas, & Medicus statim imponat discussoria, ex quibus materia tenuis discutitur & relinquitur crassa, quæ facit tumores scirrhusos & duros. Loca autem harum strumarum tria sunt præcipue, sicut tria sunt viscera, cerebrum, cor & hepar, unde loca strumarum sunt fauces, inguina & axillæ: unde si caput tantum abundet hac materia, in faucibus oriuntur strumæ: si cor, in axillis; si hepar, in inguinibus: si autem omnia hæc viscera materia hac abundant, omnes hi loci patiuntur strumas.

Ego tamen sum huius sententiz, vt possint etiam circa alia loca, siue in aliis corporis partib. oriri, vt circa digitos, quas aliquoties vidi in pueris, ac in internodiis aliis & in metacarpio, quâuis à multis nō cognoscatur pro strumis, quia ibi non sunt glandulæ: sed decipiuntur, quoniam etsi non sint veræ strumæ, sapiunt tamen naturâ strumarum & eadē ratione crescunt, vt strumę, præterea plurimæ sunt glandulæ dispersæ per corpus, quæ ignorantur à nobis. Cognoscuntur autem strumæ, si quando in glandulis sunt, ad sit tumor durus & inæqualis occupans plures glandulas: nisi enim plures occupet, non est struma, quoniam in morbo gallico sunt tumores glandularū occupantes vnā tantum glandulam, non tamen sunt strumæ; quare ad hoc, vt sint strumæ, oportet vt plures sint tumidæ, tanquam vuz racemus ac duræ, vt dicit Auicennas. Si vero sint in articulis aliis, vt pedum vel manuum, per hoc cognosci non possunt, sed tunc erit tumor durus, frigidus ac diffeminatus per varias corporis partes, ac curandæ sunt vt aliæ strumæ. Cum autem strumarum aliæ sint magnæ, aliæ maximę, aliæ minimæ, ita vt quandoq; duæ tantum adsint, quandoq; plures, vt ad 20. vel 30. glandulas intumescant, & videantur racemi vuz, ideo oriuntur differentiz quædam, vt alię dicantur simplices, aliæ vero racemosæ ratione vero moris aliæ benignæ, manifestæ ac sine dolore; aliæ vero malignæ & inflamatæ aliæ, aliæ vero cæceroz, quæ etiam vario modo tractantur. Benignę autem sunt ex phlegmate & facile inflammantur, & medicamentis cédunt, licet eum difficultate, maligna vero habent signa canceri vicerati, & neq; proritandæ sunt neq; tangendæ neq; excidendæ detecta glandulæ.

Præterea ratione loci aliæ eleuatæ dicuntur & superficiales, & simpliciter glandulæ vocantur, & sint illæ, quæ in summa cute sunt, ac moventur de loco ad locum & facile curantur: aliæ vero sunt in profundo corporis ac insertę dicuntur vel depressę. In homine enim est duplex genus glandularum, aliud in flexuris articulorum ad sustentanda vasa, & sunt statim sub cute, & tangi possunt: aliud vero genus non simpliciter glandulæ dicuntur, sed glandosum corpus, quod reperitur in profundis partibus, vt in omento & pancreas dicitur; vel in faucibus, & vocatur paristhymia; vel in mammillis ad conficiendam saliuam & lac, alia sunt circa pudenda & alia circa alas. Si glandosum corpus strumis laboret, ex lib. 14. meth. cap. 11. vocantur strumæ depressę: si vero in glandulis prominentes dicuntur & etiam primę dicuntur insertę & profundę: differunt præterea ratione colligationis, quoniā quandoq; cum arteria vel vena insigni colligantur vel neruo aut simili vase: aliquādo vero simplices sunt ac absq; colligantia aliqua, & tunc vel infiltratę vel non infiltratę vocantur.

Infiltratę strumæ sunt colligatę cū vasis & complicatę & dicuntur, si hæreant insigni vasi alicui vt neruo vel venę vel arterię. Libere v. dicuntur, si simplices sunt, ac nulli vasi complicatę. cōplicatę vero difficilime curantur: libere vero facili, ita eleuatę, insertę autē difficilimę sunt quo ad curationem. Internę, profundę, depressę ac complicatę diligentissimum requirit Medicum & optimum medicamentū: simplices vero ac in vno tantū loco existentes, quamuis diligentiam desiderent, non tamen tantam requirunt, vt depressę.

De Curatione exquisita strumarum, quo ad viciū rationem & humoris euacuationem. CAP. XIX.

¶ Vm autem strumæ & plurimū à cruditatibus oriātur ratione mali viciū, ideo optima Cydus ratio instituitur, nimis non comedant, cibariis attenuantibus vtantur, pro ratione tamen puerilis ætatis, vnde odorata semina, olera calida ac coñdita ex cinnamomo, pipere & huiusmodi sunt exhibenda: præterea salita aliqua: abstineant tamen à vino, quia cum oriantur vt plurimum circa fauces & ceruicem & à materia à capite descendere, quæ maxime generatur à vaporibus ab inferioribus trāmissis, quorum vehiculum est vinum, ideo vinum fugiant. Motus immoderatus noet pueris, præfertim eum sudant circa caput, quoniam materia commouetur, quæ postea præcipitatur & strumas augeri fugiant ergo motum violentum, pluuiam, solem, ventum & animi passionēs, non abluant caput, sed loco ablutionis vtantur frictionibus cum fursuribus tripticis ablutis aqua expressis ad exiccatis ad solem, quibus postea caput detergitur ac mundatur sine lotionē. Si vero necessaria sit ablutio, fiat cum siccantibus non autem calefacientibus, vt ex lixiuio facto cum rosis, chamomillo, betonica, hordeo, spelta & rasura cupressi: Aeris mutatio plurimum confert si sit eiusdem qualitatē. Quod autem mutatio aeris conferat, patet ex equitatione in Galliam, quamuis mulieres tribuant hoc benedictioni regis. Sed puto ego dicendum esse, sanari ex agitatione viscerum, ex motu corporis, & ex aeris mutatione, quia aer Galliz bonus est subtilis & exiccans, cum præcipue, quādo hæc sunt, sit tempus ætatis, in quo tempore tantum, quia calidus & siccus, sanatos ego nonnullos vidi. Gallorum enim rex in die ascensionis vel pentecostes dum ad ecclesiam ad expianda peccata propria vadit, duobus

*Gallium
viper. bene-
dictus pro
munda stru-
ma.*

digitis manus dextræ pollice scil. & indice faciē eius ægri mensuras vel cululiscunq; in mo-
du crucis, dicendo Rex te tangit, Deus gloriosus te sanet, quo facto rex largitur cuique æ-
gro monetam vt scutatum aureum duos & tres pro ratione itineris longi, quod ad patien-
te fieri debet in redeundo ad propriam patriam. Si vero patiens sit ex Gallis, largitur ipsi
monetam argenteam vel dimidiam vt ipsi viderit. Victus itaque neque plenus neque
tenuissimus sit, sed mediocris & attenuans, similiter motus attenuans digerensque, vnde
pueri currant, exerceantur & agentur. Circa secundum caput continens euacuationem
humoris peccantis & viscerum alterationem, per quam euacuationem non sectionem ve-
næ sed pharmaci exhibitionem intelligimus, cum sit opinio communis, vt tot sint in inter-
nis partibus quot sunt in externis, ideo si virtus consentiat, ad pharmacum deueniendum
est, quod melius succedit, quam tractatio loci affecti per manuale actionem, quod phar-
macum etiam in pueris duorum annorū exhiberi potest phlegma euacuans, quæ varia sunt,
sed ab Auicenna proponitur turbich, quod præstantissimū est ad pleuritā tenuem euacuan-
dam, vnde fiat hoc modo: ʒʒ turbethum. Zinzib. & saccharū simul mixta ad ʒij. & detur cū
vino vel iure. Si autem materia sit crassa, vitur calocynthide & hermodactylis, quibus vi-
timur præferim in adolecentibus, ac materia existente crassiori: turbetho enim ego vtor
in pueris, quia materia tenuior est in his, vnde in pueris hoc modo fiat, ʒʒ turbich. ʒij. vel ʒ.
Zinzib. condit. ʒi vel ʒ. misce in mortario. Ex hoc ego exhibebā crebro admodū in pueris
quod facile assumunt, quoniam est veluti diacironitos, quo ego tamen vtēbar facta aliqua
præparatione. Cum vero solidiores sunt strumæ & ætas maior, ac materia crassior, fiat hoc
modo. ʒʒ pul. turbeth. ʒʒ hermodactyl. ʒij vel contrario modo, quia non refert, deinde ad-
de pulueris Zinzib. conditi, & cū his edulia commisce pro decipiendis pueris.

*Pharmaci
pro pueris
proprium.
Pharmaci
pro ætate so-
lidiore.*

*Pro strumis
diuturnissimis.*

Si vero diuturnissimæ sint strumæ ac phlegma crassissimum, deuenio ego ad colo-
cynthidem cum pilulis cochiis in parua quantitate, vel puluerem diacolocynthidos Pachii,
vel confectionem hamech, vel troisciscos alhandal, quibus tamen admisceo turbich & zin-
ziber conditi & hermodactylos an. ʒij. faciēs pilulas cum melle rosato, atamen fugio ego
semper quantum possum, colocynthidem. Cum autem continuo materia ista sit educa-
nda, continuo etiam præparata est cum melle rosato & pauco oxymelite, vt quotidie ma-
tutina hora quando pueri surgunt ē lecto ad quantitatem cochlearis. Cum vero præpara-
da est materia ista, ego vtor aliquo medicamento laudato ad strumas dissipandas cū melle
rosato: vnde cum ipsomisceo & oxymelite decoctum scrophulariæ, quæ sic vocatur dua-
bus de causis: primo quia medetur scrophulis, secundo quia habet globulos in radice, &
huius capio ad ʒij. vel exhibeo ipsius puluerem.

*Preparatio
materia pro
pria.*

*Scrophula-
ria cui ista
vocatur.*

*Recentioriū
medicamentū
ita præ-
paratur.*

Recentiores autem laudant poriones quasdam à me etiam comprobatis, quibus ta-
men mea quidē sententia alia addenda sunt, inter quas primo est radix ruscī, cuius maxi-
mā in hoc esse vim multoties reperi, si per 40. etiam dies puluis ipsius ad ʒij cum vino vel
iure sumatur. Secundo est radix falsæ parillæ & puluis illius, cum quibus ego modo præ-
paro, modo vero euacuo. Sed inter omnia laudo euphorbium, ex quo fiat pilula ponderis
granorū v. vel vi. vel quandoque exhibeo vnā pilulam scetidam ad ʒʒ. Sed potissimū ego
vtor deriuatione per alia loca euacuante, vnde quoties circa ceruicē sunt, per masticatoria
euacuo per radicem Zinzib. in ore detentam. Præterea deuenio ad errhina, vt ad elateriū,
semen cyclaminis, vel internas nares cum penna oleo violaceo intincta inungo.

*Ad stru-
mæ venæ
sectio conu-
nit.
Diversio à
capite per
quæ fiat.*

De sectione venæ non est sollicitandum, quia vt plurimum strumæ sunt in pueris. Si
vero essent in adultis & diuturnæ, laudaretur à me venæ sectio: sed quo ad præparationem,
si quis est affectus requirens maximam internorum præparationem hic vnus est. Præterea
oportet, vt continua fiat diuersio à capite ac ipsius euacuatio, vnde si circa oīs sint vel fau-
ces, aperiatur cutis capitis superficies circa commissurā coronalem, & fiat crustosa exul-
cerationes in eap. & hoc etiā in pueris, qui vt plurimū patiuntur strumas, quia materia, quæ
debebat facere lactumina, est elisa in fauces & salas; quare fit vt strumas vt plurimū patian-
tur illi, qui non sunt passi lactumina: ideo Aetius libro. 5. capite. 15. imponit cataplasmata
in synepite ex radicibus capparis & polenta vt materiam attrahat. Præterea saponēs quas-
dam imponit capiti exulcerantes & quosdam etiā pulueres in spergit idem facientes. Ego
v. in tenerissimis puellis accipio butyrū vetustissimū, ipso commissurā coronalem inungēs postea
impono foliū caulīs. his. n. attrahitur vapor acris ad caput, qui sensim exulcerat, vel foliū
hederæ, vel saponē nigrū cū butyro vetustiori, vel vtor saponē nigro puro, mandans ta-
men vt prius scissificentur vlcera illa sensim vnguibus. ita vt fiant manantia: vel aliquan-
do vtor acriorib. foliis, vt hydro piperi, vel sambuci viridibus, q̄ vicerant sine dolore. Si autē
hæc non agunt, caustico vtendū est. Præterea faciēbā ego sonarellas in brachio eiusdem
lateris cum foliis flammulæ louis integris. Quandoq; cum butyro mixta cum saponē nigro
fricant.

*Attrahentia
capiti pro te-
nerissimis
puellis.*

*Vlcera
sine dolore.*

fricando coronalem commissuram vel sagittalem, quandoq; vero ad robustiora deuenio, vrad cerine emplastrum supra commissuram coronalem, quod exulcerat.

Si vero pueri sint in principio adolescentiæ, tento capitis euacuationem per masticatoria robusta, vt ex pyrethro, plpere & staphisagria, quæ non solû caput euacuant, sed materiam in glandulis imbibitam educunt. Quando autem his per aliquod tempus vñus sum, ad euacuationem per deituantia venio, vt per vesicatoria circa brachia & scapulas eû Ammonis radicibus vel flammulæ Iouis foliis & ranunculi pilosi radicibus. Post hæc autem tractationem loci vel simul etiam & semel opus est vñ medicamentis d. gerentibus materiam strumarum existentem in internis visceribus, quæ plura sunt apud auctores. Ego autem præter decoctum scrophulariæ, asparagi & rusci hoc vñus sum feliciter, ac ipsum maxime laudo in hunc modum:

TUMOR STRUMÆ. 2℥ pulv. rad. rusci 3j

irid. gr. x cum vino dulci vel aqua mellita exhibeatur pueris per 40. dies; quandoq; vero addo puluerem salis parillæ cum dicto pulvere ad 3℥, tunc tamen radicem rusci ponens ad 3℥. Nisi autem ætas impediat, vñus theriacæ & mulitridarii optimus est. Auctores enim nolunt dari hæc pueris. ego tamen aliquando feliciter exhibui, & si ipso si theriaca si inueterata & tempus hyemale, & etiam in minimâ quantitate exhibui, vt ad 3℥ tantum digerit enim, siccatur ac roboratur viscera comprimitq; materiam, & ratione viperarum agit in strumas. Ex Celso enim habemus, q; catnes anguinarum maximâ vim habeant in dissipandis scrophulis. In robustioribus vero corporibus exhibebam theriacam & tetriscos theriacales viperinos & sales theriacales. Empyric. aut quidam accipit duas vipersas integras maculas & eas in vino extinguit per 24 horas relinquens, postea vinum hoc patientibus exhibet. sed notandû est, q; ad hoc sequitur symptoma vehemens, vt ppter siccitatē teneant os semper illius, quare non laudatur a me. In Hæturia vero, præcipue in Neapoli accipiunt animal illud, q; Ceruona, vel Ceruonum aut caprimulgus dicitur, & ipsum sinunt expurgati, deinde imponunt in vas aliquod aqua plenum, cuius maximam opâ bibit animal illud, postea ipsum per 40 dies ita relinquunt, postea coquunt in vino & hoc exhibent cum carne etiam ipsius patientibus feliciter, & huius etiam anguis pinguedo venditur à circulatorib; pro strumis dissipandis, & optime succedit. His peractis deueniendum est ad loci affecti tractationem, circa quam aliqua scitu digna proferam in sequenti capite.

De Curatione strumarum per tractationem loci affecti.

CAP. XX.

Circa locum affectum ex lib. 14. meth. c. 12. aut per diffusoria aut per ablationem scrophulæ procedendum est. vnde primo videndum est, an struma suppurari possit nec ne. Si enim suppurari potest, id celerrime agendum est, vt postea aperiatur & sanetur. Cognitionem autem hoc, si adit rubedo aliqua vel levis dolor in loco, vel cognoscitur ex analogia aliarum strumarum, quæ in eodem fuerint corpore suppuratae. Si itaq; hæc adfuerint signa, ponantur suppuratoria a nobis proposita in suppuratione meliceridis & aethetotatis vt ex caricis & cochleis, vel robustioribus ibi dictis. Sed aduertendum est q; quædam sunt inter ipsa scrophulis maxime familiaria, vt est emplastrum illud ex foliis eupressi, vt f. contusa folia cum aceto supponantur, vel folia contusa vrticæ, vel oleo selini folia cum cortice nucis: præterea rad. iridis virentis & contusa in forma emplastri supposita. Quandoq; vero in pueris ego eas etiam accipio: nam ex his fit suppuratio.

Facta suppuratione duplex est ratio curandi, altera per apertionem, altera per diffusionem, quæ tamen prius tentanda est, quoniam melior. Inter resoluenda autem est emplastrum cerine, vel emplastrum sacri, vel diapalma, quod est in primo loco ponendum, quoniam non est ita valdum, robustius vero est diapalma cum emplastro sacro mixtum, robustissimum autem est emplastrum cerine. Cum autem vt plurimum non succedat resolutio, nisi in strumis scissibus, ideo quandoq; aperienda est vomica in qua actione timonali quæstione per ferum superstritione quadam acti & vtuntur caustico. Ego tamen laudans etiam causticû, quæ calescit illas partes ac materias cû strumæ sint ex genere frigidiorû, tamen potius vtor ferro, quia citius sanatur locus affectus ac rectius materia educitur. Si autem non adfuerint signa suppurationis, tentanda est, vnde ego in his, qui strumas pariuntur per totum corpus, strumam apparente struma vtor medicamento attenuante & concoquente, vt celerrima fiat suppuration, accipiens radices iridis virentes & radices altheæ virentes, & coquens sub prunis in bullis foliis caulium, vel elixo ipsas in aqua, tundo in mortario, deinde addo melis q. s. & etiam portionem pulueris iridis siccatur. & hinc feliciter vtor ego, præcipue in strumis corporis dissipationibus etiam internodiæ & articulos: hoc enim nisi aliud ageret, materiam ex alto trahit,

*Post disrup-
tionem aut
fissionē que
modo tra-
danda.*

ira vt ossa ab ista materia corrumpi non possint, quæ vt plurimum corrumpuntur in parti-
tibus strumæ dispersas per vniuersum corpus. Cum autem maturatz fuerint & disrup-
tae aut per se aut per fissionem, aut per causticum medicamentum, distincta ego curationem
habeo ab aliis omnibus. Si enim fuerit struma in duriori corpore, cum robustissimis medi-
camentis procedo, quia locus est frigidus ac durus. Si vero tener sit puerulus, mitioribus v-
tor. In iuuenibus vero vel viris ad deterforium validissimum venio, vnde statim aperta vo-
mica Ægyptiaco temperato cum oleo & cera vtor per tres aut quatuor dies, postea venio
ad vnguentum Iſidis temperatum, q̃ moderatius est, & sic cicatrice obducitur vicius. Si
autē nō ita bene cicatrice obducitur, squamam xris præparatam inspergo, & testor ego
hac sola curandi ratione me plurimos sanasse, neq̃ curationem ipsam processisse vltra 20
vel 25 dies. Cum autem quandoq̃ sanata vna struma insurgant aliz, illæ etiam hac eadem
curatione sanantur, si ad robusta f. veniamus. Aduertendum tamen, quod, dum his vtimur
circa loca exteriora, imponendum est diachylon vel emplastrum mollitiuum, si emol-
litione opus est. At si non sit opus tanta emollitione, vtor ego diapalma aut cum eo misceo
linimentum simplex, si adest calor, qui refrigeratione opus habet. Si vero nō adsit durities,
applico diachylon cum linimento simplici iridem. Si vero cum calore est coniuncta duri-
ties, impono emplastrum mollitiuum cum linimento simplici. At in corporibus teneriori-
bus vtor radicibus iridis cum melle despumato hoc modo. ʒ. mellis despum. pulu. irosan.
q̃. f. misce & repleatur hoc cauitas strumæ, quod quamuis non ita cito agat, certo tamen a-
git. Extra vero imponatur diachylon vt dixi vel mollitiuum vel diapalma. Si vero strumæ 10
non possint deuenire ad suppurationem, emolliendum est prius, deinde discutendum vt
in omnibus tumoribus duris: vnde ego hoc sæpe & feliciter admodum vsus sum:

ʒ. pingui. gallin. rec.
human. rec.

ol. amygd. dulc.
mucil. sem. lini

scenugr.

rad. alch. an. q̃. f. misce & addita pauca cera f. empl. quo illiniatur vel
inungatur locus ipse continuo. Quandoque vero accipio axungiam suillam & pelliculam
ipsi hærentem aufero pinguem & super locum appono. Quandoq̃ vero accipio omētum 30
castrati aut suis & pono super locū fasciā obducēs, vel vtor diachylone vel emplastro mol-
litiuo, vel foueo locū decocto ex illis emollientibus, vnde accipio decoctū ex capite verue-
cis & misceo sem. lini, scenugr. rad. alchæ & ad diris foliis ac radicibus maluarū locū ipsum
ipso foueo. Loco autē emollito ad discussoria venio, quorū primum est oleum resolutiū,
secundo ammoniacum præparatū cum aceto, tertio emplastrū sacrum, quarto emplastrū
cetine: quinto empl. ex pyritide lapide, quibus ego libenter vtor, deinde rursus venio ad e-
mollientia, & iterū ad discutientia: sed maxime fido in emplastro ex radicibus, vnde puto
decoctū rad. alchæ & fol. malug. in iure pingui additis mucilaginis ac pinguedinib. di-
scutis. Pro discussorio autē decoquo in aqua vel sub prunis radices alchæ, rad. cucum. asin. &
rad. cyclam. addens postea resolu. ad emplastrum q̃ robustum est. Cum autem diu gustari 40
non possint hæc emplastra, ideo noctū hoc emplastrū impono & crassum, die vero mungo
aliquo dictorum oleorū.

Si vero nihil faciat emollitio vel discussio, ad causticū est deueniendum: vnde vel sint
suppuratz strumæ vel non, vel nō possint discuti, videndū est, an pfundæ sint, & an hæcāt
alicui vasi insigni vel nervo, quoniā tunc non est aggredienda hæc curatio. Si vero non sint
mulkū profundæ nec hæcāt vasi aut nervo, caustico vtendū est. Sed vera curatio ē, vt post
apertione tenemus, an exlocantib. medicamētis possit totus sinus exticari accipiēdo pul-
uerē iridis & mel crudū, deinde deueniēdo ad vnguentū Iſidis, q̃ diuturno tempore facit in
pueris, in adultiorib. v. prima die ad ægyptiacū mixtū cū cerarō rosato deueniendū est, pos-
tea sensim ac sensim ad ægyptiacū purum deueniētes, ex quo quāvis dolor insignis fiat, ta-
men in hoc casu dolor nō fit. Si autē hæc non faciunt, deuenio ego ad extractionē glandularū 50
p. gladiolū, quando cæceroſæ sunt strumæ ipsæ vel glandulæ. Si vero nō sint cancerosæ, hoc
facio per causticū, quoniā minor est tractatio. vnde quando ego corpus aliquod rusticū ha-
beo s. manibus curandū, deuenio ad trociscos de minio Ioannis de Vigo, faciēdo primo fo-
ramen in glandula cū specillo, deinde impono parū quantitatē trocisci illius. Si vero cutis
est integra, phlebotomo aperio, postea locū coopero linteo madido aq̃ rosacea vel ol. ros.
ad feruorē caustici tollendū, postea curo vt externa, quibus caustica applicantur. Quāvis e-
nim glādoſæ faciæ sint à natura ad expurgationē visciferum & excrementorū excretionem,
ramen possunt extrahi glandulæ hæc externæ, & præcipue illæ, quæ in ceruice sunt, quoniā
ex Gā-

*Si hæreat
vasi insigni
vel nervo.*

*Extractione
per feruorē
si cancerosa
sint.*

*Cutis aper-
ta pro ex-
tractione
glandula-
rum.
Vt ros. gla-
dularum.*

ex Galeno non multum necessariz sunt. Cum autem troscisci de minio Ioannis de Vigo sint nimis potentes, ideo ego ad extrahendas glandulas trosciscos hoc modo facio:

℞ arsenic. rubri, id est, auripigmenti

arsenic. crystall. an. q. s. misce cum pasta ex farina triticea, & fiant

troscisci imponendi. Quandoq; vero aperta vomica medicamentum hoc modo confectum applico,

℞ arsenic. rubri

sandarac. Græcor. an. 3j.

axung. suill. q. s. Misce. f. vngu. quo glandula tegatur, quoniam sic putrescet, & ex se postea decidet. Si vero corpus robustius est vel glandula profundior:

℞ arsenic. crystall.

cisagall. an. q. s.

axung. suill. q. s. misce & f. vngu. robustius. Sublimarum autem vel

aurichalcum aur arsenicum hoc modo parare consueui accipiens hæc medicamenta maiore aceto & diu permanere iubeo sub sole diebus canicularibus, vel hoc facio cum sulphuris. Quandoq; vero vtor non trosciscis sed puluerib. his cum axungia porcina. Sed sciendum est, q. quando glandosa corpora interna patiuntur strumas per disculforia tantum, non autem per trosciscos curari debent. Empyrica autem ratio est impositio lardi porci cum argenti viuo expurgato tamen prius vlcere cum melle ac puluere iereos super splenia imponentes.

Quarta ratio curandarum strumarum est per illarum extirpationem; quando sunt cancerosæ, quæ sit perfectiõnem, quando alio modo extirpari non possunt ac superari videntur primo aperienda est vomica sine cutis, dimouenda glandula, excidentem & cætera agendo, quæ dicta sunt in cancro & meliceride. Primo tamen obseruandum est; dum est, excidentem glandula, ne alia nigra glandula relinquatur in loco: quoniam iterum serpunt.

Secunda glandula sanguis silitatur posca, locus detergatur deinde, ac inuestigetur a nalis ad finem glandulæ turgidæ, quas educatis, vel detegitæ, etsi minime sint, eas. n. omnes extirpare oportet, quamuis centum essent, he canceri hant insanabiles. Postea cõsuatur locus, & imponatur barbarum vel quid simile. Post purgationem autem per biennium quotannis bis, in autumno & vere purgentur patientes ab humorib. melancholicis optima victus ratione ventres iam dicta in curatione canceri. Ego autem quandoq; præstigiis quibusdam sanari vidi strumas, hoc modo potissimum. Accipiunt enim mulieres mala perlica acerbacum laniguiæ in nocte D. Ioannis Baptistæ, & singulam strumam cum singulo persico tangunt; deinde mala reponunt in foramen muri aut parietis ibi relinquentes, donec exiccata sint persica, quoniam quando exiccata sunt, exiccantur etiam strumæ vel accipiunt (mulieres) rospum & ipso obvoluto panno eadem nocte tangunt strumas omnes, deinde reponunt rospum in eam in ut sicceat, & prout sicceat rospum, etiam strumæ siccantur & euanescent. Præterea eadem nocte accipiunt seruatum arborem iuglandem & ipsam per mediũ secant vsq; ad radices & stringunt strumas inter illas duas partes iuglandis secas, postea ligant vitæmq; partem iuglandis simul, & obseruant an reuiuiscat iterum; quoniam si reuiuiscit, etiam strumæ reuiuiscunt; si vero non reuiuiscit glans, nec etiam strumæ: unde si reuiuiscit planta, non curantur strumæ, quia insanabiles: si vero non reuiuiscit planta, per tantũ temporis spatium sanantur strumæ, per quantum remanet iuglans viridis: qua tota siccata, etiam omnes strumæ siccatæ reperiuntur. Ex his ego reuera vidi strumas aliquando sanatas, quæ ope medica prius sanari minime poterant. & hæc de strumis satis sunt.

De Ganglio siue nodo, natha vel nappa vulgo dicta. C A P. XXI.

Inter tubercula est etiam ganglion, quod genus morbi nervus arripit, per nervos autem intelligendo & primarios & secundarios, id est, chordas & tendines.

Tumulus autem vocatur à Græcis, sed ab Auicenna sen 3. lib. 4. & à recentioribus sub nomine glandulæ recensetur: à Guidone vero vocatur nodus & aliquando lupia, & est morbus ille, qui vulgo vocatur nathæ siue natha, quamuis sub nomine nathæ itum vulgares intelligant etiam meliceridas, steatomata & atheromata, sed improprie. Nodus autem dicitur he tumor, quoniam nil aliud esse videtur, quam nodosa quedã concretio ac compactio nervi & quasi contorsio illa nervi, quæ à Græcis dicitur *νεύρις*. Quod autem tumor hic circa nervos concreseat, plures sunt causæ, sed vna proponitur à Gal. com. 3. in 6. epid. text. 14. & est frigus, quando igitur refrigeratur nervus vel chorda, præter modum, sic, ut illa nervosa substantia contrahatur, & ita sen sim tumorem faciat. Aetius vero & Paulus pro causa huius tumoris ponunt ictus & contusiones ipsorum nervorum vel chordarum. Ego vero inter has contusiones pono etiam lacerationes, quoniam sepe vidi in pene ob laceratione

tionem neruorum oriri ganglia, quæ difficillime sanantur, imo plurimos hac de causa priapismum vidi patientes, dum vellent liberari, vi priapum contorquebant, quo factum est, vt nerui priapi dilacerarentur, & ita succedebant ganglia, quoniam ex illa laceratione fiebat attractio & inde concretio sequebatur, ad quæ ganglia postea non potest amplius extendi pudendum directe, & quamuis turgidum fiat, non tamen directe intumescit sed contortum manet. Ob nimium etiam coitum fieri potest ganglion refrigeratis nimis neruis ac defluente materia plurima ad illas partes, vt accidit in lasciuis. Præterea labor, quia ratione nimii laboris plurimum excrementi attrahitur, cum nimis pars exercitata veluti callus cōcreseat circa partes neruosas.

Hæ autē causæ ex lib. de caus. morb. c. 6 & 8. gignere possunt ganglion dupliciter, vel quia sunt in causa vt materia fluat ad locum affectum; & ita causa ganglii est materiz fluxio, vel quia sunt in causa congestionis, vt cum refrigeratur neruus ac debilitatur ex aere refrigerante, nimio coitu & huiusmodi. Materia autem aut congesta aut aliunde fluens est similis neruo, circa ipsum obducta ex li. 6. de vis. part. c. 1. quod idem est ac si dicatur, quod est materia viscida & tenax, pituitosa vel fluens ad neruum, vel quæ sit excrementum nerui ibi congestum, eum nulla sit materia, quæ magis assimilatur neruo, quam phlegma crassum viscidum ac tenax.

Signa autem, quibus ab aliis tumoribus distinguitur ganglion, primo est cōcoloratum, ita vt nulla sit mutatio in colore partis. Secundo est tumor tenens ac valde durus, vnde inter scitihælos tumores collocatur, tertio est indolens, non quod non sentiat particula, sed quia ægrum non cruciatur, sed si comprimatur, dolorem, tamen paruum, facit. Sed cum quandoque fiant ganglia cancerosa à materia atrabiliari, quæ vera non sunt ganglia, licet sint in corpore neruoso, in his dolor adest, vnde non sunt irritanda ganglia, cum dolor adest, quia cancerosa sunt & non vera.

Quarto talis tumor labitur ad latera nerui huc & illuc fluens, & tantum ad latera deducitur, non autem sursum aut deorsum, quoniam nerui, qui sunt eorum subiectum, cum tensi sunt, nisi ad latera, non autem sursum aut deorsum inueniuntur: Quinto si comprimatur ganglion, in parte ab ipso inferiori fit paruus stupor, vt si sit in carpo, ad eius compressionem fit stupor in digitis extremis. Sexto tumor hic vt plurimum cutaneus est, non autem profundus, quoniam vt plurimum nascuntur in neruis existentibus inter corium & musculos.

Locus autem subiectus gangliis quamuis communis esse possit, vt plurimum tamen in carpo brachiali & metacarpo metacarpo oritur, in brachiali scilicet & poltbrachiali, quia nerui ibi facillime tenduntur ac refrigerantur. Præterea circa talos & articulos pedum dum modo ex carnes sint articuli. Tercio frequentius in capite oriuntur, quamuis vulgus tumores omnes capitis vocet nathas, id est, vel meliceridem vel atheroma vel steatoma. A steatoma autem difficietur distinguitur. Sed cum steatoma semper hæreat in quo stuporem faciat ad compressionem, ideo per hæc duo signa distinguitur ganglion à steatoma, id est, quia ganglion mouetur de loco ad locum & compressus stuporem facit in inferiori parte. Præterea circa frontem oritur & frequentius in pudendo virili, & raro sunt senes salaces quin ganglia patiantur in pene, & si adest, oritur in dorso pudendi: qui ipsam patiuntur, non possunt vti venere, quoniam cum tenditur neruus, pudendum incuruatur, quia nerui substantia incuruata est. Sed non solum in neruis pudendi oritur, sed etiam in membrana & glandulis ipsius: in membrana scilicet neruosa ambiente ipsum, quandoque in canali neruoso.

Præsignum. Præsignum autem est, quod si nascatur in parte, in qua non sit periculum præfectionis neruorum, sanatur chirurgia saltem: si vero circa articulos, quia ad chirurgiam tunc deuenire non possumus, difficilima est curatio, quoniam medicamentis hoc agere difficilimum est. In collo vero pudendi senilis nunquam sanatur, in iuuenili vero quandoque sanari potest. Omnis tamen curatio ganglii est cum aliqua difficultate & temporis diurnitate.

Curatio duplex est, altera per chirurgiam, altera per medicamenta: prima autem non probatur, cum ganglion in neruis oriatur, nisi in capite, in quo plurimi non sunt nerui, nec vasa ampla, vnde tunc potest per chirurgiam curari. Eadem aurem ratione educitur, qua meliceris, atheroma & alii folliculi, vel etiam vt dictum est in ipsis, cum medicamento caustico exuri potest. In partibus vero, in quibus magna sunt vasa & nerui, per medicamenta emollientia curatur, deinde per dissipantia ac discutienda. Primum itaque digitum emolliatur per spatulum vnius horæ, moderate tamen comprimendo quotidie per missa corporis

poris evacuatione, si opus sit. sed raro requiritur, cum vt plurimum per confectionem, non autem per fluxionem fiant.

Emolliētes autē digiti inungantur ol. amygd. dulc. quoniā sicuti cera & corium durum attritione emollitur, ita etiam hi tumores. Postea per aliquot dies imponatur emolliēs medicamentum accipiendo ammoniaci lachrymam purissimam cā seruando, in palma manus donec emolliatur manibus ipsam contrectando, & ex addito ol. amygd. d. fiat pasta imponenda matutina & vespertina hora, quoniā sic agēdo solet emolliiri, vel ponatur ceratū hyssopi ex descriptione Philandri, vel manibus, ac earum calore emolliatur stīrax alba & sicca, quæ deinde addito oleo dicto in pastam conuerſa per tres vel quatuor dies imponatur, prius tamen attrito tumore, vt dictum est. Hoc autem factō vtendum est aliquo discutiente & repellente. vt est lamina plumbea aliquantisper caua, non tamen tangens partem citcumpositam: quæ super fascia deligetur sine dolore; hæc enim emollit & ratione sui ponderis materia eliditur ac extruditur. Cum autem his per aliquot dies vsi fuerimus, digiti apponantur ad tentandum, an mollis factus sit nec ne, & si sit mollis, inungatur pollex ol. amygd. d. & ipso validissime comprimitur ganglion, ita vt ex hac tractatione disrumpatur ac dissipetur, comprimendo s. donec tota materia dispergatur. Facta dissipatione inungatur locus ol. resolutio vel ol. lil. alb. cum atomantibus & postea iterum imponatur lamina plumbea validius prima vice comprimens. Si vero aliquid materiæ adhuc remanserit, iterum est dissipanda absq; laminæ impositione, sed validius discutiens & aqualiter repellens est imponendum; vnde ego vti soleo medicamentō ex stercore columbino hunc in modum;

℞ mucilag. sem. psyll.

maluar. an. ʒj.

picipis naual.

maſtich. an. ʒij.

stercoris columb. ʒ ss. misce & contunde simul in mortario & f.

empl. imponendum supra ganglion secunda vice dissipanda.

Quandoq; vero vtor ego emplastro sacro Galeni, quandoq; validiori vt cetine Theſiphontis descripto in lib. 6. de comp. med. per gen. cap. 33. maxime discutiente. Emollitus autem ganglio oleo viperino inungatur. & hoc modo plurimos ego sanauī, deinde supra laminam plumbeam imponens.

In pudendo vero cum laxa sit pars, ad talem dissipationem deuenire non possumus, quoniam non potest fieri deligatio hæc, ideo difficilior est curatio, & tunc est deueniendum ad illa emollientia, & primo iisdem frictionibus & emollitione facta per manus inunctas ol. amygd. dulc. vel axungia porcina vtendum est. Deinde deueniendum ad medicamentum ex mucilaginis vel ad ammoniacum & stīracem; deinde iterum digitis emolliendum, ac etiam ad laminam plumbeam, si adaptari potest, quamuis raro succedat; vnde ego post stīracem & ammoniacum hoc vtor emplastro;

℞ mucilag. altheæ

sem. lini

ſcēnigr.

citon. an. ʒj. ss.

ol. amygd. dulc. rec.

pingued. gallin.

anser. an. ʒij.

stīrac. alb. & sicca an. ʒj.

plumbi loti

cerussę lotz an. ʒij. ss.

ceræ parum misce & f. empl. ad emollitionem penis.

Postea ego vtor discussorio aliquo, vt ol. resolutio vel aliquo ex dictis emplastris, & iterum emollio rursusque discutio; inter quæ discutientia aliquando vtor luto diui

Bartholomei & diui Petri felicitē; vel carnes cochlearum contrusas cum ammoniaco misceo & etiam stīrace faciens vngentum discutiens. Et hæc de tumorbibus glandulosis & capitis dicta sint

fatis.

Marinum tumores quos sint.

Cum de capitis tumoribus dictum sit, reliquum esset atque ordini conveniens, ut ad oculos deveniremus; sed quoniam eorum inflammationes ab excellentissimis practiciis curantur & staphylomata oculis occurrentia in tractatu de vlcetibus traduntur, ideo de his non est hoc in loco agendum. Relinquitur ergo ut ad nares descendamus, in quibus varii tumores nascuntur; inter quos primum sunt inflammationes, quæ declinant in abscessus, & dicuntur à barbatis apostemata; secundo oriuntur tumores duri, post quos quandoque sunt vlcera, quib. deinde succedit generatio carnis, ita ut tuberculi fiant, qui supercrescentes carnes vocantur; tertio solent oriri tubercula cancerosa; quarto tumores quidam qui Polypus dicuntur, quinto hæmorrhoides, quæ sunt tumescentibus membranis vlcetibus intima nares, & hi omnes tumores à Medicis cutantur sub nomine polypi, cum tamen plurimum differant inter se.

An cancer narium sit polypus Galeni.

Cum autem cancer aut cutandus non sit aut pallescendus, non est ut inultu citet ipsum laborem, sed tantum sit erit tradere ipsius signa. Guido autem credidit cancerum narium esse polypum Galeni, quod tamen falsum est ex lib. 9. de compos. med. per loc. 3. ubi componuntur medicamenta ad polypum, quæ non conveniunt in cancro, quia sunt medicamenta ptoritancia, quæ ex Paulo & Aetio mimica sunt cancro. Caruncula etiam narium differt à Polypo, ita hæmorrhoides narium à polypo & reliquis. quamvis eadem sit omnium præterquam cancri, cuius signa omnia inferius traduntur.

Polypus quid sit.

Polypus autem est tumor præter naturam in naribus existens iuxta substantiæ similitudinem carni polyporum similis ex Galeno. Polypus enim vocatur à similitudine substantiæ, quam habet cum Polypo pisce marino habente carnem albā pituitosam & vitream; unde Theodoricus de clauditur dicens ita appellari, quia sicut involutus est polypus, ita etiam hic morbus. Locus proprius sunt nares, & genus est tumor. Cause efficietes proximæ sunt destillationes humorum; remotiores vero intemperies & excrementosa natura capitis & cerebri. Materiales cause sunt humores crassi & viscosi, qui cum copiosissimi imbibantur in membranis narium faciunt carnem similem polypo. Signa autem sunt, ut quando aliqui non possunt attrahere spiritum per nares, vel ipsum attractum per easdem emittere, vel violentius id facit ac cum strepitu. Sed cum hæc possint esse etiam in alio tumore existente in naribus, ideo distinguendum est per signa cuiuscunque. Ut ergo cognoscatis, an sit polypus, committatis, ut aperitis narium validissime spiritum emittat, si enim erit Polypus, manente ægro apertis narium apparebit substantia quædam in medio narium pendens veluti papilla tremula & spiritui cedens, lucida alba ac pituitosa.

Signa hæmorrhoidum narium. Caruncula. Cancer.

Præterea si appposito specillo circumquaque tumor circumscibatur ita, ut hæreas pediculo. Præterea si aderit stupor sine dolore, mollities & laxitas substantiæ præter albedinem. Si vero loco albedinis cum his erit rubedo, tumor ille erit hæmorrhoidis narium, qui solo colore à polypo differt. Si vero sit caruncula, cognoscitur ex carnis substantia, & si tangatur facile, facile fluat sanguis, & adest sensus dolorosus, si volsella attripiat. Cancer vero cognoscitur, quia durus est tumor, secundo magis hæret, tertio est niger, quarto habet dolorem pungivum perpetuum, quinto fetorem coniunctum, si sit vlcetatus; sexto ut plurimum nares ihtorquet & corrumpit.

Prognosis.

Hic cognitio præfaciendum est de cancro, quod non possit sanari, ideo non esse irritandum, nisi pallescat cum his, quæ ad cancerum occultum faciunt. In polypo vero semper sanitas pronuntiatur ita de hæmorrhoides & carne supercrescente.

Curatio.

Quo autem ad curationem, tria sunt capita tractanda, quorum primum est de victus ratione, secundum de totius evacuatione, tertium vero de loci affectu tractatione, unde quo ad primum, instituat bona victus ratio, & cum ut plurimum fiant isti à materia pituitosa & frigida, ideo sit attenuans, & aliquantisper calefaciens & exiccans. Cuius autem alique sunt regiones, in quibus abundat isti humores ob catharos, ideo mutetur regio, donec sanati sint, moveantur, non multum dormiant, sed vigilent, feces quotidie excernant & abstineant à venere.

Evacuatio.

Quo ad secundum capitulum, evacuetur corpus & caput, & si aderit caruncula, vel hæmorrhoides, seceret vena vel basilica vel humeralis.

Preparatio instrumenti.

Si autem parvus sit polypus, à sectione venæ est abstinendum, sed pharmaco utendum præparatis prius humoribus crassis ac viscidis per attenuantia & siccantia, præcipue caput respicientia, ut per oxymel, mel rosæ, steccha, salivam & similia: postea corpus expurgeretur ab humoribus crassis per medicamenta ex colocynthide, ut sunt hiera diacolocynthidis, pilule cochiz, confectio hamech. Facta evacuatione succentur ac roboretur caput ex lib. 3. de compos. med. sec. loc. per masticatoria, ut pyrethrum & similia. Secundo per continuas frictiones ad scapulas & brachia, quæ duræ sint, apponantur cucurbitule crebro & etiam scarificæ.

ificatæ. Præterea quandoq; per intus assumpta siccandum est caput, vt per confectus post coenam, vt stoechada condit. ex florib. rosismar. saluiz. Theriacz etiam vsus post coenam ad quantitatem fabæ. Galenus vero imponebat etiam ad commissuram coronalem validissimam, vt emplastrum ex thapsia, ex stercore columbino, ex euphorbio & alia tradita in curatione hemieraniz in lib. 2. de compos. med. sec. loc. Aerius etiam imponit emplastrum ex radicibus anemones, quod validissime siccat. Quandoq; vero deraendū est caput & imponendum cetarum ex pice nigra, resina colophonis & terebinthina. Si autem hæc non adsint, veniendum est ad emplastrum cereine Thesiphontis vel purum vel cum oxyrrocto. Aerius maxime laudat emplastrum ex cochleis, quo etiam quandoq; ego vsus sum feliciter si hoc modo paratur;

¶ myrrhæ

thuris an. 3j.

cochleas integras ex. v. misce, tunde in mortario simul addendo

albumina ouorum duorum, & fiat veluti frimentū, quod satis crassum imponatur & permaneat per nouem dies. Quando deuenire possumus ad stillicidium super coronalem commissuram. Si autem caput sit validum, vel possumus stillicidio artificiali exiccante sine calefactione. Si vero caput sit humidū & frigidū, vtendū est stillicidio naturali, vt ex aqua Apponensi vel aliis sulphureis & aluminosis. vel pulueribus inspergatur caput derafum & aceto madidum. Pulueres autem sint ex myrrha, thure, sandalis, rosis, ligno aloë. Si vero caput frigidum sit, ad datur cinnamomum, pipet, pyrethrum. Si vero calidum sit, vtitur rosis & aliis frigidis. Robotato autem capite ad locum affectum deueniendum est.

De Curatione Polypi per medicamenta localia siue loci tractationem.

CAP. XXIII.

Circa locum autē affectum cum auferēda sit hæc caruncula vel hæmorrhoids sit, vel polypus: huic ablationi tripliciter satis fieri potest; aut scil. per excicationem, aut per sectionem, aut per corrosionem. Per excicationem quidem applicando medicamenta exiccantia, & non solum potestate talia sed etiam actu: quoniam valida requiritur excicatio, vnde erunt vel sub forma troscicotum vel pulueris, vt possint inspergi: insperguntur autē vel cochleari vel specillo auriculam habente, vel per fistulam inspiratur & insufflatur per nares, quod melius est.

Medicamenta autem siccantia cū alia sint robusta, alia leuia, in corporib. tenetis mitioribus vtendum est, vt pulu. ros. siccat, vt in mulierculis, pueris eumuehis & similibus: hoc enim solo se vsu fuisse dicit Galenus inter metallica vero est eumpholyx lota, thustia Alexandrina lota, cadmia fossilis lota. Si vero robustum sit corpus in ætate iuuentili vel consistenti, ad robusta veniendum est, vt est puluis ex saluiz, quo locum vino granatorum madefactum inspergimus. Præterea solia & nuces cupressi siccatæ, gallæ etiam immaturæ: præterea medicamentum Galeni ex tribus granatis de quo agilib. 3. de comp. med. per loc. cap. 3. quo etiam ego sæpe vsus sum. Sed notandum est, quod cum non adsint vbiq; omnia tria genera granatorum, quoniam in illo medicamēto oportet accipere vnum granarum dulce, aliud acidum, reliquum vero austerum, ideo nisi adsint omnia, accipiantur duo tantum, contendantur, extrahatur succus vel vinum, quod optime coctum & inspissatum seruetur in vase stanneo. Ex corticibus verò & nucleis exiccatis cōtusis fiant pastilli ad vsu. Quando vero substantia polypi est durior vel hæmorrhoidis vel caruncula, accipiat maior copia mali acidi, quia maior vis attenuans requiritur. Quando autem est mollior polypus, maior copia acerbis, quia maiori excicatione opus est. Deficientibus vero acidis & austeris accipiantur mala immatura: sed ego deficiente acido admisceo succum vuz immaturæ vel acetum vel sumach, & facio medicamentum opportunum.

Quandoq; autem ad metallica deuenio, vt ad squamam æris & chalybis lotas, ad diapompholygem lotam, æs vstum, & griginem æris tostam & lotam: hæc enim extreme exiccant sine exulceratione & modificatione his siccis vtendo.

Quoniam verò quandoq; impositionem sicel medicamenti per multos dies nō fert æger, ideo solet fieri ex his medicamentum liquidum in modum linimenti, accipiendo, vt facit Galenus loco troscisci ex tribus granatis succum pomorum dictorum decoctum & seruatum in vase stanneo, vt dictum est, & ipso nares illiniendo. Si vero illud non adsit, fiat linimentum ex succo omphacii, gallarum immaturarum vel sumach, vel ex corticib. malorum puniceorum decoctis.

Si autem siccantia nihil facient, ad corrodentia deueniendum est & exedentia il-

Correspondenti
um materia

Iam carnem, quæ robusta sint, facile enim nares talia tolerant, quorum materia est chalcanthum, alumen, sandaraca, præcipitatum, calx non extincta, diphryges, oleum sulphuris, oleum chalcanthi & huiusmodi.

Simplicia.
Composita.

Inter composita vero sunt thoscisci Andronis, Pasionis, Polyide, Egyptiacum simplex & compositum, thoscisci ex charta combusta, vnguentum apostolorum vel Damasceni & causticum commune: his tamen semper gummi calorem naturalem contemperantia miscendo ac etiâ ceterâ, ut sunt myrrha, thus, mastiche & similia. Muniantur autem loca sanalino oleo, vel pulueres hi inspergantur bis vel semel tantum in die. Ego autem vtor chalcantho vtro cum Egyptiaco addito etiam oleo & cera, vel vtor alutune vtro cum præcipitato vtro, vel ol. sulph. & ol. chalcanthi.

Curatio per
lygi per
fluem.

Facta vitione obdortat cicatrice locos.

Tertia autem curatio etat per sectionem, quæ maior est, hoc enim vnica vice Polypus totus educitur, quod à medicamentis in pluribus diebus fieri solet, & minori cum dolore fit sectio quam vstro per caustica. Sex autem modis solet auferri Polypus per manulem curationem. Primo, cum laqueo, imponendo filum circa radicem Polypi & arripit radicem natus sic relinquendo, quoniam post tres dies ex se cadit. Hoc autem tantum vtor ego in hæmorrhoidæ nasi, non autem in Polypo; & etiam hoc modo procedo in carunculis, quæ non sunt in peniculis patibibus.

Quæ in die
sectur per
lygi.


Sed cum Polypus peniculis partibus hæreat, difficile est imponere filum, quod radices Polypi capiat, quare hic etiam modus erit ineptus in caruncula & hæmorrhoidibus narium, quæ radices altiores habeant. Patulus vero dilatans nares speculo vossella Polypum arripit deorsum trahens, & apposito specillo radici polypi tentat, quatinus in instrumento ad folium myrtili paulatim excoctat radicem & secat. sed quoniam ex hac actione euenire potest, ut & membræ perforentur & cartilagine dege possint, quare tuta nō est actio, cum ex his postea fieri possint vlcera difficilia. Alii v. accipientes Polypum vossella & deinde ferameto in summa superficie lunato ac incidere secant radicem Polypi ipsum in nares impellentes. Sed etiam ex hoc modo quodq; cartilagine inciduntur, quare nō est tutus.

Modus in
quæ est
lygi.

Ego autem fistulam argenteam accipio nec nimis latam nec nimis angustā, deinde filum æneum vel chalybeum satis crassum vel ferreum, ex quo arripenda constituntur, & ipsum duplicatim pono in fistulam illā, ita ut ex illo filo in altero capite fistula fiat ansa, qua in nares imposita polypum arripio. Cum autem ingressus est polypus in ansam, impello fistulam ad radicem polypi, & caput fili ænei in parte fistule inferiori existens traho, & sic radices polypi stringo & extraho, quia ab illo filo & ansa secatur radix polypi, quæ mollis est substantia.

Forma instrumenti seu fistule.

caput fili ænei



Si autem durior sit substantia polypi, extraho polypum, ac deinde gladiolo secō, & eodem instrumento vtor ego ad hæmorrhoides anī arripiendas & ligandas, quæ postea per se cadunt, in hoc casu preciosissimum est instrumentum, quamuis alij habeant maximam difficultatem in arripiendis hæmorrhoidib. Aliqui vero fistula aliqua capiunt polypum & per fistulam ferrum ignitum itaiciunt ad intra nares, & ita vrunt, sed periculosa & molesta est actio, quoniam quamuis fistula ponatur, ne nares exurantur, tamen etiam fistula calet, fit ferro ignito, licet etiam lineis muniatur, & sic nares exurit. Præterea ex vitione polypi refudat humiditas quædam fetida per nares quæ exurit: præterea possunt exuri membræ narium: præterea possit incallescere os ethmoides & læd cerebri, quoniam non potest videri modus exulsionis, quare tuta non est curatio & actio hæc per vitionem. Alii in remotissimis polypis, in quibus non potest vsurpari ferrum, accipiunt funiculum & ipsum intorquent & imponunt in nares, ita ut ad palatum perueniat, & arripiunt filum ex vtroq; capite & diducunt vtro citroq; & sic polypum secant, quod tamen non probatur à me vltimo modo: sed ego in hoc casu dilatans speculo nares forcipe ad hunc usum apra polypum secō. Alii vero secant partes narium laterales, donec deueniant ad polypum, & ipsum deinde hiant donec per se cadat, vel exurunt vel secant, postea nares confuit & agglutinatorium imponunt, quoniam nares facillime agglutinantur, & earū vulnera cito facilliq; sanantur. Post ablationem autem polypi, quomodo eumq; ablatum sit, ad vicus confolidandum vtemini siccantibus superius dictis ac epuloticis propofitis.

De hydrocephalo & eius curatione exquisita. CAP. XXIV.

IN puerorum capite ab ortu principio oritur tumor quidam hydrocephalus dictus, quia ut plurimum fit à collectione aquosæ materiz. Sed quoniam non nisi quam in puerili ætate fit hic tumor, ideo recentiores ipsum vocant aquam concretam in capite puerorum.

Fit autem variis modis. nam quandoq; fit, quia colligitur materia inter cutim & pericranium & quandoq; inter pericranium & cranium, quandoq; inter membranas cerebri ac cerebri, vnde quatuor sunt loca ipsius, si tamen fit tumor, augeatur quantitas & perturbatur conformatio capitis.

Causæ efficientes variz sunt, sed prima est fluxio humorum, quæ (fluxio) ut plurimum oritur à roto corpore non solû puerili sed etiã à venis inuolucris fetus, id est, secundinæ & ab utero male affecto, quoniã frequentissime fit tumor hic, dum puer est in utero matris, quia uterus exonerat se per venas ad fœtum ad ipsum venientes, & sic ad caput pueri transmittitur materia hæc. Alia causa est venatum, membranarum aut corii capitis dilatatio, ex qua effunduntur humores. Tertia vero causa, quæ euidenter dicitur ab Aetio lib. 7. c. 1. vel libr. 6. c. 3. est descriptio vasorum facta vel ab ictu vel à contusione.

Materialis autem causa vna tantum proponitur à recentioribus, & est aquositas menstura cruda & imperfecta expulsa ab utero ad fœtum, quam natura non potuit concoquere, quæ deinde ad caput fluens facit tumorem. Ego autem ex his coniicio, hos non nouisse nisi vnam tantû speciem hydrocephali, quoniam etiam serum est materia ipsius, seu serosa superfluitas in venis contenta ex Paulo li. 6. c. 3. & ex Aetio lib. 5. Cum autem fit hic tumor exitu vel contusione venarum & artiarum, materia eius est sanguis eductus per ictu in vomica collectus ac colliguatus & factus veluti succus sterculentus. Notandum est autem quod quamvis isti tumores sint aquosi, aqua tamẽ illa est lenta & crassa non autem pura aqua, ut notat Aetius.

Signa duplicia sunt, hydrocephali scilicet & loci ipsius. Hydrocephali autẽ primũ est, quoniam statim a botru pueri corrupta apparet conformatio capitis, ita ut pars aliqua ipsius prominat & tubercula habeat, præterea tumor est concolor cuti sine magno dolore, quia ab aqua fit. Si vero in tali tumore addit rubedo & dolor ad tactum, si sit satis insignis, tunc est hydrocephalus ex contusione, & vasorum ruptura in ipso capite facta ab obstetricibus negligentibus, dum fœtus educitur, vel matribus gerentibus, abdomen in aliquo loco percussis, q; ego fœtor mihi ipsi euenisse, & factu esse in meratione & causa matris. Si autẽ hydrocephalon sit inter coriũ & pericraniũ & ab aqua, erit tumor mollis, valde prominens concolor cuti, sine dolore, turgidus ac facile digito cedens & refluens. Eadẽ fere ratione cognoscitur esse inter pericraniũ & craniũ, hoc tamen differt, quia durior est tumor, quoniã infra membranã illam continetur. præterea non ita facile cedit: & aliquid doloris adest ad tactum. Si autem sit inter craniũ, durus est tumor, nec facile comprimitur cedit: si vero valde comprimitur, cedit, quoniam licet sub osse materia sit, tamen in puerulis molle est os ita, ut cedat valide comprimẽti eo magis cũ aqua subiecta mollia seruet ossa. Præterea cum comprimitur, valde vagiunt pueri, quoniam ingens fit dolor: præterea forma capitis tunc deterior est, & ut plurimum frons prominat ita, ut si quid additum esset, & caligare oculis videtur, & quasi continuo illachrymatur oculi vel ut plurimum, nec audent pueri oculis aperire. Si vero sit inter mēbranas & cerebrũ, sunt illa eadẽ signa omnia, sed præterea adest quidam veluti stupor sensuũ omnium, vnde stupidus videtur puer, ac nullo modo caput sustinere potest, & si comprimantur, vagiet veluti si ex somno excitaretur, præterea ex naribus aliquid manat.

Quo vero ad prælagiũ in hydrocephalo gemino exteriori salus prælagiri potest, quoniam ut plurimum sanantur, si recte tractentur. In interioribus vero mors ut plurimum, non tamen relinquendi sunt absq; curatione.

Curantur autem ab antiquis oēs hydrocephali sola sectione, quæ tutior est in exterioribus. At in interioribus hydrocephali periculosissima est, nec fieri debet, nisi tumor maximus sit. Hanc tamen recentiores timent ob nimiam euacuationem materierum: sed hoc antiqui non timebant uti exerecitiores. Ego ramen ipsam timeo ne crucietur pueruli, vnde ipsam relinquo, si fieri possit: si maxima sit copia aquæ, sectione opus est, quam in ipso expertus sum. Si vero pauca sit, medicamentis vtendum est. Recentiores vero veniunt ad discussoria: vnde Guilhelmus Placentinus vtitur ol. anethino vel chamomel. addito sulphure. Sed ego maxime laudo repellentia, ex quibus mira quidem vidi, quæ nõ potuerunt agere discussoria, cum tamen alias ipsa non probauerim.

Quandoq; vero ex iniectione ol. ros. compl. vel ol. myrthin. vidi sanatos hydrocephalos spacio tantũ quatuor dierũ, quando precipue fit ex a pertione & dilatatione venarũ in quibus conuenit curatio cõprimens & cõfussans venas: ideo ego vtebar medicamento nũ-

Ratio mem
ni.Quæ mod
fiat.
Quæ es
quæ loca
occupet.Causa effi
cienter.Causa ma
teriali.Notandum
circa mate
riam.Signa hy
drocephali.Signa hydro
cephali ex
contusione.Si inter co
riam & pe
ricranium,
Si inter pe
ricranium
& craniũ.Si inter cri
niũ & men
branam.Si inter mē
branas &
cerebrum.

Prælagium.

Curatio.

An repellentia
sufficiant.

*Diffusoria
Fallopia.*

xio ex repellentibus & discutientibus. Ex diffusoriis autem accipiebam viridia folia eupressi & absynthii optime confusa, deinde affundebam ol. ros. compl. vel ol. myrrhin. & faciebam linimentum. Quandoque vero vtor vnguento alabastrino, quandoque foliis hederæ cum illis repellentibus & cum foliis etiam absynthii cum ol. ros. vnde ego non probō diffusoria recentiorum, qui coguntur post eorum vsum deuenire ad exustionem perforantes hydrocephalon, quoniam voluit, ut deinde tribus vel quatuor in locis caustico perforaretur caput & linamento aliquo claudatur. quod quidem causticum ipsi laudant, quia à sectione fugiunt, quasi quod causticum lenius ac leuius sit sectione. Sed meo quidem iudicio meaq. sententia si hydrocephalus sit ex contusione, vtendum est puris repellentibus. Si ex apertione vasorum repellentibus mixtis eum discutientibus, vt esset ol. ros. cum chamomel. & etiam cum albo ovi mixtum. Quamuis autem ratio dicat, quod ex repercussione materia ad caput retrocedet, tamen cum hæc materia à toto deueniat, ex repercussione fit, vt adstrictis venis materia amplius non fluat ad caput. Cum vero his fuerimus pluribus diebus vsi, si quid remanserit, discutientibus vtendū est, vt medicamento ex sulphure, vel oxycroco Guilhelmi, vel cerine emplastro.

*Apertio
quando
veniat.*

Si vero medicamentis non cedat tumor, veniendum est ad sectionem, quam quidem optime docent Paulus & Aetius, & quam etiam ego laudo, si recens sit affectus, vt pūgatur ita, vt educti possit aqua perforando abscessum in loco decliuo & ad euacuationē aque admodum apertio. Educta vero aqua statim glutinandus est locus, non autem relinquenda labia distantia, aliquid addendo repellens ac inflammationem prohibens, vt esset vinum austum & oleum totatum simul mixta, vt etiam dolor prohibeatur, & hæc cum lana applicentur, vel inspergatur puluis thuris vel aliud glutinatorium, vt est oleum abietinum admixtum mastichino. Si vero sit tumor sub osse, aliqui aperturunt & perforant os, ego tamen hoc non laudo: sed, vt docet Aetius, expectandam esse naturā puto, donec aperiat suturas, & locum ostendat vbi debeat fieri sectio. Sed sciendum est, quod fere omnes isti moriuntur, imo vnum tantum vidi, qui sectus fuit à me, & mortuus est. At primi duo exterioriores fere semper sanantur cum repellentibus & discutientibus mixtis vel solis repellentibus vel sectione: ad exustionem autem nūquam deuenit ego, quia nimis exercebat, & hæc de hydrocephalo.

*Repellent
et
inflamman-
tium pre-
scribitur.*

De Cossis sine iunctis inueniuntur in facie. CAP. XXV.

*Varia
nomen.*

Cossis iuuenum faciem infestantes etiam antiquis fuisse noti ab illis, vocati iuncti, eoq. forte videantur fosculli ac efflorescentia cutis faciei: Bothor faciei nuncupantur ab Arabibus & barbaris, quia minimi sunt tumores: Paulus vero, Aetius, Galenus & Latini vatos vocant, vulgus autem cossos appellat, & ratio ignoratur. Sed notandum est, quod oritur etiam quidam affectus in facie, qui gutta rosacea vel rubea vocatur, in qua color faciei mutatur in rubrum ac cutis inqualis redditur & sepe tumida, quæ quandoq. videtur quasi præludium elephantiasis, quæ differt valde à cossis, licet qui hac laborant, etiam cossos patiuntur, plurimi tamen cossos patiuntur, non tamen guttam illam rosaceam.

*Gutta
rosacea
differt
à cossis
Causa
effluens
Materialis.*

Causæ varorum efficientes potissimum sunt contagium vel consuetudo: præterea fluxio humoris peccantis aliquando ab vniuerso corpore sed præcipue ab epate. Materiales vero ex Aetio lib. 8. c. 13 & Gal. lib. 5. de comp. med. sec. loc. c. 3. sunt humores crassi. Sed recentiores distinctus loquentes dicunt materiam cossorum duplicem esse; alteram phlegma tantum, alteram phlegma cum sanguine: & ex hac materia duplici, varorum etiam duplicem speciem faciunt, quarum alteram vocant varos rubeos, alterā lacteos, quorum etiam curatio variatur.

Differentia.

Signa.

Quod ad signa, sunt tubercula minima in acutiem desinentia, modo rubea, modo vero alba. Quo ad præsigniū, si multitudo horū occupet totam faciem, præsigniū est difficillima curatio, quia semper noua tubercula suboriuntur. Similiter si inueterata sit hæc affectio, vnde plurimi sanari non possunt, quoniam quamuis singula tubercula sanentur, noua tamen semper suboriuntur, quæ prohiberi non possunt. Si vero recens sit per contagium recepta, non ita difficile curatur. Curantur autem si magna sint & inueterata instituta bona victus ratione, vt si albi sint vel lactei, victus tenuis sit ac bonum generans succum calidum & siccum & attenuans. Si vero rubri sint, victus sit tenuis quidem, non tamen attenuans, sed potius hepatis refrigerans. Aquæ thermales refrigerantes, vt Villenses vel frigide istæ nostræ, vel cōpō diui Petri vel virginis in monte Orthoni, vel Lucenses vel Calderianæ in agro Veronepsi, vel Agnane in agro Pisanosque omnes profunt, si in ipsis infundatur. Si autem ventriculus sit frigidus, calida adhibeantur. Præterea si rubri sint, seceetur vena in vena. Si autem lactei, euacuatio fiat per pharmaciū pituitosos humores educens. Facta euacuatione ac instituta victus ratione in sex rebus non naturalibus ad locum affectum deueni-

Curatio.

Vitæ ratio.

*Aqua ther-
males
refrigerantes.
Phlegma-
tica.*

endum

dum est, circa quem ex Galeno indicatur discussoria valida, vt cito discutiat materia, ne veniat ad suppurationē, quoniam longior tunc sit affectus molestior ac relinquens vestigiū in facie, & quandoq; puncta nigra quædam veluti stigmata faciei maxime deturpantia. Sed cum duri sint tumores ac succi crassi, emollientia cum discutientibus misceantur, vt dicit Galenus, qui quidem vnum omisit, q̄ ego tamen ex suis medicamentis proposui elicio, q̄ f. ad ea opus est etiam sectione & incisione, ideo oportet, vt medicamentum discussorium sit emolliens & incidens ac disseicans, quia aliter materia illa non potest emolliari. Sed cum variorum alii sint rubri, alii lactei, varia requiruntur: vnde in rubris pro discutientibus, incipientibus & attenuantibus est acetum acidum & acre, vt robuste discutiat, vt etiam succus limonum, & succus vix acerbæ, item succus lapati acidi siue acuti, id est, acetosæ, vel vinū granatorum acidorum vel eorum succus: præterea alumen præstans est, quoniam siccat & attenuat. Pro emollientibus autem addimus semina melonum, quoniam habent in se pinguedinem vel oleoginositatem quandam emollientem, similiter amygdalas amaras & etiā dulces, nucleos etiam persicorum, semina ricini, id est, cataputiz maioris, quā gira sole vocat vulgus vel mirafale, vel admiscetur oleum factum ex suis seminibus, quod dicitur oleum de cherua. Præterea sunt farinæ, vt farina cocta hordei vel fabarum.

Composita autem medicamenta plura sunt, sed accipiantur amygdalæ amaræ & dulces, vel aliquod ex dictis seminibus, & contundantur in mortario, deinde affundatur aliquis succus acerrimus, vt acetum vel succus limonum, quandoq; addendo portunculā aluminis combusti: Quantitas autem sit pro ratione corporis subiecti vel validi vel imbecillis & fiat linimentum. Ego autem habeo familiare quoddam medicamentum ex succo limonū, cochleis, vel porceletis illis, quæ sunt veluti cochleæ marinæ albæ & lucentes, quæ tenentur ab vnguentariis, & has colloco in succo limonum recēti donec succus ille absumat totam illam testam & relinquatur limus, quo postea locum inungo. Quandoq; vero si varus est durior, cum hoc luto misceo aliquid amygdalarū amararū vel nucleos persicorū masticatos, vel butyrum vetustissimū: vel pomatā, si delicatū sit corpus. Si autē rebelles sint vari, venio ego ad medicamentū robustissimū mihi admodū familiare hoc modo confectum;

℞ sublimati præparati loti ʒj

ol. amygd. dulc. ʒj, misce in vase vitreo aut supra cineres calidos aut sub sole, deinde accipio vel ol. amygd. dulc. optime contusarum vel amararū, vel seminum melonū optime contusorū ac munda torū ʒʒ, & cum illo oleo & sublimato misceo, postea addo succi limonū, plantag. acetosæ & aq. ros. an ʒʒ & misceo, & cum albumine oui vniū & concutio, donec omnia incorporentur; & hoc robustissimum est in variis rubeis rebellibus ac maxime faciens, in quo nihil aliud inueni validius. Si vero vari lactei sint, medicamenta accipiantur attenuantia, discutientia & emollientia, vt nitrum vel sal nitri, quando nitro caremus, sulphur ignem non expertum, sandaraca vsta, auripigmentum vstum & lotum, piper, cinamomum, cardamomū maius & minus, semina anisorū, sinapis & omnia semina acris: radix ari, id est, dracunculi maioris & minoris: radices bryoniæ albæ & nigræ: alcyonitæ præterea omnia, saponēs omnes, præsertim ille, qui dicitur pro pānis & niger, fxx

40 vini vsta, quæ est alumen facis, oleum tartari, & radices ellebori albi ex antiquorum autoritate. Pro emollientibus autem iidem nuclei dicti, pinguedines variæ, vt pomata vel vnguentum ros. Mes. quibus acris illa excipiantur, vel ol. amygd. dul. ad dentes ammoniacum, styracem & similia: vt pro exemplo, si vultis, hoc modo;

℞ pulu. cardamomi ma. & min.

& caryophyll. an. ʒʒ

sulphur. vini ʒʒ

nitri ʒj, terantur simul & cum f. q. pomatæ s. linim. emolliens & discutiens. vel fiat hoc modo;

℞ pulu. cardam. ma.

sem. anis.

cinnam.

pip.

baccar. iunip. pulueris. an. ʒj

rad. ari siccatar.

serpentar. ma. siccat. an. ʒj

nitri ʒj.

vng. ros. Mes. q. scitis terendis misce in mortario pro linimento.

Cum autem volo robur addere, admisceo alumen combustum & præcipue cupero-

Loci affecti tractatus.

Vari rubri quibus tractandi.

Semina melonum.

Composita.

Familiares Salis.

Aliud simile ad rebelles variis rubeis.

Ad variis lacteis simplicia.

Emollientia.

Composita emollientia & attenuantia.

sum, quod maxime cutim roborat præter attenuationem & siccationem, quam habet, unde quandoq; ipso solo vtor cupereolo in mortario contuso admixto luteo oui & ol. amygd. dulc. & linimentum. Cum vero his vtor, quandoq; robustissima addo, vt pulu. rad. eleb. alb. vel sandaracum & auripigmentum.

Si autem ad suppurationem veniat varus, & relinquatur stigma nigra, vt tollantur, madesiat locus succo limonum per tres vel quatuor vices. Si vero hoc non sufficiat, vendum est oleo tartari, quo madesiat acumen acus, & deinde stigma tangatur. Si vero adhuc non succedat, calamo scriptorio acuminato in acie extraho stigma illud sine molestia accipiendo cutim & ad exteriora trahendo, vt promineat stigma, deinde pennilla acutissima infixata traho; neque in hoc casu vtor gladiolo, ne vlceret partes sanas, vt fit in phleboto- mia. Educto autem stigmate per se solidatur locus & sanatur. & hæc sufficiunt de varis siue colliis: sequitur vt de affectibus oris loquamur, & primum de ranula siue lingua pagana.

De Ranula siue batracho.

CAP. XXVI.

Tumor quidam sub lingua oritur, à recentioribus ranulus siue ranula vocatus, à Græcis autem βάτραχος, quoniam in ranatalis reperitur tumor loco linguæ, qui noua lingua videtur in homine, & vulgo vocatur lingua pagana, quoniam vulgus pagani nomine aliquid inutile intelligit ac malum. Hic autem tumor aliquos balbutientes facit ac blafos, ac loquelam maxime impedit; nos autem loquimur de illo, qui actionem impedit ac impedire potest.

Causa efficiens primo est fluxio à capite aut à toto, quæ fit vel ob attractionem vel ob expulsionem, vel ob motum humorum proprium: aliquando enim fluit sanguis purus, aliquando pituitosus: & hi tumores faciunt ranulam hanc veluti carnem additam, ita vt tumor sit mollis, rubicundus, laxus & sine dolore: aliquando vero fluit melancholicus humor per se, vel cum pituita crassa, & tunc fit tuberculum nigrum & fluidum, durum ac sine sensu & dolore: aliquando tamen puncturas habet, unde duplex est ranula, altera veluti caro addita mollis, laxa & sine dolore ac rubicunda, altera vero denigrata, dura ac cancerosa dicta. Cognoscitur autem eleuata lingua, videtur enim altera lingua addita.

Quo ad præsagium, ranula cancerata nunquam sanatur, quoniam vlceratur & hominem interficit, quare curatio ipsius non est aggredienda: ranula vero simpliciter dicta sanabilis est.

Curatio. Curatur autem, si instituatur bona victus ratio, deinde corpus euacuatur, & si minima non sit, secetur vena, non quidem ratione affectus, sed loci, qui est alienius momenti & plurimos habet nervos. Præterea quis acria sunt apponenda medicamenta, à quibus excitari possit fluxio, ideo ante putgationem fiat præparatio. Quo ad locum affectum, tripliciter superari potest, aut exiccantibus aut exedentibus aut actione manuali. Exiccantia & repellentia laudat Aulcennas, vt ex sumach, hippocyttide, gallis &c. vt & ipsos troscifos tribus granatis: Idem puluerem ex cortice granatorum additis aliquibus concoquētib; vt thure, mastiche & myrrha, vt aloes amaritudo figuratur. Præterea omnia exiccantia in primo gradu dicta in polypo conueniunt in ranula.

Si exiccantia non sufficiunt, veniendum est ad exedentia dicta in polypo, exceptis autipigmento, sublimato, præcipitato & aliis huiusmodi sua natura venenosus propter cōmunicantiam oris cum ventriculo & eius ore. Accipiantur itaq; alumen, chalcanthus, myrrha, sory & cupereola, quæ quamuis bona non sint ratione ventriculi, tamen etsi degluciantur, non sunt venenosæ. Præterea oleum geminum sulphuris & oleum chalcæthi, quæ etiam per interius exhibentur in verribus ac lapide renum in lapide quidem renum datur oleum chalcæthi vel sulphuris ad tres guttas cum vino, aliquo decocto, vel vt ex capill. vener. In verribus vero datur eorum gutta cum aqua graminis.

Si vero non succedat per hæc res, veniendum est ad sectionem. Acutius vero lib. 8. ca. 37. dicit focandas tantum esse venas illas nigras & turgentes sub lingua existentes. Albuca- sis vero & recentiores vossella ranulam accipiunt & per transfusum secant, deinde imponunt exedentia, vt oleum sulphuris & chalcanthi. Postea dicit Guilhelmus Placentinus, q sola aqua aluminosa teneatur sub lingua admixta myrrha cocta, quia satis est ad cicatricem inducendam, vel accipere mel rosatum vel syrupum myrrhinum cum portione aluminis & inungatur locus. & hæc est ranula antiquorum.

Ego autem experientia adinueni aliam reperiri ranulam, quæ oritur sub palato similitudinē habens ranulæ: oritur autem sub palato, videlicet in membranulis vestientib; palatum in parte inferiori, & differt à ranula antiquorū, quoniam hæc oritur in cavitate illa laxa, quæ

Strigatum ablatu.

Ratios nomi-
nar.

Causa.

Signa.
Præsagium.

Curatio.

Loca affectu
trahente.
Exiccantia,
& repellentia.

Exedentia.

Oleum sul-
phuris ad la-
pides renū,
& vermes
quomodo
exhibendi.Ranula fa-
cta.Ranula alia
à Falloppio
admonenda.

quæ est inter linguâ & musculos in membrana inferiori & veluti meliceris est & elata lingua facile patet. Tumor autem hic his accedit, qui sæpe caput sibi mundat & permittunt ex se siccare, neq; de hoc tumore aut antiqui aut recentiores locuti sunt, sed ego ipsam adinueni & obseruaui, quod quandoq; adeo crescit, vt etiam in partibus infra mentum appareat. Oritur vt plurimum ex fluxione à capite, quandoq; ex fluxione facta à ventriculo p porositates lingue. In hoc morbo idè fere indicatur, quod in meliceride, nisi quia nec putrefactio nec discussio in hoc tumore succedit, quoniam non possunt in loco medicamenta seruari, neq; etiam exsilio cuta est, nec vsus causticorû, neque excoriari potest folliculus: hæc enim in ore periculosa sunt. Ego itaq; attenuationem cutis supra posita, in qua humor continetur, per caricâ tento supra tumore detenta, quandoq; vero cum caricâ misceo aliqd nitri. Attenuata autem cuti, appposito pollice sub mento, vt eo comprimento bene p mineat ranula, apertaq; ore phlebotomo ranulâ perforo in loco, in quo non sunt amplius venæ neq; earum multitudo faciens sectione aliquantisper magnâ, ex qua magna pituitæ flauæ quantitas effluit, quæ videtur mel, quam comprimento totam educo, & ea educta statim affundo mel rosarum, vt detergatur folliculus, ita vt partes illæ deinde agglutinari possint. Si vero inueterata sit ranula, impono mel rosarum cum alumine rochæ combusto & hoc inungo donec sanetur vlcus, à principio s. vsq; ad finem.

Sed cum quandoque secta ranula & educta materia mellea & sanato vlcere postea ad quinque vel sex dies alia renascitur ranula, tunc non est deueniendum statim ad sectionem sed oportet permittere vt crescat, deinde secetur; quoniam si statim secetur, iterum regeneratur & quandoque renascitur bis, ter & quater, quamuis etiam corpus purgatum fuerit & reuulsiones factæ sint. Cognoscitur autem nō amplius redituram esse neque regeneraturam esse ranulam, quoniam vltima vice sit tumor durus, vt scirrhus & melleus, & sic vltim⁹ hic tumor sanatur per impositione butyri viciusti & ol. amygd. dulc. intus imposita: extra vero cum his, quæ dicta sunt alias, præterea cum discutientibus. Si vero his non succedat curatio, imponantur caricæ cum butyro vel alia aliqua pinguedine quæ faciant ad maturationem, & exterius alia cerata pingua, quoniam sic sanantur, nec amplius reuiuiscit ranula.

De Gingivarum parulidibus. CAP. XXVII.

In gingiuis contingit inflammatio oriens nunc in vna parte gingiuarum nunc in alia, & morbus dicitur à Græcis, videtur enim tanquam noua gingiua addita priori, ideo *parulis* dicitur, quasi gingiua parua eborta alteri gingiuarum. Ista autem duplicia sunt alia calida ex sanguine, alia frigida ex materia pituitosa. Causæ autem ex Petro de Argilla sunt destillationes à capite, quandoq; à ventriculo, quandoq; ab aliis partibus, quandoq; à doloribus dictum, quoniam dolor attrahit. Materia autem varia est, modo enim pituita sola, modo pituita cum sanguine, modo purus sanguis, ne crebra sunt hæc tubercula.

Sed cum alia sit recens alia vero momenti ac recidiuans; plurimi enim sunt, in quibus reuiuiscunt sæpius humores, quare si recens sit, statim ad locum affectum accedere possumus.

Si vero recidiuans, prius est euacuandum totum ac optime caput purgandū & roborandum ac reuulsionibus vtendum ac bona victus ratio instituenda, aliter nihil fiet, vel si sanantur, iterum reuiuiscunt & tandem in fistulam insanabilem desinent.

Circa locum autem affectum antiquiores vt Paulus & Aetius & recentiores etiam statim deueniunt ad medicamenta robuste siccantia & discutientia. Si vero his non succedat, ad caustica deueniunt: & si hæc non faciunt, tentant maturationē, deinde sectionem. Inter excicantia autem primo est decoctum fornugracæ, secundo et ermor pitæne, tertio vinum mulsū. Si autem hæc non faciunt, admiscet sulphur cum melle cocto. Ego autem pro discussorio accipere soleo caricam & ipsa perforata in eam pono sal nitrum & vtrum optime & frico & pono super locum: Quandoq; vero impono nitrum fricando cum caricâ: Quandoq; passulas maiores, quæ possunt enucleari non autem illas paruas, quas non nouere antiqui: venio ergo ego ad passulam illam vocatam cubebo, quem antiqui per passulas maiores intelligebat, & has enucleo, & in ipsas sal imponens frico & inuersam vnam impono. Si vero hoc non valet, ad discussorium venio ex catica cum alumine vsto, quandoq; ad alume vstum & chalcanthū. Sed libentius cuperofa vtor q̃ est chalcanthū purissimum, quia non habet admixtum z s vel ferrum, & sciendum est, q̃ nisi chalcanthū haberet ferrum vel z s albu admixtum, concrescere; sed isti, si viride non conetescat, addunt, dum ipsam præparant ad tincturas, z s vel ferrum, ideo ego libendus vtor cuperofa in his partibus.

*Curatio per
sectionem.*

miscendo cum caricis & imponendo. Sed cum pauca sint tubercula, quæ discutiantur, (ego enim testor, ex centum parulidibus quatuor non vidisse dissipatas, sed omnes fere suppurantur) ideo cum succedit discussio in primis illis 4. diebus, venio ad maturationem caricis vel visus dictis addito butyro vel pinguedine gallinæ vel anseris vel ol. amygd. dulc. vel cum decocto ex malus rad. altheæ additis caricis. Statim autem maturatum tuberculum aperiendum est, quia solet materia illa acris corrodere membranam, quæ ligatur maxillis, quæ corrosa sunt fistulæ: quare statim aperienda est. Sectio autem dupliciter fit: nam si noua sit ac non recidiuans parulis, satis est phlebotomo pungere per tranuersum abicisum ipsum secando, ut pus excernatur, deinde accipiatur flosculum siue portio illa, quæ colligitur ex linteo corraso & imponatur in vlcus factum linamento ut distent labia, deinde imponatur mel rosatum simplex cum ipso pluries in die locum inungendo, quoniam cum salua detergitur locus, vel si opus sit eum melle rosato admixto ut remini pauco alumine vito. Si autem ex recidiu sit parulis, oportet forcipe rescindere totum acumen tumoris, aliter succederet fistula, quæ clauditur & facit nouam parulidem & iterum clauditur & nouam facit fistulam: quare excindatur nouacula vel forcipe, deinde expleatur cavititas alumine vito addito pauco melle rosato: deinde tota curatio procedat cum melle rosato cum pauco alumine: potest etiam cum aqua aluminosa, id est, cum nitrosa ac alumine vito. ut donec sanetur. Si vero succedat fistula, curetur cura propria.

*Si sit parula
ex recidiu.*

De Epulide cum gingivarum tumore.

CAP. XXVIII.

*Definitio
ratio.*

Solent gingivæ aliud etiam genus tumoris pati à Græcis dictum, de quo Latini nihil dixere, cum tamen creber sit hic tumor in his, qui geminos habent dentes: & etiam communis est illis hic tumor, qui distillationes patiuntur, de quo agit Paulus lib. 3. cap. 27. & lib. 6. cap. 26. & lib. 8. cap. 15. morbus autem hic talis est: gingiva enim ambiens ultimum dentem, præcipue in mala inferiori, ita quandoque crescit ac super dentem serpit & ita ad anteriora procedit, ut cadens inter dentem & dentem contundatur, & maximum facit dolorem ita ut os aperiri non possit, neque quandoque patiens comedere: Græcis dicitur quasi noua gingiva.

Causa.

Causæ huius præcipue sunt geminorum dentium generatio, qui quandoque 21. anno fieri solent: tumor autem hic fit, quoniam dentes illi tendunt carnem suppositæ gingivæ, & cum illam non possint rumpere, sunt in causa, ut gingiva intumescat & inflammationem patiatur. Alia causa est fluxio à capite calida ex salsa pituita, unde quilibet morbo gallico, in quibus defluuium gallicum est ad palatum, hunc tumorem sæpe pati solent. Materia autem est eatharralis ut plucitimum, quæ quandoque tenuis ac insipida est.

Materia.

Signa.

Signa nota sunt: videtur enim caro adaucta tegens partem dentis: adest præterea dolor maximus & impedimentum in comedendo, febres quandoque ingentissimæ insensui solent & ardentes.

Præsignum.

Præsignum autem semper est bonum, nam superata inflammatione facile auferitur caruncula illa.

Curatio.

Curatio autem est, si inflammatio sit alicuius momenti, præmittenda sunt capita vniuersalia iam dicta: si vero non sit momenti, locus tantum affectus tractetur duo agendo, primum scilicet inflammationem mitigando ex mulsâ vel decocto sem. lini vel cremore potissimæ ipsis ablundo. Ego autem soleo accipere decoctum fol. malu. addito saccharo vel melle ros. os colluendo: vel accipio lac admixto decocto malu. vel passularum vel caricarum. At si feruens sit febris & inflammatio ingens, accipio lac purum milies ipso os colluendo: quandoque admisceo decoctum maluarum, quandoque caricarum. At si magis mitigare volo, lacti aquam rosaceam admisceo vel succum ros. Si vero magis siccat opus est, addo mel rosatum, quandoque autem extinguo chalybem pluries in lacte & vtor. Per exterior vero impono emplastrum ex pane, violis, rosâ & lacte, ponendo exterior ad maxillam ad radicem scilicet aurium: quandoque vero decoctum violarum fol. scilicet & etiam malu. addito pane & ol. rosato facio emplastrum optimum.

*Per exterior
applicatio.*

*Carnis abla
tio quomodo
faciat.
Per exicca
tionem.
Familiaria
pro exceden
da carnis.*

Superata inflammatione potest aperiri os, quod prius non poterat, tunc itaque est auferenda caro illa, quæ auferitur vel per corrosionem vel per sectionem vel exiccationem: per exiccationem quidem inspergendo gallas: vel medicamentum ex tribus granatis, vel alia dicta in polypo. Si exiccatio non faciat, ad exedentia deueniendum est, inter quæ tria ego familiaria maxime habeo, quorum primum est alumen rochæ combustum, secundum scobs vsta, tertium chalcanthum vstum equis portionibus assumpta & addito sale

roste

costo ac optimè trita inspergantur & imponantur loco vel fricentur gingivæ. Antiqui autem fumebant ærugines & cetera, quæ dicta sunt in polypo, sed mihi admodum non placent. Secundum medicamentum mihi familiare erat oleum sulph. tertium vero aqua aluminis magistralis, quibus locum madefactio cotone in ipsis madefacto, & ex his ita gingiva corroditur, vt liberetur. Sed quoniam aliquando gingiva fit callosa & non potest auferri per exedentia: ideo tunc venio ego ad sectionem cum Paulo & Aetio. Notandum est tamen, quod mea differt sectio à sectione Pauli & Aetii; nam ipsi volsella carnem arripiunt, postea forcipe secant, sed ego habeo instrumentum falcatum, quod erat ad modum falcis, qua prata secantur habens acie acutissimâ, & hoc sepo per mediû ipsam gingivâ, non autem carnem aliquâ auferendo, aut amputando, sed cum acie illius instrumenti vsq; ad demum gingivam seco, deinde partes separo ita vt vna caderet inter dentes, altera vero extra; postea accipio lanuginem lineæ abradi, & ipsam obuoluo alumine combusto, vel imbuo in aqua aluminis & impono in illam sectionem vt remaneant partes illæ separatæ. Postea ad obducendam cicatricem vtor alumine combusto cum melle rosato, rubens, vt abluatur os cum decocto aluminis & myrrhæ in vino decoctis, quæ curatio mihi semper successit. Sed quia quandoq; opus est totam illam gingivæ substantiam amputare, vt facit Aetius & Paulus, quamvis raro hoc accidat, ideo si opus est, amputetur. At si levis sit affectus sola frictione salis & aluminis sanantur, vt ego multoties vidi & sanavi.

Est præterea alius tumor gingivarum parulida dictus, qui est ipsarum inflammatio quandoq; maxime molesta, de qua Paulus li. 3. c. 18. & in qua oriuntur gravissimi dolores, quæ quoniam eodem modo curatur, vt dictum est, ideo illa eadem, quæ in superioribus dixi considerantes in huius curatione similiter procedetis.

De Panariciis vnguium ac digitorum affectibus CAP. XXIX.

Secedunt tumores gravissimi circa vngues orti vulgo panaricia dicti, à græcis vero *πυρρην*, quia frequentissimi sunt circa ipsos digitos quandoq; ipsos corrumpendo, in Hetruria vocatur il mal del pino, eo quod disrumpo abscessu succrescat caro quædam, quæ pinus formam habet; apud aliquos autem vocatur il mal del fico, quia folia ficus arida & lac ipsius solent affectum hunc sanare, & est inflammatio seculissima, & ita vt Theodoricus dicat eodem modo tractandam esse vt carbunculos.

Causæ huius externæ sunt contusiones, à quibus sæpe oriuntur: quandoque punctura in extremis vnguib; sunt harum causæ & exulcerationes redivarum, id est, pellicularum circa vngues existentium, unde sæpe accidit vt mulieres consuetes ipsum patiuntur affectum. Semper autem immediata causa est fluxio, quæ fit vel à dolore vel alia quavis causa alias dicta.

Materia autem est tenuis ac biliosus vel sanguis exultus melancholicus, vt plurimum tamen est biliosus, tenuis & præter modum calidus, qui cum inuadat extrema digitorum ostia, primo vngues inflamat, postea etiam ceteras partes.

Signa sunt tumor partis, rubedo aliqua, pulsatio dolorosa, vigilæ perpetuæ, febrisq; magna quandoq;.

Præfagium autem tale est, quod; si inueteratæ sunt paronychiae & induratae, præfagendum est, quod radix vnguis sit corrupta & os extremum digiti vitiatum; ideo longa erit curatio, quoniam tunc oportet aperire & auferre os vitiatum.

Si autem recens sit affectio, semper cito sanitas est pronuntianda & facilis, quia si à principio curatur, vel non fiet, vel cito curabitur. Si vero sit inueterata ac iam suppurata, pronuntianda est difficilissima curatio ac etiam quandoque articuli corruptio, & totius etiam interdum digiti, & mors aliquando, quoniam quandoq; sphacelus percedit.

Curatio autem si in principio vocaveritis, non faciatis vt faciant recentiores, qui hæc valde timentes communiter venam secant, aluum leniunt & cum pharmacis biliosum humorem educuntibus corpus expurgant. Tenuem etiam victus rationem instruunt: Si enim scirent, qua ratione ista sint tractanda, non devenirent ad hæc, sed sine his locum affectum sanarent: quoniam non est opus his, nisi vehemens sit inflammatio & febris, quare in principio statim, vt mœser sententia, veniendum est ad loci affectus per tractationem; primo tentando prohibitionē huius tumoris ac materię illius dissipationem statim; & ob id antiqui statim veniunt ad repellentia. Vnde ego statim, nisi incipiat suppurari, ad acerrimum acetum devengo, lineum ipso madefaciens & digitum obuolvens vel succum limonum impono, vel mando vt æger digitum teneat in succo agrestis, vel facio emplastrum ex farina hordei cum succo agrestis vel limonum vel aceto & impono.

Aliqui vero recentiores faciunt emplastrum ex gallis vel ex corticibus cotoneorum, & bene faciunt; omnia enim acerbam maxime laudo ac repellentia, quæ refrigerent & excoquent. Neque est veniendum statim ad doloris mitigationem, ut aliqui faciunt ignari, quoniam ista fugienda sunt, sed repellentibus utendum. Si autem ex usu repellentium non cedat dolor, sed potius augeatur, tumor tamen minuatur, ex hoc colligendum est, quod materia quidem digeritur, sed crassior in profundo colligitur, quæ repelli non potest quare tunc veniendum est ad maturationem & concoctionem, non autem ad digestionem, quia hæc res non succedit. Tunc itaque ego laudo medicamentum Lanfranci ex axungia & scabioso foliis virentibus contusis, quia putredini resistit atque concoquit. Si vero hoc non adfuerit, ego accipio consolidæ medix folia vel minoris, id est, folia illius primæ consolidæ, quæ primula 10 veris dicitur, & contundo cum axungia & butyro: vel accipio caricas contusas cum butyro, vel portionculam lardi salici & impono sal enim aliqua portione croci, & super locum pono ad maturationem.

Facta autem maturatione aliqui secant ferro ignito antequam fiat perfecta maturatio, ut Ioannes de Vigo, qui monet, ut abscessus aperiatur, antequam optime sit maturatus, ferro ignito. quod tamen ego non laudo, sed volo potius, quod expectetur bona concoctio, deinde nouacula aperiatur. Sanie autem expressa quandoque solet superuenire caruncula, quæ *σπίρην* vocatur, quæ est caro supercrefcentis circa vngues, quam recentiores neglexere, quamvis Celsus lib. 6. c. 11. eam non neglexerit & hæc non est rediuita illa, quæ etiam *σπίρην* à Græcis vocatur: nam ipsi per pterygion duo intelligunt, primo pelliculam 10 illam, quæ vestit vngues, de qua non loquimur in præsentia: secundo vero *σπίρην* vocant carnem hanc supercrefcentem, unde male aliqui in Paulo & Actio rediuitam hoc vertunt: nam Celsus in morbis hoc meminit, at illa *σπίρην* non est morbus. Succreuit ergo caro ista, quæ vera *σπίρην* dicitur vel aperto panaricio, vel non aperto etiam, & est caro dolorosa ac grauis.

Notandum autem est, quod hæc solet quandoque decipere Medicos, quoniam in omni suppuratione vnguium semper in radice media vnguis solet oriri caruncula, quæ est origo vnguis, & ipsi credunt eam esse pterygion, de quo loquimur, quam quandoque erodentibus cutant, sed decipiuntur: nam caruncula, de qua loquimur, ut plurimum nascitur à lateribus vnguium, & est in principio, id est, in eius radice angusta, superius autem lata est: Contra vero se habet illa, quæ est origo vnguium, quæ radix est vnguis, & est bona caro ac lata in radice.

Superueniente ergo hoc pterygio omnes veniunt ad excedentia dicta, ut squamas, precipitatus, chalcanthum, trosciscos Andronis, trosciscos ex charta combusta, trosciscos Passionis, & illos, qui sandaracam & submatum habent, quandoque oleum chalcanthi vel aluminis vel sulphuris. Aliqui vero veniunt ad exustionem. quamquam ego eam non laudauerim unquam. Bene verum est, quod quandoque devenio ad oleum sulphuris & chalcanthi, quandoque ad folia ficus arida vel ad vnguentum ægyptiacum. Si autem non superueniat caruncula & sola sanies ex abscessu educatur, isti imponunt vnguentum apostolicum: Ego vero impono vnguentum Iſidis vel mel rosatum cum alumine com- 40 busto.

Sed cum hoc appositum fuerit, extra deinde apponendum est medicamentum repellens, quare extra ego impono vel micam panis madidam in vino austero nigro vel posca intinctam, vel impono vnguentum diapompholygos dictum, & his utor, donec ab omni sorde sit liberatus abscessus. Liberato autem eo è sorde, diapompholygos solo, vel vnguento diapalm. vii possumus usque in finem. Quomodo autem curanda sint ossa corrupta & nervi, in superiori anno dixi, quomodoque sint educenda, cum de articulis tractarem, quate si os corumpatur, ad illa iam dicta recurrendum est.

De Hernia quacunque, primum tamen de umbilicali.

CAP. XXX.

*Latia subie-
cta hernia.*

Differantia.

*De Hernia
Umbilicali.*

Hernia est affectus tumidus, qui solet oriri tribus in locis corporis: rupturam vocant recentiores: vel enim oritur circa umbilicum, vel in inguinibus, vel in scroto, quæ tres sunt herniæ, umbilicalis s. inguinalis, & scroci. unde primum aggrediamur nos sermonem de umbilicali.

Solet pellicula illa rugosa, quæ à Græcis *τρυπη*, id est, verula dicitur, quia est rugosa, intumescere & extendi præter naturam & à Græcis *εἰσπρη* vocatur, à nostris autem prominentia umbilicalis siue umbilici, de qua Paulus lib. 6. c. 31. & Actius lib. 4. cap. 26. & hæc est fami-

familiaris pueris & mulieribus, ratio enim videbitis hunc affectum, nisi in pueralo vel muliere, & potissimum dum parit, aut est emixa.

Causæ autem huius in puernlo efficientes sunt nimis vagitus, contentio, spiritus re-
rentis & clamor. In mulieribus autem nixus maximus inter pariendum, quoniam
tunc extensus est uterus & muscoli abdominis & pelvis vmbilici, ideo facile fit ruptura.
Præterea clamores magni, saltus & copia maxima flatuum. Materiales vero causæ plures
sunt: nam materia herniæ aliquando sunt intestina egredientia extra abdomen dilatato
peritonæo, vnde hic habemus morbum in situ, in substantia & quantitate adaucta & in
conformatione etiam ac numero. Quandoque materia herniæ est omentum, quod e-
greditur dilatato vmbilico ac museus extensus & retinetur ab abdomine & sic facit her-
niam. Quandoque ex Paulo materia herniæ est flatus, quod plerumque accidit in pueris,
quandoque est aqua coaceruata sensim ac sensim resudans à vasis illis & præcipue à vesica
per vtrigum, quæ colligitur in ea cauitate. Quandoque caro solet concretescere in hac
cauitate, & sic herniæ materia est caro: Quandoque & sæpe fit aneurisma, vt quando se-
dæ sunt arteriæ vmbilici & recens est sectio, & etiam vocatur hernia vmbilicalis.

In adultis autem raro accidit hic tumor, frequentissime vero in dictis.

Signa vero distinguuntur erunt hæc: nam si erit hernia ab intestinis, facile resupina-
to ægro intestina redeuntur ad proprium locum cum strepitu ac rugitu.

Præterea hic est inæqualis, vt sunt inuolucra & anfractus Intestinatorum. Præterea
cum hic tumor fiat ab intestinis lenibus, ideo durus non erit tumor, sed facile tractabitur,
actactui cedet & mollis erit.

Si vero erit ab omento, erit facilis tractatu, sed non ita facilis, vt altera ab intestinis, o-
ritur etiam inæqualis, sed minus, quam ea ab intestinis. Præterea resupinato ægro retroce-
det omentum, sed sine strepitu. Si vero erit à flatu, si percutiatur, pulsabit vt tympanum, et
si comprimatur, non facile eliditur flatus, sed est tensor & renitentiôr ista hernia à flatu,
quam illa intestinatorum, vel ab omento, quia flatus hic colligitur, vel aperto peritonæo vel
non. Si non est apertum peritonæum, non potest eedere, quia retinetur flatus. Si autem ru-
pina sit peritonæum, quia cauitas abdominis semper est repleta flatib. ideo non facile ce-
dit. Præterea lucidus est tumor. Præterea si conculcet digitis, statim ablatis ipsis redit ad

suam molem. Si vero sit ab aqua cognoscitur, si hydropicus sit æger: si vero non sit hydro-
picus cum non habeat communiatem cum cauitate abdominis, cognoscitur per lumen
appositum. quia lumine appposito apparet lux transparenst & aqua apparet, vnde tumor lu-
cidus est & aquosus. Si autem sit caro, adest tenitencia ac durities, mollis tamē & nunquā
retrocedit ad tactum & compressionem. Si vero sit aneurisma ex pulsatione existente in
ipso tumore, patebit tactum. Quo ad curationem, ea in hernia vmbilicali ab intestinis
facta duplex est: altera per vinculum & medicamenta, altera per manuum operationem.
Recentiores autem non laudant manualet actionem, quia reuera difficilis est, quoniam
difficile consolidantur vulnera facta. Guido etiam hanc reprobat dicens tentandam esse
sanitatem vel per medicamentum vel per ligaturam: quare iisdem medicamentis vtien-
dum est adstringentibus & exicantibus, quæ erant in vsu in hernia facta ab intestinis de-
scendentibus in scrotum, de qua inferius dicemus. Primo enim oportet vt intestina &
omentum in proprium locum deducantur, præterea oportet vt simul inungantur partes
peritonæi & vmbilici dilatæ cum medicamentis adstringentibus. Cum autem mediea-
menta hæc duorum sint generum; quædam scilicet per exterius apposita & quædam per
interius assumpta, ideo vtrisque est vtendum, vt tandem pars illa glutinetur, quod quia fi-
eri non potest, nisi pars illa conseruetur simul iuncta, ideo semper fascia & puluillis com-
primendus est vmbilicus, de quibus omnibus infra dicemus. Quo ad victus rationem &
curationem in reliquis eadem est, quæ in hernia intestinali requiritur: & sic de illa, quæ in
scroto, etiam dicendum est. Ego tamen nunquam aliam curationem tentant; vnde si ma-
nualem actionem quis vellet, legat Paulum in proprio loco & Albueasim, quoniam cū ego
eam improbem, nec vnquam ea vsus sum, ideo ipsam hic non pono nec tracto.

Si autem sit hernia ventosa, quæ sæpe solet oriri in puerulis, oportet, vt pueri ca-
ueant à rebus ventosis, ideo nutrices caueant & pueri à cibis ventosis, totus venter inun-
gatur oleo chamomel. & anethino. Præterea imponantur glandes discussorias vim ha-
bentes, & primo accipiaturspicus allii bene coctus sub prunis, & inungatur butyro vel oleo
anethino, & imponatur puerculo, vel accipiaturs caulem rutæ vitidem excoctum à pellicula
& oleo anethino inunctum & imponatis vel inungatis pauculam partem caudæ raphani &
imponatis; ex his enim diseniuntur flatus & purgabitur venter.

Causa her-
nia in pueris
& mulieri-
bus.

Materia
herniæ qua-
triplex.

Signa distin-
guuntur. Quæ
vmbilicalem ab
intestinali.

Si ab omen-
to.
Si à flatu.

Si ab aqua.

Si à carne.
Si à anem-
rysmo.
Curatio.

Alia ma-
nuale repro-
batur.

Quæ primo
agenda.

Si hernia sit
ventosa.

Glandes
discussorias
pro pueris.

*Vmbilicum
constringen-
tia.*

*Si hernia sit
aquosa.*

Hoc factio prominens vmbilicus ligandus est, postea imponantur facientia ad adstri-
ctionem vmbilici, vnde ego in pueris accipiebam folia hederæ & cupressi & ea mansa im-
pono vmbilico, & puluinar ex linteis cum fasciâ impono immutans tertio quoque die, quâ-
doq; folia illa tundo in mortario & inspergo vino austero & impono, vel accipio myrtâ,
bolum orientale, terebinthinam, & eam miscendo ad cerati consistentiam, & im-
pono vmbilico, & succedit optime. Si vero est aqua, discussoria tantum vtor, inter quæ ex Ae-
tio primo est semen ameos, si eo manso imbuatur vmbilicus: si autem hoc non faciat, venio
ad varia discussoria dicta in melieeride; vel vltimum refugium habeo cerine emplastrum
cum oxyrocæ & aliis ibi dictis. Si vero est caro, non tracto locum, nec curam suscipio, quo-
niam periculosa est curatio, & ideo potius relinquenda. Si autem fuerit aneurisma, patitur
neq; curationem aggredior, quia periculosa est.

*De Hernia inguinali, & potissimum de hernia scrota qua eodem modo cu-
rantur.*

CAP. XXXI.

Hernia.

*Hernia
scrota.*

Alia erat hernia in inguine, quæ *hērnia* à Græcis vocatur; hæc enim Græcis *hērnia* si-
gnificat, vnde *hērnia* quasi *hērnia bubonum*, qui *hērnia* inguina dicuntur; a no-
stris vel inguinalis hernia dicitur, vel *ramex*. Erat autem alia hernia scrota, de qua loquen-
dum est, quoniam illa in inguinum eodem modo curatur vt ista, nec est in nouem. Si
itaque aderit tumor maximus in scroto, oportet distinguere, an tumor sit in testiculis vel
liquor ipsorum, vel in scroto, quoniam si sit tumor testium, non erit hernia: hoc autem cogni-
scitur, quia dolebit testis, & non mouetur de loco ad locum sine maximo dolore, ac pulla-
bit, & inflammatus erit. Si autem sit tumor in scroto, quicunque sit ille, semper sub nomine
herniæ vel rupturæ continetur.

*Lata varia
possunt in
scroto con-
fiscere.*

*Hernia va-
ricosa.
Carnosa.*

Aquosa.

Sed notandum est, quod varia sunt loca in scroto quæ possunt intumescere: primo e-
nim sunt vasa, quæ perueniunt ad testes; hæc enim possunt dilatari & intumescere, & tunc
dicitur hernia varicosa: secundo potest etiam fieri caro in scroto & crescere circa vasa tes-
tis: tertio tumor, qui *carneosa* id est, carnea hernia vocatur: tertio solet fieri tumor ab aqua,
quæ colligitur vel in scroto vel in folliculo scroti extra tegumentum testiculi, vel in vagina
testiculi & *id est*, id est, hernia aquosa vocatur.

*Vento-
sa.*

Intestinalis.

Vaginalis.

Omentalis.

*Intestinalis
quomodo
facit.*

Quandoq; dilatantur membrana vestientes testes & vasa à statu, qui tumor
id est, hernia ventosa dicitur. Vltimo fit intestinalis hernia, quæ fit dilatato peritonæo.
Cum enim peritonæum peruenerit ad inguina vel ad partem illam musculorum oblique
descendentium, elongatur & facit tunicam testiculi, quæ vaginalis dicitur; quoniam hæc
tunica elabatur per perforatam chordam, ubi sunt duo canales, qui sunt ex substantia peri-
tonæi & procedunt ad scrotum ad modum vaginæ, & est integer processus peritonæi
ligatus cum peritonæo, non autem est perforatus, sed elongatus, & facit veluti saccum, vt
patet in anatome, per canales autem illos labuntur vasa seminalia; hi autem canales quâ-
doq; dilatantur vel franguntur, vnde fit vt intestina vel omentum vel aliud ad scrotum vel
inguem descendat, & tunc si intestina descendunt ad bursam, fit hernia intestinalis. Quan-
doq; vero labitur omentum & tunc fit hernia *omentalis*, id est, omentalis, vel *Zirbalis* nomi-
ne Arabum: nostri autem vocant *ramicem omenti*. Et tot sunt herniæ, quæ fiunt in bursâ,
sed primum de intestinali loquamur. Vasa autem illa, per quæ descendunt intestina, in hac
hernia, dupliciter aperiri possunt, vel per laxationem ita vt dilatentur sine fractura, & tunc
dicitur hernia per relaxationem: Quandoq; vero disrumpitur iste processus, & tunc dici-
tur hernia per rupturam: illa, q̄ fit per relaxationem benignior, ita vt speranda sit certa sanitas.
In illa autem per rupturam adest maxima difficultas & periculum de sanitate. Omnes ta-
men herniæ tandem sanantur vel medicamentis vel alia actione exceptis illis quæ sunt in-
ueteratæ & maximæ magnitudinis, raro enim accidit hernia, quæ tandem aut medicamen-
tis aut vitione aut sectione non sit sanata.

Præfagium.

Præfagium itaq; bonum erit, si non sit maxime magna, vnde recentes per relaxatio-
nem medicamentis sanantur. Recentes vero per rupturam sanantur manu & ferro. In-
ueteratæ etiam sanantur manu & ferro, nisi sint extremæ magnitudinis. Intestinalis autem
hernia distinguitur ab aliis ex inæqualitate tumoris, & mollitie quadam, parua tamen: præ-
terea cum retrocedunt intestina, edunt strepitum, & dum retrocedunt, etiam dolorem
faciunt.

*Causæ effici-
entes inter-
stinalis her-
niæ per ru-
pturam.*

Causæ autem efficientes externæ herniæ intestinalis per rupturam sunt casus ex al-
to, ex quo rumpitur peritonæum, & sic intestina descendunt; percussiones violentæ in ab-
domine, motus violenti, vt equitatio & saltatio: Præterea conatus laboriosi & violenti, licet
clamo-

clamores magni, qui dilatant & aliquando difrumpunt peritonæum, unde fratres isti, qui multum clamaht & cantant, pauci sunt, qui hernia non laborent: præterea coctus immo-
deratus, qui quâdoq; solet difrumpere vasa. Causæ vero efficientes dilatationē primò sunt imbecillitas partium, vt peritonæi & inguinum: quia in debilibus facile illæ partes laxan-
tur. Præterea humiditas partium, unde pueri facile incidunt in herniam. Causa autem ma-
terialis sunt intestina ipsa.

*Causa effi-
cientis dila-
tationis.*

In curatione autem obseruandum est, an hernia facta sit per rupturam, vel per laxa-
tionem; quoniam si per relaxationem sit, facilius curantur; nam si recēs sit, facilis est, si ve-
rusta, difficilior, sed semper facilior est illa per relaxationem, prima vero difficilis. Curatio
autem est vel per medicamenta vel per manum. Sed sciendum est, quod omnis hernia nō
potest curari medicamentis, ideo non est ad rem, vt in quacūq; hernia ponamus medica-
menta, ne eam inflammemus. Quare cognoscendus est affectus, an medicamentis curari
possit, nec ne; nam si potest per medicamenta sanari, non est tentanda curatione per sectionē,
quia est actio nimis dolorosa, periculosa atq; difficillima; quare herniæ omnes per relaxa-
tionem sunt tractandæ medicamentis.

*Curatio in-
testinalis.*

Hæ autem per relaxationem cognoscuntur ex obseruatione causarum, quæ præce-
dere, præterea ex congestione intestinorum; nam si maxima erit congestio, indicium est, qd
erit per rupturam, si autem parua, vel sensim ac sensim sit facta, erit per relaxationem, &
hæc est semper medicamentis tractanda, illa vero sectione. Similiter si sit per fracturam
in puerulis, tentanda est per medicamenta, in aliis vero omnibus, neq; in pueris etiam, si
sit vetusta, non tractatur per medicamenta. Indicationes autem dantur, vt primo inte-
stinum reponatur in suum locum, secundo vt conservetur in loco proprio; tertio vt illa o-
rificia laxata constingantur, vniantur & glutinentur vel incrispentur & callosa reddan-
tur, ita vt non amplius dilatari possint. Sed quis quæret, quid accidere potest, si non repon-
antur, cum videatur, quod non multum incommodi afferat nec periculum. Ego ta-
men dico, quod nisi curentur istæ herniæ intestinales, periculum est mortis, quoniam a-
liquando feces descendunt in intestinis illis & siccantur ita, vt non possint amplius fluere,
& ita superuenit vomitus fecum, & in illa eam incidunt, & deinde mors succedit, ideo cu-
randæ sunt & reponenda intestina in locum proprium, quod etiam aliquando fieri
non potest, quoniam fiunt sæuissimi dolores, quare dicamus primo de restitutione inte-
stinorum.

*Signa her-
niæ factæ
per relaxa-
tionem &
per ruptu-
ram.*

*Indicatio-
nes in inte-
stinali.*

*Pericula su-
peruenien-
tia, nisi cu-
rentur.*

Si itaq; intestinum fuerit flaccidum & vacuum, resupinandus est æger & cruribus e-
leuatis, digitis deinde impellendo sensim & sensim restituitur.

*Restitutio
intestinalis.*

Si autem intestinum sit repletum aliquibus materiis, ita vt non possit restitui, tunc ob-
seruandum est, an illud, quod turgit intestinum, sint status vel cruditates vel feces, quoniam
nisi hæc cognoscantur, intestinum non poterit restitui, quia prius illa omnia euacuanda
sunt. Cognoscitur autem an sit status primo per analogiam, si testetur æger, se turgidum
percipere totum abdomen a flatu, & prius emiseric flatum, & sit rugitus in aliis intestinis. præ-
terea si sit dolor pungitiuus & extendens sine gravitate aliqua, tunc indicium est esse fla-
tum. si vero fuerint cruditates, aderit dolor tensiuus eum aliquo tamen torpore & frigi-
ditate, quia à materia frigida sunt cruditates: præterea æger abundabit pituitosa mate-
ria. Si autem sit stercus, cognoscitur, quia suppressa erit aluus per duos vel tres dies an-
te: præterea quia sensim crescit tumor: præterea si multum comederit ac multa ingesserit.
Præterea adest durities insignis & pondus grauissimum. Hæc autē sunt diligentissime in-
uestiganda ac distinguenda, vt plurimum tamen fiunt à flatibus, & ob id curationem or-
diatur ab ipsa.

*Cognosce-
ndæ ante re-
stitutionem.
Signa status
in intestino*

*Signa cru-
ditatum.*

*Signa ster-
coris.*

Si itaq; status fuerint, veniendum est ad discutioria validissima calida, inter quæ primū
est lixiuium calidum & acre, in quo bulliant cineres, & ex ipso fiat fomentum accipiendo
filum, id est, massam fili crudam & coquatur in lixiuium, deinde extrahatur & ita calida,
quantum ferre potest æger, circa scrotum ponatur. Si vero hoc non prodest, veniendum
est ad decoctū aliquod discutiens cum hoc filo, vt accipiendo folia lauri, pulegii, calamen-
thi, femina odorata, vt feniculi, anisoforum, cumini & fenugreci æquis portionibus, & co-
quantur in aqua, deinde addatur vinum maluaricum potentissimum, postea filum made-
fiat vel spongia & foueatur locus. Sed si dolor sit vehementissimus, oportet addere aliquid
mitigans, vt est portio aliqua olei vel rosati vel amygd. dulc. in illis fomentis. Cum au-
tem sæpe accadat, vt status his non discutiantur, ideo eadem medicamenta coquantur in
lotio & locus foueatur, & sic discutientur status illi. Præterea si imponantur clysteres dis-
cussorii, maxime iuuant, ita assumpta per os, quæ discutunt status, vt femina aniso-
rum, feniculi, nux muscata. Quando autem maiori opus est mitigatione, coquantur

*Si status sint
in massi-
ma ferre.*

*Discutioria
validissima.*

Validum.

*Clysteris
discussorii.*

*Doloris mi-
tigatione.*

*Si adfint
cruditates.*

hæc medicamenta in oleo & cum dicto filo foueatur locus. Si autem fuerint cruditates vel phlegmata, difficillima est restitutio & curatio, & raro est, quod aufetri possit: neque in hoc casu opus est valentibus discussoriis, quia materiam vertent in flatum & siccum. rem augebunt flatuando materias illas, vnde aliqui exhibent ol. amygd. d. vt ventrem lubricent, sed hoc mihi maxime suspectum est, & etiam testor, me aliquos ex hoc vidisse mortuos, quia licet lubricet, tamen maior copia materiem præcipitatur ad locum illū, quam quod lubricando iuuat: quare si pauca sit materia tolerari potest hoc medicamentum: si autem multa sit, abstinendum est ab eo. Metitur autem quantitas mareriz à quantitate foraminis. nam magna est copia materiz, si tumor sit nullus & magnū sit foramen, p. quod intestinum fluit: quare si sit multa materia, non exhibeatur hoc neque aliud medicamentum lenitiuum vel solutiuum: in hoc ergo casu tentandum est an natura possit sensum & sensum aliquid phlegmatis ad inferiora trudere, vnde laudantur elypteres acres, qui statim non agunt, sed spatio diei vnius & noctis idemque per glandes fieri potest. Secundo tentanda est summa relaxatio circa partes illas, ideo circa inguina vtendum est oleo aliquo vel communi vel pinguedine gallinæ vel ol. amygd. dulc. vel butyro, vel oleo de anguilla, vel imponatur aliquod emplastrum erassum relaxans & etiam vim incidendi habens, vt facilius reddere possit intestinum. Emplastrum autem fiat ex fol. maluarum, medulla panis, iure pingui & mucilaginis althææ & fenugræci cū ol. amygd. d. vel alio pingui & crasso applicetur. vel foueatur locus cum spongia madida in decocto capitis veruecis vel auis pinguis, & coquatur in aqua cum rad. althææ, foliis maluarum, seminell. fenugr. & anisorum etiam ad incisionē, & in hoc maderiat spongia, & circa ignem foueatur locus. Circa vero intestinum, in quo est phlegma, aliquod incidens est p. bendum ac attendans, quod in flatum materiam non vertat, id est, quod non sit discutiens vel siccans, sed incidens ac aliquans aliqua ex parte ipsum phlegma: quare in hoc casu radices bryoniz, cyclaminis & cucumeris asinini essent commodæ, nisi facerent flatum & materiam attraherent, ideo his ego non vtor, sed accipio oxymel cum aliquo emolliente: vnde accipio oxymel & polentam factam vel ex medulla panis, vel ex farina tridacea & simul misceo cum aliquo oleo vetustissimo, siue sit chamomelinum, siue commune, siue axungia porcina rancida. hoc enim attenuat, siccatur, & impedit, ne concreseat materia. Quanto autem magis resupinus requiescet æget æquali corpore, tanto melius est. Si autem fuerint fæces, tentanda esset eorum emollitio: sed ego quidem facere me nescire, quid dicere aut agere debeam in hoc casu desperato: vnde tento primum per exteriora emollire, mittens ægrum in balneum olei communis, in quo sedeat per tres horas: speetiam incoquo emollientia in illo oleo, vt maluas & huiusmodi. Postea cum diu federit in hoc oleo, pinguedinibus illis dictis locum inungo, & ad hoc etnnes pinguedines sunt bonæ, vt etiam vnguenta illa emollientia: sed cum nihil vi plurimum prosit in hoc casu desperato, exhibeo etiam oleum amygd. dulc. commune. Aliqui autem exhibent maximam quantitatem aquæ frigidæ, ita vt concutiantur intestina: sed ego etiam quandoque exhibui, & alia dicta feci, nunquam tamen aliquem sanatum vidi, quoniam casus est desperatissimus ac conclamatus, quamuis omnia tentanda sint. Si autem succedat emollitio, reponantur intestina in proprium locum digitis sensum ac sensum comprimendo & impellendo.

*Emplastrū
relaxans.*

*Penultima
ca. intestini
cū phlegma-
te.*

*Medicamen-
tum propriū
attenuans.*

*Si facies pro-
lapsa fue-
rit in scro-
tum.*

*An exhibi-
tio aquæ frigi-
dæ commo-
det.*

*De Conseruatione intestinorum repositurum in suum locum per medicamenta & li-
gaturas. CAP. XXXII.*

Facta itaq; herpia intestinali, primum indicatur restitutio intestinorū, ipsi tamen prius euacuatis, vt diximus. Facta autem restitutione conseruanda sunt in loco, quod fit dupliciter, aut situ corporis, aut deligatione: situ quidem corporis, vt si decumbat æget in lecto per spatium 40. dierum donec conglutinetur ac vniatur relaxatio, & hic est vnus terminus ad agglutinandas illas partes, secundus terminus est 80. dierum: tertius vero 100. dierum, in quibus si non agglutinetur peritonæum nunquam agglutinabitur. Cum autē nimis graue sit, vt semper æget supinus decumbat, ideo veniendum est ad deligationem, quam ligaturam crepaturæ vocant, quæ deligatio talis esse debet, vt cingulum aliquod ambiat corpus, id est, inferiores abdominis partes, & habeat fasciculum vel puluinem duntaxat triangulare, quia comprimit rupturam siue partem illam, in qua est foramen. Sed cum varia fiant cingula illa, quædam scil. in puerulis & quædam in adultis, in puerulis nō imponatis cingulum, sed accipiat fasciola mollis & lenis & imponatur securum illud siue puluinem super rupturam, & ipsum fasciola pluries circumuoluta deligetur, vt puluinem conseruetur in loco. In adultis vero veniunt aliqui ad cingulum quod bragherium vocant

*Terminus
agglutina-
da relaxa-
tione.*

*De cingulo
vel bragherio.*

cant ex ferro velligno, sed nimis validum est ac violentum, durum & molestum, quamuis tutum sit, quod ob id potius vtendum est in casibus desperatis. Reliqua vero sunt ex tela vel ex corio, & hæc magis sunt in vsu, & ea magis ego quoque laudo, & potissimum illa approbo quæ sunt ex corio molli & laxo, ita, vt corium sit duplicatum, ita scilicet vt in medio possit intercurtere tela, vt robustius sit, & hoc non ita exulcerat ac erodit, vt illud ex tela, quare melius est. Aliqua autem sunt bragheria, quæ tantum inguina complectuntur. Sed notandum est, quod oportet, vt habeant geminas habenas, quæ ad humeros ascendunt (habenas autem voco ego capita braghetii) Scutum autem sit figuræ inter planam & rotundam, ita vt semisphærica sit eius superficies neque nimis magnum sit scutum nec nimis paruum. Parato itaque hoc modo cingulo vel bragherio restituitur intestinum, medicamentum applicetur, postea cingulum commode apponatur & applicetur. Medicamentum autem imponendum sit siccans & robuste adstringens super locum affectum, quod etiam vires suas diu seruet, quoniam non sunt semper neque admodum crebro detegendi hi; sed quoniam varia sunt medicamenta, alia enim sunt pro pueris, & alia pro adultis, ideo ego pro pueris vii soleo hoc mitteri;

Cingula ap-
probata.Forma cin-
gularum.Medicamen-
tum leue pro
pueris.

℞ ol. abietini ʒss.

bol. oriental.

aloes.

myrrhæ an. ʒj.

ceræ parum, misce, f. ceratum.

Aliqui vero accipiunt terebinthinam & bolum orientale solum & imponunt sub scuto. In mediocribus vero corporibus, vt in adolescentibus, impono purissimum ceratum barbarum vel aliquid boli orientalis.

Pro medijs
orbis.

Si vero opus sit robustiori medicamento vt in robustissimis, hoc vnum est;

℞ aloes

malicoril.

thuris an. q. f.

succ. hypocyttid.

glutin. taur.

pic. naual.

bitum. iudaïana q. f.

vini dulce. nigr. itidem q. f. tritis terendis misce & coq. ad emplastrum consistentiam, & extendatur super corium vel linteolum & ponatur sub scuto.

Robustum
pro duris.

Quandoque vero vtor emplastro de pelle arietina quod pro crepatis vocatur in officinis, sed in robustissimis tantum corporibus ac duris, non autem in omnibus; vt aliqui faciunt. Quandoque vero vtor medicamento sacro vocato in officinis. Sed notandum quod ego dero primo inguinæ à pilis impono medicamentum, & ipsum nisi quarto vel quinto quoque die aufero, quia medicamentum dissipatur & nullius sit usus, sed antequam renouarem ipsum, rupturam aliquo fomento foueo, vt hoc decocto,

Ternum
cerati appli-
candi.

Fomentum.

℞ rad. consol. maior.

fol. consol. minor. an. M. j.

centaur. officin. id est, rad. cent. ma. quod rhapontici dicitur ʒj.

thuris

myrrhæ

aloes an. ʒj. coq. in f. q. vini austeri nigri, & foueatur ipso locus ter

& quater cum spongia ipso imbuita. Facta autem fomentatione dicta impono nouum ceratum & ligo, faciens, vt æger decumbat, vt dictum est.

Præterea extra aliquid per os exhibeo, quod vim habeat glutinandi, si illa non sufficiant: ideo in hoc casu duo ego habeo medicamenta familiaria, quorum alterum est in potionem, reliquum in electuario, quo etiam libentius vtor & quotidie matutina hora exhibeo, post quod vinum maluatium superbibendum porrigo, & ex eo mira successisse vidi, unde vobis gratum admodum esse debet & pro secrete destinandum: potus autem talis est.

Familiaria
per os as-
sumentia pro
aggraua-
tione.

℞ rad. consol. ma.

fol. consol. min.

medix

plantag. latifolij.

lanceolaris

Decoctum
per interiorum
fomentum.

rad. valerianæ
pimpinell.
fol. millfol.
tanacetæ
gallitrici
nuc. cupress. an. ʒj.
masticis
maceris

cinnam.
cumini preparat. an. ʒj.
rhabarb. assatiz ij.

vinī maluat. vel romanæ præstantissimæ q. s. misce & f. decoctio,
culus dosis sint ʒij. vel iij. quotidie matutina hora eum saccharo, & hoc vsq; ad 40. dies
vtor: vel exhibeo electuarium hoc modo præparatum.

ʒ rad. consol. ma.

pimpinell. coctar. in aqua vel sub prunis an. ʒj. ʒ.

gumm. arabic.

tragacanth. an. ʒj

sangu. dracon. in lachryma ʒij.

pulu. hippoglossi (quæ vulgo herba Bonifacii vel bilingua vocatur, 10

alia autem ab hac est herba, quæ ænōne est Dioscoridis, quæ resta bouis dicitur) pulu. rad.
ænōnis, id est, restæ bouis an. ʒ. ʒ.

myrrhæ

cinnam.

maceris an. ʒj.

sacch. q. s. misce & cum aq. rosacea chalybeata f. cle& sec. art. cu-

lus accipiat cochlear vnum matutina hora, deinde superbibatur vini maluatici aliquid,
& hæc fuerunt in frequenti vsu semper apud me. Aliud etiam ego probaui cum maximo
successu & experientia comperi optimū esse, & est, vt scil. per 20. dies accipiat chaly-
bis limatura præparata ad ʒj. cum saccharo mixta ad ʒij. coſectō bolo deuoretur & super-
bibatur parū vini maluatici. Interim autē dum ista sumuntur, semper æger quiescat & ca-
ueat a cibis flatuosis, & a plurima ciborum ingestione, ac recta penitus vtatur victus ratio-
ne, & hæc satis sint de curatione herniæ intestinalis per medicamenta.

*De Curatione herniæ intestinalis in scroto existentis per manulem operationem iuxta alio-
rum præcepta & potissimum ex inuentu proprio.*

CAP. XXXIII.

Cum autē non datur occasio sanationis in herniā intestinali nec pot medicamenta nec
per cingulum, deueniendum est ad quædam alia, quæ faciant ad continendum intes-
tinum, inter quæ quædam sunt, quæ mutilum reddunt corpus; quædam vero, quæ ipsum
mutilum non reddunt.

Quæ autem mutilum non reddunt corpus, duo sunt, alterum neotericorum inuen-
tum, alterum verō à me repertum: Quod autem ego ipse inueni, hoc est. Cum non possi-
mus membranas illas coniungere, excitetur cicatrix durā in inguinē, quæ sit loco cin-
guli perpetui, vnde mando, vt supinus æger decumbat, deinde impello testem ita, donec
ad relaxationem veniat vel rupturam, deinde accipio atramentum, & circumscribo to-
tum illud spatium, in quo continetur testis, & si magnum sit spatium, tum magnam et-
iam facio circumscriptionem: hoc factō dimitto testem ad inferiora, postea accipio stup-
pam mollem & ex ipsa facio linamentum crassum & ouale quod sit longum per quatuor 10
digitos per transversum, & imbuo albo oui & ol. ros. postea pono ad partē inferiōrē bur-
sæ, & propello ad superiora sicut impellebam testem in eum locū. vbi erat circūscriptus locus
ille prius, & peruenio ad rupturā cū illo linamento, & hoc impono vt suspenderet pellē in-
guinis, vt quando appono causticū, ne casu illud (causticum) ascendat ad vasa seminalia &
caexurat. Collocato linamento in eo loco deuenio ad causticum accipiens saponem nig-
rū & calem non extinctam faciens vnguentū & impono super partē illam q̄ atramento
circūscriptā & relinquo, sed prius in oleo ros. in aqua ros. & albo oui lintea madesacio &
impono partibus vicinis, vt dolor mitigetur & feruor attemperetur. Eschara autem facta
aufero medicamentum & tentam illam, quam prius apposueram, & facio, vt cadat bursa,
iubens

*Inuentum
Fallop.*

*Ad mitigan-
dum dolorē
& feruorem
conseruanda.*

- lubens, vt semper in lecto maneat & ger donec crusta cadat & vulnus obducatur cicatrice, nam tunc optime continentur intestina, & hoc modo ego quidem multos sanavi. Modus vero recentiorum est: ipsi enim ne homines castrant, accipiunt anulum aureum, semicirculum scilicet ex auro, & ipsum efficiunt illius magnitudinis, qua constat didymus, id est, illud inuolucrum, à quo pendet testis: obseruant autem didymū arrepta bursa digitis quantum sit, an scilicet crassus vel tenuis: vnde si sit exempli gratia crassitiei vnus digiti minimi, faciunt circulum seu semicirculum ex auro non valde crassum, sed tenuem, vt est ferrum stringæ, & in extremis capitibus annulus ille sit perforatus, deinde secant eum per transversum in inguine, donec appareat didymus, qui cum apparet, eum excutiant, vt arripiant annulo illo didymum ipsum & constringant, postea ligant filo aureo, quod pertinet per illa foramina, & optime stringunt semicirculi illius capita ipsa filo aureo ligantes. Facta vero coniunctione consunt locum, & imponunt medicamentum agglutinatorium & consolidatur cutis, & remanet illud aurum, & sic non amplius descendunt intestina ob illum annulum, qui stringit didymum. Ego tamen nunquam expertus fui modum hunc. Bene verum est, quod aliquos vidi hoc satis feliciter fecisse, quare etiam hic modus à me non admodum reprobatur. Omnes autem alii modi pertinent ad oblationem testis, siue castrationem, vt dicunt: nam illa est vera medicina herniæ intestinalis, est tamen res difficilis, graui & dolorosa, non tamen ita periculosa, vt volunt aliqui, vt viderint multos mortuos, quinimo plurimos ego testor me vidiſſe sanatos & omnes præcipue, qui validis constabant viribus, quamuis hoc afferat incommodum, quia effeminatus viri, & sunt inepti ad generationem, præsertim si ambo testes auferantur: ideo incauti ad hanc actionem non accedatis, quia mancus & effeminatus redditur homo, quod malum est. Sed si opus sit hac actione, hoc faciendum est opportune, vere scilicet & autumno, non autem æstate & hyeme, quamuis in hyeme etiam possit fieri, sed habenda est ratio ætatis; nam in senibus hoc non est agendum; nec in cacochymis, nec in debilibus hominibus, nec in ruffientibus vel tussiculosis: quoniam tussis non permittit agglutinari sectionem in factam. Quare si in talibus corporibus fiat sectio, non succedet: sed pueri, vt qui plurimum habent calidi innati, sunt maxime opportuni ad castrationem. Sed aduertendum est, quod si quod adest periculi in castratione, est in fluxione sanguinis, ideo cauendū est quantum fieri potest.
- Hæc autem actio varilis modis fieri potest, aliqui enim sectionem faciunt vt Aursini illi, qui maxime actionem hanc proficiunt, & feliciter quidem exercent, neque reuera melior reperitur modus auferendi testem quam isto, vnde ego semper maxime probavi hanc actionem, & magis quam aliam quamcunque. Quando ergo volumus extrahere testem, fiat sectio, vt faciunt illi, qui castrant, & qui secant pro extractione lapidis vesicæ: hi enim secant, deinde suunt & exurunt, quoniam hoc maxime laudo, & est actio, quæ mihi admodum placuit & placet. Actio autem hæc communis est, & omnes eam facile sciunt. Notandum tamen est, quod ex ipsis aliqui in inferiori bursa, postquam extraxerint testem faciunt foramen, vt si qua est sanies vel fiat, excerni possit, & bene faciunt, & qui illud non faciunt, male faciunt.
- Alius modus est, vt extrahatur totus didymus in inguine vsque ad os inguinis, postea auferatur testis: sed hoc ego non laudo, quoniam nimis molestum est. Alii vero medicamento caustico exurunt, didymum vsque ad os, & hoc faciunt arsenico sublimato, aut argento sublimato, & totum didymum exurunt vsque ad os inguinis, postea extrahunt exustum testem, & hic est modus Guidonis, qui tamen mihi non placet, quia ineptus est, dolorosus atque periculosus, quando spatio nouem dierum hoc agat.
- Alii vero accipiunt acum cum sericino filo & perforant didymum, deinde stringunt sensim ac sensim, donec totus didymus secetur, postea cicatricem obducunt: sed hæc actio longa ac dolorosa est nec tuta, cum non nisi spatio octo etiam dierum fiat. Alius modus est, vt cauterizetur os peccinis suspensio didymo, quod tamen vanum est, & ideo non faciendum. Alii vero stringunt annulo vel filo aureo, & ita stringunt, donec totus cadat testis: sed nulla harum actionum tuta est, nisi illa Aursinorum, id est, illorum, qui castrant, & hæc actio etiam magis placet.
- Hernia vero, quæ sit ex omento, eadem ratione curatur, restituito omento suo loco, postea vritur, deinde suunt & castratur æger, vel sit cicatrix, vel uti possumus annulo in didymo, vel vitur medicamentis.
- Cognoscitur autem hæc hernia, quia est parua, & ex substantia solida nondolorosa, & in restitutione non edit rugitum sicut illa intestinalis. Curatur autem sicut intestinalis: & hernia vocatur, hernia etiam xibalis apud plerosque autores, & hæc satis dicta

sint de his speciebus hernie. Sequitur modo, ut agamus de hernia illa, quæ sit ab aqua, quæ quoniam recidiuare solet, maxima indiget Medici diligentia, & ob id de ea exactius tractare oportet, ut in sequente capite.

De Hernia aquosa.

CAP. XXXIV.

I. Item.

Siquero fuerit hernia aquosa, sciendum est, quod duplex sit eius species: una enim est, in qua aperto peritoneo aqua descendit à cavitare abdominis ad ipsam bursam, & potest fluere & refluere: & hæc non potest curari, nisi auferatur aqua, quæ est in abdomine, quæ scilicet facit hydropem. Cognoscitur autem hæc ex aqua existente in abdomine, præterea quia possumus elidere aquam illam in abdomine. Alia vero est hernia aquosa, in qua est aqua in bursa, quæ destillat per vasa & venas occulto modo, ac sensum ad serotum: hæc autem duplex est, aut in qua continetur aqua in membrana adnata, & in proprio folliculo, alia est, in quo continetur aqua in inguinali tunica, quæ vestit testem. Cognoscimus autem primo esse herniam aquosam appposito lumine. Cognoscitur autem aquam habere in tunica adnata, quia separatur testis à parte aquosa manibus: præterea ista hernia habet propriam circumscriptionem aliquando rotundam, aliquando ovalen. Si autem sit in vaginali tunica, non possumus amplius attingere & distinguere testem ab hernia: quoniam in eodem loco & aqua & testes erunt constituti. His autem constitutis sciendum est, quod in hernia illa, in qua continetur aqua in vagina testis, & quæ aliquantisper sit diuturna, corruptus est testis. In alia vero hernia, in qua aqua est in folliculo, maior est spes sanationis, quoniam etsi verus sit, non est periculum de corruptione testis.

Curatio quæ
in aqua sit in
serotum.

Curatio autem potest fieri per medicamenta, & per manum. Per medicamenta eadem est curatio, quæ erat in meliceride, & in nullo differunt hæc in curatione. Primo enim discutientibus curatio tentanda est, ac si non discutatur materia, vel si non speretis succelluram esse dissectionem, ut in meliceride dictum est, ad putrefacientia & macerantia deveniendum est, quæ pus scilicet vel saniem gignunt: nam nisi maturetur hic folliculus, nunquam sanabitur hernia. Maturato autem folliculo est aperienda vomica & educenda sanies & obducenda cicatrix: Et hæc curatio convenit cum in ea, in qua aqua continetur in folliculo proprio, tum etiam in ea, in qua aqua continetur in vagina testis. Si vero hæc actio non proliat, deveniendum est ad apertionem. Apertio autem dupliciter fieri potest ex Galeno, tertio vero modo ex recentioribus. Galenus libr. 14. method. med. cap. 3. vult, ut pungatur hernia, & imposita fistula argentea tota educatur aqua, deinde imponitur medicamentum siccat & repellens factum ex absinthio, bolo armena, sanguine draconis & albo olei, imponens ter & quater, id est, spatio trium vel quatuor dierum, ut ibi dicit.

Curatio quæ
in peritoneo
est, modus Galeni.

Alter est modus antiquorum, ut secant per longum serotum, & educant folliculum integrum, vel si sit aqua in vagina & corruptus sit testis, arripiunt totum didymum, & testem vinculo postea consuunt, & hoc modo sanant: sed curatio hæc mihi non placet, quia dolorosa est & parum rata.

II. recentiorum.

Tertius vero modus est recentiorum, ut scilicet imponatur seto accipientes acum, in cuius foramine imponunt filum sericinum pluries duplicatum, & perforant serotum, & ducunt hinc inde filum illud, ac vitro citroque, donec exeat aqua, & reiciunt per plures dies, quod mihi etiam satis placet. Sed notandum est, quod sæpe fit, ut hernia reuliscat, vos tamen non abstineteis ab hac actione, unde notandum est, quod exceptis pueris non est unquam tentanda integra sectio hernie, sed in adultis pungatis tantum & educatis aquam, & si iterum reuliscat, iterum pungatis: nam sæpe ego vidi multos per hernias liberatos esse à gravibus affectionibus, ut ab empyemate & ab hydrope pulmonis, unde si penitus sanetur, poterit multos morbos postea inferre: quoniam materia illa sensum & sensum descendebat ad testes, & per eos euacuabatur, quæ si interceptatur, ad partes nobiliores tendet. Setonem itaque hunc opponatis, quem gestabunt, ut aqua illa possit expurgari, & hoc est servandum in adultis. In pueris vero sanatur omnino hernia aquosa, quæ in his sit ob humiditatem abdominis. Poteritis etiam alios sanare cum pluribus vicibus fuerint perforati, quia materia illa iam expurgata erit. Ego autem vos docere volo secretum, quod à muliere quadam didici, & optimum quidem atque pulcherrimum: illa enim ligabat pueros, & imponebat ceterum adstringens & exiccans, quod sanabat, & sic omnes curabantur, ac sæpissime successit in hac hernia aquosa puerorum, quoniam impedit venas, ut dimittant aquam illam ad serotum: ideo hoc laudo etiam si esset hernia aquosa in proprio folliculo. Cum autem ego rationem huius quærerem, & viderem reuera esse herniam in proprio

Secretum quod
mulier præbere
non aequa.

prio folliculo, veni in hanc sententiam, quod deligatio illa & medicamentum exiccans & adstringens constringat comprimatque vasa didymi, vt non ita facile fluat aqua in scrotum, & illa, quæ iam collecta est, calore naturali discutitur, ita laudo, vt in pueris hoc modo fiat: accipiat aliquod cæratum mollius, & imponatur & ligetur, postea oleo calidiori inungatur locus affectus, vt resoluatur aqua collecta, & bene succedet.

De Hernia ventosa, carnosa, cancerosa, varicosa, atque etiam de tophacea.

CAP. XXXV.

Hernia vero ventosa curatur discussione tantum, quamvis curetur à Paulo, sicuti cura-
tur hernia ab aqua, tamen vos discutietis etiam hanc materiam, & facile sanatur, & si
materia ventosa descendat ab abdomine, non potest sanari. Si autem colligatur flatus per
se in scroto, curatur discutientibus dictis in meliceride.

Si vero sit hernia carnosa, aliquando conrescit caro circa vasa seminaria, aliquan-
do circa testes. Si circa testes conrescat, tunc est dolor & punctura cancerosa, & est ad-
ditamentum carnis cancerose, ideo eam non irritetis. Si autem non sit dolorosa caro
nec pungens, poterit curari, primo actis communioribus capitibus veniendo ad emol-
lientia dicta in curatione scirrhii, deinde ad discutientia dicta in curatione meliceridis.
Sed sæpe non succedit discussio: ideo tunc secandum est scrotum & detegenda caro,
& à teste deradenda vel vasis, deinde sistatur sanguis & appositio teste in locum consu-
tut scrotum & agglutinetur. Si autem caro sit coniuncta testi, & aliquid passus est testis,
aufertur est (testis) vna cum carne & didymo, deinde consuendum & agglutinan-
dum est.

Sed si caro sit cancerosa, non tentetur curatio, sed curatione pallescente sola proceda-
tur, de qua in cancro dictum est.

Si vero fuerit hernia varicosa, sciendum est, quod in bursa sunt venæ emulgentes, &
venæ seminariæ, & venæ etiam, quæ ferunt alimentum ad scrotum. Istæ autem postero-
res, si dilatentur, non faciunt herniam varicosam, sed dicuntur varices scroti: si vero aliæ di-
latentur, faciunt herniam varicosam.

Cognoscitur autem hæc, quia si apponantur manus ad testes, apprehendentur plu-
rima vasa vel massa filorum, nam ibi adest maximum inuolucrum plurimis venis, & plu-
rimis fibris, vt si essent intestina parua, & istæ sunt crebræ herniæ, sed non insignes. Ista
autem varicosa hernia solet esse dolorosa certis temporibus, nam vere & autumno, & eo
tempore, quo intestina turgent flatibus, solent dolere ob dilatationem venarum illarum,
vt in esu fructuum & ciborum ventosorum, & in frigore pedum excitantur dolores in
hernia ista varicosa, quia materia aliqua statulenta deuenit ad illa vasa: hi itaque fugiant
statulenta & pedum frigus.

Aliqui autem hanc curant sectione, sed mihi non placet, quia materia illa, vt plu-
rimum est melancholica, & sit vlcus melancholicum. Præterea oportet etiam auferre tes-
tem, vt sic curetur, ideo veniatis ad medicamenta maxime adstringentia & refrigerantia,
vt sunt omnia illa, quæ sunt opportuna in aneurismate, & non dubitetis, quod non est pe-
riculosa. Sed notandum est, quod qui laborant hac hernia semper oportet, vt portent sus-
pensum testem aliquo brachio. Ego enim vidi ex sola hac gestatione suspensi testis sa-
natos homines, si per duos aut tres gestauerunt abluta hernia aqua sola stillatitia, ex foliis
& nucibus cupressi viridibus in duplici vase stillata, & matutina hora quotidie abluitur
hernia, & dum modo etiam suspensum ferant testem, & sinant abluitionem per se ipsam
siccat. Sed per aliquod spatium temporis abstinere à coitu: nam vt plurimum ex plurimo
coitu oritur hæc hernia. Paulus autem facit mentionem herniæ tophaceæ, quæ fit cum ves-
fica gignitur in teste appensa, in qua conrescunt lapides siue tophi, quorum tres ego vidi
laborantes hac hernia: rarus enim est affectus, nec admodum grauis, nec momenti si acce-
dat, nec aliquid sentiunt ægri, nisi percutiatur testis, tunc enim dolorem sentiunt, ideo
non video causam cur sit veniendum ad curationem, quæ fiat per sectionem: ideo de hac
nil dicendum est, cum non sit periculosa, nec nimis affligat patientes, unde non laudo ego il-
los, qui aliquid circa hanc herniam agunt. Sed quoniam Medici fere omnes teccantes
distingunt herniam in humoralem, & non humoralem, per non humoralem intelligentes
omnes illas, de quibus dictum est, in quibus materia in folliculo siue sinu aliquo con-
tingitur, quæ facit tumorem, per humoralem vero intelligentes omnem humorem, qui scro-
tum vel testes occupat, à quibus humoribus frequenter provenit testium inflammatio,
ideo de ea aliquid dicamus.

Causa externa.

Testium inflammatio per se nota satis est affectio, quia calida est cum insigni tensione, cum inflammatione ac pulsatione manifesta & cum tumore. Varias autem habet occasionales exteriores, inter quas est contusio, ictus & agitatio testium. Præterea solent succedere inflammationes ratione flatuum, qui gignuntur in abdomine: aliqui enim abundantes flatibus fluunt per vasa seminalia ad testes, & faciunt dilatationem illarum partium, ex qua fluit sanguis, & fit inflammatio. Præterea causa potest esse gonorrhœa suppressa, à qua ut plurimum fit inflammatio hæc, quando nimis cito supprimitur gonorrhœa: cum enim vel ob contagium vel laxitatem illarum partium & colorem, vel ob materiam hiliotam acrem adest gonorrhœa, & cito supprimitur, statim succedit inflammatio vel utriusque testis vel vnius saltem: & ratio huius patet: nam cum semen gignatur in illis in uolucris nervosis, quæ efformant didy mum, ac sensim & sensim debeat fluere, cum retinetur feruet & facit dolorem, & ita per consequens fit attractio matæ sanguineæ, & ita inflammatio fit. Immediatæ autem cause sunt fluxiones humoris. Materia vero ut plurimum est sanguis, quamvis aliquando cum sanguine bilis vel pleuita iungatur, ut plurimum tamen est sanguis ipse.

*Causa interna.
Materia inflammatio.**Prognosis.*

Præsignum autem tale erit, quod sit difficilis curatio & tarda sanatio, & semper etiam post sanationem longo tempore relinquitur tuberculum paruum circa epididymum, quod est seminarium recidiuæ. Præterea præsignandum est, quod moderatis medicamentis tractandus sit locus affectus, ne veniat ad suppurationem: quoniam si fieret fistula, si validis tractaretur, quæ sanari non poterit.

Cura.

Quo ad curationem, si sit inflammatio ex contusione, in principio mitigandus est dolor, secundo confistanda sunt vasa, deinde prohibendæ fluxiones: vnde cum fuerit contusio, vel etiam quod non ad sit ista in principio inflammationis huius, primo veniendum est ad rationem vidus tenuem & refrigerantem et si sit ex contusione, quoniam tubus talis conuenit vidus, ita ut etiam aquam bibant. At si sit ex flatu, non refrigerantem, ideo non laudatur tunc usus aquæ puræ, sed alteratæ cum salvia & cinnamomo & huiusmodi, fugiat pisces, lactucas & similia. Si vero ex retento semine, comedat omnia frigida, ut & si sit ex contusione quiescat æger, moderate dormiat, non irascatur, fugiat mulieres, illis exceptis, in quibus inflammatio orta est ex retento semine: non tamen coeat cum illis, sed tandem cum illis colloquantur interdum, quia ex hac colloctione ac inspectione moderate aperiuntur vasa illa, & semen effluit succedente gonorrhœa. Præterea secetur vena immediate: si autem non potest secari, exhibeatur phar macum, quod leniat alium, & retrahat materiam à renibus & vasibus seminalibus ut est cassia, ol. lenitium, syr. ros. sol. Quandoque vero ad valentiora ascendendum est medicamenta, postea ad locum affectum veniendum, circa quem si sit inflammatio ex contusione, utendum est dolore lenientibus, adstringentibus & siccantibus, ut est ol. ros. ol. myrrhin. admixto etiam succo rosato recenti: præterea vnguentum alabastrinum vocatum optimum est, quibus vten-
40 dum est primum ad mitigandum dolorem, & constringenda vasa. ego autem hoc familiarare habeo: recipio folia hederæ viridia, folia ros. quæ conseruantur in fundo olei rosati, deinde tundo in mortario, & addo album oui, & etiam luteum quandoque & aliquid etiam stercoreis vaccini, quoniam hoc mitigat, adstringit & siccatur, & ipsum modo frigidum, modo vero calidum impono, vel accipio vinum austerum nigrum, & oleum myrrhinum & rosatum miscens & stupas imbuens impono; postea ad discutiencia & moderate repellentia venio; & hæc, si ex contusione fiat inflammatio.

*Polichæmia.**Lenitium.**Lauri afflatus
trullatus.**Familiaris Fal-
lopian.**Si sit inflama-
tio ex flatu.**Emplictrum
quingulare
vni-
versum.*

Quando autem est inflammatio ex flatu, habeo ego medicamentum, quod quidem (verum fatendo) didici à quodam tonfore, magnam habens vim discussoriam calidam, & etiam repellentem, qui tonfor Pisis erat; hoc ramen ille non semper utebatur recte: quoniam non sciebat distinguere, sed utebatur ijs in qualibet inflammatione.

At ego rationem insequens dico utendum esse hoc emplastro in inflammatione tantum à materia flatuosa, non autem à sanguine, & sic in principio: quoniam si hoc in principio inflammationis ex retento semine vel ex sanguine applicatur, maior succedit inflammatio. Medicamentum autem hoc constat ex foliis rutæ viridis, lauri, stercore vaccino & oleo rosato, aliquando vero ego addo oleum chamomelinum loco olei rosati; & sic vos etiam alio simili uti poteritis, ut sunt ea, quæ diximus in polypo narium ad dissoluendum & siccandum, dummodo emplastri modo ponatur, & in crassam formam.

Si autem fiat inflammatio ex semine, mitigandus est dolor, & non impediendus transitus seminis vilo pacto, sed aliquandū semen, vnde non est in hoc casu adstringentibus vtendum, sed potius laxantibus. vnde ego testor me vidisse aliquas mulieres; quæ in hoc casu affabant folia lactucæ in sartagine ol. ros. & butyro & imponebant felici cum successu. Aliqui vero alixinem accipiunt, quæ vulgo pauatina dicitur, eamque disrumpunt & elixant in sartagine cum ol. rosato & applicant, nam optime facit, quia laxat, mitigat & refrigerat. Aliqui vero his duobus medicamentis admiscunt aliquam portionem parietariæ & simul affant in sartagine cum ol. ros. & bene faciunt. Ego vero quandoque sum vsus ol. ros. completo solo ipso linteā madefaciens & imponens sed hoc sæpe immutari debet, & familiare hoc mihi est: Quandoque vero impono vnguentum ros. Mesue & infrigidans Galeni, & hoc si dolor sit ingentissimus, alioquin admisceo aliquid olei amygd. dulc. loti cum aqua hordei, non solum vt mitigetur dolor, sed etiam ad relaxanda vasa, siue vt laxetur substantia membranæ continentis semen, ex qua relaxatione semper, vt semper comperi, mitigatur dolor. Quandoque impono fol. maluarum cocta in sartagine cum ol. ros. vel folia spin. achiarum cocta in ol. amygd. dulc.

Sed aduertendum quod statim creuit testis in maximum tumorem, dolor tamen cessauit, cui maxime attendendum est, & præcipue si fiat ex semine retento ipsa inflammatio, & nunquam est veniendum ad robustissima repellentia. Si itaque intumescat testiculus & cesset dolor incumbatis resolutioni per medicamenta lenia, non autem robusta: ideo primo ego vtor emplastro ex fabis. At si dolor viget & calor, addo oleum ros. complet. Si vero calor non viger, addo oleum chamom. & hoc emplastro procedo vsque ad statum, vel etiam vsque ad finem. Quare notandus est error illo tum, qui hoc vtuntur à principio: quoniam succedit, vt hoc medicamento materia tota non possit digerī: quare vtor ego emplastro ex semine panici vel milii cum ol. ros. vel chamomelino. Quandoque vero si adeest aliqua durities, addo his emplastris oxymel simplex vna cum ol. ros. complet. & ol. chamomel. facit autē oxymel ad attenuandum semen, quod factum est grumofum in vasis seminariis. Quandoque vero venio ad fomenta facta ex decocto chamomeli, Betonicæ & fol. menthæ & simillium non valde calidorum: quandoque coquo fabam vel panicum vel milium in lixiuio dulciori, vt magis digerant. Quandoque venio ad olea robustiora, non autem emplastrilla, quæ ita quandoque obstruunt, vt suppurationem causent, quæ est in hoc casu fugienda, vnde accipio vel ol. lil. albor. & inungo vel ol. anethin. vel vulpinum, vel chamomel. & testem inungo donec discutiatur materia. Sed notandum, quod aliquando remanet tuberculum durum, quod videtur nouus testis, factum à grumoso sanguine, & videntur hi tres habere testes: sed in hoc casu opus est patientia quoniam tempus illud dissipat, nec medicamentis cedat aliquid tamen est agendum, vnde tenenda est emollitio, sed non poterit sanari breui tempore, ideo vtatur ol. amygd. dulc. cum pauco oxymelite vel eodem oleo cum pauco oleo resolutiuo, & inungatur locus bis in die, & non agitur etiam, & caueant à coitu & cibis calidioribus cum diuturna patientia donec resoluatur tuberculum ipsum: nam impossibilis est facilius seu citius resolutio. Vnum tamen notandum est animaduersione dignum quod pertinet ad situm partis, quod scilicet testes semper debent esse suspensi dum curantur, ita tamen vt non doleant: aliter nunquam sanabitur inflammatio. Ideo cum imponitis emplastra, vel vnguenta, vel olea, curetis vt testes sint suspensi suspensique maneant & non peniles: sine dolore tamen fiat hæc suspensio: quoniam hoc maxime proderit, imo ita necessarium est, vt sine hac suspensione impossibilis sit sanatio. & hæc sufficiant de testium inflammatione dicta.

De Affectibus glandis pudendi ad tumores pertinentibus.

CAP. XXXVII.

Glandis pudendi patitur quosdam tumores carnosos, qui dicuntur à Græcis, Thy-mia vero à Celso, vel carnes additæ; & ficus à recentioribus, vt etiam ab Actio. Cum autem glandis creuerit ad maiorem tumorem, vulgo porrifici vocantur, non differt tamen thymus à fico nisi ratione magnitudinis: quia cum paruus est tumor, thymus dicitur, cum autem magnus est, vocatur ficus vel porrifici.

Sunt autem ista tubercula propria trium locorum, primo pudendi muliebris, secundoglandis, tercio ani. Sunt autem carnes quædam rubicundæ, quæ in extremo si sit sim-briatæ, vti sunt ficus in interna parte, radix autem huius carnis est angusta, color r. bicun-dus, aliquando vero albicans, quandoque nigricans.

Causæ autem sunt duæ, prima est contagium, contagiosa enim est affectio, ideo cau-endum est à mulieribus, quæ laborant his carunculis in vulua, & si mulier illa laboret mor-

bo gallico prius inficiet homines eam cognoscentes his phimīs, qui deinde progredientes generant morbum gallicum etiam in viris: quare quandoque cum gallico adueniunt, quandoque vero sine eo. Secunda causa efficiens est caries (sepe enim sic cariosus penis à carie non gallica, quæ carie) sanata solent superuenerè phimī. Præterea si quis coitu utatur, tempore menstruorum corripitur hoc morbo: nam ab illo sanguine vitiosa inflammatio glans pudendi & variis coloribus afficitur, postea superuenit phimus, dum inflammatio abiit. Fluxio vero & intemperies mala in loco sunt causæ immediatæ: introducitur enim intemperies mala in glande, quæ corrumpit facultatem generatiuæ & formatricem eius, quæ postea generat, quæ non deberet.

Materia. Materia vero sunt humores vel sanguinei vel pituitosi vel melancholici: ideo sunt thymi quandoque cancerosi quandoque benigni: nam humor melancholicus quandoque facit thymos cancerosos, qui sunt nigri, fetidi & dolorosi cum puncturis. Benigni autem sunt rubicundi albicantes & sine dolore, qui sunt ab humore sanguineo vel pituitoso.

Prognosis. Præfagium autem tale est, quod si sunt cancerosi, non sunt proritandi, quoniam non sanantur. Si vero sunt benigni, possunt sanari & facile: si vero sunt cum morbo gallico, difficillime. Præterea in lochiis muliebris non succedit curatio, quia manum adhibere non possumus: similiter in ano.

Cura. Curatio autem fit & medicamentis & manu præmissis vniuersalibus, si opus sit: quare si sunt magni & copiosi, & pluribus in locis: primo expurgetur corpus, deinde veniatur ad locum affectum, circa quem primo vtendum est medicamentis leuibus: vnde ego familiare habui ammoniacum præparatum cum aceto: quoniā dissipat & discutit illas carnes. Sed cum maximus addit pruritus, oportet vt æger manus contineat & non scalpet vel accipiebam ego portulacam confusam & imponebam: vel madefaciebam linteam in eius succo & imponebam, vel accipiebam portulacam syluestrem, quam verticariam vocant, vel vermicularem, quæ acris est, & est semper viui species, imo vocatur semper viuum sacrum, & hæc tundebam succum exprimens, quem deinde affundebam supra thymum feliciter: vel accipiebam scorpioidem Dioscoridis, terebam & imponebam, illa scilicet quæ proferit pillulas rotundas. Quandoque caro bouina vel vaccina cruda imposita iuuat. Aliqui vero lac thymali inspergunt super phimōs modō glandem non tangat, quoniam eam excoriaret. Quandoque vero ego accipio ramum ficuineum viridem, & etado substantiam internam & ipsam derafam impono. Quandoque accipio ramum ficu tenebrum & exprimo lac eius super phimum, munita tamen glande, ne tangatur à lacte. Si autem hæc nihil faciunt, venio ad robusta medicamenta illa siccantia, quæ iam dicta sunt in polypo. Si vero neque hæc faciunt, venio ad exedentia, vt ol. sulph. vel aquam aluminis magistralē, sed semper tegendo glandem, vt cum membrana aliqua vel charta tenuissima & molli, vt possit reduci ad suum locum: quoniam semper tegenda est præputio suo glans, aliter intumesceret, ideo semper reducatur præputium in suum locum & tegatur, ne a medicamentis illis exedatur, quare tegatur aut charta aut membrana tenui.

Quæritur per manum. Quandoque sanatur phimus per manum: vnde aliquando ipsum vincio seta vel forcipe seco: nam hoc modo facillime sanatur. Sed aduertendum est, quod quando secatur, oportet, vt magnam copiam sanguinis effluere sinatis: quoniam ex hac optima expurgatione citissime sanatur. Sed si voluerint patientes perferte forcipem, imponatur circa thymi radicem filum sericinum & stringatur per vices: quoniam spatio duorum dierum sanatur cadens. Si vero remaneat postea quid radicis illius, vt ego quibusdam medicamentis, ratione quorum sanantur, nisi cancerosa sint. Sed notandum, quod quando sunt in glande plurimi: quoniam quandoque viti sunt fixidissimi, ita vt quamuis coeant cum fixidissimis mulieribus, non tamen postea glandem detergant, vnde non solum eorum glans, sed etiam quandoque totus penis thymis corripitur, vnde in hoc casu aduertendum est, quod non sunt exedendi omnes simul, sed primum sunt exedendi interiores, deinde exteriores, ne exedatur tota substantia præputii à vi medicamentorum simul collecta, id est eo primum interiores exedatis & obducatis cicatrice, postea exteriores curabitis, & hæc de phimīs sunt factis. Sequitur vt agamus de affectibus canalis vrinarii & potissimum de caruncula.

De Caruncula supererectente in canali vrinario molestissima.

CAP. XXXVIII

Suboritur quandoque in canali vrinario penis caruncula quædā & molestissima quidem, quæ aliquando etiam fit callosa, ita vt vsq; ad mortem perducat & exerceat miseris ægros, & aliquando supprimeat lotium & interficiat patientes, & ego quidem testor me aliquos

quos strangulatos vidisse ratione suppressi lotii occasione huius carunculae supercrecentis in canali vrinario. Caruncula vero hæc solet succrescere ex gonorrhœa diuturna, quæ facit vlcus, quia canalē deradit, ex quo non consolidato vlcere suboritur earo ista, & ideo in gonorrhœa diuturna vlcerare necesse succedente, statim semper veniat ad localia, quæ faciunt vlcus. Multi autem multa hic dicunt, sed pauci scopum attingunt. Quidam tamen est, qui vocatur Petrus Gallus, qui quidē in curatione huius rei omnes superat: quoniam scopum attingit & medicamentum composuit, quod omnia superat, & hic Petrus modo Venetiis degit: & ego, ut verum fatear, ignoro medicamenta a ipsius, quorum materiā & compositionem multoties tentavi perquirere, nunquam tamen potui eas consequi, unde factor me ignorare, quodnam sit eius medicamentum. Multi autem alii tenent curationem hanc, sed quandoque succedit, quandoque non. Ego autem hoc modo facio: primum impono candelam, tentans, an dura vel mollis sit caruncula. Si enim mollis est, molli quoque vtor medicamento, si dura, acrioribus: unde si levis est, accipio medicamentū habens in se purum præcipitatum, vel accipio Ægyptiacum, & addo tantum ceræ & olei, ut mollius reddatur medicamentum, postea illius portiunculam pono in summitate candelæ, quam deinde oleo inungo, & postea introduco, & carunculae medicamentū ipsū applico: quandoque vero cerine vtor, quandoque diapalma addens parum nitri vel aliquam portionem squamæ & impono: quandoque emplastro Isidis puro vtor. Si autem dura est caruncula, accipio præcipitatum & aluminis combusti & chalcanti rubificati an. partes æquales & his infusio summitatem candelæ, & optime digitis puluerē candelæ imprimo, ut infigatur, postea ipsam oleo inungo, & imponēdo applico ad carunculam. Sed inter alia vnum familiare habeo secretum, quod erat arsenicum crySTALLINUM, sed hoc longo tempore aufert, ego tamen emollio optime arsenicum ipsum super lapide pictorio cum succo limonum, postea ipsum soli expono, donec siccatur, deinde ipsum diluo aceto stillaritis. Et iterum sub sole sicco, & hoc quater facio iterum sub sole siccans, vltima autem vice abluo aqua rosacea, deinde ipsum cum aliquo cerato misceo, ut cum diapalma, vel diachylonē, vel cum ol. ros. & cera & facio emplastrum pro ratione durtitiei carunculae, & minimā portiunculam huius medicamenti pono in extremitatem candelæ, & quotidie semel aut bis in meatum vrinarium felicissime intromitto: quoniam non est periculosum medicamentum si ita præparetur. Vtor etiam quandoque calce non extincta cum aliquo vnguento & impono: sed illo præcipue dicto vtor. Quando vero candela non potest penetrare, impono medicamentum illud in capite pediculi folii maluarum de raso cortice exteriori, & ipso loco candelæ vtor. Notandum est præterea, quod in suppressione lotii ex his carnibus sæpe accidit, ut sint quatuor vel quinque carunculae in canali, quæ lotium supprimant, & nihil prodesse velagi possit, unde aliqui etiam neque ex vsu balnearum, inunctionum, neque ex impositione candelæ, quæ non penetrat, neque ex alio remedio prodesse poterunt, ut æger mingere possit. Ego autem in hoc casu pulchrum quidem remedium inueni, accipio enim iuncos acuminatos virentes, & in capite eorum acutissimo impono portiunculam vnguenti inungendo prius iuncum, deinde in canali pono tentans, ut sensim & sensim penetret inter callos, deinde aliquantisper iuncum in canali relinquo, postea extraho, & ex hoc succedit lotium feliciter: postea iuncum melle ros. madefacio, vel alio defensorio & impono ad detergendam saniem, & sic carunculam aufero & vlcus consolido. Sed etiam notandum est, quod non satis est carunculam auferre, sed oportet postea vlcus factum cicatrice obducere, in quo deficit Petrus ille Gallus: unde ego ad hoc consequendum accipio butyrum recens, mel rosatum, & cum minima quantitate aluminis crudi misceo & impono, quandoque vero squamā æris optime præparatam candelæ ipsi impono, ipsa scilicet squama candelam inficiens & impono, quandoque ferri squamam optime præparatam: allquando squamis addo pompholygem præparatam vel tutiam, quandoque autem initio decoctum hoc: ꝯ. gall. immar. cortic. granarorum, rad. tormentill. thur. mastich. aloes, myrtiz, bol. oriental. & alum. rochæ an. partes æqual. coq. in vino dulci vel saltem non austero, nigro & crasso faciens decoctum, quod bis in die per clysterem infundatur in canalem vrinarium: hoc enim obducit vlcus cicatrice per sparium tantum vnius diei vel alterius.

De Affectionibus illis, qui ad tumores pertinent, & manu indigent.

CAP. XXXIX.

In duo sunt genera morborum, quæ materiam medicam desiderant, quæ etiā communia sunt loculis muliebribus, & præsertim alteri, quod vocatur: nascitur o-

De condylomata.

nim tuberculum in extremo ano, vel circa marginē ani durum & callosum, quod vocatur, ut sunt protuberantes notī in articulis digitorum, quod quidem tuberculum graue est, præcipue quando fecēs duræ excernuntur, vel quid aliud, quod fecēs comprimant.

Causa.

Causæ autem horum sunt aliquando phymata præcedentia anī vel turpis coitus vel rhagades ex pessimo & diabolico illo coitu, vel etiam fecum durarum excretionis rhagades enim inueteratæ, ut plurius terminantur in condylomata, quæ tubercula vulgo cristæ vocantur inueteratæ: cristæ enim duplices sunt, vel enim sunt sicosi illi tumores, vel sunt ista condylomata, quæ duræ sunt cristæ, nullusque reperitur homo, qui passus sit phymata, vel suppressionem fecum vel ipsarum durarum excretionem in hæmorrhoidibus maxime, qui non habeat ac patiatur hæc condylomata.

Cursus per se, diuina uel quæ per medicamentum.

Sed quo ad eorum curationem, sciendum est, quod quando hæc condylomata sunt leuia, non requirunt curationem. Si autem molesta sunt, sunt etiam curanda. In quorū curatione proponuntur multa medicamenta exiccantia ab autoribus. Ego autem in hoc casu nunquam vtor medicamentis, sed sectione, quia melior, tutior ac citior est curandi ratio. Secati autem possunt condylomata tripliciter, vel filo vinciendo ipsa condylomata ita ut cadant, vel forcipe vel medicamento caustico. Si autem condyloma pediculum habeat angustum, nil melius est sectione, quia breuissima est, & non dolorosa actio.

Sed notandum, quod aliquando sunt venæ manifestissime in condylomate ac insignes circa pediculum, quæ si secantur, sanguine copiosum effundunt, unde tunc est vendum filo vinciendo radicem eius donec cadat, non autem scienda sunt vel sectione videntur. Sed si non adsint venæ, secantur forcipe vel aliquo instrumento secante, ut rasorio, vel gamaui vel gladioli forcipe tamen breuior, facilior, tutior ac minus dolorosa est actio. Post sectionem autem ponatur pulvis factus ex calceostro, alumine rochæ vitæ, galis & granatorum corticibus vel caustico exadatu unde ego pro caustico vtor sandaraca vel auripigmento macerato in oleo vitrioli: nil tamen melius est, quā ut madescat linteam in oleo sulphuris vel chalcanti & applicetur condylomati.

De Hemorrhoidibus.

CAP. XL

Hæmorrhoides vnde quæ sint.

Post condylomata succedunt hæmorrhoides, per quas duo intelligimus vel intelligere possumus, vel scilicet venas in ano existentes, quæ sunt aliquando quinque, aliquando sex, aliquando plures, aliquando pauciores, quæ sunt capillamenta venarum in extremo ano quæ aperiuntur sæpe in ano & effundunt sanguinem; secundo vero intelligimus per hæmorrhoides morbum quendam tumidum, qui fit circa capillamenta illa venarum anī: nam solet tunica illa in superficie anī intumescere, unde etiam venæ istæ intumescunt vel aperiuntur, & hæc hæmorrhoides etiam dicuntur. De cūta autem hæmorrhoididarum primo modo captarum non est loquendum: quoniam non sunt morbi, sed de hoc secundo genere tumido.

Hæmorrhoides vnde quæ sint.

Hi autem tumores sunt varii generis ex Hipp. in lib. de tumorib. nam aliqui habent similitudinem acini vix nigri, & istæ hæmorrhoides ob id acinales vocantur aliquando vero veluti moræ tuberosæ, & ob id morales dicuntur. Aliquando vtriusque videantur & duræ sunt, unde verrucalēs dicuntur. Aliquando vero videntur ampullæ & vesicæ, & ob id vesicales nuncupantur: unde quatuor sunt species hæmorrhoidum, quæ differunt ratione materiæ diuersæ, à qua sunt: nam acinales à puro sanguine sunt, morales vero à sanguine atro & crasso, verrucalēs à sanguine melancholico vel bile atra, vesicales autem à sanguine pituitoso. Notandum tamen est, quod istæ hæmorrhoides aliquando extra anum sunt, aliquando intra occultantur, si autem extra sint, manifestæ dicuntur, si intra, occultæ & cæcæ, à recentioribus vero barbaris surdæ vocantur, unde surdæ recentiorum & cæcæ antiquorum eadem & idem sunt. Præterea aliz sunt dolorosæ, aliz sine dolore. In his autem notandum est, quod plurimi decipiuntur: nam solent dupliciter aperiri venæ istæ: solent enim aliquando capillamenta illa venarum producere tuberculum, ut est granū milii & pars illa nigra protuberans spargit sanguinem: aliquando vero fit vlcus paruum in hæmorrhoidē purum & mundum, & ex his etiam sanguis effunditur, in quo Medici decipiuntur, quādo talia vlcera vident, aut quia credunt esse vlcus, & sanare tentant, sed frustra, quia ista vlcera sunt oscula venarum aperta & exesa, nec requirunt curationem, nec possunt sanari, nisi sanentur hæmorrhoides. Causæ autem hæmorrhoidum notæ sunt, ut malus succus in corpore contentus, & plenitudo sanguinis melancholici, ideo in eis non est immorandum, sed ad curationem deueniendum quam citius.

Causa.

Modi.

In hæmorrhoidibus tria requiruntur, primum quando dolent, ut mitigetur dolor. nam maxime excruciat iste dolor, quia maximus est & intolerabilis quandoque & præcipue

pue quando cæcæ sunt & occultæ, nec maxime tumidæ sunt, sed parum aut nihil. Quare primum indicatum est sedatio doloris, si quis adest. Secundum indicatum est, quod, si non fluat sanguis, curetur vt fluat, vel si nimis fluat, sistatur. Tercio auferenda sunt tubercula ista: quia molesta sunt, & si extra sunt, impediunt etiam Ingressum, & si sint intra maximus fit dolor in excretionem & inuertuntur, ita vt tolerari quandoque non possint, vel non sine maxima difficultate. Quoad primum dimittenda sunt communia: nam præter modum dolentes requirunt rationem victus contrariam humori pescanti, sectionem venæ in talo vel cubito, tertio requirunt, vt non exhibeamus lubricatā aluum, sed quanto tardius fieri potest, vt excernantur feces, melius est, ideo suppressenda est aluus. Sed quoniam feces hoc modo siccabuntur, vnde dum voluerit patiens postea exercere, maxime cruciabitur ab ipso dolore. Vnde ego dico, quod bene curandum est, quantum fieri potest, vt æger raro feces excernat: sed quoniam percipiet stimulationem fecum, infundatur clyster ex oleo purissimo ad lbj, & butyro recenti ad ʒiij. quibus calefactis ac mixtis infundatur, & ipsum teneat patiens per spatium vnius noctis vel diei integri, quia ex hoc liquefiunt feces ita, vt postea egrediantur sine molestia. Hoc factū ad doloris mitigationem veniendum est, pro quo varia sunt, sed inter omnia sola ea, quæ refrigerant & siccant, & discutunt humores impactos, bona sunt in hoc affectu. Vnde ego familiare habeo vnguentum populeon, quod refrigerat & siccant: sed vt magis siccet, addo cortices granatorum tritos vel puluerem gallarum, vel puluerem ex corticibus ouorum, vel metallica illa, vel squamas lotas, & quandoque etiam præcipitatum, vt magis siccet & impono. Quandoque vero ad lumbrosos terrestres venio: quoniam hi præstantissimi sunt in hæmorrhoidibus non spargentibus sanguinem, vnde tunc accipio oleum armelini vocatum, quod pro hæmorrhoidibus seruatur in officinis, & vocatur etiam oleum de baricocoli, vel de armelin aut moniachæ, quod quidem oleum fit ex aromaticis malis, ex quorum nucleis fit oleum, & in hoc ego incôquo vermes terrestres in vase ferreo: sed si hoc vas non adsit, accipio lucernam coquinariam, & coquo, deinde inungo ac impono feliciter. Quandoque vero vehementioribus vtor accipiens millipedes, animalcula illa scilicet, quæ aselli vocantur seu porcelletæ, quæ gignuntur in hortis pensilibus, vel etiam degunt sub vasis aquariis, & hæc animalia in ollam imponens in furno exuro, & puluerem conficio, iterum etiam accipio asellos viuentes, & in eo oleo armelino dicto decoquo, & hoc hæmorrhoides inungo, super quas etiam puluerem inspergo. Vltimo venio ad quedam animalia nigra, quæ gignuntur ex stercore bouino in viis, & scarabei vocantur, a Græcis veto Canthari: hæc enim animalia sunt vera medicina hæmorrhoidum dolentium, & hos scarabeos incoquo, in quocunque oleo & optime, donec fere ex toto vrantur, & deinde hoc oleo inungo. Quandoque vero eos macero tota æstate in oleo & ad vsum seruo. nam hæc mitigantia sunt aliis omnis communibus, anodynis scilicet, & hæc mihi sunt familiaria. Verum autem est, quod etiam quandoque duo alia egerim pro sedando dolore hæmorrhoidum, vel coim primo ferramento calido exurebam hæmorrhoides dolentes, sed ferramento non vrens erat, sed multum calidum, vel oleo feruenti tango hæmorrhoidas, sensim tamen, donec exuratur superficies hæmorrhoidum, vel hirudines etiam impono: nam ex his dolor sedatur vt plurimum.

Si autem non fluat sanguis, & tumidæ sint hæmorrhoides aut mariscæ, siue extent, siue non extent, infinita proponuntur ab Aetio, quæ faciunt ad operationem ipsarum. Ego autem etiam in hoc duo familiaria habeo medicamenta, ad aperiendas scilicet mariscas, quæ etiam mitigant dolorem, quæ si facere non possunt, deuenio ad hirudines, vel ad manuum operationem, primum autem ex rad. cyclaminis & pannis coctis hoc modo est confectum:

ʒ. carn. pom. sub prun. coct. ʒij.
rad. cyclam. virid. ʒj β. vel etiam ʒij.
litharg. aut. ʒij.
aloes ʒj.
croci ʒj.
ol. ros.

mell. an. quantum sufficit. Misce, fiat empl. in mortario, quod imponatur, siue sint manifestæ, siue occultæ: habet enim vim mitigatoriam, & aperit & sanguinem educit.

Aliud emplastrum est hoc:

ʒ. carn. cæparum commun. sub prunis coctar. vel loco harum expas, liliorum albor.

Indicatio.

Clyster in hæmorrhoidibus.

Distinguitur.

Familiari Populeo pro doloris sedatione.

Oleum armelini.

Aliud familiare.

Oleum scarabei optimi.

Emplastrum Populeo pro operatione hæmorrhoidum.

rad. cyclam. virent. an. 3 ij.

aloes 3j.

afellas cr. xx.

ol. ros.

mell. an. q. s. misce in inortatio & fiat emplastrum. Si autem ex hys

Folia ficu non aperiantur mariscæ, venio ad folia ficuum accipiens duo folia ficuum virentia & simul ea inter se frico, vt asperitatem remittant, præterea frico etiam simul, vt suo lacte imbuantur, deinde mando, vt æger exprimat mariscas, deinde sensum & sensum frico ipsas cum dictis foliis, & sic aperiantur. Quod si neque hæc faciat, ultimo loco hirudines apposto, de quibus alias dictum est, cum de fluxu sanguinis ageretur. Sed cum non semper hæc sufficiant, ideo opus est devenire ad exustionem, vel medicamento vel ferro, aut ad præsectionem aut ad ligaturam. Exustio autem facta per ferrum & causticum non laudatur à me, nec etiam præcisio & inuersio, vt docent auctores. Sed semper ego per deligationem tentavi sanguinem sistere & optime successit. An vero omnes ligandæ sint & excandæ, cum omnes sanguinem spargant, difficultas maxima est inter Aetium & alios Medicos. Aetius enim in hoc omnibus contradicit, quia Hipp. sect. 6. aph. 12. dicit, quod si vna non relinquatur apta, incidunt patientes in hydropem & similes morbos, in quos etiam incidunt, si nimium sanguinem spargant. Interpretes autem dicunt, quod vna vena sit relinquenda aperta. Aetius autem aliter dicit. Ego autem cum Galeno consentiens dico vnam semper esse relinquendam apertam si fieri potest, nisi maxime fluat sanguis, sed in hoc non est immorandum, cum ego alias docuerim: quomodo ligandæ sint, cum loquebar de polypo: tunc enim instrumentum docui ex fistula argentea, ex filo æneo, quo optime ligantur hæc morrhoides ipsæ. Notandum est autem, quod si extra sint, facile ligantur: at si sint intra, tunc infundendi sunt clystères, vt extra veniant, ac omnia sunt tentanda, vt extrahantur, vel imponatis emplastrum ex cæpis puris coctis addito sulphure tantum, vel nitro simul cum sulphure, vel cucurbitulas ad anu in apponatis ad foramen scilicet, vt his extrahatur mariscæ, vel per clysteria actiora hoc tentabitur. Sed notandum est deligatione, quod cum sunt eductæ & arreptæ filo æneo, cum filo deinde sericino ligatur, non sunt nimium stringendæ: quoniam si nimium stringantur, cadunt citius quam oporteat, & antequam consolidentur. Postquam autem fuerint vindæ, inungantur omnes oleo armelinorum vel vnguento popul. vel ol. amygd. dulc. & eas postea digito iuuando curetis, vt repellantur in suum locum, vel hoc fiat per candelam ceræ albæ optime vinctam, vel cum digito inundo oleo aut butyro.

Ad omnes ligandos hys liganda sunt, omnes sanguinem spargant.

Ad viciatam hys liganda sunt, morrhoides.

Cum autem exciderint hæc morrhoides ligatæ, vt vulnus ipsum consolidetur, ego vtor troiscis ex tribus gtanatis ipsis inungendo, vel dissoluo ipsos pomata vel ol. armel. & impono in sedē, & sic fit cicatrix. Et hæc satis sunt de hæmorrhoidibus dictæ: sequitur modo, vt agamus de tumoribus illis, qui partium extremarum sunt morbi, inter quos primum agamus de illis, qui permiones siue bagantiæ dicuntur.

De Affectibus Partes extremas occupantibus, & primum de permionibus.

CAP. XLI.

Permiones que hys occupant.

Permiones sunt affectus extremorum membrorum, qui non nisi hyeme oriuntur, & Græcis *hymalia*, quasi hyemalia, vocantur, & sunt tumores rubicundi in principio, qui postea fiunt luidi, nigri & molles & aliquando ad suppurationem veniunt, & etiam quandoque gangrenantur & oriuntur circa arciculos pedum & manuum, & aliquando circa calcem, & quandoque circa nasum & etiam aures.

Causa.

Causæ sunt frigora ingentia quæ afficiunt extremas partes: causa vero immediata est fluxio sanguinis boni: materialis vero sanguis bonus fluens ad partes illas debilitatas, vt quando abundat sanguis habituosus in corpore, vt in pueris & mulieribus, cū non possit dissilari dolente parte ob frigus, fluit illuc & facit tumorem, & putrescit magis ob frigus quam ob aliud. Hinc autem est, quod puellæ ante menstrua patiuntur hos tumores & sic pueri bene habituantur.

Curatio.

Curatio autem horum tumorum ignota est omnibus fere præterquam Aetio, qui optima proponit medicamenta: nam omnes hæc curant per calefacientia & siccantia imponentes rapas, alii vrticas, alii raphanum, alii oleum ex feminibus lini: alii exurunt cineribus calidis vel ferro calido, quia putant quod cum frigus sit horum tumorum causa, quod calor harum partium sanctus decipiuntur. Nam ego assero, quod tota curatio in principio consistat in repellentibus ac robustis refrigerantibus & exsiccantibus: & si adulem sit corpus

Errat canon: tumorem periculis in principio.

corpus, nil præstantius esse potest, quam secare venam in principio: sola enim hæc sectio-
ne venæ plurimas ego præseruari: quare in puellis, in quibus est tempus menstruari, non
autem adhuc fluunt, secetur venâ etiam in hyeme, nec timeantur frigora. Bene Verum est,
quod oportet, vt in thalamo calido maneat, & secetur venam basilicam. Circa locum au-
tem veniatis ad repellentia refrigerantia & exsiccantia, quibus etiam Aeris vitur, sed ipse
nesciebat quare hoc faceret: quoniam imponit ipse emplastrum ex succo citri vel limonis
vel arantii. Accipitur itaque succus limonum vel arantiorum acidorum, vel mali citri &
miscetur cum farina hord. & oleo ros. omphac. mira enim fient ex hoc: vel accipiat suc-
cum ros. & acetum acerr. & album oui, & cum farina hord. fiat polenta, sed omnia sint
10 cruda. Vel accipiat farina orizæ & succus rosatum cum oleo ros. vel acetum ros. & succus
myrrhill. cum ol. similiter ros. & fiat polenta & applicetur. Vel etiam tripharmaco vt po-
teat, quod quidem constat ex litharg. ol. ros. & aceto, quod diducitur in mortario plum-
beo ad linimenti consistentiam, & hoc quotidiè inungatur locus affectus: quoniam est
præstans medicamentum.

Ego autem familiare hoc habeo,

2℥. suc. ros.

solatri.

plantag. an. ʒj.

ceruss.

litharg. an. ʒij.

acet. acerr.

Ol. amphac. an. ʒiij. misce in mortario plumbeo, & subigantur
ad linimenti consistentiam: quoniam optime succedit. Sed aduertendum, quod cum ho-
rum vsus soleat maximum pruritus facere, ideo quando pruritus adest maximus, deter-
gendum est medicamentum & auferendum totum, & abluendi perniones aqua ros. fri-
gida. Si autem exulcerati sint perniones, ego vtor vnguento diapompholygos. Sed infi-
nita habentur medicamenta ab Aetio, Paulo & omnibus, quæ huius scopo inscriuunt, quib-
us vt poteritis, si vicerati sint, aliter nunquam ipsis vti debetis.

De Calli seu clauis. CAP. XLII.

Suboriuntur in extremis partibus ob laborem calli, qui clauis etiam vocantur, & rectius,
quoniam qui clauis istis laborant, ita punguntur, ac si clauos in parte illas infixos habe-
rent. Vt autem quis possit ab istis præseruari, sciendum est, quomodo nascuntur. Nascun-
tur itaque primùm suboriente vesica, quæ oritur, quando quis vitur crepidis, & postea
dimissis illis vtatur caligis stricioribus, vel cum caligis vsus est, vtatur deinde zoccolis si-
ue crepidis. Ex horum enim hoc vsu vario oritur vesica, quia atteruntur ab his pedes, quæ
vesica si relinquatur & siccat, vt plurimùm facit callum: spatio enim quatuor dierum tan-
tū humor, qui erat in vesica illa, siccat, & pellis supraposita fit dura & continuo carnem
attretit, & ita calli suboriuntur, qui sunt duri: & hæc causam ego multoties reperi didici:
40 ab experientia hoc, quod ex attritione in itineribus vidi vesicas subortas, ex quibus dein-
de calli facti sunt: ideo moneo vos, vt si præcauere vultis à callis, vt illas ampullas amputetis
ac vesicas illas aperiat, quæ in pedibus suboriuntur, neq; permittatis eas siccat, aliter cal-
lus subsequetur. Verum est tamen, quod pellis illa subiecta vesicæ dolet, & ideo imponen-
dum est aliquod medicamentum, vt diachylon, vel diapalma, vel diapomphol. vel aliud,
ne doleant, aliter calli superueniunt. Sed loquamur modo de iam factis, quomodo sanen-
tur. Infinita autem sunt medicamenta, sed omnia debent habere vim attenuandi & ex-
cendendi. Aliqui vero macerant callos lixiuio, & deradunt cum molles sunt facti. Ego tamen
non laudo derationem: quoniam non est bona curatio, quia iterum suboriuntur, præterea
quandoq; bonas carnes deradunt, vnde ego macerationem tantum cum lixiuio maxime
50 laudo: Macerationem autem facta ego accipio acetum stillatitium vel acetum forte & ma-
cerato callo in lixiuio fortiori impono ossulam panis maceratam in aceto illo acerrimo,
quando it dormitum patiens, vt tota nocte seruetur, quid fiat per tres noctes, die autē im-
pono empl. sids: quoniam sic maceratur callus & fit mollis, nec amplius affligit hominem.
Cum autem hoc quandoq; non succedat, ideo veniendum est ad validiora, vt est nitrum,
ammoniacum, vt si nocte vtatur aceto dicto: die vero accipiat nitrum vel ammoniacum, &
seruet in palma manus, donec emollescat, atq; etiam digitis atteratur, vt mollis fiat, deinde
excédatur & tractetur, ac si esset pasta, deinde plateina fiat, in cuius media cauitate impo-
natur aliqua porriuncula salsi nistri triti: & si hoc sit nimis vthemens & acre, torrefiat, &
callo imponatur per totam diem.

Si vero hoc non sufficiat, accipiat auri pigmentum tostum, sandaraca Græcorum, salnitrum, & sulphur ignem non expertum æquis portionibus ac ponderibus, terantur & fiat puluis, qui excipiatur cera vel ammoniaci lachryma molli, & imponatur. Si vero neque hoc sufficiat, ut quādo ita duri sunt, ut his non cedant, veniendum est ad causticum; unde ego soleo accipere ventres cātharidum & cōtundo, deinde cum croco misceo & fermento, & huius mixtionis nimirum portiunculam impono super callum; ex hoc enim excitatur vesica cum aqua, & ita abscedit callus, deinde vesicam seco & locum postea cum diapompholyge curo: vel accipio capitellum pro caustico medicamento, si cantharidibus vel non vellet aliquis. Et hæcenus de callis.

De Poris seu verrucis.

CAP. XLIII.

10

Verruæ sunt
de poris.

Formicæ.

Pensiles.

Materia.

Verruæ sunt
de poris.Verruæ sunt
de poris.

Genus.

Verruæ.

Verruæ sunt
de poris.

Suboriuntur quædā tubercula, quæ verruæ dicuntur siue pori, qui in toto corporis nascuntur, & non vnius generis, sed aliz myrmeciz, id est, formicales dicuntur, unde a recentioribus formiculosi vocantur pori, aliz verò *de poris*, & à nostris verruæ pensiles nuncupantur, à quibus vero naui. Formicales autē duræ sunt admodum, & nascuntur ut plurimum in manibus, & habent radicem latiore apice, atq; apicem asperum.

Pensiles vero ut plurimum nascuntur in collo, molliores sunt, & in aliis etiam partibus oriuntur, quandoq; & pediculum angustum habent. Istæ autem omnes verruæ nascuntur ex materia melancholica, crassa & quandoq; cum pituita etiā errare formatrice facultate partis, quæ cum non possit materiam illam discutere, potius format verrucas quam ipsam discutiat, & sic facit morbum in numero. Quandoq; vero sunt à materia melancholica cum pituita mixta, & istis laborant rustici, quia abundantius puris excrementis crassius, & his etiam pueri laborant, quia licet succo melancholico non abundant, pituitositate maxime abundant. Verruæ præterea cōtagiosæ sunt; si quis enim non laboraret verrucis, si cadat sanguis ab ipsis in aliam partem dum rescantur, succrescit alia verruca; unde aliqui verrucas capiunt, si in linreo detergantur, in quo fuerit sanguis verrucarum collectus: & sunt aliqui, qui nunquam liberantur ab his verrucis. Si autē quis diu his laboret, oportet vniuersalia capita præmittere, postea venire ad locum affectum, si tardio sint illæ homini. In aërochordonibus vero, cum quasi delitiosi sint, non multum laborandum est; nam aliqui maxime delectantur his, ut cum hæc habent in naso vel collo: & si hæc curare velitis, non multo labore hoc facietis, nec reuiuifcent. Sed si sint formicosæ verruæ, cum satis molestæ sint, ideo validissimis indigent medicamentis discutientibus & resoluentibus, inter quæ primo sunt folia salicis viridia, quod casu ego didici à quadam veuila, quæ his vebatur cum aliqua tamē incantatione: verum per se faciunt hæc folia, si ipsis fricentur quotidie matutina hora. Succus etiam foliorum istorum discutit, & attenuat & digerit. Quandoq; vero ego accipio folia salicis sicca & facio puluerem, & cum aceto misceo, quandoq; venio ad acetum squilliticum. Si autem hæc non faciunt, venio ad portulacam sylvestrem virentem verrucariam dictam, ipsa verrucas fricans aliquando accipio scorpioidem illam verrucariam, quæ profert pilulas, & frico; quandoq; scrophularia maiori ipsa frico, aliquando radice dracunculi maioris vtor vel radice ari, vel radice cyclaminis prioris, his ipsas fricans. Si vero neque hæc sufficiunt, venio ad caustica accipiens allium viride, illud cōtundo, & eius partem super verrucam pono, postea facio pileolum ex cera, & impono & fascia obduco: nam hoc modo facit vesicam, & cadit, & sic curantur verruæ; vel accipio sandaracam Græcorum, auripigmentum purum & misceo cum oxymelle, vel cum melle, vel fermento & impono, quia vrit optime, vel accipio oleum chalcanthi, vel sulphuris locum madafaciens, vel vltimo in loco venio ad exulsiōnem cum sulphure, accipiens nucem iuglandis per medium diuidens ac nucleos extrahens, & accipio dimidiam partem testæ, & facio in ipsa foramen paruum, magnitudinis scilicet verruæ, & appono super verrucam, ita tamen, ut ipsa optime ingrediatur in illud foramen optime calcans, postea pono sulphur in illa testa, deinde candela sulphur accendo; sic enim eliquatur sulphur & exurit verrucam, nec partes vicinæ vruntur, quoniam ab ista testa perforata præseruantur, & hæc donec sufferre possit æger: nam ter vel quater est faciendum. Quando vero sanatus est locus, vrendum est per aliquot dies vel foliis salicis vel aliis superius dictis, ut dissipetur materia illa, ne reuiuifcat verruca, nam quandoq; reuiuifcunt.

Cum autem alii non ad sint tumores, qui adhuc cognoscantur, ideo finem huic operi hic imponemus, Deo gratias agentes.

FINIS TRACTATUS NONI.

GABRIEL

GABRIELIS FALLOPPII MV- TINENSIS MEDICI AC PHILOSO- PHI PRÆCLARISSIMI DE DECO-

RATIONE.

TOMI II. Tractatus vltimus.

Præfatio. CAP. I.

DE DECORATIONE vniuersi corporis humani, & singularum par-
tium, quæ partim necessario corpus constituunt, partim verò per ac-
cessorium quoddam illud perficiunt, tractaturus, necessarium est prius
videre, quid sit Decoratio: Secundo quid circa corpus vniuersum, vel
partes agat. Tertiò ad quem artificem pertineat. Quarto quid in illa
contineatur. Vltimo qui scriptores legendi tractarint de hac materia:
vtrque hæc certo pateant, alius quædam repetenda, quod omnes artes
à scriptoribus diuiduntur in duò genera, alteras bonas constituunt, alteras malas, atque fu-
catas; malas vocamus eas, secundum Philosophos, & Medicos ex auctoritate Galen. quæ
versantur tantum circa illud, quod bonum videtur esse, non autem est; quarum finis bon-
um, & perfectum apparens est, non tale existens. bonas vocamus eas, quæ circa bonum
finere, & vere bonum versantur. per bonum intelligimus perfectionem in substantia
rei, & integritatem eius, de qua dicitur bonum. Vnius, autem, cuiusque rei cum vnum
sit bonum (vnum tantum, & perfectio tantum (quoniam vnum, vtrumque, vnam in-
tegritatem, vnam perfectionem, & vnum bonum habet) & ideo vnaquæque ars circa
vnum bonum, vnum finem, & vnam perfectionem versatur illius rei, de qua tractat. Ver-
um bonum hoc in vnaquæque dupliciter obseruari potest: altero quidem modo, quo
consistit hoc bonum, & in actu reperitur in re, verbi gratia, in corpore perfectio est, vt
possit moueri, dum adest motus, adest perfectio, & bonum: aliquando bonum deside-
rarur, vel quia nondum genitum, vel quia genitum corruptum est. Quum igitur duo-
bus modis possit tractare ars de bono, vel præsens conseruando vel desideratum restitui-
endo; quaeritur an eadem sit ars? 14. cap. illius lib. ad Thrasib. dicit Galen. ad eandem ar-
tem pertinere; nam cum perfectio sit finis artis, ars non solum producere eam debet, sed
conseruare, ex his colligimus, quod vna ars habet vnum finem, & vnum bonum pro fine:
bonum est perfectio rei, circa quam versatur. hunc finem ars tentat efficere, & effectum
conseruare. Architectonica habet finem, constructionem ædium, si pereunt ædes, resti-
tuit; si restituit, conseruat. Cum itaque medicina ars sit, necessarium est habere vnum
finem, qui sit perfectio subiecti, circa quod versatur: quod est perfectio corporis humani,
verum non ita constat, quid in corpore humano sit bonum, & perfectum, circa quod ver-
satur ars; aliqui volere perfectionem corporis humani esse robur, & vim ad actiones obe-
undas; & bene sentire; quia hoc est potissimum in corpore humano; & ideo dicitur ista
integritas corporis, quoribus potest integras actiones perficere. hoc confirmatur à Galen.
in eodem lib. cap. 15. confirmatur etiam ratione ista potissimum: corpus humanum est
organum animæ: organum est organum ad hoc, vt edat talem actionem, quam, si edere nõ
potest, imperfectum est. si corpus est organum animæ, & finis eius est actus, & opus, ergo
summa perfectio corporis est robur, & vis in agendis actionibus: idcirco finem Medici-
næ dicimus in corpore versantis esse conseruare robur corporis, quod probatur alia ratio-
ne. robur est virtus corporea. non dico vis, sed virtus: virtus autem est summum bonum,
dicebat Aristot. ergo sequitur, quod robur est summum bonum, finis corporis quatenus
organum est; & in hoc tendit ars Medica. Alii dixere sanitatem esse illud optimum in
corpore, sanitas est causa omnium optimarum actionum efficiens, & conseruans, ergo sa-
nitas est summum bonum. Nam sicut Deus est efficiens, & conseruans, & finis omnium,
& bonum summum, ita sanitas, in quam omnes conspirant. Probo auctoritate eius-
dem Galeni in dictis locis, & auctoritate Aristotelis, qui sanitatem ait esse virtutem cor-
poris. si virtus est, ergo summum bonum corporis, & perfectio, & integritas eius. Alii
volere esse bonum habitum; quoniam habitus bonus est causa functionum, & habitum
bonum tentamus omnes, ad quem non solum Medicina, sed mangonica etiam ars inren-
ta. nam antiqui arte Medica conseruabant habitum. sed hoc non satis erat: habebant Gy-

*Pulchritu-
dinem esse
summum bo-
num corpo-
ris.*

*Summum
bonum.*

*Finis Me-
dicinae.*

*Pulchritudo
duplex.
Fucata.*

Naturalis.

*Historia De
meretrix.*

*Primo de
sup. 3.*

*In lib. de op.
post ad Tr.
14. primo de
Vita p. 3. 17. de
suis in 13. 1.
de comp. con-
det. lac. 2.*

maasticam artem, & Mangonicam artem, quæ molliendo, & remolliendo præstantiosum habitum faciebant, & cum à Galeno & Aristot. virtus prodita sit, ergo bonum corporis dicimus esse istum bonum habitum. Ultimo non defuere, qui dixere pulchritudinem esse bonum corporis summum. cum hæc ab omnibus affectetur non solum feminis, sed maribus: non modo iuuenibus, sed senibus, cumq; etiam virtus sit, ideo est summum bonum, & perfectio. ex his habemus rationes pro omnibus partib. Quodnam autem est summum bonum? quod pertinet ad actiones videtur magis excedere, tamen non est summum bonum. Hac ratione dicemus artem Medicam non habere vnum finem, vel corpus humanum plures habere fines, quorum neutrum est asserendum. quodnam ergo erit hoc summum bonum? Respondet acutissimus Gal. quod bonum, quamuis multiplex videatur, vnum tamen esse dicitur, multiplicitas autem dependere videtur, quia aliud est causa boni, aliud est fructus illius boni, tamen vnum est bonum, vnus est finis, & ita bonum aggregatum ex his est ex sanitate, bono habitu, pulchritudine, & robore actionum, videamus artes ita se habeat. accipiamus sanitatem, & bonum habitum, hi sunt causa pulchritudinis, & roboris in actionibus; pulchritudo, & robur sunt fructus, sunt effectus istarum causarum. si coniungamus causas, & fructus, vnum erit bonum. Summum bonum in homine est, quod generatur, ideo secum coniunctam habet causam: ex hoc colligemus, quod quemadmodum omnes alie artes habent vnum finem, vnum bonum, ita Medicina, quæ habet perfectionem ex omnibus his quatuor virtutibus compositam, & istæ virtutes constituent corpus nostrum. Probat Galenus rem istam, & inquit, videte, quod non potest alterum horum sequestrari ab altero: non possumus sequestrare pulchritudinem ab habitu, neque à robore, neque à sanitate; nec habitum bonum ab vno horum, nec robur à sanitate, habitu, & pulchritudine, nec sanitatem à cæteris, restituta sanitate, restituitur robur, & pulchritudo; restituta pulchritudine restituitur robur &c. sequitur ergo quod re vnum, & idem sint, quamuis ratione differant: colligemus ergo, quod in Medicina finis est summum bonum corporis humani, quæ est perfectio constans ex quatuor virtutibus aggregato, quæ sunt sanitas, robur, pulchritudo, & habitus, cum hæc omnia comprehendat ars medica, expolit omnes alias artes, exempli gratia, Mangonicam, Athleticam, comptoriam; ipsa omnia facit, ipsa molliat, ipsa pulchrum reddit corpus. Cum autem in hoc summo bono contineatur pulchritudo, sequitur, quod colligere possumus pulchritudinem pertinere ad artem medicam. quia hæc aut præiens est, aut deest, ad artem Medicam conseruatio, & restitutio pertinet. Verum hic scrupulus quidam occurrit, cum videam Philosophos, qui continuo hæc tractant, accusare pulchritudinem: Habemus auctoritatem Galeni in illa oratione sua foris ad artes, in qua dicit pulchritudinem esse potius occasionem mali, quam boni: quomodo ergo erit ex eodem Galeno virtus, & summum bonum? Domini, cum hoc videam, cogor, vt ego veniam in hanc sententiam quod duplex est pulchritudo: altera fucata, aduclterina, ficta, & non vera, quæ non naturalis, vel præternaturalis dicenda. de qua Galenus primo de vita p. 9. & opt. secta ad Theasib. cap. 10. & primo de comp. med. per loca cap. 2. & hæc appellat sumum mangonicam, vel comptoriam, & hæc meretricia, vel cynaglica dicitur; nam destruit conditiones naturæ, vt artis aliquot pessimas condiciones inducit, quam si affectant senes, iuuenes, & mulieres: Mulier destruit venustatem: senes grauitatem amittunt: iuuenes virilitatem perdunt. Altera pulchritudo naturalis dicitur, quam vnusquisq; affectare debet: & qui non affectat, turpis est, & Democriti factum in illum quadrat. Democritus in prandium vocabatur sepe ad domum oparissimam, vbi erat instructa mensa linteaminibus pulcherrimis, argenteis, & aureis oculis ornata, amicus autem sordidus erat totus. Cum Democritus expere vellet circumuoluens oculos nihil inuenit turpius amico; & ideo in facie desipuit eius: idem merent illi, qui despiciunt faciem, barbam, colorem, & naturalia: digni profecto sunt, vt expuantur. altera igitur est pulchritudo, quæ naturalis dicitur, quæ dupliciter Gal. describit. altero modo nimis seuerè, altero modo latius aliquantisper. anguste, & pressius, quando timebat à pulchritudine fucata, meretricia, & ideo dicebat lib. 3. de placitis Hipp. & Plat. cap. 3. esse compositionem, & connexionem naturalem, ac symmetriam partium inter se. & ab ista ablegauit molliciem, partium colorem, & similes notas pulchritudinis. ablegauit ista quæ pertinent ad pulchritudinem naturalem, ne daret aditum fucate pulchritudini; ne ista meretrix in Theatrum veniret. verum quum postea non timebat istam meretricem, latiore pulchritudine explicabat, & connumerabat substantiam, colorem, quantitatē, situm, figuram, & conformationem partium, in his enim omnibus constituebat pulchritudinem.

Definitio decorationis, ad quam artem pertineat. CAP. II.

EX quibus omnibus, cum nos simus tractaturi de decoratione, quæ conseruare, & restituere potest, ita eam definimus. Pulchritudo est bonus, & naturalis habitus corporis in substantiæ, quantitatis, situs, figuræ, atque coloris symmetria consistens. Hæc est natura istius pulchritudinis, circa quæ versatur res huiusmodi, de qua nos instituimus tractationem: Et notate, quod non vna symmetria datur in his. Aliquando color dicitur symmetri ratione coloris vnius partis comparati ad colorem alterius partis, verbi gratia, videmus iuuenem rubrum, habentem barbam flauæ coloris: huiusmodi est symmetria: quia vtrumque quadrat cum ætate, & faciei color respondet colori barbar. Symmetria etiam cadit respectu vniuersi corporis. habet iuuenis rubram, candidam, roseam faciem, si corpus est huiusmodi, tunc dicemus habere symmetriam. Tercio dicitur symmetria telata illa qualitate ad vnum præstantissimum in vniuersa specie. si imaginemur colorem in muliere, ille est, qui est mixtum lac cum vino: & ille adolescens habet colorem optimum, quoties carnis albidæ, vellactis cum sanguine mixtio videatur. si videmus hoc, dicimus pulchritudinem adesse, quia adest symmetria cum colore pulcherrimo totius speciei; idem dicimus de iuvene, puella, sene, & viro. idem de reliquis qualitibus, figura &c. Hanc pulchritudinem obseruat Medicus, atque conseruat, & quia per turpitudinem destruitur, hanc ipse fugat. Verum duobus modis pulchritudinem restituit, sicut duobus modis perit: nam aliquando perit per se non pereunte sanitate partium, aliquando per accedens pereunte sanitate partium, verbi gratia: sit mulier sub sole, inficitur cutis, & nulla pars laborat morbo. vice versa sit carbunculus in facie: huiusmodi nigredo turpitudinem inducit, pereunte cum pulchritudine sanitate. Medicus vtrunque pulchritudinem restituere potest, primam per se, secundam per accedens. hoc secundum genus operis pertinet ad medicinam curatiuam; primum verò ad medicinam, quæ Cosmotice, hoc est, ornatoria, dicitur, vel decoratoria. ex quo patet vis artis multiplex: vis, quæ restituit sanitatem, dicitur curatiua; quæ restituit pulchritudinem, dicitur ornatoria, decoratoria. Sed est differentia inter comptoriam, & ornatoriam. comptoria destruit naturam, & addit, quod non est in natura. Decoratoria semper respicit id, quod est secundum naturam in isto homine, vel in tota specie, vel in hac, vel in illa parte. Ex quibus constat, quod decoratio nihil aliud sit, quam conseruatio vel restitutio pulchritudinis naturalis vel in vniuerso corpore vel in corporis parte per se: nam decoratio non tractat de curatione pulchritudinis per accedens, quæ est per sanitatem corporis, sed de pulchritudine per se, quatenus pulchritudo. Nos autem in hoc de decoratione tractatu hunc seruabimus ordinem; vt scilicet primo de vniuersi corporis pulchritudine tractemus, postea descendamus à capite ad pedes. tractabimus autem de illa decoratione, quæ restitui potest, sine curatione morborum. quoniam fusius Scriptores de hac curatione dixerunt; vos repletos libros multarum ægritudinum inuenietis. Ego agam de pulchritudine restituenda sine morborum curatione. Ex instituto tractantur primum de hoc Cleopatra Medicus, deinde Chrito, tertio Moschion, vt habemus ex Gal. Rhafis tractat de huiusmodi negotio 36. lib. continentis Auicenn. vltimam fen 4. libri. Inter recentiores Ioannes de Vigo; Petrus ab Argillata, Nicolaus Florentinus in vltimo libro omnium suorum operum. qui sparsim tractant, sunt multi, Galen. in lib. de comp. med. per loca. Paulus, Aetius, Oribas. Alexander Trallianus, Celsus, Othavianus, Marcellus &c. & non est Medicus, qui locutus sit de locis affectis, qui non dixerit aliquid, quod pertinet ad pulchritudinem. in primo capite nos tractabimus de impinguatione, & gracilitate corporum, vt quando nimis pingua sunt, quomodo gracilia reddenda, & e contra.

De Turpitudine & primum de obesitate, & quid nominis eius.

CAP. III.

Pulchritudinem aliam esse naturalem; aliam vero fucatam, & meretriciam dictum est. Hanc posteriorem non esse tractandam à Medico, priorem esse inter eius scopos collocandam tradidi. cumque huiusmodi pulchritudo naturalis, à turpitudine destruat, statim requiri opem Medicam, dicebam. Adiungebam ex mente Galen. consistere pulchritudinem in proportionem, analogia, in substantia, quantitate, situ, & figura partium. quibus adiungitur coloris innati qualitas proportionata habitui, & ætati. Turpitude erit corrupta proportio istarum rerum, vel substantia, vel quantitate, vel situ, vel figura, vel colore partium. cum indecorum habitum abigere sit intentio, metito de omni lapsu loquen-

dum non morboſo, ſed turpi. nam duplex eſt lapſus; alter qui dicitur morboſus, qui eſt aſ-
fectio præternaturalis impediens actiones corporis; de hoc non tracto: alter pertinet ad
pulchritudinem, quando analogia obſtans oculis deſtruitur, ſolet autem hic lapſus eſ-
ſe vel in vniuerſo corpore, vel in parte. Turpitudinem vniuerſi debet præcedere turpitudi-
nem partis: quia vniuerſalior eſt: & quoniam turpitudinem vniuerſi (vt plurimum) in quan-
tito conſiſtit, vel præter modum aucto, vel diminuto, ideo de hoc tractemus. & primo de
aucta quantitate; ſecundo de diminuta, poſtea ad ſingularia membra deſcendamus. De
nimia igitur corporis craſſitie agenda, dicendum, quæ maxime vocata eſt. *μῆλα* à Græcis
homo vocatur excedens magnitudine. vacatur *μηνιχμία* abundantia cordis. aliquando
μηνιχμία hoc eſt incraraſſatio vocatur. igitur & *μηνιχμία*, & *μηνιχμία* & *μηνιχμία* improprie vocant
noſtri Latini, & præcipue, qui interpretati ſunt Græcos obſeſitatem, craſſitiem aliqui &
craſſitudinem; ſunt qui ventricofitatem tranſferunt: alii vero corpulentiam dixere. vnde
corpulentia, ventricofitas, craſſitudo, craſſities, & obſeſitas idem ſignificant, ex quo
Galenus Latine loquens, obefos præpingues, & craſſos vocat. de natura ergo obſeſitatis
tractemus.

Imprimis autem obſeruare debemus, quod corpus hominum tripliciter in quan-
titate excedit quantitatem ſymmetram. voco quantitatem ſymmetram: hoc eſt, in qua
maior pars hominum conuenit, quæ conuenit neque magno, neque paruo. Hæc exce-
dere ſolet tripliciter ex 2. aph. 3. 4. prima ratio exceſſus dicitur magnitudo *μῆκος* à Græcis.
ſecunda dicitur longitudo à Galeno *μακρότης*. tertia craſſities *παχυνσις* ibi vocata à Galeno, per 10
magnitudinem intelligit excedentem quantitatem corporis in longum, latum, & pro-
fundum: igitur quoties corpus fit magnum & per longum, & per latum, & per profun-
dum, illa dicitur magnitudo ſupernaturalis: & de hac non loquimur. altera longitudo,
quando corpus tantum per longum creſcit; & de hac nequaquam dicere intendimus. ter-
tia erat craſſitudo, in qua ſecundum Galen. fit incrementum nimium ſupra illud, quod
eſt ſecundum proportionem, ſecundum latum, & profundum, non autem ſecundum
longum: hoc eſt ita ad latera, veluti ad partes anteriores, & poſteriores; ita in intimis, ſi-
cut in extimis. Hæc eſt ergo obſeſitas, quam cum Galeno definire intendimus hoc mo-
do. Craſſities eſt tumor vniuerſi corporis adaucti, vel creſcentis ſupra id, quod eſt ſe-
cundum naturam latum, & profundum. ex quibus verbis colligimus hanc obſeſitatem
non eſſe morbum. nam quamuis ibi Galenus tumorem vocet, tamen non omnis tumor
morbus eſt; vt ſatis abunde dictum eſt in tractatu de tumoribus eſt enim aliquis tumor,
qui eſt ſymptoma, aliquis eſt morbus, aliquis ſupra naturam, id eſt, ſupra habitum natu-
ralem; nam plurimi obefi funguntur actionibus propriis integre, quamuis non ita valde
ſed dicenda affectio ſupra id, quod eſt ſecundum naturam.

Iſtius obſeſitatis quatuor ſpecies conſtituimus ex duabus differentiis eius. nam ratio-
ne naturæ conſentientis, aut non conſentientis reperio quandam craſſitiem naturalem,
& quandam non naturalem ex 2. de temp. 4. nam ſunt quidam tales obefi natura, aliquot
non natura, ſed acquiſiticia conſuetudine, qualitate facti ſunt tales. Si quis quæret quæ eſt
obſeſitas naturalis? eſt augmentum ſecundum latum, & profundum ſupra id, quod eſt
ſecundum naturam, in quo omnia correfpondeant cum naturali habitu corporis obefi.
voco naturalem habitum corporis illam temperaturam corporis, & partium, qua donatum
eſt corpus ab ipſa generatione. Et quæ erit? primum, vt mollities adſit in obefo; ſecun-
dum, vt adſit albedo vniuerſi corporis, nam habitus naturalis conſentiens cum obſeſitate
debet eſſe humidus, & frigidus; in humido, & frigido coſequitur albedo, & mollities. ad-
dite anguſtiam venarum non à pinguedine, non à carne factam, ſed à natura correfpon-
dentem habitui: quia habitus frigidus, & humidus habet venas paruas. addatis, quod
in hoc corpore non adſint ſigna inſignis caloris, vel ratione excrementorum, vel ra-
tione pilorum, & cæterorum. nam pili pauci ſubſtavi, & molles requiruntur ſi duri,
nigri, criſpati fuerint pili, iſta non eſt obſeſitas naturalis. Obſeſitas non naturalis eſt, 30
quæ non conſequitur ad habitum naturalem, ſed ad habitum per conſuetudinem ac-
quiſitum: cognoscimus hanc obſeſitatem: quia non correfpondent omnia obſeſitati:
habitus naturalis non reſponder, & ita in obefo non naturali adeſt plenitudo, & va-
ſtitas corporis; ſed color erit ruber, vel niger, durities calloſa, latitudo inſignis vena-
rum, quamuis non pateat ad ſenſum: tamen ſi liget Medicus brachium, videbit ad
ſenſum venas laciliſſimas, & ampliſſimas; igitur in his & color, & mollities, & angu-
ſtia venarum non repetitur, præterea excrementa nimis rubicunda ſunt, hiriſſi ſunt,
& piloli. Hanc non poſſum dicere obſeſitatem præternaturalem, commotus authoritate
antiquorum milles citata à Gal. quod conſuetudo eſt altera natura: quia per conſuetu-
dinem

Magnitudo

Longitudo

Craſſities

3. cum in 6.
aph. com.
ten. 39.
Deſinit.De quatuor
ſpeciebus ob-
ſeſitatis.Obſeſitas na-
turalis.Obſeſitas non
naturalis.

dinem obesitas hæc facta est, non à primordio generationis. Alia differentia est consti-
 tuens duas alias species obesitatis, quæ sumitur à morbosa, & salubri natura: & ita morbo-
 sam habemus, & salubrem obesitatem. Morbosam vocamus, quæ peruenit ad extremum
 magnitudinis, ita vt ledat actiones, vt habemus apud Rhāsīm 1.4. contin. & Galen. 2. de
 temp. 4. apud Auicennā 7. fen. 4. libri tract. 4. capit. 5. Apud Hippoc. in lib. de aere, aquis, &
 locis circa finem: ad extremam crassitiem solent isti morboſi affectus contingere. &
 primum, quo ad generationem, qui præter modum crassi sunt, solent esse inepti ad Vene-
 rem, neque illam solent affectare, & non percipiunt magnam voluptatem in coitu. so-
 lent tamen aliquando luxuriosi esse, & gignere plures masculos, & foeminas. Nōcōmē-
 10 tum autem, quod foeminis valde præpinguibus accidere solet numeratur ab Hippoc.
 vbi ait non solere concipere mulieres præter modum obesas: quia concūcatur os vteri
 ab omento, & non recipiunt semen: & si concipiunt, non retinent ob molliem, & si
 concipiunt forte, pariuntur abortum: & si pariunt, imbecillis erit fœtus. Non sunt salaces,
 non sentiunt delectationem coitus: ideo aduertant Medici circa fœtus pinguium: quia
 laxi sunt, & imbecilles, & cito corrumpuntur. Addatis, quod in hac morbosa pinguedine
 sequitur anhelitus difficultas. Adde cordis tremorem, & palpitationem: solet diarrhœa
 fieri cum, vel alterius materiæ succedere, pariuntur etiam sæpe dysenteriam ex Galeb. 2. de
 temp. 4. isti non possunt tolerare famem, nec sitim: quoniam cum habeant venas angu-
 stiores, si ieiunio infestantur, deficiente sanguine pauco, quem habent, deficiunt vires.
 20 Hoc confirmatur ab Hippoc. Rhāsī & Auic. locis dictis. Apperunt imbecilliter cibaria,
 quia humiditate nimia abundant, & (ex lib. de salubri dieta) scætant plurima pituita: &
 ideo semper laeguet appetitus, quamuis labantur vires obiciuntur. Adiungitur etiam
 hebetudo sensus: ego vidi, quod corium in vno ex his erat ita incrassatum, vt sensum a-
 mitteret ratione nimie impactionis neruorum: ineptiam habent ad motum, & per hanc
 ineptiam non solum intelligo motum diminutum, sed quia sunt multi motus, quos per-
 ficere non possunt, primo quoniam non possunt extendere brachia ad posteriora, vt ob-
 scænas partes mundent: pariter optime non possunt fricare caput, nec attollere formam,
 & ponere pedem supra genu, & in motu infinita alia incommoda patiuntur. præterea im-
 becillitas est omnium actionum, quæ etiam in sanis obesis reperitur. Est autem sana obe-
 30 sitas, quæ est coniuncta cum sanitate corporis ex Galen. primò de san. tuend. 5. vbi dicit
 obesos, & valde obesos sanos esse, non tamen sibi placere eorum habitum. sunt sani: quia
 obeunt ciuilia munia, commode equitant, currunt, iter faciunt & cæteras actiones admi-
 nistrant, gignunt, dormiunt, vigilant, itudent, & omnia alia agunt, quæ homo ciuilis age-
 re debet. Et quamuis huiusmodi crassities non ledat actiones, tamen non est utilis in seni-
 bus, sed periculosa: inde cœca est iuuentuti, & indecens ex 2. aph. 54. ideo est abigenda, &
 omni studio, diligentia, & ope Medica extirpanda.

Sed hoc non est satis: oportet scire quomodo fiat hæc obesitas: Fit dupliciter, vel su-
 perabundante pinguedine, vel carne. si superabundat pinguedo, crassities, vel *injetis* dicitur,
 si caro, *injetis* vocatur. Quomodo abundat pinguedo? ex Galeno in omni genera-
 40 tione sanguinis semper gignitur multa copia pinguis tenuis & levis materiæ, quæ oleo-
 sa est, ista in corporibus calidis & siccis solet esse pabulum calidi innati, & ita non apparet,
 sed in habitum conuertitur, & exhalat. Huiusmodi oleum in omnibus animalibus gene-
 rat, in habitibus frigidioribus, & humidioribus. cum calor ille sit moderatus, ex isto o-
 leo quid sit transfunditur à venis ad extrinsecas venas, quia cum tenuis sit, penetrat, & extrudi-
 tur extra venas. & cum quicquid est extra venas, vel sit pars frigida & siccæ membranosa,
 ossæ & cartilaginosa, vel sit pars carnosa calida, & humida. si hoc oleum accedit ad pri-
 mam partem, sit pinguedo, & sic sunt corpora pingua, non obesa. si accedit ad carnosas
 partes, quæ si sint calidæ in halitum vertunt illud oleum, sed si caro vel ratione otii, vel a-
 50 lia ratione defecata est, & imbecillis redditus sit eius calor, tunc augentur carnes, & cor-
 pus non solum pingue, sed obesum dicitur. At ratione carnis fit hoc modo, quia partes
 carnosæ sunt robustæ, & aut hauriunt maximam quantitatem sanguinis, vel quia vasa angu-
 sta transfundunt maximam copiam sanguinis, qui fit caro, & augentur muscoli, & crescit
 corpus per incrementum carnis. Hic est geminus modus, cui addamus tertium,
 quando ex vtroq; fit crassum corpus nostrum: plurimi sunt obesi
 ratione pinguedinis: rari, carnis ratione: frequen-
 tissimi, ratione vtriusque.

Quid esset corporis crassities, uti fieret, & eius species quot sint, diximus: nunc videamus causas, deinde signa, tertio præsignia, & tandem veniamus ad curationem. Causas omnes distinguunt in duo capita, in internas & externas. in primo loco externarum sunt aer frigidus & humidus ex Galeni: unde apud Scythias, in quibus vigent frigora, reperiuntur obesi præter modum corpora. Quies etiam obesa reddit corpora: quia refrigerat calorem, & non absorbitur alimentum. addatis motum temperatum, quia tantus sit, quantus satis sit ad eliquationem materiz. fricationes, inunctiones replentes, & balnea sunt etiam causæ obesitatis. præterea est somnus longus, quoniam in eo non fit digestio & exussio materiz. verum omnia superantur à copia ciborum multum, & cito alentium, primum inter hæc locum habent vina crassa, dulcia, & parum differentia à sanguine. unde habemus vinum maritimum ibidragum vocatum, quod ex Illyria affertur. Inter causas internas connumeratur primum, robur carnosum generis, ita ut maximam copiam sanguinis attrahat: & ideo multum crescat: sanguinis etiam nimia copia soler esse causa obesitatis: sicuti etiam maxima copia oleosæ materiz est altera causa materialis obesitatis. Venarum angustia, quoniam eum non multa eongeries sanguinis in venis fieri possit, necesse est extrudi extra venas. potissimum est habitus frigidus & humidus, quoniam in eo oleosa materia, & sanguis abundat, & non resoluuntur humiditates: sed oportet, ut frigidas non sit intensa.

Signa obesitatis non sunt erranda, quia patent ad sensum. sed signis eognoscuntur species obesitatum: nam una naturalis, altera non: una morbofa, altera salubris est. color albus, mollities cutis, pilorum defectus, venarum angustia indicant crassiciem naturalem. si color subruber, vel niger, cutis dura. pilorum abundantia, venarum apertio, tunc erit non naturalis. Cognoscitur etiam obesum corpus ob pinguedinem: quia albedo est nimis candida, laxitas vniuersi corporis cum flacciditate partium, frigiditas ad tactum, quæ est pinguedo Carnispiruli: ita enim illud de pingue. Obesitatem vero ex carne adaucta cognoscimus primum ex soliditate molli corporis, indicatur ex colore albo cum rubore admixto, caliditate ad tactum insigni, verum leni, non mordicante. adest robur maximum virium in omnibus actionibus. si attripiant hominem supra thoracem, & constringant, suffocabunt, & dimouebunt, veluti si palea esset. Si vero sit crassities morbofa, eognoscitur à symptomatibus: si salubris, cognoscitur, quia non adest impedimentum.

Præsignia, quæ possunt in pinguedine proferri, hæc sunt, ut sit semper suspectus habitus crassius & obesus. ratio est ex Gal. quoniam facile patiuntur ab Internis causis, aut salubris, aut insalubris sit obesitas: patiuntur enim ab obstructionibus, à feruoribus, &c. præterea, qui obesi sunt, etiam si salubres sint, facile moriuntur 1. aph. 44. Instant Arabes, & dicunt, quod per se non subiciuntur obesi huiusmodi periculo: quoniam vita consistit in humido, ergo obesi diutius viuere debent: quia habent multam materiam pro alimentis, & caloris. Verum si obseruemus quæ consequuntur, cum nimia fuerit crassities, facile calor suffocatur. præterea cum subiliciantur accationibus internis, facile suffocantur, & alteratur calor in ipsis. huius rei reddit rationem Galeni in com. illius aph. & dicit, quod brevis vita pinguium, quia deest sanguis copiosus, in quo sustentatur calor: eo quod venæ sunt angustæ, & est ratio contraria Arabibus. præterea (dicit) non multus est spirituosus calor: quia arteriæ primum natura angustæ sunt, deinde ab abundantia carnis, & pinguedinis coarctantur ex Galeni. & ita non possunt copiosum calorem ad corpus deferre: si nobis tractandum est obesum corpus, potest ne sanitati restitui? si non est confirmata obesitas difficile sanantur, si diuturna difficilius, si est naturalis, & diuturna, multo difficilius, tamen omnis obesitas vinci potest.

De Indicationibus curatiuis.

CAP. V.

Quomodo autem obesitas ista superabitur? Nos dicebamus, quod causa obesitatis est habitus frigidus & humidus: humidus præcipue cum moderata caliditate & frigiditate, qui aut sit acquisitiuus, aut naturalis. si hoc est, necessarium est, ut nos in superanda obesitate habeamus scopum mutandi huiusmodi habitum. in obeso corpore abundat humida materia, necessarium est conuertere in siccitatem, & caliditatem oportet ergo, ut nos inuotemur istum habitum: & sic obesitas exicabitur ex Galeni. sed assequemur hunc scopum duobus modis, primo discussa omni humiditate, quæ iam congesta, & compacta est: non possumus facere hoc, nisi pinguedinem, & carnem eliquemus, & post discussimus.

mus. secundum agendum est, ut nos impediamus nouæ humiditatis generationem, & additionem. Hoc autem fiet vel subministrato minimo alimento, vel ut mali succi sit alimentum, non respondentis pinguedini, ita ut partes potius fugiant, quam attrahant, vel alimentum sit paucum, ut non possit pertransire ad loca reficienda, aut quod viscera sint præter naturam affecta, ut bonum non restituat alimentum: vel obstruenda sint.

Quibus autem instrumentis hæc assequemur? sicut res non naturales possunt replere corpus, ita etiam euacuare ex Galen. & Hippoc. sicut aer frigidus & humidus replet, ita calidus & siccus exiocat eliquando carnes, & absumendo. in hoc casu æger sub Sole sit, & si potest esse nudus, eo melius, quoniam si sit in aere calido & sicco, & sub sole: maxime siccatur corpus. si sit in loco frigido, & corpus sit nudum, frigiditas repellit calorem, & facit bonam concoctionem, & impedit transfusionem materię à venis ad extra venas. Nos habemus præceptum Orib. apud Rhafim 14. contin. ut non solum sint sub sole, sed obruantur arena, & cineribus. & ego expertus sum, & experientum optimum est, dummodo sit obesitas naturalis, & non adfictorium durum. pariter si lutemus cretaceo luto, vel luto montis Ortonis facit ad summam maciem, non solum in particulis, sed in vniuerso. accipimus enim lutum, & dissoluimus aqua thermali, vel chalybeata, & vngimus corpus, & exponimus soli. solemus autem obruere arena, vel luto corpora, ne obducantur crusta, corrumpantur, exiccantur, arescant, & vlcera oriantur, atque rimæ contrahantur.

Adiungitur motus, & quies: quoniam quies aliquando, quæ labefactat virtutes partium, solet extenuare partes: quamuis motus moderatus impingat, tamen inter causas potissimas gracilitatis motus connumeratur: sed debet esse motus vehemens, acutus, inducens ad laborem, & laxitudinem, atque sudorem. Exercitationes sunt luctatio, equitatio, lusus pilæ vel paræ, vel follis magni, follis agrorum, lusus ferræ, & dimicatoria exercitatio: sed inter omnes Galen. numerat cursum vehementem. Ex quo colligo, quod inter omnes exercitationes nulla potior est cursu: non quia difficilior, & maiorem sudorem faciat: sed quia obesi hæc exercitationem facere possunt. Dimicatio periculosa est, ne defodiantur oculi: non possunt equo vehi, ne rumpatur dorsum equi: non ludere pila, ne eadendo nasum comminuant: nullus est, qui currere non possit, quamuis cursus non sit ita validi. Sed in hoc cursu hæc obseruanda sunt. primo, ut fiat ieiunio stomacho, ne repellantur artus: secundo, ut statim post cursum non comedas sed sinas, ut refrigeretur corpus: postea accedat ad balneum, & demum cibetur. tertio, ut præparetur corpus ad cursum: præparabat Galen. frictionibus linteorum duorum, donec rubesceret corium, deinde oleo resolutorio vngebat, quod describitur ibi à Galeno & 14. method. 5. & constat ex oleo veteri cocto cum althea, aristoloch. opop. &c. quod in officinis resolutorium vocatur. sed si non adest: omnia olea acopa bona sunt, vt ol. lil. alb. simp. & comp. cum arom. ol. irinum, ol. de spica cum arom. quæ resolutientia sunt. sed vnum notare, quod cum dixerim: præceptum esse necessarium, ut isti post cursum quiescant, contrarium proponitur ab autore libr. de salub. dieta, qui dicit, ut statim anhelosi sumant cibum. dicit Galenus in eom. ideo autorem dicere hoc, ut celerrime replentur corpora. Hoc autem facit ad extenuationem: quia non nutriunt: quoniam dum attrahuntur cibaria violentè, inconcocta, & cruda sunt. & ideo non facile fluunt, nec possunt reficere corpora. Præterea faciunt obstruções in visceribus, nisi istæ sint causæ, ex Galeno possumus colligere, quod sibi non placeat: quoniam morbosum corpus efficeretur. igitur quiescant post exercitium ex Gal.

Somnus, & vigilia impingunt corpora, si moderata fuerit vigilia. ideo contrarium est instituendum. plurimum vigilandum est. studeant obesi, & vigilent, ut fiant graciles, sed, si quis studeat, & postea dormiat, vel fuerit in otio, non fiet gracilis. parum dormiat superlectum durum, non in pluma, nec in strato molli: quoniam dura cubatio semper contundit partes, & impedit appositionem alimentii: ideo dormiat supra tabulam, ut mæteretur. Addatis excrementa corporis, facite, & fæces, & lotia excernantur, & subducantur. & ita clysteres acres quotidie imponendos curates: quoniam necessarium est ex Auic. ut distributio alimenti impediatur. postquam ergo concoctus cibus est in ventriculo, statim facite, vt fæces excernantur, & bonæ sunt aliquot pillule ad hoc. & ego ex aloë familiares habeo, & mando, ut quotidie vnam sumant ante cibum: sed hæc non sunt bonæ pro senibus, vt Addatis & animi passiones, quæ maximi sunt momenti. Monet Arabes, vt semper maledicamus illis, nuntia mortuorum amicorum, atque parentum afferenda, oburgandi sunt, culpandi, iniuriis onerandi: quamuis ego viderim homines continuo liuore vexatos, & perturbatos, impinguari. ideo obesi negotientur.

Fama

Pillularia,
Sicut enim.

Sicut enim.

Coma.

Sicut enim.

Sicut enim
quod
Sicut enim
Sicut enim.

Sicut enim.

Fama

Sicut enim
Sicut enim.

Sicut enim.

Sicut enim.

Sicut enim.

Sicut enim.

Veneris ratio habenda est, nullus est habitus, in quo tantum venus profit, quantum in obess, ut in tantum possent, quantum opus est: sed non sunt salaces, ineposissimi aligent. Vicius ratio tenuis, & attenuans habenda est, per tenuem intelligimus victum exhibentem paucum alimentum, paucum alimentum potest haberi a victu vel paucum exstante in quantitate, vel magno in quantitate, quod parum alat, & ideo comedant semel in die, sed parum comedant dicit Gal. in lib. de salub. dieta. Unica illa vice, si demus carnes bonas, vel panem, demus quam minimum, sed si famelici sunt: Ego habui obesos, qui omnia subibant, ut extenuarentur, ac in vno prandio comedebant tantum, quantum comedunt quinque homines, ad minus enim duos capos deuorabant. Ego vidi lachrymas exundantes præ fame ab oculis eorum. Galen. monet nos, ut exhibeamus panem furfuraceum in aqua si multum comedunt, multum cacabunt. Mandant olea quantum voluerint, ut est lactuca, spinachia, &c. præterea fercula exhibemus ex oryza, ex milio, & si possent comedere panem ex forgo, extenuarentur spatio quindecim dierum. Inter carnes, nulla potest exhiberi: quia omnes alunt, bibant aquam. Dices ru, vis siccare, & aqua humectat, & refrigerat, exhibite aquam cum aceto, & ego vidi ex vfu solo oxyerati, vel aquæ chalybeatis sanatos. Vicius attenuans est, quod parum nutrit, sed attenuat, & plurimum locum tenent in hoc caro, & pisces saliti. Præterea caseus antiquissimus salitus. Olera omnia acuta, ut allia, scalongia, cæpe, & bibant aquam, si voluerint, & habeant hæc omnia cruda, vel cocta, comedant radices raphanorum, erucas, & possumus eo quere admixto aceto. Er quamvis Rhafes dubitet de aceto: quoniam discutit valde: ego tamen dico, quod discutit exiccando. Ego vidi potantes quotidie spatio 40. dierum cyathum, sex, aut octo vnciatum emaciatis aliquot reperi, qui coquebant acetum cum semine fenic. vel anisi, vel petroselin. asparagi amari ex montibus cibum præstant ad hoc commodum. Item caules tenues, & stiones ex rusco, ex bonifacia herba: & omnia cibaria calida & sicca præstantissima sunt. vnde vfu cinn. caryoph. pipetis, & omnium aromaticum præstantissimus est. Potus sit aqua, vel vinum acerrimum, & calidissimum in parua quantitate, vel posca, multum vinum replet corpus. possumus ne istis alia ratione extenuare: Per medicamenta, de quibus agere iam tempus oportunit est.

Imprimis autem duo medicamenta notanda sunt, primum est propositum a scriptoribus euacuans, ut sunt, quæ euacuant per sudorem, vel per lotium, omnia generaa. 30
piorum bona sunt, asparagi amari: quæ leniunt aluum, sunt præstantissima, & ideo pillulatum continuus vfu præstans est. sed quis dicit euacuatio per sectam venam conuenit nullus de hoc mentionem facit: quia in his, ut plurimum, non abundat sanguis, cum habeat venas angustas, sed Galen. dicebat, quod copiosus missus sanguis in obess, periculosus est, quia illi facile patiuntur, si paucū sanguinem mittimus, nihil erit, si multum, non perferent vires, ideo tantū purgantibus mediocribus est lenienda aliū. At medicamenta alterantia quæ sunt: quæ habent vim siccandi & digerendi, vnde ruta, & quamuis Galenus laudet syluestrem, tamen hortensis præstantissima est: ego laudo, ut isti comedant rutam, sicut decocta, & electuaria ex ruta. addite aristoloch. totund. addite centaury. minor, cui parum sidi, quia lotia sanguinea prouocat. addatis gentianam, possumus monentium. 40
sal viperinum, quia est præstantissimum pro morbo articuli. Troscisci vipetini præstantissimi sunt. Memini cuiusdam compositionis Gal. in lib. de Antid. Theriaca præstantissima est. sed Arabes addunt laccam, & suam sandaracam matutina hora. addunt composita hæc: veluti acetum squilliticum, non dico oxymel squilliticum, quod perferre non potest stomachus: nam acetum statim petit fundum, & hoc facit conuulsiones, & actiones molestas in ventriculo. ac oxymel id facit ratione mellis, quod supernat, & manet in ore ventriculi. ideo cochlear accipiant aceti squillitici, procul dubio extenuabuntur. Ego mactero eam cum vj. aquæ marinz matutina hora assumptis aliquando troscisci vfu sum de lacca, de rhabarb. de absynth. & confectio anacardina habet principatum, quam matutina hora capiat in parua quantitate.

De Gracilitate.

CAP. VI.

Sicut enim.
Sicut enim.Sicut enim.
Sicut enim.

Sequitur dispositio quedam superiori penitus contraria, quæ variis vocibus nuncupata est, eam Gal. tribus vocibus vocare solet. *maiores* enim, hoc est tenuitas, appellatur. *inermis* hoc est gracilitas, *maiores*, id est, attenuatio, quamuis etiā attenuatio significet motū, per quē introducitur gracilitas. Nostri vocant gracilitatē maciem, vnde gracilia & emaciata corpora vocantur: dicitur quineriam tenuitas in libris Arabum, & recentiorum extenuatio vocatur, in qua affectione videamus quid sit, quo modo fiat, quot species habeat, deinde quot sint cause, signa, & quid præsciendum?

Sicut ergo tripliciter excedit quantitas, ita etiam huiusmodi gracilitas, & attenuatio
 trium generum est: quando corpus attenuatur; ita, ut sit breuius, & tenuius, quam conue-
 niat secundum larum, & profundum: & sunt pusilla corpora, ut pygmeorum. aliquando
 deficit quantitas in longitudine tantum; & ista dicitur breuitas: aliquando solet diminui
 secundum larum, & profundum, & tunc est macies, gracilitas appellata. ex his colligimus de-
 finitionem, & dicimus cum Gal. quod macies est totius corporis molis ablatio secundum
 larum, & profundum infra id, quod est secundum naturam. nam quoties tumor natura-
 lis, prominentia partium secundum larum, & profundum est ablata in vniuerso corpore,
 dicitur macies: nam, si est vnius partis, potius dicitur extenuatio: & est affectio, quæ non est
 præter naturam, sed infra id, quod est secundum naturam. nam recedunt partes ab habi-
 tu naturali tripliciter, aut præter naturam, quando laborant morbo: aut supra naturam, quæ-
 do laborant obefitate: aut infra naturam, quando laborant macie.

Sed macies duplex est, vna est, quæ est morbus, & consequitur ad tabem, alia est non
 morbosa, in qua actiones oportune sunt, & hæc infra naturam dicitur. Huiusmodi co-
 gnosci oportet species, quæ oriuntur ratione trium differentiarum, ita ut sex sint species:
 vna est naturalis, altera non naturalis, & idem dicimus per contrarium, quod diximus
 de obefitate. Naturalis macies, est quando habitus consentit cum gracilitate, & hic habi-
 tus duplex est, aut frigidus, & siccus, aut calidus, & siccus. non naturalis est, quando
 nos videmus, quod non respondet habitus naturalis viscerum cum gracilitate: ut quum
 habitus est frigidus, & humidus, vel calidus & humidus, & gracilitatem habet. Aliæ
 species sunt, ut nos cognoscamus morbosam, & salubrem maciem: morbosa est coniuncta
 cum morbo, cum tabe, ut aridi facti sint, hirsuti ægri, & consistere non possint. Salubris est,
 quando ciuilia munia perficere omnia possunt corpora. alia species est, quando macies est
 confirmata, in qua non solum carnes, & partes pingues consiciuntur, sed etiam cutis est e-
 maciata, & contracta, & siccata. contra autem quum videmus attenuatam pinguedinem,
 & carnes, & laxam, & flaccidam, & mollem cutim, tunc non est confirmata macies. Hæc
 colliguntur ex Gal. in loco dicto epid.

Modus autem, quo fit macies, triplex est, aut per eliquationem tantum pingue-
 dinis; vel per pharmacum; vel per laborem insignem. alter modus est, quando non
 solum pinguedo, sed etiam caro absimitur, & hoc prouenit à validiori causa; tertius
 modus est, quando non solum pinguedo, non solum caro, sed etiam humiditates, quæ
 sunt in corio, & partibus spermaticis, consumuntur. & hæc est potissima & consummata
 macies.

Cause maciei distinguuntur in internas, & externas. externæ sunt omnes cause,
 quas laudabam pro cohibenda obefitate. nam primò ipse Hippocr. in libr. de aere, aquis,
 & locis. Galen. 5. de sanit. tuend. 2. proponunt aerem calidum extenuare corpora; unde
 incolentes loca calida graciles sunt. aer etiam fit arte calidus. Vnde mora sub sole, nuda-
 tio corporum, consistentia sub arena, vel puluere, exercitatio immoderata, lotiones in
 aquis thermalibus, frictiones validæ, natationes in mari, eursus, saltus, lusus pilæ, vigi-
 liæ, omnia hæc extenuant. adest etiam diarrhœa, qua colliquantur carnes & pinguedo.
 quoties ergo fluxus ventris adest, adest extenuatio, euacuatio etiam per lotium insignis
 facit macilentos. Vnde diabetici maciem habent. addatis animi passionibus. Veneris usus
 pessimus est. Verum ratio alimenti primas tenet. & est alimentum extenuans tenue vel
 potentia vel actu voco, qui in pauca quantitate subministratur; qui vult
 non esse macilentus, non parum comedat. similiter victus potentia tenuis hoc est parum
 alens, idem facit. Verum etiam alimentum attenuans idem præstat, ut allia, cæpe,
 cinnamomum, & aromata: sed addatis medicamenta: mille obesi facti sunt tenues
 post pharmaca exhibita soluentia, Antidota diuturna, & purgantia. Ex quo Gale-
 nus dicit, quod aliqui ex continuo usu theriacalium salium mortui sunt, adeo extenua-
 ti sunt.

Internæ autem cause sunt istæ. prima est sanguinis defectus; quia non tantum o-
 leum est in sanguine, nec tantus sanguis deferretur ad musculos, ut caro gigni possit; ideo
 necessario fit macies. non est autem tantus sanguis, vel quia vitiosus non possit distribui,
 vel quia nimis paucus sit in venis. Quomodo vitiosus? Hoc vitium exponit Auicenna,
 quod est duplex vel in substantia, ut si sit nimis crassus, vel non possit egredi è venis, vel
 per qualitatem, quando biliosus amarum effectus abhorretur à partibus, & non attrahitur.
 alia est causa interna, quam proponit Galenus & est facultatum ipsarum imbecillitas.
 explicat duobus modis, primo quando dicit; non fit bona distributio, secundo, quando prædicit,
 non fit in partibus concoctio bona. quid sibi vult? hoc est quod facultas attractrix par-

tium carnosarum non est adeo valida, ut attrahat sanguinem, vel quoties concoctrix mala erit, quia quando non bene concoquunt, non bene immutant, succedit macies. Rhases, & Auic. dicunt, quod quoties expultrix peccat, ita vicius expellat sanguinem, vel quoties attrahitrix non tantum attrahit, fit macies. de quo etiam Gal. Addunt tertio in loco temperaturam totius corporis. nam duæ temperaturæ necessariæ faciunt maciem, vna est calida, & sicca, potissima autem est illa, quæ est intemperies frigida & sicca. In his autem duobus debemus nos hoc obseruare, quod possunt esse naturales, & acquisitæ temperaturæ, & utraq; faciunt ad gracilitatem. Rhases & Hipp. in lib. de acre, aquis, & locis capit tertio notat, quod magnitudo, scirrhus, & crassitudo lienis emaciant corpus, & hoc experimento cognitum est. reddit rationes plurimas Auic. reddit vnam Hipp. & dicit, quod lien crescit absolvere, veluti spongia, omnem sanguinem, vel bonum, vel malum: addit Auic. primo, quod lien cum inculcet hepar ob magnitudinem, refrigeret eum, & fiat mala concoctio sanguinis secundo, quia facit obstructions in hepate, & est causa, ut non fiat distributio: addit aliud ab Auic. 3. canon. ubi loquitur de fame, quod, qui laborant vermibus in ventriculo, & intestinis, macie afficiuntur: & hoc patet in puerulis: etenim turgidos vidimus infantes sensim emaciar. matres solertes ponunt os ori, & sentiunt prauum odorem, & cognoscunt. Neq; solum vermes con crescentes in ventriculo, sed etiam prauum odorem, vel alia parte, emaciat. Nephriticæ affectiones causæ sunt maciei: addunt resolutionem nimiam ob calorem, sed hæc refertur ad alias causas.

Cognoscitur autem naturalis macies, quæ venæ sunt lætæ, corpus pilosum, color subniger. hō naturalis, quum color albus, venæ angustæ, & corpus molle & glabrum est. Maciem morbosam indicat morbus præfens: maciem salubrem indicant actiones præstantes, de qua loquitur Hipp. in aph. & dicit, quod diuturniorem vitam producit, quam obesitas, quia non adest occasio suffocationis caloris. ista autem macies, ex Galen. est, quæ facile patitur ab externis, ut ambiente calido, & frigido: sed obesi magis patiuntur ab internis. Macies non confirmata, cognoscitur, quoties cutis est laxa, & potest deduci à subiectis paribus, contra quando nos videmus, quod cutis dura, contracta non potest diuelli à subiectis partibus, erit confirmata, & ideo duobus, vel tribus verbis Hipp. explicabit has species in illo tex. 29. 3. sect. 6. epid. quando dicit in macie primū laxatur cutis, deinde contrahitur, quando macies fit, vel est facta, non confirmata, tunc cutis est laxa. tunc est confirmata, quum corium siccat, ut si ex vitæ educamus vinum, aut oleum, & etiam aridum, & solidum reddamus.

Quando habemus istas macies, quid est sperandum? non naturalis, & non confirmata facile restitui potest, dummodo non adsit morbi impedimentum. Et ideo optime videaris eum maciarum, habitum, & præterita, & præsentia signa inuestigatis. secundo macies naturalis non confirmata difficilis est curationis; naturalis confirmata difficilior est. macies morboſa sequens marcōrem, & tabem, insanabilis est, nisi per miraculum.

De Maciei curatione.

CAP. VII.

Quomodo ergo erit repletum corpus? non est dubium: tota ratio consistit in his tribus capitibus, ut nos paremus bonam concoctionem, bonam distributionem, & apta materia subministraretur in qualitate & quantitate. Hoc fiet duobus præſidiis, ratione victus, & reliquis rebus non naturalibus, atq; pharmacis. de rebus non naturalibus mutare omnia, q̄ diximus in curatione obesitatis. Eligite aerem calidū, & humidum, vel frigidum, & humidum. quietem, & motum moderatum. mora in balneo moderata, præstans est etiam replet artus, non extenuat. frictiones molles rubram cutim reddentes. sed etenim duo sunt frictionum genera, molle, replens, & durum, constipans. nos autem lenibus lintheolis fricemus, donec rubrum fiat corpus. deinde duris lintheolis breuiter fricetur cutis tribus, vel 4 vicibus. quia constipando non fit exhalatio. Constipanda autem cutis post frictionem, vel per balneū calidū, vel aqua frigida, si virtus fuerit robusta. & ita necessario manet humiditas in partibus, & apponetur. si autem corpus non sit robustum, venite ad vñctiones olei visceris, & non resolutionis, ut ol. oliuarum maturi, vel omphacini; & si rosatum fuerit, præſtabilis erit. ol. amig. dulc. ol. pineorum nucleorum, vel ex pistachijs præstans est; quia humectat, & adstringit. Ad hoc facit somnus multus. & ego memini, quod volentes impinguare suos, accipimus farinam liliaceā, coquimus, & damus, ut forbeat sues. Somnus profundus inducitur eis, & maxime pinguescunt. Vnde laudo lactucas, vel lac, seminis papaueris, vel hyocyami. Addatis animi passionibus: læta quærant, fugiant graua. Venus fugienda, & qui volunt pingues fieri, castrentur. Vnde Eunuchi sunt pingues, molles. solemus autem castrari,

- strari, & mente, & gladiolo. Castreminime, castrando appetitum vestrum. Cibaria sunt contraria attenuationi. & primum sunt boni succi, & facili concoctionis. sed quædā sunt peculiariora, & primum locum tenet lac, quod quanto erassius, tanto opportunius. Ne- que solum in prandio, & cœna, sed in matutina hora ante prandium sex, vel quinque horis. lac vaccinum primas tenet; secundas ouinum; tertias caprinum; quartas & ultimas asinum, & humanum. & quamuis butyrum sit opportunū, tamen lac non sit ex animali præter modum pingui, ne fluat in ventriculo. Secundas adscribimus ferculo factō vel ex cremore cicerum, vel ex cremore optime coctō fabarum, vel ex medulla panis, optime & diu cocta in aqua, vel iure. & Illustrissimæ istæ Venetæ vtuntur. sed necessarium est, vt accipiat quam tenuissimam substantiam, quæ, nisi attenuetur, non impinguat: quia non habet celerē appositionem. vnde bulliat panatella spacio quinque, sex, aut septem horarum, vel etiam octo cum maxima copia aquæ: nam, si non ita bullit, obstruuntur viscera. & hanc capiunt post, vel ante cœnam. vos testes esse potestis coloris, & pulchritudinis sanguinis illatum. si autem exhibeamus cremorem cicerum, aut fabarum, pingua fiant fercula butyro. Succedit substantia amygdalarum optime cocta, & pinei nucleī cum panatella. Sed defertur quædam nux ex Indis, quæ Indica nux dicitur, quæ, si rancida non est, sed recens, si pura comedatur, vel ex ea panatella conficiatur, primas tenet in incrassando. at notate, ne rancida sit, quia non distribuitur, sed siccatur, & attenuatur. Quæ autem sint cibaria boni succi, nota sunt sed cibi bene, & cito distribuantur. In qua re ego repetio Gal. dissentientem ab Auic. Auic. monet, vt nō vtamur balneo post cibum; nec frictione, nec motu impingundū. Gal. vult, vt vtamur balneo: vterque tamen benedicit. sed potius videtur ratio Auic. quoniam si motus, & balneum sequitur cibum, fit attractio crudi cibi. Gal. hoc vidit, & dicit hoc idē, quoniam succedit obstructio. sed non ob id debemus omittere balneum; nam possumus succurrere obstructioni capparīs floribus cum oxymelite: & ego sum istius sententiæ: quod quando volumus extenuare obesum, debemus aduertere, quod febris succedat, quæ etiam attenuat, & floccificat febrem Medicus, dummodo diligens sit. ita non curanda obstructio; dummodo expleamus, & cito agamus: ego potius inclino in sententiam Gal. quam Auic. quia tarde impinguitur corpus. ita monet Gal. vt Interrogemus sæpe ægros, an patiantur grauitatem in visceribus.
- 30 Solebant antiqui medicamentis hoc tentare, hoc est attrahentibus sanguinem ad partes, & habentibus vim calefaciendi, & humectandi: inter quæ primum locum tenent acopa, & vocatur illa acopa, quibus vtuntur Medici ad lassitudines tollendas: nostris temporibus est oleum resolutiuum, ol. lilior. alb. cum arom. oleum irinum, ol. de spica. secundum locum tenent dropaces, & sunt medicamenta, quæ ponebantur cuti, vt educerent ad superficiem materiam, & erat picatio, quæ fit ex pice. & tantæ erat authoritatis, vt istud solum replere posse corpus testetur Galenus & Auicennas in mille locis. Picatio fiebat hoc modo. Primū radebant corpus vniuersum ex primo. de comp. med. loc. 4. quia pix hæret corpori, & facit eruciatu, si pilis applicetur. Secundo capiebant picem siccam, & addebant oleum, vel commune, vel amygdal. dulcium, vel aliud calidum, & humidum, quod fiebat mollis pix. Hoc medicamentum ex Gal. calefacit, & humectat corpus: si ratione picis hoc diceret, falsum esset: quia pix siccatur. Haec ratio dico, quod diluebat pix oleo calefaciente, & humectante. At, si vos viderini, habeatis picem veram bonam: nam in hac regione Veneta non habemus picem siccam bonam. habemus pro ea pissasphaltum, & diabolicum est medicamentum, facit exstare nares, nimis acre, nimis siccans est. Habeatis ergo picem siccam delatam ex Alemannia. de pice liquida potestis coquere cum aqua: quia fiet solida, & dura: vel sine aqua: & erit actior, postea diluat is aliquo ex oleis prædictis, & habebitis medicamentum præstantissimum. modus autem applicandi picem hanc, talis esse debet. Primo corpus vniuersum pilis exuendum. Secundo incallescendum, vt plenius reddatur, hoc autem fit balneo aquæ calidioris, non calidissimæ, vel fritione: & statim pix applicanda subacta aliquo ex dictis oleis calefacientibus, & humectantibus, & quamuis reperiamus multos valde eliquantes picem, alios non ad dentes oleum, tamen curate vos, vt habeat corpus viscidum, & tenax. quum præparata est, extendatur supra lineæ, quæ possunt applicari. accipiuntur lineæ, apponuntur ad ignem, donec liquida fiat pix, & statim ponuntur in parte, dum refrigerari incipit pix: postea auellitur, iterum calefit, & imponitur ter, vel quater, donec valide rubeat membrum: & turgidum factum demum oleo communi, vel amygdal. dulcium inungendum est, talis est modus picationis. Hora est matutina, vel vespertina: hyeme vtræque hora commoda est: at in æstate monet Galen. vt semel picemus: quia actio molesta est, & facit aestuare corpus, nec potest ita perferre. præterea quandoque quotidie; alterius quan-

doq; diebus, aliquando quarto quoq; die picamus ex 14. merh. 16. & de offic. med. cōmentario 3. com. text. 32. pro necessitate, & conditione affectus, si magnus, vel parvus fuerit, & pro corporis temperatūra: postea veniamus ad munditiem cutis, quoniam pix colorē deturpat: vide aliqui nimis pulchritudini stūdentes hoc medicamentum ferre non possunt. sunt enim nigerrimi, & nec oleo, nec sapone purgantur. vnde opus est vti medicamentis dicendis pro deterfione.

Preparat.

Si non possunt perferre picationem, venimus ad dropaces, cuiusmodi est nitrum, sulphur, pyrethrum, piper, thapsia, euphorbium, quæ habent vim attrahendi ex alto, quæ dissoluta cum humedante medicamēto, conseruant humiditatem. vnde thapsiam melle miscemus, & illius vniuersum corpus. sed vtimini in paucā quantitate, vt rubrum fiat corium, non inducat vesicas, euacuet materiam, & non impinguet. & ideo notate bene. Solemus etiam vti huiusmodi medicamentis cum cerato aliquo, veluti cum humido cerato facto ex cera, & oleo puro. vel cerato ex ol. amygd. dulc. & hoc cum cerato vtimur, quando diu debet consistere medicamentum; cum melle, quando volumus, vt interius penetret: cum oleo, quando breui debet consistere. Solemus aliquando sinapi cum cæicis mixto vti. finis autem horum medicamentorum est, quum coriuth rubrum redditum est. quo facto, statim abluamus huiusmodi medicamenta. si erunt cum oleo, vel cerato, non tentate deterfionem cum aqua, si mixta cum melle aqua tepida detergatis. Facta deterfione, inungatis oleo dulci, vel amygd. dulcium.

Ablutio medicamenti a vno.

Elab. primum.

Solemus etiam propositis medicamentis ab Arabibus vti, ego autem vsus sum hoc elect. Accipio amygd. dulcium, nucleorum pineorum, pistachiorum mundatorum, seminis fœami, auellani. mundatarū ana vnc. i. pulueris tereb. siccoris (quæ defertur ex Cypro cocta in aqua, & si nō est, ego coquo, vt docet Aëtius pro trociscis cyphi) vnc. med. carnis nucis Indicæ, vnc. ij. sarcocollæ drach. ij. sem. papau. albi vnc. i. & med. sacchari q. s. teruntur, terenda, & formatur electuarium dissoluto saccharo communi aqua. hoc assumitur quantitate trium, aut quatuor cochlearium maritima hora: & si super dormitur, optimū est. Medicamentum hoc ratione simplicium magnam vim habet, & experimento confirmatum est. Hæc sunt satis pro impinguando corpore vniuerso. si autem talem suscipimus curationē est sepe, quando post tabem macies succedit. Macies. h. naturalis potius affectatur pro agilitate: nisi sint mulierculæ, quæ cupiunt obesse, & turgidulæ videri. ideo potius non solemus partes tractare, vt omnes in vnum conspirantes corpus efficiant pulchrum, atque decorum.

De Diminutione vel puritate alicuius membri restauranda.

C A P. VIII.

Epilogus doctorum.

TRactantes de repletionē vel temperamēto vniuersi corporis dicebamus, quod aut secundum naturam aut non secundum naturam emaciati, dummodo macies morboſa ac confirmata non sit, quæ agenda sint circa victus rationem & in corrigendis rebus non naturalibus. addebam præterea duplex esse instrumentum, quod eam superare possimus, primum erat victus ratio ac rerum non naturalium, alterum vero medicamenta ipsa, quæ partim per os assumpta, partim vero corpori applicata; & horum quædā leuia esse diximus, vt olea illa de quibus mentionem feci, quædam valida, vt quæ acopa medicamenta vocantur; medicoria vero alia, inter quæ erat picatio, quæ quomodo fieret instrueram dicere, dixique primum ante picationem admoendam corpus ipsum præparari debere, deinde ipsi applicandam picem hanc præparatam oleo, vt dictum est; & addebam corpus præparandum esse vt incalſceret ac tingeret ipsa frictione vel balneo aquæ neque tepidissimæ neque calidissimæ, sed calidæ tantum, corpore vero tumefacto statim accipiat pix, quæ sit recte præparata, id autem fiet, si picem siccā habueritis vel ex Germania vel à vobis met ipsis in aliquo vase cum aqua vel sine etiam assabitis donec dureſcat, quæ postmodum aliquantulum eliquetur cum oleo aliquo calido ac humido, vt vel communi ol. vel altero ex amygd. dulc. Pissasphaltumq; non conuenire dixi, quoniam nimis exiccat ac valde calefacit, modumque ipsius picis corpori applicandæ tradidi, & in applicatione quæ & quot seruanda sint, ostendi: & terminum etiam eius cum hyemis tum etiam æstatis tempore pro ratione roboris corporis & necessitatis, & denique si voluerit æger picationem admittere, cum admodum moleſta sit atque maxime deturper, ad quæ alia medicamenta sit ascendendum, & cum quibus misceri debeant formulam tradende satis laudatā ab autoribus. Sed quoniam raro fit, vt qui secundum corpus vniuersum extenuatus sit, nisi morboſa sit macies, hanc raro diuturnam curationem subear, cum præcipue ipsi videantur agilliores &

res & apiores ad obeundas actiones, quam qui pleni sunt, cum plenitudo potius ad pulchritudinem, quam ad robur faciat. Frequenter autem solet in usu venire, ut brachium vel manus siue alia aliqua pars corporis extenuata sit, culus repletionem desiderant, ideo de hac particulari alicuius membri plenitudine nunc tractemus: hæc autem vocatur diminutio vel paruitas illius membri, in quo existit, ac duplex est, vel naturalis vel acquisiticia, naturalis, quando à natura tale est effectum membrum: altera vero acquisiticia est, non secundum naturam, sed per morbum, vel aliam causam attenuantem. Hæc lædit sæpe actiones, & facit turpitudinem, ratione turpitudinis nos de utraque loquamur. & per reuocantem hanc, intelligimus maciem partis, quæ sit diminuta secundum latitudinem, & profundum, aliquando secundum longum, hoc patet in luxatis. Naturalis vnde proveniat, perquirendum in natura fœtus, non naturalis causæ duæ sunt ex Hipp. quietis, & deligatio sunt causæ extenuationis membrorum. istæ geminæ causæ mihi videntur referri, & in distributionem, & in nutritionem partis, eo quod non bene nutriantur membra, neque fiat distributio alimenti ad membra.

Qua autem causa sit ista nutritio mala? ut plurimum fit ratione refrigerationis, & ista est causa, quæ facit malam nutritionem, & ut non fiat distributio, refrigerantur autem ista membra quiete, quando frangitur crux, & manet in quiete 40. diebus, emaciatur, quia ob quietem refrigeratur: exercitium calefacit artus, & est in causa, ut nutriantur: quod dico de cture fracto, idem dico de aliis membris quiescentibus sine morbo. adtingitur à Galeno deligatio artus: quoniam solemus incipere deligationem supra locum affectum, & ascendimus usque ad principium membri deligando, & exprimitur sanguis, & spiritus usque ad principium membri, quod ex hac deligatione refrigeratur.

Addatis aliam causam refrigerationem: quoniam in exulceratis membris, vel vulneratis partibus manant humiditates innatæ insigniter cum sanie, & sic membrum refrigeratur. Addatis quarto constrictionem vasorum, obstruuntur sæpe vasa ab aliquo humore, de necessitate refrigerantur artus, quia non transmittitur spiritus, & sanguis fouens facultatem nutrientem: præterea distributionis causa extenuantur membra; quia refrigeratum est membrum, & hinc est, quod caret facultate attrahente, distribuitur autem alimentum, aut quia transmittitur, aut quia attrahitur. secundo etiam impeditur distributio huiusmodi, quoniam per longam deligationem aliquando vasa compacta, & exiccata fuerunt, & facta inepta ad distributionem: igitur potissima & prima causa maciei est distributionis impedimentum. iam vero properemus ad signa.

Signa maciei naturalis in aliquo membro nota sunt. signa maciei præternaturalis cognoscitur cognitis causis emaciationis. & ideo non est necesse, ut in rebus ita notis diutius immoremur, ergo ad præfagium properemus.

Debemus autem obseruare quoties proponitur membrum macie confectum an sanabile sit, nec ne. cognoscimus autem hoc facto experimento Gal. pulcherrimo. ut accipiamus aquam calentem, tepidamue. si cito rubrum redditur membrum, eam speremus sanationem: si non cito, sed tarde rubrum redditur, at tollitur in molem, tunc difficilis curatio erit: si nunquam rubescit, non tollitur in molem, non sperare curationem, quia non succedet, nunquam emollescit, vel replebitur pars.

Curatio autem consistit in robore addito, & sanguinis attractione ad locum, ut non discutiantur. quatuor autem sunt, quæ robur addunt parti, & quatuor sunt, quæ attrahunt sanguinem. primum robur addendum obinet fricatio moderata. & quomodo? fricatio calefacit partem, calefaciendo attrahit spiritum, & sanguinem, spiritus & sanguis cum calido robur addunt parti, robur autem concoctionem facit: sed possumus fricare artus vel nudis manibus, vel cum oleo, quale est amygdalinum, vel maturarum olluarum. præterea fricatio semper debet ab origine membri superiori incipere, ut trahatur magna copia spirituum. fricatio debet esse longa, obliqua, & transversalis: quoniam omnes fibræ, omnes pori aperiuntur, & calefiunt. Hæc fricatio moderata sit. finis fricationis est donec membrum plenum, & rubrum reddatur. secundum locum habet perfusio ex aqua simplicissima, vel hydrelei, vel olei simplicissimi, & purissimi: aqua præstans, hydreleon præstantius, quia replet, humectat, & non sinit egredi. aqua non sit frigida, nec feruens, sed media inter has. perfusio semper tendat circa extremum membri, incipiendo ab origine eius. tertius perfusionis est, quum videmus turgidum, vel rubens membrum. Tertium est motus partis. exerceatur pars. sed

Mortu.

Modicamen-
tum lota-
le.
Olea.

Picatio.

Dropac.

Deligatio
vero de offi-
mod. com-
ten 32.
In deligatio-
ne obstru-
da.

Auic. lib. 1. fen. 3. doct. 1. c. 11. Notat, quod quum volumus exercere membrum, exerceamus naturali, & consueto exercitio. obambulatio est motus cruris, micatio brachii, & sic de simili exercitatio sit moderata: finis est, donec inrumescat. Vltimum est medicamentum appositum loco, quod habeat vim calefaciendi, & est idem, quo utimur in vniuerso corpore, sunt medicamenta lenia dicta, vt oleum ex euphorbio, ex castoreo, vel ol. costinum, vel vulpinum, vel lil. alb. cum arom. vel itipoti: si volumus robustius, deuenimus ad picationem, quæ admittitur libentius ab ægrotantibus in singularibus artubus, ego visus sum semper felici successu hac picatione, vt non opus fuerit venire ad validiora, sed si ad robustiora oporteat descendere, venire ad dropaces dictos. terminus medicamenti est rubificatio, vel turgiditas: quum sumus in sermone quid agendum? detegere debemus membrum, & ungere oleo, vel sesam. vel amygdal. dulcium, & dimittere naturæ si hyme, tegamus lana, vel panno calido. si æstate, relinquatur intestum. ar hoc non est fas. sed oportet documentum obseruare Auic. qui monet nos, vt aduertamus, an tumor ille, quem excitamus sit bonus, vel malus, si malus, succedit apostema, vel morbus: si bonus, non succedet. Quomodo cognoscemus, quod robur sit bonus: primum, quia non diu durabit, nec inerecet ablatum medicamentum: si crescit, est rubor, qui sit per transmissione sanguinis extra venas, & sic inflammatio oritur, aut erysip. secundo cognoscimus ex vasis, quoties videmus, quod imposito medicamento ita repleuerimus locum, vt venæ intumuerint, videte, an aliquot venæ, quæ prius non apparebant, apparent, tunc suspectum est medicamentum. præterea, si remanent turgide, tunc omnia sunt dimittenda, & potius præcauere debemus, quæ imminet, & impedire fluxionem. si hæc non fiant, tunc non solum robur dare debemus partem, sed etiam sanguinem attrahere ad partem, & eadem, quæ faciunt ad robur, faciunt ad attrahendum sanguinem. sed vnum est, quod proponitur ab Hipp. loco dicto, & est deligatio. & in hoc admirandus Hippo. qui deligatione impingat, & demacrat artus. si vos habetis manum extenuatam, & vultis replere: monet Gal. in com. dicto vt ligemus vniuersum membrum, & incipere à parte sana circa originem membri debeamus. sed ætior, & strictior sit in principio, & laxior sit in parte emaciata deligatio ipsa. si in æstate fuerit, nihil ferme deligamus partem emaciatam: hyme aliquatisper tegamus ratione frigoris, stringamus aut partem sanam in principio. aliud est preceptum in deligatione. si esset totum membrum extenuatum, non possumus iuuare per deligationem, notat Gal. aduertendum esse, quæ sint partes: quæ sunt vnus, & eiusdem generis, & sunt crura inter se, & brachia inter se. venæ, quæ currunt ad vnum, habet idem confinium, & eandem originem cum venis alterius. & ita, si emaciatum fuerit totum brachium, ligabimus brachium sanum incipiendo à digitis manûs exprimendo sanguinem, & sic fluat ad partem maciatam. sed expressio hæc non debet esse dolorosa, ne fiat attractio, vel inflammatio ad partem sanam. Hæc sunt seruanda pro replendo membro emaciato: supposito, quæ corpus abundet bono sanguine, & ideo bene mundatum sit, vt subministraretur bona materia, sin minus loco impinguationis nos inducimus morbos.

De quibusdam partibus naturæ tenuibus tractandis atq. magnificandis.

CAP. IX.

De languis-
dine pudendi.

In hoc tractationis genere non solum atre emaciatæ partes continentur, sed quæ natura breuiiores, & tenuiores sunt effectæ: continentur quoq. & partes dectatæ aliquo casu, vel ætitudine, vel sectione, & vulnere, qui oēs affectus cum pendeat à diminuta quantitate infra id, quod est secundum naturam: ideo curatione aggredi debeo. partes supra modum auctæ lædentes actionem, requirunt eandem curationis rationem, quia supra naturam sunt: sed primum de tenuibus partibus, atq. breuius à naturæ defectu genitis, non de matris, agamus. inter quæ primum locum obtinet cholis, vel pudendum, quæ ita breue est, vt turpitudinem non leuem faciat in compositione corporis humani. Hoc non tractant Recetiores, quia honestius factum genus hominû non videtur nudû, vt antiquiores, quando in palestra, & balneis continuo inuicem videbantur. Verum hæc partes, cum iam recte ferantur, turpitudine cessat loco, & ideo de hac non tractare debemus, neq. enim videretur pertinere ad Medicum, qui curat, sed ad eum, qui curat. At quia hæc prætermittuntur à prædictis, ideo ego de magnificatione cholis aliquid tradam. si pulchritudo requiritur, pro pulchritudine tradam. sin minus cum Auic. me excusatum habeat fuerit isti, & fertici viti quidem vult docere modum magnificandi cholis, cum turpe videatur Medico de his agere, respondet huic obiectioni, quia ita est necessitas conseruationis speciei, quod obsecrorus ei habenda est cura. nam nisi pudendum constringatur à vulua, voluptate non afficitur mulier, non emittit semen, nec fit conceptus, ideo arte crassum faciendum membrum hoc. Ego moneo parietes, vt studeat in ætate infanti, vt magnificetur membrum puerorû: magnû etenim inutile nunquam erit, & si fue-

si fuerit inutile hoc rarissime accidet, quum enim nimis longum erit, solet utrum contin-
 dere, & os matricis, & impedire generationē. nimis autem breues, aut semper, aut frequen-
 tius incommodum erit de magnificando igitur membro agamus. in hoc autem duo ob-
 seruanda sunt, & quod possumus producere pudendum, & quod possumus crassius red-
 dere. producimus, quum facimus in longū crescere: augemus vero, si efficiamus milia &
 frequentem extensionem. non. n. augetur augmento pinguedinis, & carnis, sed oportet, vt
 nervi cavitates fiat maior, nam quoties cavitates ampla facta fuerit, & protēditur membrum,
 & ad sint vapores, ac spiritus, crescit. primum autem loquamur de longitudine. Hoc potest
 fieri si impedimenta auferamus: inter impedimēta est frenum, vel canis nimis constrictus
 pudendi. catiem vocamus partem illam, quam filellum vulgō appellant, qui ligat præpu-
 tium in patre inferna cum glande iuxta canalem. qui habent eandem decurtatum, non pos-
 sunt in longum producere pudendum, quoniam facit dolorem canis ille, & sic non potest
 diu consistere tensum pudendum, & impeditur eius incrementum: nam causa magnitu-
 dinis pudendi est frequens eius distensio; vnde incumbentes Veneri, & continuo tensum
 habentes priapū, longum habent, & magnū. ideo fecimus per transuersum canem; alterū
 est, vt obseruamus loca neruorū. in dorso pudendi sunt nervi in dextro, & sinistro latere (vt
 vidistis in anatome) quoniam neruosus est priap., oportet videre an nervi sint tēsi, an aliqui
 chordæ tense sint, vel percipiamus aliquot grana vt grana milii: & si hoc est, sunt ganglia
 non dolorosa in nervis, & veluti nodi impediētes nervos. in hoc casu auferenda tensio,
 laxandi sunt nervi, per emollientia, & laxantia, vt ol. amygd. dulcium, vel communi inatu-
 ro. facit & ad productionem aliud. vt aliquando nos efficiamus, vt tumore aliquo pter natu-
 ram laboret pudendum potest autem intumescere, vel ratione spirituum, & non erit præter
 naturam, potest vel tumore præter naturā tumere. & ideo ad illa acria confugere debe-
 mus. pueri per ludicrum solent vt his medicamentis. Antiqui solebant inungere glan-
 dem, vel præputium lacte ex volubili latifolio, quod similacem lenem appellamus, ac re est
 medicamentum, inflummat, & facit quasi priapismū. similiter lac ficulneum præ-
 stantissimum est, si vel glandem, vel totum pudendum inungamus. lactatia, tithymalos
 vocata à Græcis, si accipiamus characiam, vel aliud simile, præstantia sunt. Verum in usu
 istorum medicamentorum opus est, vt incumbamus ardori, & dolori insigni, & pueri
 his solent deludere alios. Rario medela est, vt contemperemus feruorem cum vfula-
 tis, & linteolis lacte repletis; vel decocto maluarum, vel decocto violarum, vel oleo
 cerato violato, vel ol. ros. Mesues. & obuoluamus caput pudendi. Ego resēdo freno, &
 emollito dorso, duplicato hoc medicamento vidi crescere ad quartam partem. Faciunt
 ad productionem etiam tractationes, calefactiones, vsus Veneris, atque medicamenta,
 scilicet synapismi, dropaces &c. at inter extendentia ineptius instrumentum est vsus Ve-
 neris, quia non diu remanet tensum: concidit enim. oportet autem, vt diu tensum ma-
 neat, & enim copiam spirituum adesse necesse est. Hoc fit medicamentis calidis, & al-
 liis rebus calidioribus, etiam quod non sint medicamenta. Hac ratione vtuntur Rhazes,
 & Auicennas vt continuo ter, quater, sexties, & decies in die fricetur membrum; frican-
 dum autem non sicca manu, sed inuncta lacte ouino. sed qua ratione? non reddunt ratio-
 nem. addamus nōs, quia lac obstruit meatus, & ita non discutuntur spiritus: lac etiam
 potest gignere ex se spiritus similes spiritibus sanguinis. præterea lac emollit ac laxat; præ-
 cipue si pingue est. præterea quasi suā natura experimento confirmata; illud facit. Ad-
 dit Auicennas vt fricemus saltem aliquo pingui. & si esset ex pinguius, quæ faciunt ad
 proritatem Veneris, tanto præstantius, vt si est pinguedo ex calidore. in summa frica-
 tio est, quæ facit tensionem. Addunt etiam, vt ab exterioribus tensum reddatur: hoc
 autē fit picatione, imposita pice eadem ratione, qua dictum est supra. Possumus etiam vt
 dropacibus reliquis. Nos vtamur vnguento ex thapsia. sed cum his omnibus adhibe-
 re portiunculam moschi: vel, si moschum, & zibetum adhibeatis mixta cum ol. amygd.
 dulcium, non inuenietis medicamentum præstantius: conelat, prorit sanguinem, &
 excitat appetitum Veneris, & hoc habent pro secreto maximo. His rationibus per trans-
 uersum fricando, extendimus priapum. fit etiam hoc calefacientibus, vt testa ignea ac-
 cepta intra cūtra, vel pannis calidis. sed obseruate, vt statim quum concidit pudendum,
 erigatis, vel pannis calidis; vel alio calido; nam hoc iuuat pueris, & etiam consuetu-
 dinis. sed aduertant imbecilles, non abundantes copia spirituum, ne extensa vasa
 spiritu implere non possint. Hoc autem fiet per medicamenta proposita à practi-
 cis. Hoc quod dico, & quod in posterum dicturus sum, necessitate generationis co-
 actus assero, non quod quid contra legem aut contra bonos mores promulgare audeam.
 Scriptores proponunt medicamenta pro amplificando pudendo, quæ agunt à tora-
 mentis

De longitu-
dine chole.Ad tensiō-
nem natu-
ram.Lac similitudo
lenis.Ad contem-
perandum
ardorem.

R. & C. & C.

Lactis ouini.

Pica ad
tensionem.

*A tota sub-
stantia am-
plificanda
pudenda.*

substantia. Ego non vñs sum iupis, sed semper deueni ad illa inflammãtia dicta. Ista autem medicamenta sunt primo vermes terrestres, quos vino ablutos exiccamus, & in puluerem vertimus, & cum ol. sesam. vel ainyg. dulcium misceamus. Aliud proponitur à Rhasi, & desumitur ab Auic. vt accipiamus recentem nucem Indicam, & aperiamus, in ista nucem reperiemus aquam dulcem in interna medulla. accipimus sanguifugam, & relinquimus in ista aqua septem diebus, postea extrahimus, & contundimus, & puehdum illinimus. Ego nō expertus sum. Referunt Recentiores ex Diosc. quod vsus cotinãdri in cibariis prãstans est. tarde hoc agit, nec ego nimis sîdō, cum alia habeam medicamenta. si scirem modum leniendi priapismum ex cantharidibus, illud esset prãstantissimum remedium, sed est dolor incompãrabilis, ego nescio antidotum, ideo de medicina non sum sollicitus. [Annō 10
1139. superueniente Quadragesima, quo cōronatus est Carolus V. Rom. Imp. & capta est
Florentia exercitus Hispanus Mutinensî hybernauit in agro, in loco, qui dicitur la Bastia
septimo lapide distante à ciuitate. erant insolentes milites male tractantes villicos, ex quo
apud Ducem cum hi cōquesti sunt, Dux misit Scribam suum, qui non erat homo admo-
dum sapiens, cui Militum prãfedi exhibuere cãtharidas, incidit in priapismum, & cum re-
disset in ciuitatem in concione ostendit mentulam timens se venenatum esse. sumebant
quartam partem cãtharidis, contundeabant, addendo piper, cinnam. & garioph. efforma-
bant pillulam, & exhibebant. sanatur autem sine dolore, & subito, & tuto succo cuiusdam
herbæ, quam illi Hispani proplnarunt. cuius figuram eō ignoro [Sed in hoc augmento etiam
municipales leges ponunt terminum: nam aliquando nonnulli volunt habere nimis
vastas hæc partes. Ego vellem vt tantum in parulis hoc fieret, decurtatæ partes tantum de-
berent corrigi, & magnæ suo in situ permittendæ, & non in maiorem atollendæ molem.

De Præputii breuitate corrigenda.

CAP. X.

Quandoq; aliquis accipit vulnus in naso, qui secatus facit turpitudinem maximam. vt
accidit anno elapso cuidam Pedemontano, cui à latronibus decurtata fuit apex na-
si, docent Medici ratione pulchritudinis sanare, pariter ob frigus decurtantur aures, ne vi-
deantur hæc iure decurtatæ, oportet iterũ restituere aliquando pars labii superioris in me-
dio diuisa est, & leporarii dicuntur pueri, ideo iungendæ illæ partes, pariter Antiqui (vt di-
xi) cum nudati incederent in palestra, & ablatis præputiis esset valde infamis, ideo solliciti
erant de tegenda glande, quare primum de hac restitutione tractemus, deinde de aliis. in
pupio tractando notare debetis, an natura factum, vel arte sit. secundo an valde, vel parum
breue sit. Ita, si parum fuerit decurtatum, leui ratione producemus: si valde; opus erit ma-
iori actione, & tandem chirurgica. Solemus enim medicamentis, deligationibus, & chirur-
gicã actione producere: sed notare, quod quamuis hoc faciat ad pulchritudinem, facit ta-
mẽ etiam ad generationem, & ad voluptatem maiorem. ratio est, quoniam naturaliter lu-
brica non est illa pars, quæ non habet præputium, & requiritur lubricitas in signis in vene-
re, & cum maiora sũt voluptas, mulier emittit semen, & materia oportuna pro forma-
tione factus, & pro generatione membranarum. Si autem quærat, cur Deus altissimus
in populo electo instituit, vt auferretur præputium, causæ sunt æternæ, & posite in mente
Altissimi, quas non oportet dicere in profanis scholis. [fortasse id iussit Deus, quoniam si
vt dictum est, præputium veneris voluptatem adauget, resectum minuit. Deus populum
suum dilectum; & castum, & à venereis voluptatibus, quantum fieri poterat, abstemium
quærebat, vt non ita delectationibus illis allectum Creatoris cultum negligeret. & ad hoc
fortasse exitum ille Theologus Moses respiciens, Puellam sanxiuit, pro virgine ductam, si
corrupta fuerit, lapidibus obrui, aut coitruptam concernari & si quis eam non inuitam vi-
riauerit verget, extremo supplicio afficiatur. Adulterio, incesto, sodomiticæq; sceditati ca-
piralem pœnam lex irrogabat. Quinẽdã ad idẽ respiciebat promulgatum illud institut-
um, ne qua mulier belli tempore attingat virile instrumentum, necq; vir muliebrem. & hoc
est, quod dicit Aristot. esse in prouerbio legum diuinarum lucem non habens, quæ ad hoc
dirigebatur, vt populus suus abstineret à venereis, quoniam corpora nostra habebat, refige-
rat, imbecillia reddit, atque corruptis. quod autẽ præputium in causa sit, vt maiorem
sentiant scemine delectationẽ, indicio sunt ludæ, Turcæ, ac Mauritanæ, & infideles mu-
lieres, quæ libentius mancipijs Christianis, quam dominis resectis se subicere patiuntur,
& volunt. si ergo curtum sit p̃putium, quid agendum? Galenus docet per membranulam
cartaceam. Faciebat enim hoc modo: producebat p̃putium ad antriora, quantum fieri po-
terat (& hic locus à nullo notatur, quia fortasse non intelletus est) attractum obuoluebat
membranula cartacea sticta cum gummi citrea pellem, & faciebat scicare membranulã,
& ita non poterat recurrere, ideo necessarium erat, vt produceretur ad partẽ anteriorem.

Vtrum

*Quare Deus
tollit
Etiam ut
posuerit
præputium.*

*De ætate
proh. 2.*

*De ætate
proh. 2.*

*De ætate
proh. 2.*

Verum notandum est, quod dum volumus apponere istam membranam per transfusum, quia cedit nimis præputium, non potest applicari, præterea necesse est mingere, *Inciseda.* ideo oportebat relinquere canalem. Gal. fistulam ponebat in parte anteriori, siccata membrana, remouebat fistulam, & sic membranula ad duos, & tres, & quatuor dies relinquebatur. membranula autem sit tenuis ex carta, ego volo, ut capiatis cattam coriaceam, & videte an adsit filamentum, vos ex illa cartulam tenuissimam auferatis, qua nihil tenuius, librarii capiunt cartam pecorinam ex ea parte, qua erat pilus, & euellunt membranulam renuem, transparentem, veluti crystallum, & hanc conglutinant supra cartâ impressam fractam, & sic apparent literæ, & fractum restituitur. Galenus hanc vocat fibrâ cattâ. *Ratio curâ de alio loco.* 10 ceam, hæc est, de qua loquitur: mollis est, & robusta. Alii solebant producere hoc modo: accipiebant fistulam, apponebant ad glandem, & supra fistulam trahiebant præputium, & alligabant, & imponebant medicamentum ex thapsia, quod rubrum redderet præputium: tamen hoc habet incommodum: quia deligatio illa dolorosa est; succedunt aliquando gangrenæ, ideo placeat ratio Galen. & ego illa vtor. quamvis credam, quod toto vitæ meæ curriculo non tractarim bis, aut ter hanc rem. Præterea alia ratione producitur pudendum dicta à Galibidem, à Paulo lib. 6. c. quinquagesimo tertio ab Auicenna etiam. ut per sectionem producamus præputium: & uti solent interna, & externa sectione. trahimus præputium vi ad exteriora, postea secamus circulariter, & vna sectio spacio vnus, vel duorum digitorum ab alia distat, postea linimenta parti sectæ applicamus. sed ego possum testari, 20 quod nunquam secui, neque reperi aliquem stultum, qui voluerit pati hunc cruciatum. præterea videtur in media parte, vbi facta est sectio, decurtatum: ideo notate, quod sectio fienda prope testes, prope scrotum, primo ut scarificatio fiat, & tegatur; præterea, ut cutis à prima origine scarificata prolongaretur. in interna parte scarificabant præputium circa coronam: sed oportet applicare lintecolum molle, quo impediatur, ne glans cum præputio coalescat, sed in adidum sit primum albo oui, postea vino austerio, ut obducatur cicatrice. Hæc igitur sint dicta, quo ad præputii productionem: quam rati sunt qui affectant, tū quia dolorosa est, aut nimis fastidiosa ratio curandi, tum etiam, quia etiam quod natura in hoc deficiat, præstat tamen, eo quod, qui habent glandem detectam, rarissime lue gallica inficiuntur, quia crassa & dura cutis aeri exposita reddita est, & ideo excoriationem, aut vi- 30 lulentiam illius ingressum facile non admittit. modo ad cæterorum membrorum restitutionem transeamus.

De Nasi regeneratione, labiorum, atque aurium.

CAP. XI.

Reliquas autem partes quomodo coniungemus? Multi tentant restitutionem nasi per generationem carnis. in Calabria deesse aiunt Medicos, qui denuo regnunt nares: & modus hic est. scarificant cutim in brachio, in qua seruari iubent nares immotas, donec agglurentur cum brachio: postea secant carnem ex brachiis, & efformant nares quibusdam ferreamentis, & laminis ferreis, & sic sensim, & sensim faciunt imponendo iterum, atque iterum, donec efformetur nasus. Negotium hoc est aliquando trium mensium, aliquando sex, aliquando anni integri: ego teneo, quod maximus est cruciatus, & vellem torum amittere nasum potius, quam hunc subire laborem. moneo, ut potius vrantur fictitia naso, quam isthæc subire tormenta; nam ex personata materia fit nasus, qui gumbi apponitur. si autem amputatio sit parua, non sumus solliciti. monet Galenus, ut scarificemus partes laterales, ut producat cutis, & consuamus, & agglutinemus. Ita de labio scarificate, & auferre superficiem, & agglutinetis; quia sanabitur: tanta enim est mollicies in pueris ut labia vniri possint. sic de aurium defectu pauco, dicendum. at, si defectus magnus esset, oporteret vri fictitia autem; nam non esset tanta pellis circumcisa, ut possemus efficere aurem integram. Hæc sunt satis. & quoniam multi sunt mor- 30 bi, qui accidunt mulieribus ratione partus, & faciunt ad pulchritudinem: ideo de his agamus.

De Mammillarum amplificatione.

CAP. XII.

Solent nimis displicere, atque frequenter accidit aliquando cum noxa satis insigni, mammillæ nimis reuæ. mores ciuitatum varii sunt. in aliquot enim locis paruitatem affectant mulieres, quia modestiores sunt alibi quadratum habitum affectantes, impletas, & pingues desiderant. præterea copiosum colligunt lac pro alimento pueri, quæ magnæ sunt, græciles egestate laborant; ergo non tantum ratione pulchritudinis, quantum ratione sce-

tus, Medicis tractant de amplificatione mammillarum. Omnia autem facientia turgere, ad hoc deferuntur, quare vsus balnei frequens, & diu opportunus est: caliditas enim, & æstus multum facit ad inflammandas mamillas. si tractantur, leuiter manibus tanguntur copiosius attrahunt sanguinem. sed picatio, dropax, sinapismi, vnctiones, & omnia à me tractata opportuna sunt, dummodo nos expleamus vniuersum bono sanguine per optimum exhibitum alimentum. sed quoties affectatis amplas mamillas, non habent cingula, & angusta pericardia, sed pendeant mammae, & vestes latissimæ sint. præterea non suspendantur, quia non poterunt produci. De colore autem, & mollitie carum, dicam postea.

De Papillis. CAP. XIII.

10

AD hoc etiam pertinet papillarum tractatio; aliquæ non habent, aliquæ habent nimis paruas. hoc turpe est, & ad fœtum in eo modum: ego non quero magnitudinẽ vacuam, sed moderatam. puer non potest sugere lac, si tenuis est papilla. cui difficili succioni lactis concretio in mamillis subsequitur, & agritudo. quomodo autem restituantur papillæ? omnibus illis, quæ calefaciunt, & rubore suffundunt pattem balnea, tractatio papillæ præstantes sunt, pudendum etiam virile, & fœmineum harum tractatione proritatur. tractentur ergo mamillæ contractu non solum fœminarum, sed adolescentulorum, si cõ honestate id fieri possit. pariter si vngantur oleis. si vtram dropacibus, & picientur idem assequi poterimus. sed chirurgico opere idem obtinere possumus: cucurbitula scilicet angustissimi oris: quæ per aliquot temporis spacium papillæ imponitur. alii recipiunt calles glandium, quæ habent in summa copulam, calefaciunt, & apponunt sed si multum extrahere volumus, huiusmodi calice non possumus: vtiur tamen in minimis mamillis. Mulieres aliquot inuenere instrumentum opportunissimum, quo vtuntur: quando volunt seipsas lactare, & emungere, si nõ habent puerũ, aut puellam. Inuentum est instrumentum vitreum ad similitudinem cucurbitulæ, quod habet rostrum, quo rostro sugunt lac: hoc instrumentum opportunum est ad productionem papillæ. alii accipiunt fistulam ex arundine puram, mundant, expurgant, & apponunt papillæ, ex ore sugunt ab altero cauo fistulæ. huiusmodi solent vti multi. Ego vero vtor fistula plumbea, quæ sit eius amplitudinis, quantæ magnitudinis requirimus papillam: & ista ab vno latere aperta est, ab altero paruum foramen adest. postea applico huiusmodi fistulam in parte perforata, & opposita singulis foramen paruum. cum papilla iam ingressa est, ego primum lingua, postea digito, & cetera elaudo paruum foramen, & sic per suctum ingreditur facile pupilla in fistulã, & suo pondere spacio trium, aut quatuor diebus producit. sed sit optime lenis fistula, ne habeat angulos secantes. tempus producendarum mammillarum non est, quum rimosæ, vel viceratæ sunt, non quando adest lac. sed expectetis occasionem, in qua non turgescant lacte, & aggredimini curationem, & succeder. Hęc pertinent ad partes extenuatas, natura, vel ætate, vel morbo aliquo consumptas.

De Partibus crassis extenuandis.

CAP. XIV.

40

VIdeamus quomodo partes crassas attenuare debeamus. aliquando tumet pes, vel manus, & non possunt sanari. aliquando mamillæ erescunt præter modum, aliquando testes nimium augentur, & nimis salaces, & ad eamque ineptos reddunt pueros. de his modo agamus. Quoties mulieres laborant huiusmodi crassities, hoc fit fluxu alicuius materie: ideo opus est maxima diligentia. & si quod est difficile, est affectio isthac. etenim communis est opinio, quod symptomata venientia ad partus, quando male expurgatæ mulieres, difficilia sunt curatu. Primum ergo expurgandum totum corpus. præterea prouocandi sunt menses plurimi. quæ faciunt ad hoc nota sunt omnibus. expurgato vniuerso, & prouocatis mensibus, deueniendum ad locum affectum: & primum retrahamus sanguinem ad aliam partem: deinde repellamus vel instrumentis, vel alio ingenio. si manus sit tumida, debemus fricare manum oppositam, & trahere totum sanguinem illuc, & deligare. hac ratione reuelimus. præterea debemus exprimere sanguinem à parte tumida, fascia incipiente ab extrema parte quæ sensum, & sensum stringat valide, ne tamen fiat dolor, sed vsque ad principium, vbi est pars sana, fascia sit potius laxa, quam stricta. Hoc non satis est. debemus venire ad medicamenta idem facientia: & sunt, quæ habent vim exicandis, vel cum caliditate, vel cum frigidityte, vel plurimum tamen sint frigida, & sicca. Quæ autem sit materia horum medicamentorum, e-

godi-

go dicam, quum tractabo de extenuationibus mammillarum. Quare de mammillis tractemus.

De Mammillarum extenuatione. CAP. XV.

Solent præter modum crescere mammillæ, & turpitudinem afferunt, sed maiorem in virginibus, nam, nisi virgines tenes habeant mammillas, suspectam habent virginitatem, quæ etenim feminæ factæ sunt ob incalescentiam veneream maiores habent mammillas; ideo nos has tenues facere debemus arte, & industria. Præterea illis, quæ pepererunt, pulchritiores sunt mammillæ rotundæ & parvæ, quam crassæ, & magnæ, vaccinas *Causa in ref. m. m. m.* referentes. Amplæ fiunt ex usu copioso balnei, ex contactu frequenti virorum. Addatis, quod solent crescere ob laxam vestium appositionem. vsus vini copiosi atque potentis idem præstat, ad hoc facit pendens ille scius, paratur genus edulii ex vino dulci, saccharo, vitellis ouorum, &c. quod dicitur Zampiglioni. Hoc auget, & impinguat thammass. lactatio frequens, atque Venæ vsus idem efficiunt. si parvas volumus, & rotundas tedere, debemus causas, quæ faciunt eas magnas, rescare. Viæ ratio sit sicca: constringantur vestes, suspendantur: producantur menstrua, quantum fieri potest: non accedant ad balnea. sed necesse est, & ad alia veniamus: solemus stringere mammillas, vel medicamentis, vel opere chirurgico. Medicamenta sunt duorum generum, vel quæ agunt manifestis qualitatibus adstringendo, siccando, & refrigerando, vel quæ tota substantia faciunt. quorum rationem reddere ignoramus, tamen effectus manifestus est. Et ego vidi miraculum spacio vnius noctis, & tandem operatione chirurgica. & primum medica materia hæc sit. nolo emplastra composita explicare, sed tantum materia propriam, quæ ego, & alii vtuntur. inter siccantia cum calefactione primum est ergo æris. secundo est alumen, abrotanum, cuminum, sulphur viuum, cæpæ liliorum alborum. ex hac materia, admixtis frigidis, solemus parare illitiones, decocta, & emplastra. at emplastra bona sunt, quia multum, & diu agunt! debetis enim applicare medicamentum, & non mouere nisi de tertia in tertiam diem: quoniam quanto minus agitur, tanto citius attenuatur mammilla. Inter medicamenta adstringentia, siccantia, & refrigerantia ego do principatum cretæ, quæ colligitur ex cultrariorum rotis, vel capiatis gemina frustra molæ, & fricetis simul. secundo in loco sunt omnia ex ferro, scoria, squama, & limatura ferri, & quamvis rubigo ferri calida sit, tamen si abluatur, præstans est medicamentum. addo cretam argillatam, rubricam sinopicam, quæ dicitur bolus orientalis: & rubrica omnis, cerussa, lithargyrium idem facit. inter plantas laudatur hyosciamus: & si accipiamus lac, vel aquam stillatitiam, vel succum foliorum: solanum omne, cicuta, pyllium, gallæ limaturæ, lolii farina præstantissima est, cito, & valde facit. lentiscinum oleum, & omnis materia ex lentisco, & terebintho, cortices granatorum, semina lentis exusta, platanus: sed opium præstantissimum est. vetum nullis ex dictis cedunt cochleæ ipse comitatus, limacia dicta. quas contundamus, & cum melle, & radicibus consolida maioris viridibus misceamus, & de tertio in tertium ponamus, & non mutetur medicamentum, nisi per se cadat. sed alia sunt, quæ à tota substantia id agere creduntur. & est sanguis testiculi porcini, vt recitat Auicenna. præterea sanguis erici terrestris habet magnam vim. adiungatur sanguis testudinis. his ego non vsus sum in hæc, quoniam superioribus multum egi, & multum fido. at inter ea, quæ à tota substantia agunt, vetula me docuit vnum, quod menstruum virginum maxime extenuat illinendo eo mammillas, manente aperta, & detecta papilla, & imbuatur bis, & ter. vetula volebat, quod ille sanguis esset primus virginis: ego expertus sum prima, secunda, tertia, & centesima fere vice. Chirurgici sunt deligationes: & ad hoc, vt fiant rotundæ, & tenues, opus est, vt ponatis lintamina exhibentia talem formam rotundam. ideo imposito emplatro, strophiala ex panino, vel linteo ponatis, quæ rotundam dent figuram. alia chirurgica actio sit per sectionem.

Hoc autem facimus in vltis, in quibus crescent mammillæ, vt in feminis, & colligitur lac, vel humiditas lactea. ideo confugiamus ad ea, quæ diximus medicamenta, deligationes: sed, si hoc non esset satis, Paulus libro sexto, à quo omnes sumpserunt, docet modum, & moriet, vt nos in parte superiori, vel inferiori faciamus lunarem sectionem circa originem mammillæ: postea excotiemus cutim præcedentem circa mammillam, & auferamus pinguedinem. Albucasis monet, quod, si facta excoriatione propter fluxum sanguinis non possumus auferre pinguedinem, vt medicamento caustico viamur: postea glutinatorio medicamento sanemus. Sed, si huiusmodi magnitudo nimia fuerit, debemus facere duas sectiones lunares concurrentes simul, sed vna sit minor altera, & concurrent ad eisdem apices. Domini nescio an ego appellem bestiam cum,

qui voluerit hunc cruciatum, ego malle mamillas, quæ cadum magnitudine superant, quam impias parti sectiones istas. tamen probatur actio hæc à Græcis, & ab Arabica schola. in melancholicos incidimus sæpe, qui volunthæc sectiones; in istis secare, vt sui morbi pœnas luant.

De Testium extenuatione.

CAP. XVI.

QUæ dixi in mamillis, hæc eadē in testibus nimis crassis applicanda, quia faciunt adolescentē nimis turpes, laiaos, & ineptos ad cantum. chirurgica opera fugienda; non enim ferro tractanda sunt loca illa. sed si aliquod esset, id deligatio esset, vt testes suspensi seruentur, vt sint in otio, languidi, & frigidiotes fiant. sum ego istius sententiæ, sed nunquā veni ad eorum extenuationem, nisi quum crassati sunt præter naturam. Verum credo quod sanguis testis suis multum faceret. Inter communia, quæ faciunt ad pulchritudinem, continetur vniuersi corporis color, atque partium. ego primum de colore vniuerso malo, & de omni infectione tractabo, veluti de lentigine, liuoribus, nigredine, & aliis maculis inefficientibus cutim. postea ascendam ad caput; & pediculis bellum inferam, & cætera necessaria pertractabo.

FINIS TOTIVS TOMI SECYNDI



INDEX

INDEX RERVM ET VOCABVLO- RVM, QVÆ IN TOMO SECVNDO OPERV M FALLOPPII MEMORABILIA & præ cæteris notanda occurrunt,

IN QVO PRIOR NVMERVS PAGINAM,
ALTER VERO LINEAM

ipsam denotat.

| | |
|--|---|
| A BDOMEN quid sit. 219. 21 | Acorum palustrem non esse verum acorum Dio- scoridis 33. 53 |
| abdominis vulnere diuisio 24. | acria omnia habere vim erodendi 254. 25 |
| abdominis vulnere quoruncum- que signa 210. 35 | Acrochorrones esse deliriosas 314 |
| abdominis vulnere penetrantiam signa 219. 31 | actionum omnium instrumentum immediatum esse spiritum 106. 13 |
| abdominis vlnus si penetret absq. leſione contentio- rum. 220. 55. an penetrantia statim conſuenda 220. 57 Si instrumentum ladens remanſerit in thorace 221. 13 | Actuarius duos esse 98. 28 |
| abdomine vulnerato cur ſanguis ſtatim ſiſſen- dus 178. 13 | acuum quibus in conſuendis vulneribus utimur, condiciones 177. 22 materia ibid. 26. nume- rus ibid. 31 quomodo præferuntur à rubigine ibid. 33 vsus acuum aliquorum malus ibid. 55 |
| abdominis vulnus quomodo pro intromiſſione in- teſtini inſtati ſit dilandum 224. 24 | Adipes contra ſcirrhus pugnantes 260. 31 |
| abdominis medi vulnere eſſe diſſicilia & quare. 221. 13 que in eorum conſuſione obſervanda. ibid. 39. terminus ſciendæ ſuturæ in vulne- re abdominis ibid. 52 | adſtringentia in vulneribus neruorum eſſe vitan- da 229. 32 |
| Abſuſio quibus perſiciatur 19. 44 que abluen- tia ibid. | Ægyptus Plinii 17. 9 |
| abſceſſus omnes eſſe vel cū vel ſine folliculo 276. 27 | aqualitas laborum in vulnere in quibus conſiſtat 173. 34 |
| abſceſſus cum folliculo quomodo vocentur 276. 29 | ac quomodo attrahatur in arterijs 138. 11 |
| abſceſſus folliculum habentes ſeu nodi quatuorſup- ſint 276. 32 ex qua materia ſiant ibid. 36 | ac gallicus quantum coferat contra ſtrumas 289. 57 |
| que ſint eorum cauſa efficiētes ibid. 40 que cau- ſa efficiens folliculi ib. 30 cauſa materialis 277. 1 | Æthiopes cur habeant pilos eripſos 134. 2 |
| ſigna folliculi in abſceſſibus ibid. 13 loca ſubiecta abſceſſibus cum folliculo ibid. 19 quare hi tu- mores habeant præſagium ibid. 47 | agere à tota ſubſtantiâ quid ſit 116. 26 |
| Abſerſio quid ſit 19. 16 que abſtergentia ibid. | agglutinantia exterius opponenda in vulneribus narium 203. 58 |
| abſerſum compoſitum 187. 5 | Alarum & iniquum vulnera alimentum eſſe duplex 145. 48 |
| Aceris vel ceruus 57. 10 | Aloe ſedem maxime irritat alteratio tripliciter accipitur 6. 45 |
| aceris vis 21. 39 | alterationem triplicem fieri in humoribus 168. 43 |
| acetum vt & omnia acida eſſe inimica, & quare ſit huius cauſa 263. 33 | alterantia ſine leſione 7. 27 |
| acetū adſtringere per acci- dens 167. 28 | Amara in quo gradu ſint caliditatis 16. 28 |
| aceris præſtantiâ contra lepram 173. 57 | Amathus Luſitanus mendax 51. 38 |
| aceris ſciliticium vt & mel quomodocumq. admi- niſtratum in curando ſcirrbo omnia alia medi- camenta ſuperare 259. 59 | Suſpectus 54. 49 |
| acida non multum diſtare à calido 23. 31 | Amathi Luſitani in conſtantiâ de meū 34. 40 |
| acida curcum ſint frigida non adſtringant 23. 28 | Amathi Luſitani error circa malabathrum 44. |
| acida & acria quomodo differant 23. 36 | 29 |
| Acopa medicamenta 335. 32 | Amathi Luſitani ſemithibras error de baſſamo 51. 1 |
| Acorum quid ſignificet 33. 33 unde nomen habeat ibid. 35 | Amathi Luſitani opinio de malobathro reproba- tur 43. 31 |
| Acori deſcriptio ibid. 38. Genera ibid. 48 eius ra- dicis vis in extrahendis ſpiculis ibid. 56 | Amathi Luſitani error de ſpica montana 40. 43 |
| acori radicis vis 34. 12 | Ambi deligatio 173. 57 |
| | Ambra quatuorplex ſit 58. 30 quid vera & præcioſa, ibid. 40 unde proueniat ibid. que varia eius nomina ibid. quomodo adulteretur 59. 6 quo- modo adulterium deprehenditur ibid. 8. Quæ ſint eius ſpecies ibid. 10 facultates ibid. 14 vi- tes ibid. 16 |
| | Anomum eſſe nobiliſſimā aroma apud antiquos 48. 11 quæ ſint eius nomina ibid. 15. quæ eius |

historia ibid. 18 *Imposture* ibid. 33 *omomum*
verum non haberi ibid. 38 *qua eius species* ibid.
40 *electio* ibid. 50 *vires* ibid. 56 *substitutio*
ibid. 59
anatomies necessitas in curatione vulnerum *variorum*
colli 210.40
Anatomen tempore Aristotelis fuisse imperfe-
ctam 132.43
Aneurisma quid sit 283.4 *qua eius natura &*
definitio ibid. 9 *causae praeipuae* ibid. 12 *causa*
dilatationis arteriarum ibid. 16 *causa interna*
ibid. 24 *species seu differentia* ibid. 38 *materia*
ibid. 46 *loci subiecta* ibid. 52. *signa gene-*
ralia 284.7 *signatilius, quod sit per dilata-*
tionem arteriarum ibid. 28 *quomodo distingua-*
tur aneurisma factum per dilatationem ab fa-
cto per vulnus ibid. 40. *qua & quod duplex eius*
curatio 284.56 *qua patiuntur manuales &*
actionem & qua non ibid. 57 *duo genera aneu-*
rismatum esse in capite sicut duo genera arteria-
rum 285.6. *quomodo illud, quod est per dilata-*
tionem factum sit tractandum ibid. 19 *quo-*
modo alterum per vulnus ibid. 37 *curatio pro-*
pria per causticum ibid. 53 *indicationes cura-*
tinae in parvo aneurismate ibid. 57
Anguis anza seu ceruinus ductus 275.13
anguis angelica preparatio ad lepram 275.14
Animam nostram tres habere facultates 132.49
animalia omnia cor habere 132.18
animalia frigida & excrementosa abundare me-
dulla 104.34. *& quomodo ibid.* 59. *& 105.5*
animalia vivuntia varia constare compositione
96.18
Antidota contra cancerum pugnancia qua ratio-
ne agant 264.7
apthorum seu ulcerum palati divisio 246.48
causa ibid. 50 *signa* ibid. 55 *cur in atasepue-*
riili maxima fiant ibid. 56 *curatio* 247.4
aquam benedictam frigidam non sanare vulnera
179.35
Aquacassia odoratissima 46.16
aqueae virga aurea destillata vel contra cancerum
264.16
argenti vivi partes 110.54
Aristoteles an sibi ipsi in enumeratione partium
similium conflet 99.55
Aristotelem interdum fuisse negligentem 107.58
Aristotelem esse veram simiam Hippocrati 196
48
Aristotelem saepe errare in tradendis astrologia &
anatomia 27.45
Aristotelem nihil dixisse sine forti ratione 109.
58
Aristolochia radicem durare usque ad quing. an-
nos 30.21
aromatum natura 31.21. & 34.20
aromatum vis occulta ingenita 49.8
Artium omnium duo esse genera 325.19
artes male qua sunt ibid. 20 *qua bona* ibid. 22

Ar. ornatoria quomodo à compertoria differat 327.
29
Arteria quid sit & qua eius natura 135.49. *qua*
earum substantia 136.43 *materia* 133.4 &
144.54 *forma* ibid. 6 *causae efficientes* ibid. v.
sus ibid. & 145.4 *unde nomen habet* 135.18
non esse compressam ex carne & fibra ibid. 55
à quo in pulsatione moveantur 138.45 *quid,*
donec sint, moveantur de necessitate 141.4 *qua*
sint eius fibrae 140.14 *quis earum fibrarum v-*
sus ibid. 25. *an arteria si habens fibras vo-*
litas, moveri possint 141.6 *quare arteriarum*
fibra non possint attrahere ibid. 13 *cur inter-*
na tunica arteriarum & ventriculi faciat ad
motum, externa vero ad receptionem ibid. 18
arteria ligata inferior pars cur non pulsset 142.
22 *cur sanguis excusca arteria profudit subito*
ib.27. *arteria quomodo pulsset antequam sintor*
143.30 *omnes arteriae esse sinistras* ibid. 57
cur dextra pulsset validius ibid. 18 *an arteria*
sequantur motum cordis 144.11 *qua sint ar-*
teriarum passiones 145.11 *an arteria sentiant*
ibid. 17 *an dissecta conglutinentur* ibid. 20
arterias sapere naturam cartilaginem 131.57
arteria cur pulsset 132.18
arteria cur quandoq. fiant ossa 281.29
Arterie aortae vulnera cur necessario sint lethalia
163.42
Arterie vulneratae quomodo sint ligande 200.47
arteria vel vena magna in thorace laesa signa 214.
51
articulorum tres gradus 76.23
Articulorum effluxio 61.34
articulorum vulnera 163.15
articuli luxati restitutio an sit remedianda si simul ad-
sit inflammatio 77.16 *quomodo ei & quibus*
medicis sit occurrendum ibid. 30 *quibus sit idem*
si inflammatio succedat post restitutionem 78.4
articulus luxatus quo usque sit consolidandus 76.
21 *terminus hic consolidationis à quibus impe-*
diatur ibid. 37
articulum luxatum deligandum quomodo sit ascen-
dendum 70.41 *quo sit ducenda fasciata secunda*
ibid. 56
articulum luxatum restitutum primo esse in sua fi-
gura collocandum, deinde ligandum 68.13 *qua-*
tuplex eius positio 72.28 *quos positioni requi-*
rantur ibid. 56
articulus luxatus restitutus quo & quibus fasciis
sit deligandus 68.14 *deligationis modus* 70.20
prima medicamentum ibid. 10
Asari radice odorata esse odorem, semper serua-
re 44.11
Asarumina ibid. 16 *cur ita vocetur* ibid. 18
asarum non esse plantam coronariam ibid. asarum
non esse bacchari ibid. *asarum quare vocetur*
umbago ibid. 30 *asarum descriptio* ibid. 33
facultates ibid. 50 *loca, ubi nascatur* ibid. 53
Ascia deligatio 94.36 & 173.55
Ascia

I N D E X

Afcia quid fit ibid. 46
Aftelepidis opinio de atomis 27.20
Asperum quod fit 12.38 *quæ eius causa* ibid. 39
asperæ arteriæ vulnera ut plurimum non sanantur 165.5
asperitas siccitatem sequitur 22.5
asperitas quomodo & quibus fit corrigenda 22.5
Asphalatum & asphaltum non esse idem 33.57
asphalatus quid sit 53.59 *quis eius usus ipud vnguentarios* 54.5 *quæ ratio nominis* ibid. 13
varia eius nomina ibid. 15 *descriptio* ibid. 18
species ibid. 25 *flores* ibid. 32 *semina* ibid. 36
locus ubi nascitur ibid. 41 *usus* ibid. 46 *genera* 55.7 *oculta vis* ibid. 5 *eius lignum non esse lignum brasilium* ibid. 20
Atbamai Rex 34.20
Atbamai populi 32.34
Atheroma quid sit 280.31 *quæ eius natura & materia* ibid. *32* *quæ loca potissimum occupet* ibid. 37 *quomodo sit curandum* ibid. 39 *quid circa locum affectum agendum* ibid. 42 *qui sunt huius cura scopi* ibid. 45 *putrefactio materia quodupliciter fiat* ibid. 48 *sectio quomodo sit facienda* ibid. 53 *si folliculus atheromatis ossi hæreat quid agendum* ibid. 58 *Quid si os sit delectum & corruptum* 281. *si parua sit ossis corruptio* ibid. 11 *si os corruptum separatum sit* ibid. 41 *si corruptum os non appareat* ibid. 46 *Caro aucta quomodo abscindenda* ibid. 55 *quomodo cognoscatur* 277.31
Atrophia 21.10 *quomodo huic succurrendum* ibid. 23
attractio per quos gradus caliditatis fiat 24.23
Auditum non posse præbere fidem ad circa naturam medicamentorum 14.44
Auerrhoen quando scripsit de numeropartium simplicium, fuisse ebrium 99.49
Auerrhoen sibi ipsi esse contrarium de natura pinguedinis 111.50
aures inter omnes corporis partes fere siccissimas indigere medicamentis 238.45
aurium de fluxione cur & quomodo etiam in adultis fiat 238.13 *quomodo curande* ibid.
aurium fluxionibus in infantibus quomodo occurrendum 237.57 *quando non sint sistenda* 238.8
aures quot modis fiant purulente 238.38 *quæ sit ipsius purulentia causa* 238.39
aurium purulentum quomodo occurrendum 238.54
aures infantium purulente quomodo sint curande 238.31
auris vlcere esse cum ossis corruptione quomodo cognoscatur 239.19 *quomodo curetur* ibid. 23
aurium interius exulceratarum signa 238.4
aurium vermes unde generentur 238.59 *quomodo cognoscantur* 239.1 *quomodo curentur* ibid. 6
aurium polypti quomodo curande 239.11
auricula si sint amputatæ quid faciendum 206.10

B

Alueum pro scirrhus 260.43
Balsami veri nomina 49.20 *descriptio* ibid. 25 *altitudo* ibid. 28 *Forma sine affectu* ibid.
38 folium ibid. 59 *locus in quibus nascitur* 50.20 *species* 52.46 *modus & tempus colligendi eius lacrymam* ibid. 52
balsamum verum nos habere & non habere 49.20 & 51.23
balsamum non verum ex Indis occidentilibus delatum 51.36 *quomodo paretur* ibid. 47 *quæ eius dotes* ibid. 48 *Arboris ex cuius ligno paratur, descriptio* ibid. 51
balsamum orientale 52.1
balsamum artificiale 52.15
balsamum arte factum 51.26
basilicum matius 186.34
Benedicta medicamenta cur a Medicis ita vocentur 20.43
Bethra descriptio 44.36 *vis ad ciendam venenem* ibid. 38
Bilem in corpore humano triplicem a Medicis cognosci 253.39 *naturalis quæ & qualis sit* ibid. 42 *quare nec tangi nec conspici possit hæc naturalis* ibid. 49 *quæ non naturalis* 254.11 *unde sic vocetur* ibid. 12 *quod hac bile nihil sit amarum* ibid. 22 *quod non acris nec erodens* ibid. 27 *In qua parte corporis fiat* 254.38 *quot & quos morbos faciat* ibid. 54 *quotuplex sit præternaturalis* 255.1 & 5 *quæ eas sit* ibid. 8 *quomodo & quos morbos faciat* ibid. 10
bilem euacuari posse sine præparatione 183.34
bilis adusta per admixtionem 255.30
bilem atram non fieri ex pituita adusta 257.48
quod omnis atra bilis per admixtionem facta, licet frigida sit, habeat tamen partes calidas & acres 258.33 *quod atra bilis existat nunquam faciat scirrhum exquisitum & sine dolore* ibid. 34
bilis atra quotuplex sit 257.1 *quæ naturalis* ibid. 3 *quotuplex non naturalis* ibid. 11
bilis ventulina 259.28
Bolus in prima visitatione vulnerum thoracis exhibendus 217.50
bonum summum quod sit 326.10
bosphorus duplex 37.6
bones cur circa finem hyemis fiant macilentis 61.20
bonum articulos facile luxari, & quæ sit eius causa 62.19
Branzola error de spica montana 49.37
Bronchocele quid sit 286. *unde fiat* ibid. 53 *quæ eius materia* ibid. 54 *causæ succientes* ibid. 55
signa ibid. 56 *cur potius faciat ad huius tumoris generationem* ibid. 58 *cur oriatur tantum in gustare* 287.1 *an eius efficiens sit intemperies vel qualitas occulta* ibid. 5 *quotuplex sit hic tumor* ibid. 13 *quot modis curetur* ibid. 10 *curatio per manum an conveniat* ibid. 16 *curatio per caustica* ibid. 32 *per differentia* ibid. 35 *quæ sit vera eius curatio* ibid. 39

bryon quid significet 58. 15 quæ eius species ibid.
quid bryon marinus ib. 19 bryon duplex ib. 40
buccellatio quid sit 108. 45

C

Cadmia duplex 264. 59
Calamus aromaticus an sit acorus 34. 8
calida non omnia attrahere 20. 36
Callus quid sit, contra Galenum 89. 45
Callus luxatio articulis superueniens quotuplex sit
84. 15 quibus luxationibus quibusque ar-
dialis solet succedere ibid. 17
Calli lapidosi signa ibid. 23 signa duri sim-
pliciter ibid. 28 calli lapidosi non esse susci-
piendam curationem ib. 35 quæ ipsius sit cu-
ratio ibid. 37 calli curationem admissen-
dis medicamentis localia ibid. 46 emollien-
tia ibid. 53 frictions ibid. 59 frictione sa-
cta quid agendum 85. 5
Calli generatio quomodo fiat 323 præseruatio à
callu ibid. calli facti curatio ibid. varia no-
mina & species ibid. materia. ibid.
callus ossis quid sit pt. 50 unde oriatur ibid.
quando concreuit callus quid agendum ibid.
55. quæ sit eius materia 92. quæ materia sit
apta ad eius generationem ib. 6. Quæ ad eius
generationem requirantur ibid. si magnus cal-
lus sit procurandus quid requiratur ibid. 20
quid si parvus ibid. 27 si mediocris ibid. 34
Cancer quid sit 261. 38 quæ eius nomina & no-
minum ratio ibid. 39 quæ genera ibid. 48 &
262. 35 quotupliciter ducatur occultus ibid.
54 quotupliciter manifestus ibid. 57 quod
cancer fiat à quacumq; atra bile 262. 4
Cancer benigni signa 262. 18 venis non effecer-
unt signum canceri, nec in omnibus reperiri
ibid. 21 quæ signa maligni ibid. 22 qui can-
cri dicantur aulis & qui hærentes 262. 35
cur malignus cancer dicatur nobis metange-
re 262. 40 Quæ sint causa canceri efficientes
ibid. 50 quæ cibaria eum prognerare soleant
ibid. 55 quæ causa materiales ibid. 59 quæ
causa ulcerationis in cancro 263. 6. Canceri
occulti externi benigni præsagium ibid. 11 quæ
sit canceri curatio 263. 24 quod & quare con-
ueniat vena sectio 263. 43 quæ eligenda pur-
gantia 263. 57. quales curæ sunt utiles
conueniant in hac cura 264. 21. circa locum
affectum quid tentandum ibid. 36 qualia ex-
terna cancro incipienti conueniant ibid. 37
quæ in augmento ibid. 51
Canceri qui abscindi possunt ac debeant 265. 20
quos condisiones requirantur in sectione canceri
ibid. 23. cur magis conueniat sectio quam vstio
ibid. 31 sectio recentiorum cur reprobetur
ibid. 34 sectio quomodo fieri debeat ibid. 39
quid post sectionem faciendum ibid. 43 lo-
cus sectus quando consueudus ibid. 52 qua-
rum mammillarum canceri secari debeant & qua-
rum non 266. 5 quando ad vstionem sit dene-

niendum ibid. 7 per quæ vstio perficitur ibid.
10 &c. quomodo ij, quibus cancer sectus & cu-
ratus est postmodum sint regendi ibid. 39 qui
canceri occulti sint curandi, & qui non, & quæ
curatione tractandi ib. 47 quid circa vena se-
ctionem notandum ib. 19 quid faciendum si
cum cancro sit morbus galleni 167. 13 quod
etiam canceri occulti pallentri possint ibi. 31 caro
unde fiat 105. 43
Cancer narium an sit polypus Galeni 296. 14
Canceri narium signa 296. 38 præsagium ib. 42
Cani pudendi virilis quid sit 339. 10
Capilli quomodo post curationem tinearum sint re-
generandi 217. 47
Capsula Galeni pro fractu membri collocanda
91. 1.
Obseruanda in hac capsula ib. 15
Capiti euacuatio in oculorum ulceribus quos mo-
di fieri possit. 247. 51
Cardamomum quid sit & quale 36. 55 unde ad nos
deferatur ib. 53
Cardamomum Græcorum nos non habere 37. 3
Cardamomi electio 37. 10 Genera ib. 13
Cardamomi ex India delatum esse duplex 37. 36
Cardamomo Arabum nos non carere 37. 50. nec
illud esse idem cū Cardamomo Græcorū 37. 50
Cardamomi facultates ib. 51
Cardamomi veri loco quid supponendum 37. 53 &c.
Carpobalsamum quid sit 51. 23 nos habere in of-
ficinis falsissimum 51. 27
Caro quid sit 113. 24 quæ & quotuplex eius ma-
teria ib. 28 varia eius nomina 112. 26 Species
ib. 30 causa efficiens 114. 1 Temperies ibid.
58 & 116. 17 facultas ib. 22. gradus calidi-
tatis ib. 38 vsus ib. 43 differentia 117. 13 pos-
siones ib. 18 an reperiatur caro in venis & ar-
teriis 112. 36 an reperiatur caro simplex & si-
milaris ib. 50 carnem esse veluti municipium
omnium partium similium 113. 1 Carni ge-
neratio in vulneribus ib. 52. Carnem liquari à
calido interno immerso 114. 40 Carnem coctā
non esse carnem ibid. 47. an caro possit alterare
sanguinem ad calidum & humidum 115. 8 an
caro carnem generet ib. 17 quomodo sit calida
& humida, & quomodo frigida, & sicca ib. 18
quod sensum habeat exquisitiorem, quam alia
partes 116. 45 Quod non sit instrumentum im-
mediatum motus 114. 41 quod sit primum ele-
mentum corporis 112. 3
Carnes habere quidem vsu, at non perfectam a-
ctionem 103. 10
Carnes quomodo præseruentur à putredine 12. 40
Carnis generatio in vulneribus quæ & quæ requi-
rat 124. 54
Carnis gignenda materia ib. 56. causa efficiens
185. 3
Caro supercrefcescens in vulneribus unde fiat 187.
40 quibus medicamentis possit auferri ibid.
49

Cartilago quid sit 108.40 **Quæ** eius materia 107.39 **quæ** causa efficiens 108.31 **forma** ibid.33 **usus** ib.37 **passiones** 107.10 **passiones** naturales 109 **instrumentum** effectus 108.26
20 **unde** immediate nutriatur 108.25 **in** quibus corporis locis nascatur 107.12 **quod** sit prater ossa omnium partium speciosissima & durissima 107.7 **quomodo** abesse differat ib. & 19 **quodnam** eius proprium ib.12 **tur** natura medullam in cartilagine differt per tota eius substantiam ib.25 **cartilaginei** non habere eandem materiam cum osse ibi.36 **quod** habeat etiam suas cavitates 108.3 **Quod** cartilago sit duplex ib.4 **Quomodo** variatur quædam ib.8 **quod** sit ad vocem formandam pars inter omnes commodissima 109.13 **quod** carant sensu ib.11 **quod** ulcerat a difficultate sanentur quam ossa ib.22
Carui agreste 7.21
Caruncula saporis effertur in canali urinario quid sit 319 **quæ** eius causa ib. curatio ib. **Petri Galli** laus in eius medicamento ib. **Candela** loco quonam utendum 320 ib. **notandum** in suppressione virtutis caruncula ib: decoctum pro cicatrice inducenda 320
Caruncula urinarum signa 296.37
Cassia inter aromata esse apertissimam 451 **esse** similem cinnamomo ib.2 **eius** historiam antiquis esse ignoratam ibi.3 **quæ** eius nomina ib.8 **ubi** oriatur ib.9 & 12
Cassia antiquorum esse cinnamomum officinarum ib.10 **solum** corticem ad nos deferri ib.32 **cannellam** nostram esse veram cassiam ib.39 **cassia** arbor in quibus locis nascatur ib.44 **qualis** sit arbor ib.50 **quæ** optima ib.33 **quæ** eius species ibid.38 **quæ** facultates 46.12 **pseudocassia** 46.4
CastRATIONEM esse veram medicinam hernia intestinalis 313 **in** quibus non conveniat ib. **quomodo** fiat ibid.
Catagma osium quid sit 18.46 **quæ** huius causa ib.58
Causa crusta inducentia pro vulncribus vasorata 217.47 **in** quibus locis corporis conveniant & quibus non 217.48
Causitorum usus quibus in locis corporis sit fugienda 217.49
Cauteria quot modis fiant in ulceribus oculorum 242.12 **quando** non conveniant cauteria ib.13
Cauteria an in ulceribus narium conveniant in decessu 245.33
Cedrum esse laricem 16.50
Cera valde arida fermentant melancholicam 273.20
Ceratum commune pro aranda inflammatione in luxationibus dammandum 69.46
Cerati humidi ad eundem finem approbatio & descriptio ib.57 **duplicem** esse modum conficiendi hoc ceratum 70.3

Ceratum barbarum ex Galeno 171.10
Ceratum amygdalinum 192.11
Cerebrum non esse instrumentum vita, nec durum, nec in motu 163.54
Cerebrum cur non habeat pinguedinem 111.15
Cerebri vulnera an sint lethalia 163.43
Cervena seu caprimulgus anguis vis in sermone 291
Chalybis praequantia in emolliatione scieris, patris & matris 281.31
China adicis decocti vis in cancro, praefertim si sit coniunctus cum morbo gallico 267.13
Cholera seu bilis citrina 255.26
Chorda omnes nostri corporis habere principium ab uno esse & declinare in aliud, maiore extensio donec integra fiant 281.3
Chorda quomodo sit pars composita & quomodo simplex
Choridis perdicum & coturnicis mulari in ossa
Chymica virtus cognitionem valde utilem esse Adedico & cur 29.2
Cicatrix quid sit 188.26 **quæ** eius materia ib.11 **quæ** causa efficiens ib.21 **an** fiat tantum a medicamento 188.23 **quomodo** parti vulnerata induci possit ib.10
Cinnamomi nomina 46.30 **ubi** oriatur ibid.33 **quales** sit planta ib.37
cinnamomum ut & cassiam antiquis fuisse incognitam ibid.3 **ubi** oriatur ib.12
cinnamomi varia genera secundum varias aetates ib.47 **nos** habere cinnamomum confusum 47.3 **cinnamomum** quo modo a cassia differat ibid.13 **Quomodo** ex cassia fiat cinnamomum ib.12 **teneram** cassiam esse cinnamomum ib.35
Cinnamomi genera 47.40 **in** quo differat verum cinnamomum a pseudocinnamomo & xylocinnamomo ib.54 **quæ** sint eius facultates 48.1
Cingulum bragherium dictum pro herniosis 310
3.9 alia magis approbata 311.4 **quæ** eorum forma 311.4
Clysters nutrientes in vulncribus ventriculi 226.4
collocatio membrorum fractis 219.41
colli partes quæ & quot sint 206.18
colli vulnus simplex quod sit 206.18 **quomodo** curandum ib.31 **in** eius confusione quæ obseranda ib.35 **quid** post suturam faciendum ib.40
quomodo prohibeatur abscessus si pars musculi abierit 206.18
Colli vulnera quomodo liganda 209.47 **quid** post tertium diem faciendum 206.18
Colores indicant dispositionem corporis, quæ in superficie est, non autem illius, quæ in profundo existit 17.24
Color an praebeat cognitionem substantiae 17.22
Colores ac odores quantum inferant ad dispositionem naturæ mixti cognoscendam 17.27
Colores in ingris dominiam humorum indicant 17.30

Collyria ad cicatrices oculorum tollendas 209. 53.
 Collyria pro ulceribus oculorum ad fordidis 242. 41
 Collyria pro remouenda cicatrice ulcerum oculo-
 rum 243. 33
 Comagenensis regio 37. 4
 compressum omne ex elementis necessarium habere
 mentus vel ordinatos vel inordinatos. 203. 21
 compressibilia & non compressibilia 10. p qua ho-
 rum causa ibid. 21
 comprimentia ac adstringentia quomodo enacuent
 20. 3
 concretionem per congelationem fieri dupliciter
 114. 20
 conditura medicamentorum per qua fiat 29. 6
 Condylomata quid sint 320. qua eorum cause ibid.
 quousplacia sint ibid. curationem per sectionem
 meliorem esse quam per medicamenta ibid.
 congelationis & indurationis causa 36
 consolidantia medicamenta pro vultibus thoraci-
 cis quot modis possint applicari 216. 22 quot u-
 plex eorum sit materia ibid. 49 simplicia 217.
 4 composita ibid. 19
 contenta in vultere trium esse generum 169. 23
 contradiatio apprens inter Galenum & Diosco-
 ridem de spica nardi indica 38. 13
 contradiatio in Galeno de temperie arteriarum
 144. 38
 contradiatio maxima in Galeno, Paulo & Aetio de
 dyspnoea 80. 52
 contradiatio inter Galenum & Aristotelem de par-
 tibus similibus unde consent 90. 56
 contradiationes Galeni de numero partium simila-
 rium 10. 12
 contradiatio in Galeno de tendinibus 113. 20
 contradiatio in Gal. de sensu chordarum 126. 8
 contradiatio in Gal. de membranis 127. 17
 contradiatio in Galeno de tunicis arterie 136. 24
 lia ibid. 15
 contradiatio inter Galenum & Aetium de epuloti-
 ci 188. 54
 contradiatio inter Auicennam & Galen. 335. 20
 cordis substantiam non esse eandem cum substan-
 tia arteriarum 142. 55
 cor quare sit inter partes corporis calidissima 111.
 13
 cor quomodo sit principium venarum 129. 28
 cor non esse principium omnis sanguinis contra A-
 ristotelem 133. 22
 cor quare non possit esse principium omnium trium
 facultatum 133. 8
 cor cur habeat pinguedinem circumpositam 111. 24
 cor & epar utrum prius generetur in animali 133.
 26
 cor & cerebrum utrum praesentius altero 133. 30
 cor ventriculorum dextrum non habere per se, sed
 per accidens 133. 46
 cor detestum ut & arteria cur non moueantur
 143. 38
 cordis vulnera 163. 30 cur omnia lethalia ibid.

cordis vulnera signa 114. 25
 corallina quid 56. 22 qua eius vires ibid. 24
 Corallum esse lignum & versi in lapidem 108. 9
 cordumeni Arabum 37. 17 duplex ibid. 18
 Cornarii error de castis 41. 43
 corpora caelestia quomodo alterare possint inferio-
 ra ibid. 7. 16
 corpora simplicia quomodo a philosopho consideren-
 tur 2. 19 quomodo a medicis ibid. 37
 corpus simplex naturale quod aut quid sit
 corpus homogeneum quale sol. 2. 11
 corpus omne mixtum suas habere partes 119. 2
 corpus summa perfectio qua sit 125. 47
 corpus humanum in duas diuidi partes 96.
 49
 corpus humanum non ex unica substantia esse consti-
 tum 96. 19 ex quibus partibus constet ibid. 30
 corpus humanum tripliciter excedere symmetriam
 in quantitate 128. 26
 corpora puerorum cur magis vaporosa quam se-
 nium 11. 11
 corpora dupliciter fieri mollia 21. 41
 corpora mollia quomodo induranda 21. 42
 Corpori attrahere quidem ac non retinere valenti
 quomodo occurrendum 21. 15
 corpus dupliciter esse posse vacuum alimentis 21. 3
 corpus si sit vacuum excrementis quid agendum, &
 quid si alimentis 21. 1
 corpora super quae membra locata collocantur qua-
 sit esse debeant 23. 9
 correctio locorum de cinnamomo 47. 48
 crassum quod sit 13. 8 qua eius causa ibid. 9
 crassities quomodo & quibus curanda 21. 49
 Gratae herbarius quo tempore vixerit 27. 8
 cremabile & non cremabile 11. 17
 crusta in uestione causa quot modis fiant magna
 vel parua 86. 25
 cubeba semen 32. 28 Cubeba Arabum ibid. 101.
 cubeba Arabum nos non habere ibid. 31
 Cuprosa quid sit 303. 56
 curatio fracturae simplicis quomodo differat a cu-
 ratione eius, qua est cum ulcere 94. 17
 curcumam officinarum esse cyperum indicum 36.
 41
 Curtii opinio de natura pinguedinis reicitur 111.
 38
 Cutis vera quid 154. 49 qua cutis nomina ib. 26
 materia 155. 35 nutrimentum ib. 56 tempera-
 tura 156. 4. Usus ibid. 10 passioni naturales
 ibid. 14 causa efficiens 155. 59 ex quibus parti-
 bus constet corium & quae sint 154. 35 cuticula
 154. 38 quod non habeat actionem sedentium
 usum ibid. 56 qualem habeat sensum 155. 6 &
 156. 13 quod sit verum instrumentum tactus
 & uestitum ibidem. 19 an habeat substan-
 tiam propriam, vel sit caro refecata ibidem.
 28 quod non regeneretur ibidem. 38 qua-
 re non coalescat ibidem. 41 cor cutis capitis
 non ita exquisitè sentiat 156. 20
 Cyperi

Cyperus nomina 35. 31 *variorum horum nominum causa* *ibid.* 40
Cyperus descriptio *ibid.* 40
Cyperus semina comesta inebriare 36. 2
Cyperus duplex genus 36. 13 *electio* *ibid.* 25
Cyperus verus unde ad nos deferatur 36. 16
Gysifolia eandem habere figuram suam, & lanuginem cum folio samplicis 30. 11
D *Decoctum leniens asperitatem medicamentorum pro oculorum vulneribus facientium* 201. 10
decoctum guttatum in oculum vulneratum loco albuminis oui infundendum 201. 40
decoctum pro fouenda parte vulnerata narium refrigerata 204. 34
decoctum stupefaciens pro doloribus vulneratorum oculorum 203. 27
decoctum infundendum in cauitatem vulnerati thoracis 217. 37
decoctum exicans saniem ad abluendum vlnus pectoris 218. 41
decoctum fons in intestinum per vlnus egressum pro discutiendis flatibus 214. 20
decocta in vlna ventriculi infundenda 213. 51
decoctum repellens pro ablutione & confirmatione agri ablutum dentium 247. 27
decoctum modice siccans pro fistulis ani gallicis 252. 8
decoctum pro spu sciendo in bronchocele seu bocio 287. 46
decoctum per interius sumendum pro hernia intestinali scrois 311. 54
decoratio quid sit 327. 30
defectus animi quid sit 189. 48 *que eius causa* *ibid.* 53 *qua arte possit praecari* *ibid.* 58 *quomodo ager collocandus* 190. 11
dehaurio 173. 45 *quae eius species* *ibid.* 50 *materia* *ibid.* 59
delatio incarnatiua 174. 27 *retentiu* *ibid.* 37
expulsiu *ibid.* 40 *prohibens apostema* *ibid.* 46 *que & quot sint obseruanda in delgatione* *ib.*
deliquium animi praesens quomodo curandum 190. 22
dentium sensus qualis sit 116. 54
dentes quid & quomodo sentiant 143. 20
dentes quomodo a topio praeseruari & ablu possint 247. 22 *quomodo agiles confirmandi* *ibid.* 26 *quid siccant facienda* *ibid.* 31
densum quod sit 12. 23 *que huius causa* *ibid.* 26
detergentia quatuorplex sint 254. 34
diacasia 217. 31
diaphragmatis vulnerati signa 214. 46
diaphragmatis vulnera quae lethalia & quae non 164. 13
diapysmaon dicta medicamenta varia 217. 21
differentia veluti potentia in simplicibus m. e. lica-

mentis quae & quot sint 213
differentia inter Aristotelem & Galenum de compositione corporis 100. 15
difficultas magna de hippocelino 43. 18
difficultates circa castam esse multas 45. 1
digestiu communis descriptio 186. 18
digestiu vulnera concoquenda 190. 33
diognos non moueri a seipsis 140. 32
dilatabile & non dilatabile 10. 43
Dioscorides fuit Empiricus 25. 48 *quos scripserit libros* *ibid.* 50 *quos habuerit amicos* *ibid.* 55
Dioscorides plures fuisse 25. 20
Dioscoridi nostri patria 25. 37
Dioscorides fuit miles & quare 21. 44
Dioscoridi auctoris a. ib. 43 cur dictus fuerit Tharsensis 16. 41
Dioscorides correctio de a. i. p. o 36. 18
Diphryges quid 205. 8
Discordia maxima inter Dioscoridem & Theophrastum circa saporem radicum cyperi 36. 20
Discordia inter Matiholum & Amatum Lasiannum de iride 32. 27
Discrimen inter Galenum & Aristotelem de partibus corporis humani 96. 30
Discutientia medicamenta quae sint 19. 12
distorsiones articulorum dupliciter fieri 27. 6
distorsio facta per obstetricis ib. 12 quomodo corrigenda *ibid.*
diueticis pro vulneribus renum 217. 11
doloru vulnerum causa 191. 13 *curatio* *ib.*
dolor in vulneribus oculorum quomodo mitigandus 202. 54
Dropaces quando potissimum fuerint in v. s. & quatuorplex sint 21. 27
dulcedinis gradus quanto magis est intensus, tanto est corpus illud, in quo consistit, calidius 23. 6
dulce an & quomodo sit contrarium amaro, & acre acerbo 16. 35
durum quod sit, quae & quatuorplex eius causa 12. 27
duritiem multipliciter oriri posse 13. 17 *& quomodo unaquae tolli possit* *ib.* *quae sit incurabilis* *ib.* 38

E

E *Clegma optimum pro vulneribus partium internarum gula* 207. 40
Elaterium quandiu integrum seruari possit 30. 26
electuarium sub lingua ieiundum in bronchocele seu bocio 287. 54
electuarium pro hernia intestinali scrois 312. 14
electuarium contra maciem 336. 20
Ellebori albi virum & palus reprobantur in lege 274. 39
elleborus albus quomodo exhibeatur ad comedendum 274. 43
Elongationem articuli esse duplicem 86. 38 *quomodo emendanda* *ib.* 44
Elongatio membri quot requirat 65. 12 *quo tempore instituenda* *ib.* 20
Eluxabile & non eluxabile 10. 57 *quae utriusque*

| | |
|---|--------|
| causa | ibid. |
| Emplastrum Fallopi contra cancrum incipientem | 264.43 |
| Emplastrum icesis faciens ad luxationes | 75.50 |
| Emplastri lisis nomina & descriptio | 181.50 |
| Emplastrum diaboli anion | 171.5 |
| Emplastrum concoquentium materia | 190.59 |
| quomodo ea vulneribus imponenda | 191.6 |
| Emplastrum varia pro erysipellate in vulneribus | 191. |
| 55 | |
| Emplastrum Fallopi pro sedando dolore in vulneribus oculorum | 103.5 |
| Emplastrum carnem generis in vulneribus venarum & arteriarum | 109.15 |
| Emplastrum vulneribus peitoris applicandū | 115. |
| 48 | |
| Emplastrum ex radice consolida maioris | 213.50 |
| Emplastrum Fallopii pro aneurysmate | 286.8 |
| Emplastrum Alexandri ad melicerides | 278.20 |
| Emplastrum ex salibus contra melicerides | 278.31 |
| Emplastra maiurancia materiam meliceridum | 278.31 |
| Emplastrum pro curando ganglio penis | 295. |
| 40 | |
| Emplastrum ex cochleis | 267.10 |
| Emplastrum relaxans pro hernia intestinali scroti, quando in intestinis adsunt cruditates | 309.17 |
| Emplastrum cuiusdam consoris optimū pro inflammatione testium | 316 |
| Emplastra Fallopii pro apertione hamorroidarū | 321 |
| Emphysemata thoracis vulnerati quomodo sint tractanda | 218.16 |
| Epulis quid sit 304.12 quæ nominis eius ratio ibid. 26 cause ib. 29 Materia ib. 35 Signa ib. 37 Praesagium ib. 39 curatio ib. 40 quomodo & quibus ablunda ib. 44 quæ exterius applicanda ib. 49 Carnis ablatio quot modis fiat ib. 55 medicamenta familiaria pro excidenda carne ib. 58 Fallopii curatio per sectionem diceram ab illa Pauli & Aetii 305. | |
| 7 | |
| Epulotica qualitate esse debeant 188.35 quem gradum siccitatis requirant ib. 41 epulotica composita triplicia 189.6 propria ib. 30 | |
| Erodentia omnia esse vel Jassa vel acria | 254. |
| 26 | |
| Errhina in ulceribus oculorum vsualia | 242. |
| 4 | |
| Error interpretis Dioscoridis in descriptione amomi | 48.6 |
| Erysipelati in vulnere curatio 191.48 & 192. | |
| 3 | |
| Evacuatio quot modis fieri possit 19.4 & unde tot modi hauriuntur ib. 8 | |
| Evacuatio quando per absterisionem fit instituenda 19.40 & quando per abluionem ib. 42 quando per lubricantia ib. 48 quando per lenientia | |

| | |
|---|--|
| ib. 53 | |
| Evacuatio per pharmaca an contentatio in vulneribus 183.12 unde indicetur ib. qui humor possimum evacuandus ib. 19. quæ pharmaca exhibenda ib. 23 In quibus vulneribus conveniant pharmaca ib. 27 | |
| Euphorbium bonum quatenam sit 22 quod raro invenitur ib. | |
| Euphorbii præstantia in nervorum vulneribus 230.17 | |
| Euphorbium quot modis misceri possit pro medicamento ad dolorem punitorum nervorum 231.8 | |
| Excrementa omnia habere suas causas 109.29 & quomodo ib. 35 | |
| Excrementa omnia habere eamdem, quo extramittantur ib. 35 | |
| Excrementorum vulnere varia vices 167.45 | |
| Excrementum vulneris duplex 153.8 | |
| Excrementorum vulneris natura 161.10 | |
| Excrementi secundi in vulneribus natura 168. | |
| 41 | |
| Excrementorum vulnere materia 169.12 | |
| Exsiccatio capitis quot modis fiat 245.56 | |
| expressio humorum an in luxationibus conveniat 69.2 | |
| Expurgationis vis in cancro 264.12 | |
| Extensionem fracti membri sine anarome esse impossibilem 30.23 | |

F

| | |
|--|-------|
| Fallopii opinio de balsamo | 50.57 |
| fasciarum materia 173.59 delectus 174.5 | |
| usus ib. 16 | |
| Fascia membrum luxatis imposita quomodo in suo loco conservari & stabiles reddi possint 71.24 præcepta circa fasciarum obvolutionem 72.3 | |
| Fascie pro deligendis articulis luxatis quales quoniam & quot esse debeant 68. & 69.14 quibus rebus madescentia ib. 18 | |
| fascia quomodo in fracturis cum ulcere obvolvenda 94.10 & 95.2 | |
| Ferulis quando viendum sit in fracturis 91.16 | |
| Ferula ad fracturas ossium quando apponenda 92.36 ubi crescant ib. 37 | |
| fibra cur facta sint à natura 128.46 | |
| Fibularum nomine quid Aledici intelligant 176.38 quid fibula significet ibidem 44 an fibula distinguatur à sutura, an vero sit idem cum ea 177.2 | |
| Figatella 56.27 | |
| figuratio articuli restituti quod duplex 68.1 | |
| Fili, quo in consensendis vulneribus utimur, conditiones 177.41 materia ib. color ib. 47 | |
| Finis medici in tractatione de simplicibus 17. | |
| 55 | |
| Fistula lachrymalis unde habeat nomen. 243.41 quomodo cognoscatur ib. 46 quod duplex sit & quæ utrinque signa ib. 49 quæ & quoduplices harum | |

harum causa ib. 17 signa 244.1 curatio ib.
4 quod semper sit utendum erritina ibid. 20
quid agendum si fistula sit cum perforatione cu-
tae ib. 20 si os sit corruptum quomodo cogno-
scatur ib. 24 quid agendum ib. 31 fistula li-
chrymalis quomodo possit diluari ib. 27 quid
agendum si os tantum deiectum sit ib. 46
fistula callus quomodo sit adimendus 245.2 quo-
modo curare regeneranda ib. 4
fistula si vulneris thoracis superueniat, quid agen-
dum 219.1
Fistula an quid sit 248.33 quot modis oriatur
ib. 37 qua sint eius differentia ib. 40 causa
externa ib. 51 causa tuberculorum fistulas pra-
ecedentium ib. 53 cause interna ib. 58 signa
249.3 praesagia ib. 26 indicationes univer-
sales ibid. 39 an conveniant pharmaca a toto
trahentia ib. 42 vena sectio ib. 46 loci affe-
cti tractatio ib. 50
fistula an quot modis secari possit 249.54 fistula
callus ante vel post sectionem & quomodo sit
auferendus 250.1 quid si fistula non perfora-
tus ib. 16 modus curandi fistulas absq. sectione
251.1 fistulae insanabiles & non perniciosae qua
& quotuplices sint ib. 29
Fistula an an sint curanda nec ne 251.14
fistula quando sit sanabilis & quando non 30
Fistulam omnem sanabilem esse sanandam 251.
10
Fistula an quomodo feruentur aperta ib. 38 quo-
modo praeservetur a callo ib. 44 quomodo cal-
lus praesens removeatur ib. 49
Fistula an si sit perniciosa, quid agendum ibid.
55
Fistula an si sit gallica, quomodo curanda 251.57
notandum circa usum aquarum thermalium in
anifistulis 252.1 Ratio usus cannulae in iisdem
ib. 6
Fistularum plumbearum usus in vulneribus na-
rium 205.18
fletu maxime nocere vulneratis 184.27
Flexilia & non flexilia p. 53
flores quando sint colligendi 30.48
Fomentum pro herniis 321.40
fons miraculo ortus 30.42
Formabile & eius causa 10.36
Formicarum usus pro saturare cutis 127.59
Formis narium quomodo sit utendum 205.
24 qua inter ceteras magis laudata ibidem
46
Fractura si superueniat inflammatio vel tumor quid
agendum 93.48 Quid si vlcus ib. 49 cum os
est denudatum non tamen prominet ib. 52. Si
os paruum sit detectum 94 si vlcus inrude-
scit ib. 24 si magnum os sit recessurum ib. 31
si os promineat a carne 95.9 si conuulsio post re-
stitutionem accidat 95.27
Fractura ossium curanda species 89.1 signa ib.
5 Curatio ibidem 24 quaratione membrum

sit extendendum 90 quid facta extensione inci-
pienda ib. 20 quomodo membrum in sua
sede constringendum ib. 27 quomodo inflamma-
tio arcenda ib. 30
Fractura cum esse prominente extra carnem qua-
do possit sine conuulsione restitui & quando non
95.11
fracturarum sanatio u terminus 93.18
fractum membrum ligatum tunc interdu Medi-
cus cogatur iterum dissolvere 93.28
fracto membro extenso & reposito quid obseruan-
dum 95.21 tempus restitutionis fracti mem-
bri quodnam sit ib. 25
fracta membra quando extenuentur 91.43
Frangibilia & non frangibilia p. 46
Fragile quod sit 12.58
frictionum duo esse genera 234.27
frictionem mollem laxare, maximam vero indu-
rare 76.13
Frictiones pro callo in luxationibus 24.59
fronti canitatis vulnera cur ut plurimum non sa-
nentur 165.2
fractus quando sint colligendi 20.48
fractus qui cito & optime maturentur 29.57
Fuchsius taxatur 56.45
fulgines sint ne in corpore

G

Galangae duae species 33.56
Galangam officinalem non esse radicem acori
31.58
Galenii textum de spica mentana esse corruptum 40.
33
Gallia triplex 39.20
Ganglion quid sit & unde suum habeat nomen.
291.50 tarconcrestat circa vernos ib. 34 qua
eius sit causa ib. 58 materia 294.13 signa ib.
18 loca subiecta ib. 33 per qua signa a steato-
mate distinguatur ib. 37 quale habeat praesa-
gium ib. 47 qua & quotuplex curatio ib. 52
ganglio penis vel podendi, quando & quomodo pos-
sit curari 295.32
gargarisma pro agglutinatione partium internarum
gula 207.38
Generationem nostram non esse totam ex sangui-
ne, contra Aristotelem 133.23
gingiuarum erosio 247.3 quomodo sit curanda,
ib. 16
glans plumbea vel ferrea ex sclopeto corpori immis-
sa quando sit extrahenda 235.3 quomodo ib.
13 quibus instrumentis ib. 18
glandes pro pueris hernia umbilicali laborantibus
307.34
glandularum duplex genus in homine 289.23.
quicarum usus 292.57
glossocomion recentiorum pro fractis membris col-
locandis 90.57
gluten pro applicandis formis masearum 205.48
glutina facientia ad retas applicandas vulneribus
175.29 gluten Fallopi optimum ib. 47

glutinositas quid apud Galenum 166.11
 Gonzali Ferran silanus 51.42 & opinio de balsa-
 mo 169.34
 Gossipium usum non conuenire in vulneribus fac-
 ciei 169.34
 Grane quod sit 12.10 grana & terrestria sua na-
 tura multa dici, quae tamen appareant sensibus
 lenia ib.14 quare & quomodo id fiat ib.16
 Gravitati immodica quomodo & quibus occurrē-
 dum & quomodo item lenitati 22.20
 Guilandini laus 52.5
 Gule vulnera cur sint periculosa 207.3 quid in
 ipsis sit statim faciendum ibid.15 potius qualis
 conueniens & ex quibus fiat ib.50 qualis cibis
 ib.54
 Gummi contra scirrhus vsualia 260.38
 Gustus qualis sit sensus 15.24 eius praesentia ib.
 Gustus quomodo possit cognitionem trahere medi-
 camentorum ac naturarum simplicium 15.16
 Gussa rosacea quid sit & quomodo à cōsue differat
 300.34

H

 Habitus corporis naturalis quid sit 328.42
 haemorrhagia narium quomodo sistenda per
 testiculorum refrigerationem 20
 Haemorrhoides venae quot sint 320 quae earum
 species ib. materia ib. Cause ib. Curatio ibid.
 Indicationes ib. Clyster. ib. doloris mitigatio
 ib. Quid agendum si sanguis nimium fluat. ib.
 321 an omnes haemorrhoides liganda sint, si
 omnes sanguinem spargant ib. quomodo sint ci-
 catrizanda ib.
 haemorrhoidarum provocatio quomodo fiat 263.
 Haemorrhoidis narium signa 298.36 praesagium
 ib.44
 hepar non esse principium venarum 229.23 &
 esse principium venarum ib.30
 hepar esse verum & perfectum officinam sanguinis
 131.20
 Hepar cur non habeat ventriculos veluti cor 133.
 50
 hepar cuius vi attrahat 98.24
 hepar quadruplex habere excrementum 254.40
 hepatis vulnera quae lethalia & quae nō 164.3
 hepatis vulnera qualia sint 226.36 quomodo co-
 gnoscantur 219.42 quid de iis praesagiendum
 226.37 quae ipsi exterius sint applicanda ibi.
 40 quae per interius exhibenda ib.45
 hepatica 58.27
 Hernia quid sit 306.33 in quibus corporis locis
 oriatur ibid. quae sint eius differentia seu spe-
 cies ibid.34 Quae causa hernia umbilicalis
 in pueris & mulieribus 307.3 materia ibi-
 dem 6 per quae signa umbilicalis ab intestinali
 possit distingui ib.17 quomodo cognoscatur si
 sit ab omento ib.22 à statu ibid.26 ab aqua
 ibid.30 à carne ib.33 sistit aneurysma ibid.
 34 Quae ius sit curatio ibid. 35 actionem

mannalem non esse sentendam ib.37 quae pri-
 mo agenda ibid.42 quid, si hernia sit ventrosa
 ib.32 quomodo umbilicus sit contrahendus
 308.1 Quid agendum si hernia sit aquosa i-
 bid.6 Omnem herniam non posse curari me-
 dicamentis 309.10
 Hernia aquosa quid sit 280.24
 Hernia aquosam esse duplicem 314 quae sint
 eius signa ibidem. quot modis eius curatio fie-
 ri possit ibid. quid faciendum si aqua sit in
 folliculo ibidem. quando ad curationem per a-
 pertionem sit veniendum, & quomodo ea per-
 ficiatur ib. notandum circa sectionem in pueris
 & adultis ib.
 Hernia inguinalis nomina 308.16
 Hernia intestinalis quomodo fiat 308.42 quae
 le habeat praesagium ib.51 quomodo ab aliis
 hernia speciebus distinguitur ib.53 quae ha-
 beat causas efficientes ruptura ib.57 quae di-
 lationis 309.3 materiales ib.5
 Quid in eius curatione observandum ibid.7 per
 quae illa fiat ib.10 quomodo cognoscatur an
 hernia ferot sit facta per relaxationem aut per
 rupturam ib.16 Quae hernia sint tractanda
 medicamentis & quae sectione ib.14. & 19
 quas intestinales habeat indicationes ibid.21
 quae pericula superueniant si non curetur ibid.
 20 quomodo intestina restituerenda ibidem 31
 quomodo materia in intestinis egressa contenta
 cognoscatur ib.35 si flatus sint in hernia inte-
 stinali scroti, quid faciendum ib.47 quid, si
 adfuit cruditas 310.1 an conueniat oleum o-
 mygdalarum dulcium cum lubricatione ibid.4
 quae circa intestinum cum phlegmate sint po-
 nenda ibid. 22 Si facies prolapsa fuerint in scro-
 tum, quid iam agendum ibid.31 an exhibitio
 aquae frigidae in hoc casu conueniat ibidem 37
 Hernia intestinalis scroti intestina in suum locum
 restituta quomodo in eos conseruentur 312. 47
 in quo termino relaxatio possit aggruati ibid.
 48 qui sit terminus applicandi cerati pro hac
 hernia 311.38 quid faciendum pro doloris mi-
 tigatione & feruoris contemperatione 312.54
 Inuentum recentiorum sanandi sine ablacione
 testis 313 quomodo curetur hernia ex omen-
 to ibid. quae sint hernia ex omento signa ibid.
 Hernia scroti 308.18 varia loca in scroto posse in-
 tumescere ibid.25
 hernia varicosa 308.26 carnosae ibid.27 aquo-
 sa ib.28 ventosa ib.31 Intestinalis ibid. 32
 vaginalis ib.32 omentalis ib.39
 hernia ventosa quomodo sit curanda 315 quomo-
 do carnosae ibid. quomodo sistit caro cancerosa ib.
 quomodo fiat varicosa ibid. à quibus venis fiat
 ibid. notandum in hernia varicosa ibi. distin-
 ctio hernia ex recentioribus ibidem.
 Eleophili laus in anatomicis 129.44 & 132. 44
 auctoritas apud antiquos 25.27 praesentia cir-
 ca anat. ibid.
 historia

Historia Democriti 316.44
horri folia 50.40
horus magni regis in Cayro 50.41
humores cur à Galeno non reponantur inter partes simplices 100.8
humores in vulneribus nervorum quomodo praparandi 228.42 *quomodo enacuandi ib.* 48
qua vietus ratio seruanda ib. 50 *qua circa locum affectum agenda ib.* 54 *quid si vulnus sit angustum ib.* 56 *quid si latum ib.* 59
quomodo & quib. rebus dolor mitigandus 228
59 quod stupefacientia hic non conueniant 229.
4 qua olea ad dolorem sedandum conueniant ib. 29
humida duplicia esse 22.5
humida non omnia humectare 23.49
Hydrocephalus quid sit 299.2 *quæ ratio nominis ib.* 3 *quos modis fiat ib.* 5 *qua & quot loca occipet ib.* 6 *qua eius cause efficientes ib.* 9 *materiales ib.* 16 *qua & quosuplura signa ib.* 25
qua signa ipsius tumoris ib. signa locorum affectorum. *ib.* 31 *quale habeat præsignium ibid.* 45
curatio ib. 48 *an repellentia conueniant ib.* 55 *sectio seu apertio tumoris an & quando conueniat* 300.16
hydraulicus cur non conueniat in vulneribus nervorum 239.7
Ichor quid significet 167.49
Ichor exiens è vulnere quid sit 168.33 *quomodo cognoscatur ibid.* 34 *qua eius materia ibid.* 39
ichoris cocti ortus 169.2
Illinitio partium thoraci vulnerato adiacentium 215.58
incantationib. & benedictionibus vulnera curari non posse 179.37 *quomodo tamen interdum his curentur* ibid.
Incrassantia triplicia esse 21.53
Inflamabile & non inflammabile 11.20
Inflammatio à quibus producat in luxationibus 68.51
Inflammationis in luxatione prohibitio per vietus rationem 73.37 *& reliquæ res non naturales* 74.1. &c.
Inflammatio in puncturis nervorum quomodo prohibeatur 228.37
Inflammationis testium causa externa 316. im-
mediata ib. materia inflammationis *ib.* præsa-
gium ib. curatio *ib.* phlebotomia *ib.* lenitio alui
ib. loci affecti tractatio *ib.* quid sciendum si sit
inflammatio ex statu ibid. *Quid si ex semine*
317 *Quid si dolor sit ingentissimus* ibid.
*Inflammationi in vulneribus circumcingentis spi-
 nalis medulle quomodo occurrendum* 213.
Inflammationis vulneris superuenientis curatio
191.38
Inspida humida esse 22.35 & 23.21

*Instrumentum seu partem instrumentalem dupli-
 citer accipi* 166.2
Instrumenta præcisa an possint uniri 166.10
*Instrumentum quoque corruptum in fistula lachry-
 mali excurrit, ex quo metallo fieri debeat* 244.
 40
*Instrumentum antiquorum pro locandis fractis
 membris* 90.49
*Instrumenta varia pro extrahendis telis è vulne-
 ribus* 172.35
Intemperatarum in vulneribus curatio 192.6
Intestinorum vulneratorum signa generalia 219.
 56 *specialia huius vel illius* 220.1
intestinorum vulneratorum sanatorum signa 210.
 54
*intestinorum gracilium vulnera cur sint curata
 difficilia* 212.55
*Intestinorum vulnera cur ubi Hippocriti sint dicta
 lethalia* 224.8
Intestinorum vulnera non semper esse lethalia 164.
 51
*intestina vulnerata quot & quibus modis consu-
 antur* 223.7 *quid post cõfusionem faciendum
 ib.* 47
*Intestinum vulneratum non apparens an debeas e-
 duci ut consuatur* 224.50
intestini crassi vulnerati curatio 212. & 124.59
gracilis ib. 54
*Intestina per vulnus egressa si sint refrigerata quid
 agendum* 224.13 *quid si inflammata* ibid.
 16
*intestina per vulnus abdominis egressa quomodo
 sint intrinseca* 212.40
Inuentum Falloppij pro hernia intestinali in scroto
 312.44
Ioannis Leonis historici Aphricani laus 50.1
Iris unde nomen habeat 31.35
Iridis varia significationes 31.38
Iridis narsa & vires 32.57 *particulares vires à
 tota substantia* 33.1 *dubium an vi tormen-
 ti medeatur* ib. 6
Iridis descriptio 31.49
iridis radices descriptio 32.9
Iridis collectio & conseruatio 32.23
iridis flores quos habeant colores 32.4
Iridem viuant facile carie infici ac corrumpi 32.
 24
Iridis electio 32.29 *unde ad nos deferatur ibid.*
 30 *qua eius species ibid.* *qua sit in visu ibid.*
 44
Iris cur referatur inter aromata 31.24 *cum Dio-
 scorides primo de ea egerit* ib. 22
*iridis radicem siccam esse odoratam, viridem ve-
 ro suatidam & cur* 32.14
 K
 Kali 56.32
 L
Læpro dolore leniendo cur in vulneribus ner-
 uorum non conueniat 229.10

- Inc plantarum quando sit colligendum* 30. 60
Lachrymarum fluxus unde oritur 241. 43
Lactuca quomodo saporem habeat cum tamen sit
humida 23. 22
Lactumens infantum quid sit 237. 15
Lamina plumbea vsus quantum conferat in pleuro-
matide 82. 54 *quintam in ganglio* 291. 11
Lana succida qualitas 80. 43
Laricem antiquis fuisse ignotam 36. 53
Latices quomodo indurantur 8. 44
Laxitas causa 81. 10
Leue quod sit 12. 35 *quae eius causa* *ibid.* 36
Lenitas in corporibus nimia quomodo & quibus
auferenda 22. 8
Lepra quid sit ex Auenenna 268. 39 *quid secun-*
dum Fallop. *ibid.* 8
Lepra quatuorplex sit 268. 10 *unde sic vocetur ib.*
13. cur vocetur elephantiasis ib. 19. *cur leont-*
asis ibid. 19. *cur satyriasis ibid.* 34. *cur morbus*
herculeus ibid. 37. *cur cancer totius corporis ib.*
56 cur morbus sancti Lazari ibid. 59. *qualis*
in lepra sit intemperies ibid. 23. *quare suae exul-*
cratione corrumpat formam 269. 1
Lepram esse ex morbis a tota substantia ibid. 4. *esse*
morbum contagiosum *ibid.* 7.
Lepra ex qua regione primum ad nos peruenit
ibid. 11.
Lepra causa efficientes ibid. 16 *an in Gallia &*
Germania fiat lepra ab aere, an vero e victu ib.
23 causa materiales ibid. 51 *tribaria, ex*
quibus fieri potest ib. 57. *cur in Alexandria &*
Aegypto hic morbus sit plurimum vagetur ib.
39 cur non aque in Scythia 270. 7 *Qua le-*
pra causa immediata ibid. 9. *lepra diuisio rati-*
one materia ibid. 22 *Signa huius morbi quo-*
duplicita sunt ibid. 23. 29 *per lepram incipien-*
tem quid intelligendum *ibid.* 30 *quid per*
antiquitatem *ibid.* 30. *quomodo lepra incipiens*
cognoscatur ibid. 35. *quomodo confirmata*
ibid. 36. *quale habeat praesidium* *ibid.* 51
Quod inter dum etiam sanetur *ibid.* 53
Lepra quomodo differat a cancro 273. 3 *quomo-*
do sit curanda ibid. 15 *quantum leprosi noceat*
Ventus & quare ibid. 45 *quare conuenias vena*
sectio 273. 30 *quia vena secunda ibid.* 34 *se-*
cta vena quid agendum *ibid.* 46. *quatuorplex*
fit locus affectus in lepra 274. 52 *medica-*
menta a tota substantia agentia *ibid.* 58 *quid*
agendum circa coram superficie 275. 40
Leue quod sit 1. 4 *quomodo a graui possit experi-*
mentis segregari *ibid.* 12
Liber primus Dioscoridis an sit inter medicos li-
bros reprehendus *ibid.* 26. 30
& ausi legendus a philosopho *ibid.* 34
& cur ab eo scriptus sit *ibid.* 50
Lich Dioscoridis 56. 17
Lien magnus quomodo sit causa maciei 334. 9
lienis vulnerati signa 279. 49
Lienis vulnera an sint necessario lethalia 264. 32
Ligamentum quid sit 120. 21. *qua eius nomina*
ibid. 7 *Genera ibid.* 13 *materia ibid.* 31. *for-*
ma ibid. 39. *causa efficiens ibid.* *temperatura*
ibid. 42 *facultas ibid.* 47. *usus ibid.* 53 *pos-*
siones 21. 15 *an habeant sensum* 120. 17 *cur*
natura nec ligamenta nec ossi dederit sensum
121. 20 cur ligamenta sentiant morbos ib. 27
cur per se nullum habeant motum 120. 24 *an*
resecta & comminuta possint restaurari 121.
33 cur non resuscitentur 121. 8
cur distensa non possint consui *ibid.* 45
Ligatura crepatura 316. 53
Ligatura dissolutio in quibus casibus luxationum
fit praetrahenda 75. 20
Lignum possum in aquam petrificatum quomodo
vertatur in lapidem 168. 9
Lignum quatuor cur non conuenias in cancro 167. 9
Lina merta in artibus neruorum vulneribus semper
eturi non esse imponenda & quare 130. 11
Linamentum pro vulnere thoracis quale esse de-
beat 215. 53
Linamentum Fallop. contra cancerum 164.
46.
Linamentum pro illinendo palato in bronchocle
188. 10
Liquabilia qua sint 9. 23 *liquabilis causa &*
differentia *ibid.*
Liquor in 24 horis glutinans vulnera in sinu
224. 1
Liquorum & puluerum miscendorum in medica-
menti praecipuum 187. 13
Localia pro callo in luxationibus 84. 48
lubricantia qua sint 19. 48
Lumen quantum noceat vulnerati oculis 203. 39
Latun D. Petri ut & alterum D. Bartholomei ad
callos in luxationibus 83. 40
Luxatio seu dislocatio quid sit 61. 41 & 64. 25
& ib. 57 *qua eius natura ibi.* *Causa externa*
ibid. 48. *interna* 62. 1 *Species qua & quot*
62. 40 Signa quatuorplex 63. 7 *prognostica*
ib. 53. *Indicatio ib.* 37. *quid an se restitutionem*
agendum 65. 42 *quo tempore restitutio sit in sti-*
tuehda ibid. 18. *qua & quot sint genera resti-*
tutionis *ibid.* 58 *organa quibus in resti-*
tutione utimur 66. 6 *Lora ibid.* 22 *lori mate-*
ria ibid. 24 *vincula ferica ibid.* 31 *locus*
applicandi laquei ibid. 36. *notandum circa v-*
lun laqueorum ibid. 39. *Quando veniendum*
ad organa ibid. 46 *scala* 48 *Modus extensio-*
nis ibid. 15 *circa extensionem obseruanda* 67. 1
quantum sit extendendum ibid. 14. *quid ante*
extensionem faciendum *ibid.* 33. *quot modis*
ossa in suum locum impellantur *ib.* 39
luxationis curari per exteriora 74. 50
Luxatio an esse erumpente extra cutem an debeat
curari 78. 10 *in quibus articulis debeant cu-*
rari & in quibus non *ibid.* 40. *quod ha luxa-*
tiones sint admodum rarae ibid. 36 *quod est plu-*
rimum lethales ibid. *articuli non restitui que-*
modo

modo collocandi 79.3. facta restitutione aut
collocatione quid agendum ib.6
luxatio parvorum articulorum cum prominētia
offi 82.57 quando restituenda ib.59 quid
post restitutionem faciendum 83.4 si super-
veniat consulsio ib.12 si inflammatio succe-
dat post restitutionem ib.14 si superveniat
gangrana ibid.18 quia illius gangrana causa
ibid.20 quia vitius ratio in hac luxatione ser-
vanda ib.33 locus affectus quomodo trahan-
dus si superveniat sphecelus ib.43
luxatione existente cum prominētia offi quid ob-
servandum circa eius curationem 82.36 ter-
minum recessus prominētiis offi ib.40
luxatione existente simplici an sit secunda vena.
74.10 quando sit secunda ib.19 quae sit se-
cunda ib.25
luxatio articulo quando ulcuscula sub fasciis latens
quid agendum 76.47
luxati articuli iam restituti quot modis iterum ex
sua sede possint excidere 85.56 quia huius re-
cessus causa 86.3 quae curatio ib.6 quid ob-
servandum circa restitutionem seu huius recessus
curationem ib.17
luxati articuli cum desectione offi qui restituendi
sunt & qui non 79.37 quando in his iterum
luxare conveniat ib.41 si restitutionem mo-
liri non convenit quid agendum ib.44 ante
curationem luxationis & ulceris quid facien-
dum ib.50 partes circumpositae quomodo tra-
hantur 80.4 praecepta circa applicationē me-
dicamentorum in talicasu ib.27 vitius ratio
81.43 tempus huius vitii duplex ib.57 ve-
nae sectio 82.2 res non naturales ib.
luxati articuli an & quibus conveniat pharma-
cum 74.30 an conveniat elleborus ib.38
luxatus articulus restitutus quomodo & quot mo-
dis in suo loco conservari possit 67.50 restitu-
tus articulus quomodo & in qua figura sit collo-
candus 68.3
luxati membri restitenti figura 72.58
Lycium quid sit 47.48

M

Malefactibilia 9.32
Magnitudo praternaturalis corporis hu-
mani quae sit 328.22
Macies quid sit 333.6 quae eius nomina 332.55
differentia 333.1 species ibid. 13. quomodo fiat
macies ib.28 quae sint eius externae ibid. 34 in-
ternae ib.51 signa 334.20 praesagium.
Maciem seu diminutionem alicuius membri esse
duplicem 337 naturalis unde proveniat ibid.
quae causa non naturalis ib. quae macies natu-
ralis signa ib.36 quae praternaturalis ib. quodnam
eius praesagium ib. 39 quomodo cognosci possit
an macies illa sit sanabilis nec ne ib. 40 in quo
eius consistat curatio ibid. 44 quae exterius
applicanda 338. 4 quomodo cognoscendum
an rubor qui post usum dropacis sequitur sit

bonus ib. 26 quae in deligatione membro adhi-
bita sint observanda ibid.27
Malagmata optima ex Galen. declinantes inflam-
matione in luxationibus 77.58
malagma Nilei ibid.54
Malabar regio 43.33
Malabathri descriptio 43.29 & 44.8 ratio
nominis ignota ib. 37. an habeat radices 44.7
species ib. 22 impostura ibid.
Malabathrum nos non habere 44.45 quid pro
eo substituat ib.45
Malabathri electio 44.46 facultates ib.50
malabathri nomine esse semper intelligendum sim-
plex 43.29
Malabathrum maxime odoratum suum aroma-
ticum esse 44.18
Malabathri duo genera ex Plinio 44.18
Mali pumica altitudo duplex 49.33
mamillarum temperies 248.7
Manar error de spica nar di Indica 32.48
Marcelli error in iride a Manardo reiectum
32.2
mastricbe cum albo oio solo vulnera curari non pos-
se 180.8
mater balsami 194.20 ipsius laudes 195.17
materia medicinalis quo loco sit colligenda 28.28
quo modo ibidem. 42. per modum quid intel-
ligendum ib. quomodo conservanda ibid. 47.
quot modis conservatio illa fieri possit ib. 59 in
quo loco conservari possint 29.9
Materiam informantia quae & quot sint 8.19
Materiam odoratam diligentius esse servandam
31.3 & in quibus vasis id fieri debeat ib.11
materia pro componendis medicamentis extrahē-
tibus tela è vulneribus 170.18
materia imbuenda liquore pro sistendo sanguine
209.18
Matthioli laus 55.16
Matthioli error de spica montana 40.47
maturantia materiam meliceridis quotuplicia sint
278.48
Medicamentam quid sit 4.39 quid quoad nomi-
6.23 quid quo ad rem ibid.30
Medicamentum quomodo à nutrimento differat
4.40
Medicamentorum forma quid sit 13.17
Medicamenta quotuplicia 3.56 & 4.34
medicamenta sunt instrumenta artis medicae ib.38
Medicamentorum genera quot sint 7.19
Medicamentorum cognitio cur admodum sit neces-
saria 28.1 quid per cognitionem medicamen-
torum sit intelligendum ibid. 3 unde ea cogni-
tio haberi possit ibid. 6
medicamentum nullum excepto elleboro ultra tri-
ennium durare 30.36
Medicamentorum simplicium differentia à quibus
sumantur 8.3
Medicamentorum simplicium cognitionem esse
duplicem 2.746

| | | | |
|--|----------------|----------------|----------------------|
| medicamentis calida in primo gradu quæ sint & quid operentur 13.41 | quæ in 2do. 26 | Quæ in 3do. 29 | Quæ in quarto 1b. 52 |
| Medicamenta qua methodo corpori applicanda 17.18.1 | | | |
| Medicamentum Fallopii pro thymis 318 | | | |
| Medicamentum Fallopi insudendum super vetriculo vultus 226.10 | | | |
| Medicamentum Fallopii pro teniendo dolore hæmorroidum 321 | | | |
| Medicamentum Fallop. pro perniciosis 323 | | | |
| Medicamenta Fallopii contra panaritia 306. | | | |
| Medicamentum Fallop. ad varos rubeos rebelles 239.18 | | | |
| medicamenta Fallopii per os assumenda pro agglutinatione hernie intestinalis scroti 311.50 | | | |
| medicamenta omnia calida sumpta repleto ventriculo dimittant vapores ad caput, & ita illud dolore afficiunt, idem faciunt etiam odorata 35.8 | | | |
| medicamentum optimum ex succis pro vulneribus vasorum colli 210.23 | | | |
| medicamentum ponendum super scutetum in vlcibus oculorum 242.18 | | | |
| alud adstringens ad idem 1b. 24 | | | |
| medicamenta eliquantia sanguinem concretum in thorace vulnerato 216.2 | | | |
| medicamentorum validorum in secundo gradu vscæque ad tertium facultas & signa 18.12 | | | |
| medicamenta digerentia & discutientia melicerides 278.12 | | | |
| medicamentorum differentia à forma quæ & quot sint 13.19 | | | |
| medicamentum vulneratis intestinis imponendum ante confusionem 223.32 | | | |
| Medicamentum Lanfranci contra panaritia 306.8 | | | |
| medicamentum compos. extrahens tela Fallop. 170.36 | | | |
| altæ ex Galeno 1b. 47 | | | |
| medicamenta frigida in primo gradu quæ sint 13.53 | | | |
| quæ in secundo 1b. 50 | | | |
| quæ in tertio 14.4 | | | |
| Quæ in quarto 1b. 7 | | | |
| medicamentum mulierum pro inflammatione testium ex semine 317 | | | |
| medicamenta temperata nullam actionem inferre corpori humano 13.37 | | | |
| medicamenta quomodo dicantur calida vel frigida, temperata vel intemperata 13.23 | | | |
| medicamenta intemperata multiplicasse 13.40 | | | |
| Medicamenta interius iniicienda in vlcibus narium 205.3 | | | |
| medicamentum recentiorum pro vlcibus oculorum praestansissimum ex ovis dictum 202.19 | | | |
| medicamenta pro imbuendis lineis in curatione vlcis 187.11 | | | |
| medicamentum leniens pro extractione infixi in oculo 200.40 | | | |
| Medicamenta humectantia in primo gradu quæ sint 14.10 | | | |
| Quæ in secundo 1b. 11 | | | |
| quæ in ter- | | | |
| tio 1b. 12 | | | |
| quæ in quarto 1b. 16 | | | |
| Medicamenta seccantia in primo gradu quæ sint 14.17 | | | |
| quæ in secundo 1b. 22 | | | |
| quæ in tertio 1b. 23 | | | |
| quæ in quarto 1b. 28 | | | |
| Medicamentum ex stercore columbino discutiens gælion 293.22 | | | |
| medicamenta pro simplici vlcere & dolore recentiorum 293.30 | | | |
| medicamentum recentiorum pro vlcibus thoracis cum empyemate 228.51 | | | |
| propriis 1b. 50 | | | |
| medicamenta tela & vlcibus extrahentia triplicia esse 290.4 | | | |
| medicamentum lenis pro pueris hernia intestinali scroti laborantibus 311.17 | | | |
| aliud pro mediocribus 1b. 22 | | | |
| robustius pro duris 1b. 24 | | | |
| medicamenta ad vlcera narium facienda quot modis præparentur 248.18 | | | |
| medicamentum ex tribus granis 297.39 | | | |
| Medicamenta discutientia cancrum per interius 264.3 | | | |
| medicamentum pro sistendo sanguine in vlcibus colli 210.2 | | | |
| medicamenta seccantia pro vlcibus 178.55 | | | |
| qualia esse debeant 179.14 | | | |
| quæ eorum vsu 1b. 9 | | | |
| medicamenta adstringentia pro vlcibus venarum & arteriarum colli 210.11 | | | |
| medicamenta quomodo possint conservari supra leca vulnerata 187.21 | | | |
| medicamenta iniicienda in vlcera narium vesicæ urinariæ 227.33 | | | |
| Medicina quale sit inuentum 157.14 | | | |
| quis sit eius scopus communis 1b. 17 | | | |
| quæ & quot sint eius instrumenta 1b. 23 | | | |
| quæ & quot parci 1b. 24 | | | |
| Medicina quæ simplex sit 346. & 4 | | | |
| Medicinam tria habere instrumenta 26.4 | | | |
| Medicina finis quis sit 325.39. & 47. & 326.26 | | | |
| Medicus cen artifex sensatus unde instrumenta ad naturas rerum investigandas sumat 14.40 | | | |
| Medicus quam pulchritudinem obseruet 327.17 | | | |
| quos modis eam restituat 1b. 19 | | | |
| Medicus quando ad medellæ vlcis advocatur, quid primo observare debeat 190.3 | | | |
| Medico in extractione telorum manuali quæ & quot sint observanda 171.29 | | | |
| Medulla an sit excrementum ossium, an vero nutrimentum 104.24 | | | |
| cur non sit excrementum 105.7 | | | |
| quæ sint eius partes 1b. 31. & 46 | | | |
| cur in principio generationis sit rubra 1b. 37 | | | |
| quæ simplex sit 111.17 | | | |
| medullæ facultates 19.24 | | | |
| Mellis dulcedo 15.41 | | | |
| Mel & pix quomodo indurantur 8.52 | | | |
| Melancholia non naturalis quotplex sit 257.11 | | | |
| Melancholia per excussionem quotplex sit 257.43 | | | |
| Meliceris quomodo cognoscatur 277.23 | | | |
| quare & quando | | | |

Quando vena sectionem requiritur ib. 52. &
278. 1. quando purgationem totius 278. 3. quid
circa locum affectum agendum ibidem. 6. putre-
factio materia in his tumoribus per qua &
quomodo fiat ibidem. 42. quomodo cognos-
catur an folliculus seu vesicula sit patrefacta
279. 3. quomodo secanda cutis ibidem. 12. si sit
fluxus sanguinis in sectione, quid agendum ibi.
14. quid, si folliculi pars remanserit in sectione
ib. 15. quid si pars folliculi remaneat post usum
medicamentorum ib. 25. folliculo extracto quid
agendum ib. 34. folliculi extractio per sectionem
ib. 45. per usum causticorum ib. 36. si radix folli-
culi relinquatur 280. 3. cur puerorum capita pra-
cipue pariantur ptericidas ib. 12.
membra corporis quoad quantitatem esse in tripli-
ti differentia 68. 42.
Membrana quid sit 126. 57. quae earum genera-
tionis materia 127. 33. materia nutritionis ib.
40. causa efficiens ib. 37. vsus ib. 44. differentia
128. 7. passiones ib. 8. nomina 126. 31. membra-
na quare membrana dicatur & quare tunica ib.
44. membranam omnem posse esse tunicam, sed
non e contra 126. 50. Membrana & corpus me-
branosum quomodo differant ib. 53. qualem ha-
beat membrana sensum ib. 59. paucas esse partes
sine membrana 127. 4. an membrana in fibras
dissolvatur ib. 13.
membrana succingens spinalem medullam sibi vul-
nerata in una parte exigua, quid faciendum
122. 55.
membrana sigmoidea in principio arteriae aortae
sue 140. 14.
Mesenterii vulnera cur ut plurimum sint lethalia
164. 54.
Mesiae error de asaro 41. 44.
metalla quae pro cancro vsurpantur, quomodo sint
paranda ut acredinem deponant 267. 24.
metalla an conveniant in nervorum vulneribus
sectis seu celsis factis 212. 21.
metallis quibus vsi possimus in thoracis vulneri-
bus & quibus non 216. 50.
metallia lenia pro ulceribus narium 246. 15.
Methodus Dioscoridis circa capita medicamen-
torum 26. 20.
Meu nomina 34. 24. cur dicatur asthamantium ib.
26. ubi potissimum nascatur ib. 36.
Meu descriptio 34. 47. facultates 35. 4.
Molle quod sit 121. 32.
Monita quadam de scrophulis 261. 21.
morbus quid sit ex Galeno 158. 46.
morbum quing. genera 159. 16.
morbus simplex quid sit 158. 33.
Morbus expelli triplici instrumento 17. 52.
morbus compositus quid sit 158. 36.
morbi penes quae dicantur occulti 261. 50.
mordicatio medicamenti pro vulneribus quomodo
asferatur 185. 33.
Moscibus quid sit 57. 40. esse saniem ib. 33. omnia

superare aromata ib. 34. ubi nascatur ib. 30.
quomodo multiplicetur 58. 10. quomodo de-
tegetur parum a mixto ib. 11. Quasi cius fa-
cultates ib. 15. apud antiquiores nullam eius
esse factam mentionem 57. 30. Quis etiam ve-
ficarum vsus ib. 53. animal ex cuius corio pro-
venit, quale sit 58. 2.
moschum & muscum maxime differre 56. 34.
motus immediata instrumenta 119. 9.
motus quomodo fiat 119. 25.
Motum partium a fibris factum tripliciter fieri
140. 53.
Mucor naturalis & ingentius 61. 37.
Mucilagines scirrhos emollientes 266. 40.
mulieres obesa cur sint plerumque steriles 110.
26.
musci arboris vsus 56. 12. genera ib. nomina ib.
35. quid sit ib. 39. ubi nascatur ib. 46. quot &
quibus arboribus adnascatur 57. 6. quae eius ele-
ctio ib. 14. facultates ib. 15. muscum arboris &
brjon esse idem ib.
musculum unumquemque habere nervos 124. 37.
musculos non habentes tendines paucos esse 123.
26.
Musculos ossa moventes, veros videri musculos 123.
28.
musculorum capita habere sensum obtusum 124.
23.
musculorum vulnera 169. 13.

N

Nares quot modis possint vulnerari 204. 23.
quomodo ea vulnera curentur ib. 25. quae
in confusione eorum vulnere servanda ib. 30.
si pars laesa pendens sit iam refrigerata ibid. 36.
an pars nari frigida & semimortua possit coa-
lescere ib. 44. quomodo conformatio narium
vulnerata sit conservanda 205. 11. si os na-
rium sit etiam fractum ib. 33. si nares disforquean-
tur ib. 37.
Narium tumores quot sint 296. 4.
narium vlcera serpentia quomodo curanda 246.
27. quomodo si sint pessima ib. 33.
narium vlcera dinstro 245. 21. causa ib. 28. si-
gna ibid. 35. Curatio eorum, quae sunt a causa
interna ib. 38. an conveniant cauterium in oc-
cipitis ibid. 33. quot modis fiat capitis exsecatio
ib. 56. si caput sit frigidum & humidum 246. 8.
locus affectus quomodo tractandus ib. 11.
narium vlcera crusta quomodo auferenda 246.
24.
Nares decurrit a quomodo restantur 341. 47.
Natura dupliciter accipitur, 4. 59.
Nerum quid sit 117. 40. quod duplex ib. 31. quae eius
materia ibid. 43. unde nutriatur 128. 28. Quae
causa efficiens ib. 33. species ib. 36. facultas ib. 37.
vsus ib. 41. passiones 119. 37. & lin. 38. inter pro-
nomi quod & subsequens punctum interponere ver-
bum sit. nervorum cautates esse insensibiles 119. 1.

quot sint prima instrumenta motus 119. 2
 unde habeant originem ibid. 24
 Nervos à cerebro esse molliores, quam eos à spinali
 medulla 144. 6 cur nervi propinqui cerebro
 sint exquisitioris sensus ibid. 5
 Nervus quomodo sit compositus 103. 18 quomodo
 confiet ex cerebro ac duabus membranis ib. 36
 quomodo sit pars simplex ibid. 30
 nervorum sensus qualis sit 228. 21 & 229. 46
 nervosa substantia quotuplex sit 228. 12
 nervus cur à natura sit cum arteriis unitus 10. 46
 Nervorum calli vulneratorum curatio 213. 22
 Nervorum vulnera cur sint difficilissima 227. 50
 quot sint eorum genera ib. 57 quæ signa 228.
 6 præsigna ibid. 28
 nervus si sit scissus vel cassus vulneratus quid agē-
 dum 231. 30
 nervi vulnerati qualia requirant medicamenta
 229. 48
 nervus si sit contusus cū cute quid agendū 232. 40
 qualia medicamenta conveniant ibid. 45. quid
 si dolor succedat ibid. 34 Quid si contundatur
 nervus sine contusione cutis ibid. 56
 Nodus seu lupus palpebrarum quid sit 280. 16 quo-
 modo curetur ibid. 17
 Nutrimentum quid sit 442 & 6. 33
 Nutritionem omnium fieri ex simili 105. 41
 nutritionem propriam esse viventium partium
 1. 145. 45

Obesitas seu crassities corporis humani quid
 sit 328. 29 quæ & quot eius sint species ib.
 36 quæ obesitas naturalis ib. 40 quæ non natura-
 lis ib. 50 morbofa 329 quid obese sint inepti
 ad venerem ibid.
 Obesius pinguis quib. potissimum morbis sint ob-
 noxi ib. quæ obesitas sana ibid. 30
 obeseas quomodo fiat 329. 17 quæ & quotuplices
 habeat causas 330. 4 quæ sint signa naturalis
 ibid. 22 non naturalis ibid. morbofa ibid. 30.
 salubris ibid. 32 præsigna ibid. an obese durius
 vivant quia habent inultam materiam pro ali-
 mento caloris ib. 38 Indicationes ibi d. 51 quod
 vixit obese maxime prosit 332. quæ vixit rari-
 us tenenda ibid. quid conferat ipsis sudor &
 quomodo prouocandus ib. quid sectio vena ib.
 oculi in fixa quot modis extrahatur 240. 54 quo-
 modo si infixa sint calx vel cinis &c. 241. 9
 oculi humore aquo egresso an visus patiat 199
 33
 oculi vicia si sit egressa & pari ipsius oculi amputa-
 ta 201. 18
 oculorum viciis si fiat à fluxione, quomodo sit curā-
 dum 241. 27
 oculis viceribus obsecus semper esse secandam ve-
 nam, si atas & vires tolerant 241. 18
 oculorum vlcera unde proueniant 239. 39 cur
 sint sanari difficilissima ib. 40 quot sint eorū
 species ib. 45 quæ eorum causa 240. 46 præ-

signum ib. 48 curatio ib. 51 quomodo sint
 tractanda 242. 35
 oculorum viscera si sint sordida, quid tenendum
 242. 44
 Oculorum vulnerum causa 239. 55
 oculi abscessus quomodo prohibeatur 198. 18
 oculi bulbi vulneribus quæ conveniant medica-
 menta 199. 1
 Oculi concretio cum palpebra in conglutinatione e-
 ius vulneris quomodo prohibeatur 199. 14
 oculi superiori parte per transversum vulnera
 quid faciendum 198. 2
 oculi bulbus sit ita vulneretur ut humores coeant
 quid agendum 199. 30
 oculi cornea si vulneretur 199. 43 si portio in-
 strumentis ferientis remanserit in oculo 200.
 1 si infixum non appareat 200. 11
 oculi humor vitreus aut aliqua tunica sit gredia-
 tur 199. 47
 oculorum vulneribus infixa non apparentia an ex-
 trahenda 200. 11
 Oculi vulneratus si non potest perferre contactū
 203. 15
 oculorum vulnerum curationem esse quidem præ-
 sitendo facilem, in actu practico autem difficil-
 limam 202. 50
 oculorum vulnera cur sint sanari difficilia 198. 15
 quæ sint eorum vulnerum species & differentia
 ib. 34 quotuplex agglutinatio ib. 54
 oculo vulnerato si periculum sit, ne humores prala-
 bantur 200. 58
 oculi quomodo sint lingendi pro remouenda eorum
 cicatrice post vlcus sanatum relicta 223. 34
 oculi deligatio 173. 17
 odor in quo consistat 16. 50
 odores sub quâ ratione nobis sint nati 17. 10
 odorem non ab omnibus partibus mixti cuiperare,
 17. 4
 odores sequuntur naturâ mixti sicuti sapor 16. 49
 odores incertam præbere cognitionem essentia sim-
 plicium 16. 55 & quare 17. 2
 odoris vaporem crassiores esse ipso aere 16. 54
 odore & sapore multa esse delectabilia, quæ non so-
 lum temperamentum proprium laedunt, sed etiam
 interficiunt 17. 36
 odoratum omne habere partes tenues & calidas &
 primæ colles 32. 15
 odorata ferè omnia esse tenuium partium & cali-
 da 17. 8
 odorata cur delectent 32. 18
 Ossipum an concoquat 80. 48 an adstringat 81. 9
 olea quomodo abstantur 191. 54
 oleum armenum 32. 1
 oleum Arnoldei de villa mona vires balsami habent,
 52. 22 quæ eius facultates ib. 25
 oleo benedicto ut & puris linteis vulnera non pos-
 se curari 180. 1
 oleum ex castia 46. 15
 olea ad conuulsionem in luxatione cum prominentia

ita ossa 83.19
Oleum hyperici magistrale 230.50
Oleum Nicodemi mirabiles vires habens 32.39
Oleum ex scarabais 327
olea ad scirrhus facientia 280.38
Oleum sulphuris ad lapide renum & vermes quomodo exhibendum 302.46
Oleum vituperinum quomodo paratur 276.8 *qua etiam vis & praesentia* ib.4
Oleum pro sedando dolore nervorum vulneratorum conueniens si haberi non potest, quomodo sit preparandum 229.36
olea calida & exsiccatia pro vulneribus membrana circumcinctis spinalem medullam 213.1
oleum cur in doloribus vulneratorum nervorum admittatur, cum tamen sit inimicum nervis 229.17
Olfactum sensum imperfectissimum a natura hominibus esse traditum, gustum vero perfectum 13.13
Omentum tale esse per pinguedinem 109.55
Omenti vulnerati signa certa non haberi 120.21
Omentum si egrediatur ex vulnere illud, quid faciendum 122.11 *si refrigeratum si omentum & incipiat corrumpi* 10.9 *si egrediatur intestina illa* ib.36
Omenti amputandi modus secundum recentiores 122.15 *proprius* ib.13.
Operatorium usus in dolore vulnere 191.20
Opobalsamum quid sit 15.12
Opobalsami quantitas & pretium 53.2 *nota* ib.6
substituto ib.7 *adulteratio* ibid.
Ordo librorum Dioscoridis 26.6
Oribasi contraditio in descriptione spica montana 40.55
Ossa quid sint 106.43 *quod sint omnium partium solidissima* 103.50 *qua & quoniam duplex eorum sit materia* ib.53 *quare consistant ex materia aerea & terrea* 104.17 *quoniam duplex materia eorum nutritionis* ib.19 *Cur natura sequestraverit nutrimentum ab ossibus* 105.14 *Quia ossium causa efficiens* 106.4 *forma* ib.27 *Circumscriptio* ib.32 *Passiones* ib.46
Ossa omnia exceptis dentibus suum habere periosum quo vestiuntur ib.54
Ossa an possint eignere carnem 115.26
Ossa detectum cur non resarciatur, tectum vero & fractum restituitur 122.30
Ossium visus 60.13
Ossium principium esse unum & quare 60.10
Ossa cur numero plura sint 60.24
Ossa quidem nutrire, non tamen sentire 38.57
Ossa prominens in luxatione quando & per qua sit excidendum 82.45 *quomodo ager in ea actione sit collocandus* ib.50
Ossa illius excessu per qua possit impediri ibi. secto *osse quid agendum* ib.54
Ossa, quando franguntur, frangi ita, ut villorum superficie non maneat aequalis 90.2

Oua quales & quomodo sint partes corporis 151.28
qui albuminis facultas 180.12 *usus* ib.14
Oxyrotem Nicolai quibus inflammationibus conueniat 77.58
Oxygala quid sit 273.1 *quomodo paratur* ib.2
Oxygala & melcha quomodo fiant 114.34

P

Algebra casum fieri duobus modis 198.2
palpebra vulnerata an coalescat 196.45
Palpebris vulneratis qua conueniant medicamenta 198.29
palpebris vulneratis qua sutura conueniat 197.19
qua & qualis acus ib.28 *qua arte acus preparanda ut flecti possit* ib.33
palpebra & musculus oculorum si vulnerentur simul, quid agendum 197.50
palpitationis motus qualis sit & unde fiat 144.9
Panaritium quid sit 305.26 *qua eorum nomina & nominum ratio* ib. *Causa* ib.32 *materia* ib.37 *Signa* ib.40 *praesagium* ib.42 *Curatio* ib.49
an phlebotomia & euacuatio conueniat ibid.56
qua a principio ante se purgationem agenda ib.56
non esse statim venientem ad mitigationem doloris 306.3 *non esse deueniendum ad restrictionem* ib.36
paniculum carnosum 154.35
papillaram ulceram diuisio 247.41 *Causa* ib.40
cur difficillime curentur ibid.49 *qua sit eorum tectura curatio* ib.54 *quomodo lac excidari vel retrahi possit* ib.57 *si vlcus sit immundum* 248.10
partis nomine duo posse intelligi 151.27
partes corpora humana constituentes triplices esse, ex Hipp. 96.31
partes similes qua sint 97.35 *quis & quoniam duplex earum usus* ib.40 *qua varia earum nomina* ib.17
Quare vocentur simplices ib.23 & 101.16
An habeant vim naturalem ex hepate an vero ex seipsis ib.59 *quot numero earum sint* 99.16
quot earum classes ib.24 *quot modis partes dicantur simplices* 101.3 *quod possint esse organica* 102.41 *etiam esse compositas, quantitas & figurata* ib.44
pars similis cur & quomodo similis 159.14
Partium similium tractatio cur sit difficilis 96.13
partes similes unde consistant 96.56
partes similes esse duorum ordinum 128.38
partium similium actio propria 159.3
partium instrumentalium quatuor genera 100.48
earum naturam non consistere tantum in figura 101.29 *quod sit organum, ex Galeno* 102.17
partes instrumentales non esse necessario compositae 102.15 *sed quasdam esse simplices* ib.19 *quare dicantur compositae* ib.22
pars instrumentalis quare & quatenus talis 159.16
Partem omnem compositam esse organum, sed non e contra 102.38
partes corporis qua crassiores sint, qua tenuiores 68.24

partem unamquamque corporis habere nutrimentum proprium 105.53
 partes naturales qua ratione agant 98.29
 partes omnes corporis habere vim gignendi carnis, ex Aristotele 114.16
 partes omnes sentientes habere vim sensitivam à cerebro 116.51
 partes occultæ quæ sint 161.52
 partes omnes coalescere præter ossa 197.12
 Partium colligantium varia nomina 60.42
 partis vulneratæ succi ac cur semper sit conservanda 178.38. quoniam modus ea conservari possit ib. 40
 Parulida gingivarum quid sit 303.19
 Parulides gingivarum quid sint 303.32. quæ ratio nominis ib. quæ eius species ib. 31. Causa ib. 34
 Materia ib. 37. si recitantes sint, quomodo curanda ib. 39. quomodo si recidivantes ib. 42. quomodo loci affecti tractandi ib. 45. quomodo per sectionem curande 304. 5. scilicet quoniam modus fiat ib. 7. si sit parulid ex recidiva, quid agendum ibidem 11
 Pastilli Andronis 232.11
 Pastilli de charta combusta 232.14
 Pastilli Passionis 232.8
 Pastilli Polyda 242.4
 passula non nota antiquis 303.52
 Pedum ulcera quomodo sint sananda 243.3
 Pedem columbinum esse vel geraniū vel hæræchis speciem 44.18
 penis magnitudinis causa quæ sit 339.13
 Penem magnum nunquam esse inutilem 339. penis quomodo possit reddi longior ib. quomodo nervi extendendi ib. 19. usus lactis, mochi & Zibeti quantum possint huiusmodi, quæ à tota substantia pendenda amplificent ib. 59
 pennarum usus ad confusionem vulnerum reprobatur 177.58
 Periones quæ loca occupent 322. quæ sint eorum cause ib. Curatio 323. Quæ circa locum affectū conveniant ibidem. notandum si adest prurius ibidem. vitio cum sulphure quomodo fiat 324
 Petri Martyris opinio de balsamo 50.44
 pharmacum pro pueris struma laborantibus 290.17
 aliud pro atate solidioribus ib. 20
 Phu nomina 42. 8. ubi nascitur ib. 13. quæ eius facultates 43. 10. adulterinam ib. 14
 phu omnes habet conditiones aromatis, præter quod quod est domesticum medicamentum 42.3
 Phu quale habeat caulem 40. 44. correctio loci circa cuius flores ib. 47. quod non sint flores narcissi ib. Opinio Fallop. de phu vero ib. 58
 Phu radices quomodo sint similes radicibus mardis 42.1
 Phu Valerianam dici ab omnibus 42. 29. & quare ibid.
 pilularum cochiarum cum veratro compositio ex Cæcio pro lepra 274.11

Pilularum sctidarū vis in expurgando materiam pituitosam scribit 260.12
 pilularum de hermodactylis vis in expurgando materiam pituitosam scribit 260.14
 Pilus quid sit 151.19
 Pilorum nomina 151.8 materia 152.13 Generatio ibid. 50 Causa efficiens 153.2 Genera ib. 4 temperatura ib. 2.8. visus ib. 31. Passiones ib. 59. causa crispitudinis pilorum ib. 54 Causa casus pilorum 154.4. an pili sint partes corporis 151.13 pilos non omnes à natura mendi ib. 32. quod non possint attrahere & quare 152.40. an materia pilorum sit eadem in primo & secundo ortu 152. 53. cur perpetuo crescant 153.40. cur in caluito non renascantur ib. 41. unde habeant colorem ib. 47
 pili in vulnere illapsi quomodo sint extrahendi 169.29
 pilorum leporinorum vires 109.21
 Pinguedo quid sit 112. 6. quæ eius species ib. 9. varia nomina 109. 35. natura ibid. 37. passiones naturales ibid. 42. materia 110.40. materia proxima ibid. 43. causa efficiens 111. 3. visus 112.1. quod sit sine sensu, 109. 42. an sit incrementum nec ne ibid. 44. non habere eandem materiam cum semine 110. 25. an fiat ex aquositate unctuosus ibi. 46. an fiat à frigidiitate 111. 5. dubium de eius natura ibidem. 29. quomodo dicatur non posse concretescere 112.13
 pinguis quædam sua natura siccare 237.4
 pituitam non posse mutare cum melancholia misceri 258.59
 piulcum quale sit instrumentum 216.28. quis eius usus ibid. 32
 plantas omnes habere radices, nisi super aliis plantis oriantur 44.14
 plantæ nec alterari nec crescere absque radicibus 44.9
 plantarum duratio quomodo à Medicis cognoscenda 30.29
 plantarum ætatem esse cognoscendam & cur 31.8
 Plantarum impetus triplex 36.6
 plantæ de mortuis esse per triennium commutandas 30.11
 plantæ spectantes ad meridiem an aliæ sint meliores 29.13
 plantarum colligendarum tempus earumque aetate cur potissimum sit observanda 29.27
 plantæ cur potius sint colligenda ex montibus aliis & non ex campestribus 29.36
 plantarum parvarum aliquas non sustentari per se, sicut & aliquas ex magnis quasdam vero sustentari 49.14
 plantæ odorata quando sint colligenda 30.41
 plantæ montanae quales sint comparatae campestribus 29.43
 Plinii error de asaro 41.44
 Plinii error de loco ubi nascatur balsamus 50.28
 Plinii error de saluina 39. 4. eius declaratio ib. 43
 Pliniam

Plinium esse fabulosum circa castam 45. 18
Plinis textus de acoro depravatus 33. 41
Polypus quid sit 296. 20 unde habeat nomen ib.
 21 qua eius causa efficiens ibid. 24. materia-
 les ibid. 26. signa ibid. 27. praesagium ibid. 43
 qua victus ratio servanda ibid. 47 in quibus
 polypus venasit secunda & in quibus non ibid.
 53 Quid circa locum affectum agendum 297.
 26 quomodo polypus per sectionem possit curari
 298. 12 quot modis sectio illa fieri possit 16
 pororii in medicamentis simplicibus varietas 8. 27
 posca quomodo fiat 167. 23
 potus an descendat per asperam arteriam 135. 22
 Potio pro siti vulneratorum tollenda 183. 50
 potio pro vulnera sit in thorace 217. 52
 potiones glutinantes calefactes non esse usur-
 pandas 184. 38 & quare ibid. quales igitur
 debeant esse ibid. 43
 praecisionem nunquam curari in viliis partibus nec
 similibus nec dissimilibus 185. 50
 Praputium decurtatum quomodo sit restituendum
 340. 57 quis sit usus praputii ibid. 37 quare
 Deus ordinavit hebrais ut rescerent prapu-
 tium ibid. 38. quod praputium sit causa maio-
 ris voluptatis in venere ibid. 54
 praternaturalia omnia aut esse per se talia, aut per
 accidens 255. 4
 principium tripliciter dici 129. 15
 principia corporum qua sol. 1. lin. 50 quoduplicia
 ibid.
 precidentia vna oculi tunica quot modis fiat 240
 27
 precidentia vna tum minoris tum maioris cura-
 tio 243. 2 si sit precidentia callosa ibid. 15 quo-
 modo amputanda ibid. 22
 prognosticandi ars in vulneribus 183. 14
 Pseudonardus 38. 54 non esse nardum Plinii 39. 2
 Pterygion quid sit 306. 18. quod a recentiorib. sit
 neglectum ibid. quod plerique Medici in eius co-
 gnitione errent ibid. 26
 pueri & mulieres cur habeant carnes lenes, iunnes
 vero & senes contra asperam 12. 41
 Pulchritudo quid sit secundum Falloppium 327. 4
 quot sint in ea symmetria ib. 6 quot modis percat
 ibid. 20
 pulchritudinem esse summam bonum 326. 3 ad
 quam artem pertineat ibid. 30 quod sit du-
 plex ibid. 37 naturalis ibid. 42
 pulmonum vulnera signa 214. 36
 pulmonum vulnera partim lethalia esse partim no
 164. 18
 pulsus quid proprie sit 137. 24 quid per pulsum in-
 telligatur ibid. quis pulsationis usus ibidem. 47
 cause 138. 44 an in pulsu duplex sit motus 137.
 27 an quies in pulsu sit perceptibilis ibidem.
 45 an facultas motrix corde emanet in arterias
 142. 32
 pulvillorum materia 149. 1 figura ibid. 3. quan-
 do pulvillis sit utendum & quando non ibid. 6

pulvis inspergendus in oculum vulneratum 202.
 5
*pulveres quomodo in oculum vulneratum sint in-
 spergendi* 201. 54
pulvis adstringens pro vlcibus ocalorum 242.
 21
pulvis pro implendo oni albumine 202. 32
*pulvis inspergendus vulneribus post matrem balsa-
 mi* 194. 54
pulvis cyperi 56. 10
pulvis ad parandum gluten pro vulneribus 175.
 33
pulveres varii conglutinant 180. 52
pus quid significet 168. 9
putredo unde fiat 22. 45 & 23. 3
*putrida a caliditate talia facta facile in acidum sa-
 pore verti* 23. 32

Qualitates secunda qua sint 24. 6 qua sint
 qualitates tertia ibid. 7
 Qualitates secunda cur vocentur formales ibid.
 16 & cur prima materiales ibid. 18
 Qualitates tertia & quarta quomodo inuestigen-
 tur 24. 36
 Qualitates quomodo considerentur in medicamentis
 simplicibus & quomodo in corporibus 132. 9
 Quies quantum conferat vulnerati 183. 51
 Quies conueniens post collocationem membri la-
 xati 73. 23 quam sit necessaria ibid. qua sint
 circa quietem observanda ibid. 27

Radices quando sint colligenda 31. 3
Ranula quid sit 280. 20 quomodo curetur ib.
 21
Ranula seu barrachus quid sit 302. 16 quareatioe-
 ius nominis ibidem. 18 qua causa efficiens ibid.
 22 materia ibid. 24 Signa ibid. 29. Praesagium
 ibid. 30 curatio ibid. 33 loci affecti tractatio
 quomodo per sectionem auferenda ibid. 50 Ra-
 nula alia a Falloppio adinuenta ib. 57 Ranula
 palati quibus accidat 303. 2. qua eius sit cu-
 ratio ibidem 6 si ranula sit inneterata, quid
 agendum ibid. 16 quid sit semel curata redeat
 ibid. 18 quomodo cognoscendum quod non sit
 reditura ibid. 22
Rarum quod sit 12. 21 qua huius causa ibidem.
 Regis Gallorum benedictio pro sanandis strumis
 289. 58
*Remedium pulcherrimum Falloppii pro caruncula
 in canali urinario* 320
Renum vulnera quando sint lethalia & quando non
 164. 40
*Renum vulnera quomodo cognoscantur an pene-
 trent* 226. 52 quomodo curanda ibid. 53 & 227.
 6 quomodo non penetrantia 226. 57
Repercussio a quibus qualitatibus fiat 24. 27
repletum quod sit 13. 6
Res qua non possunt indurari 9. 16 & cur non pos-
 sint indurari ibid. 18

- Scirrhi pituitosi ac veri signa 259. 1. praesidium 42. 24
 ib. 12 Quot modis curentur ib. 25 qualia me-
 dicamenta exteriora scirrhi requirant 260.
 22 Emollito scirrho quid ulterius agendum
 260. 56 Scirrhorum emollitio & resolutio per
 interna 261. 22
 Scirrbo à materia pituitosa convenientia 18. 22
 Cancrosum scirrhum nunquam esse sine dolore
 & pondione intercurrente 258. 28
 Scissile 10. 27 quae scissilitatis causa ib. 28 non scis-
 sile ib. 33
 Scopus librorum Dioscoridis 261
 Scrophularia herba unde habeat nomen 290. 31
 Secretum ex duobus medicamentis compositum ma-
 gnum aduersus cancerum 267. 40 quia circa
 hoc secretum notanda ib. 52
 Secretum Fallopi pro caruncula in canali urina-
 rio supererescente 318
 Secretum optimum pro hernia aquosa 314
 Sectio variae chirurgorum in curandis vulneribus
 thoracis non penetrantibus 35. 19 modus pro-
 prius ib. 37
 Sectionis modus super costas in vulneribus thoracis
 215. 50
 Semen non pulsare 143. 37
 Seminalis materiei duas esse partes 103. 58
 Semina quando colligenda 26. 48
 Seminum melonum cui aduersus viros rubros 301.
 12
 Sensus externi quot sint 14. 42
 Sensus quomodo deferatur ad universas partes per
 nervos 14. 51
 Sensus quae ex his magis & quae minus seruiant ad in-
 vestigandas rerum naturas 14. 50
 Septisariorum inveniuntur circa amovium 43. 44
 Siccantium medicamentorum tres classes 185. 48
 Siccitas est inimica natura 16. 20
 Signa vulneris colli 184. 49
 Signa vlcis in crura sectionis in fractura & egres-
 sarum squamarum 84. 24
 Signa vlcusculorum in luxationibus sub fasciis la-
 tentium 96. 46
 Signa quod si in luxatione denudatum sit squama
 emissurum 82. 24 quibus medicamentis squa-
 mas illi sit occurrendum ib. 30
 Signa recessuri magni ossis in fractura cum vlcere
 94. 31
 Signa bona vel mala deligationis in luxatione 72.
 26
 simplex quoad nomen quid sit sol. 1. 40 quoniam
 ib. & sol. 2
 simplicita dupliciter accipi 5. 18
 simplicita naturalia an etiam reperiantur 4. 50
 simplicita quo tempore colligenda 28. 20 quid per il-
 lud tempus intelligatur ib. 21
 simplicita frigida quando sint colligenda 28. 9
 sinapsimi quomodo & ex quibus conficiantur 21.
 31
 Sinapium ex Galeno esse dioscurum sine hipposeli-
 non 42. 24
 Solim error de loco in quo nascatur balsamus 301.
 21
 Soluentia quando sint colligenda 28. 30
 Soluentia seu purgantia electiva quae facultate tra-
 hant 20. 14
 soluentis medicamenti ut traherent inuari à cali-
 ditate 20. 37
 solutio continui quid sit 15. 8. 24 sit ne morbus sim-
 plex vel compositus ib. 41
 Solutio continui cur dicatur morbus communis 159.
 23 quae sint eius differentiae ib. 29 ex quibus for-
 ribus hauriantur ib. 34
 Solutio continui an ledat nutritionem 2. 59.
 5
 Solutio speciei ex Conciliatore 159. 45 ex Ga-
 leno 160. 6 unde hauriantur secundum Fallop.
 ib. 40
 Solutio ossis multiplex 88. 13
 Saninus & quae oculorum quantum vulneris co-
 ferat 263. 40
 Sordes quid significet 108. 1
 Sordis causa 169. 9
 Spica seu nardi genera & species 40. 19
 Spica nardi indica descriptio cur à Dioscoride sit o-
 missa 38. 21
 Spica nardi indica duplex 38. 10 unde sit vocetur
 ib. 11
 Spica nardi indica electio 38. 20 electio spica mon-
 tanae ib. 52
 Spica nardi indicam veram an habeamus nec ne
 38. 23
 Spica nardi indica descriptio ex Plinio 38. 26 Opi-
 nio Fallopi 38. 34
 Spica nardi indicam integram ad nos non defer-
 rat 38. 37
 Spica nardi indica num sit spica vel radix 38. 40
 unde ad nos deferatur 38. 48 quae sint eius vires
 39. 7
 Spicam nostram non esse spicam celticam 40. 10 nec
 spicam celticam lauedulam esse ib. 12 nec salu-
 cam ib. 12 nec psendonardum
 Spica celtica vires 39. 51 descriptio 40. 2 electio &
 preparatio ib. 7 adulterium ib. 8
 Spica nardi celtica cur dicatur gallica 39. 18 quod o-
 mnes habeat doses quas indica ib. 16 ubi nasa-
 tur ib. 26 unde ad nos deferatur 40. 6
 Spica montana nomina 40. 24 descriptio ib.
 42
 Spica montana unde potissimum ad nos deferatur
 40. 39
 Spindis medulla vulnera an & quae lethalia sint
 36. 23
 Spinalis medulla in collo vulnera quae & qualia
 sint 212. 37 cur necessario sint lethalia ib. 50
 Spiritus non componere corpus 115. 12
 Spiritus nostri corporis sensu cognosci non posse
 sed ratione saltem 96. 36
 Spiritum animale esse immediatum instrumen-
 b h 3

- rum facultati animalis 118.47
 Spiritus naturalis unde fiat & quo tempore 98.35
 quis sit eius fons ib.
 Spiritus vulneratorum quomodo restituerandi 190.
 32
 Splenia unde nomen habeant 71.25 ex quibus re-
 bus fiant ib.27 quis eorum usus ib.30 qualia &
 quanta esse debeant in luxationibus ib.36 appo-
 sitis splenis quid agendum ib.53 ad quid faciāt
 fascia super splenia ligata ib.58
 Splenia in fracturiscum ulcere quibus madesce-
 da 95.5
 Spoggia cur elixari non possit 11.5
 Squalor apud Theophrastum quid & quod signifi-
 cet 29.31
 Staphyloma quid & quotuplex sit 240.39
 Steatoma quid sit 282.8 quae eius nomina & ma-
 teria ib. quas corpora paries occupet ib.13 qua
 sint eius signa ibidem.15 Curatio ibidem. ven-
 na sectio ibidem. 16 Curatio per caustica ib.
 27 Curatio per sectionem, si sit pendens ibi-
 dem 37 si non pendens ibidem. 44 si sit cir-
 caguttur. ibid. sectionis modus proprius ib.
 50
 Steatoma quomodo cognoscatur 277.35
 Stigmata seu distorsiones 61.29
 Stigmata nigra post suppurationem varorum in
 facie relicta quomodo sint auferenda 302.
 5
 Struma seu serophula quid sint 183.18 unde
 habeant nomen ib.25 causae sint maxime
 infesta ib.26 quae earum causa efficiens ib.
 30. materia ib.36 quotuplex sint struma
 ib.45 quomodo fiant ibi.48 quos locos oc-
 cupent ib.55 & 189.1 quomodo cognoscantur
 289.6 quomodo a tumoribus gallicis differant
 ib.8 si sint in articulo pedum vel manuum quo-
 modo cognoscantur ib.10 Quae sint earum dif-
 ferentia ib.13 quae malignarum signa ib.18
 quae in ipsis viuentio seruanda ib.41 cur à
 vino abstinendum ib.45 quomodo & per qua
 materia peccans sit euacuanda 290.20 quan-
 do struma sint diuturnissima per quae euacuatio
 fit instituenda ib.23 quomodo materia pra-
 paranda ib.27 an vena sectio conueniat ib.
 43 diuersio à capite per qua fiat ib.46 mate-
 ria strumarum exsistens in visceribus quomodo
 fit digerenda 291.8 an usus theriaca conue-
 niat in pueris ib.15 Theriaca quid & quomo-
 do conferat contra strumas ib.18 quomodo co-
 gnoscendum an struma sit suppuratura 291.37
 quomodo suppuratio sit promouenda ib.39 an
 aperienda sit struma vomica per ferrum an ve-
 ro caustico ib.49 quomodo struma post dis-
 ruptionem tractanda 291.2 quomodo cicatrice
 obdunda ib.8 Si post unam strumam sanata
 insurgant alia quid faciendum ib.11 quando stru-
 ma non possunt su- pura ē. quid agendum ib.10
- quid si struma haereat infigui vult vel nemo ib.
 45 Si sit cancerosa quomodo per ferrum extra-
 henda ib.51 Cuius quomodo pro extrahēte glā-
 dulari sit aperienda ib.55 struma quomodo mo-
 do Empyriorum curanda 293.17 quomodo per
 sectionem extirpanda ib.19 quae earum curatio
 praestigiosa ib.29
 Sublimatum quomodo parietur 291.13
 Substantiam hominis multiplicem esse 96.22
 Succos omnes in corpore, quoniam etiam excremē-
 ta sint, habere partes aliquas tenuiores 258.5
 Succus foliorum & plantarum quando colligendus
 30.51 per succum illū quid intelligendū 30.49
 Succus limonum vis 25.40
 Suffumigabile & non 11.46
 Suffumigium ex lapide pyritide contra scorbis
 261.2
 Sugens venenum ex vulnere quomodo sit praer-
 uandus aut praueniendus 190.13
 Sutura quid sit 176.26 quae eius species ib.27 ma-
 teria 177.22 quantū carnis in consusione vul-
 nerum sit arripiendum 178.5
 Sutura in qua vulneris parte incipi debeat 179
 Syngotomi figura pro secunda fistula ani perfora-
 te 250.16
 Syngotomi figura pro secunda ani fistula non pe-
 forante ib.34
 Sympus infundendus in canalicem vulneris the-
 racis 172.2
- T**abella & regula lignea ad fracturam osium
 vsuales 92.58 quando apponenda 93.1 qua
 in vīs obseruanda 10.4
 Tactum in homine esse exquisitiorē quam sint a-
 lij sensus 134.20
 Tactus quomodo possit cognitionem tradere medi-
 camentorum ac naturarum simplicium 143
 Tactui cedentia & non cedentia 9.53 quae horum
 causa 11.2
 Talpa quid sit 180.5
 Telarum & laqueorum ad coniungenda labia vul-
 nerum preparatio 175.21 modus applicandi ib.
 54 quae circa modum hunc obseruanda. 176.3
 Tela an & quādo statim sint extrahenda & quan-
 do non 171.50 & 172
 per quam viam & vulneribus sint extrahenda 172.
 8 an integra sint extrahenda ib.22 quomo-
 do ager in hac operatione sit collocandus ib.19
 Tela in vulneribus relicta a quando sint extrahenda
 & quando non 169.40 quos modis extrahi pos-
 sint ib.55
 Temper amēta omnia possunt reperiri sub quacunq;
 specie celeris 172.22
 Temperamentum quotuplex 178.43
 Temperies loci vulneris quomodo possit conserua-
 ri 178.30
 Tempus vel tampus 44.42
 Tendo

I N D E X

Tendo seu chorda quid sit 123. 11 *quos eius significata* 122. 58 *qua materia* 123. 35 *alimendum ibid.* 50 *ortus ibid.* 52 *temperies* 125. 44 *usus ibid.* 52 *differentia ib.* 58 *an omnes musculi habeant tendines* 123. 20 *Tendo & ucrum quomodo differant* 123. 41 *omne chordam nascere in musculo* 123. 53 *chordam esse copositam ex nervo & ligamento* 124. 12 *quod habeat sensum non per consensum sed per presentiam nervi ibid.* 15 *num in compositione chordae tantum sit nervi quantum ligamenti* 124. 53 *inter chordam & ligamentum maiorem esse similitudinem quam inter chordam & nervum* 125. 26

Tenuz quod sit 13. 10

Tenuia quomodo & quibus incrassanda 21. 53

Terebinthum, myrtum malum, punicam candem habere magnitudinem 49. 41

Terribile & non scribile 10. 49 *qua utriusque causa* ibid.

Terra ampelisi 75. 51

Textuum varietas & correctio de men 34. 30

Theophrasti nugae de cassia 45. 25

Theriacum omnia superare medicamenta in lepro, & verum eius esse antidotum 275. 38

Thorax ex quot & quibus partibus constituitur 213. 31

Thymi quid sint 318. 38 *quomodo differant a fico ib.* *qua loca occupent ib.* *qua eorum sint causa ibid.* *materia ib.* *prafagium ib.* *curatio ibid.* *curatio manualis* ibid.

Tinea species 256. 36

Tinea humida qua sit 237. 39 *quomodo curetur ibid.* 41

Tinea & lactum infantium quomodo differant 237. 14

Tinea superata signa 237. 21

Tinea furfuracea quid sit 236. 38 *qua eius causa* ibid. 43 *signa ibid.* 48 *prafagium ibid.* 51 *curatio* ibid. 52

tinea si fuerit rebellis quid agendum 237. 32

tinea ulcera quomodo consolidanda 237. 25

tinea crusta quomodo fit emollienda 237. 5 *quomodo crusta innungenda ibid.* 8 *quomodo fricanda* ibid. 12

Triapharmaci compositio 323

Tricifici venes pro strumit 293. 3

Tumorem non omnem esse morbum 328. 31

Tumores magnos nunquam esse mites 262. 29

tunicas multas esse, qua non possunt esse membrana 126. 49

Turpitude quid sit 227. 57 *quotuplex sit ibid.* 59

Turpitude univrsi in quo consistat 328. 5

rum nomina & nominu ratio ib. 32 *qua causa efficientes ib.* 39. *materiales ib.* 40 *differentia seu species ib.* 43 *signa ibid.* 46 *prafagium ibid.* 47 *curatio ibid.* 51 *vultus ratio ib.* 52 *in quibus vena secanda ibid.* 57 *quomodo loci affectu tractandi ibid.* 59 *vari rubri quibus sint tractandi* 301. 8 *quomodo lactei* ibid. 34

vas omne in corpore pulsans esse arteriam 137. 19

vasa cur rumpantur quando facta est congelatio in ipsorum ore 9. 10

vasa vulnerata an debeant deligari per laqueos 210. 53 *quando non possunt ligari quid agendum* 211. 17

vellem Pauli esse idem quod voffellam Celsi 95. 18

qua eius figura ibid.

vena quid & qua eius natura 128. 30 *qua eius nomina ib.* 18 *constructio* 129. 3. *materia ib.* 4 *temperies ib.* 134. 15 *usus ib.* 18 *Passiones ibid.* 27. *substantia qua & quotuplex* 128. 26 *qua causa efficiens* 129. 7 *cur habeant triplicem fibrā* 128. 52 *an habeant in se carnem ibid.* 53 *an oriuntur ab epate* 129. 10 *quod primo fiant quam tpo ibid.* 11. *quod radicatione sint omnium partium prima ibid.* 18 *an viscus aliquod sit principium generationis venarum ibid.* 26 *quod ordinem primo fiant vena* 131. 58

venae causa explanationem omnes Medici exordiri ab epate excepto Vesalio 132. 45 *venas ab arteriis toto caelo differre* 133. 42 *Quod vena habeant unum actum & unum principium ib.* *quomodo, cur hepatis & cerebri vna sint principium venarum* 134. 12

an vena sentiant ibid. 36

vena an sint partes similes 102. 48

venam simpliciter accipi posse 102. 55

vena puppi 285. 9

vena ressecta cur restituitur 122. 20

vena sectio num requiratur pro curatione vulneris 182. 34 *unde indicetur in vulneribus ib.* 50

quando comeniat 183. 3

venarum & arteriarum colli vulneratarum officia quot modis observantur 208. 24

venis & arteriis colli vulneratis quid primo agendum 208. 10 *quomodo liganda* ibid. 34

venae causa vulnera cur lethalisima 163. 38

venena quantitate 7. 20

venena tota substantia ibid. 24

ventre & capite vulnerato cur frigida contingant, in artuum vero vulneribus calida esse debeant 184. 16

ventriculi vulnerati signa 226. 16

ventriculi vulnera qua lethalia sint, quaque non 164. 45

ventriculi vulntrum prafagia 225. 12 *si vulnus sit superficiale quid agendum ib.* 21 *quid si perforatus ventriculus ib.* 27 *si vulnus sit amplum ib.* 36 *qua exterius applicanda ib.* 42 *qua, qualia & quanta debeant esse cibaria ib.* 56 *qua exterius applicanda* 226. 9

| | | | |
|--|--------|--|-----------------|
| ventriculo vulnerato circumiacentes partes quomodo tractanda | 226.28 | unguentum de gummi elemi | 186.50 |
| venis quæ corpori incommoda afferat | 340.12 | unguentum malabathrinum & foliatum non esse idem | 43.40 |
| venere vulneratis vi plurimum morietem afferere | 184.28 | unguentum de matrisfilva | 186.40 |
| vermes esse causam maciei | 334.14 | unguenti ex melle duplex descriptio | 231.41 |
| verrucae esse contagiosas | 324 | unguentum de thutia magistrale | 189.10 |
| versiones omnes fieri aut per corruptionem, aut per ulteriorem concitacionem | 47.24 | ungues quid sint & quæ earum natura | 148.49 |
| vesica urinaria vulnerata signa | 220.15 | quæ earum causa | 149.27 |
| vesica vulnera qualia sint | 227.21 | quæ mater ibidem | 4. n. trimentum |
| in fundo vesicæ quid prognosticandum ib. | 14 | 2. causa efficiens ibidem | 8. |
| notandum circa syringæ usum ibidem | 28 | temperies ib. | 12 |
| qualis debeat esse cibus ibid. | 38 | usus ib. | 10 |
| quæ vena secunda ibid. | 39 | possessionis ibidem | 47 |
| vesica vulnera quæ lethalia sint & quæ non | 164.27 | quomodo ab ungulæ differant | 143.31 |
| vesica fellis vulnera cur necessario sint lethalia | 164.37 | sint partes corporis ibid. | 4. |
| vestimentis quibus rebus possint conservari à corruptione | 22.45 | an vere nutriuntur | 147.36 |
| victus attenuans quid sit | 332 | an sint partes similes | 148.50 |
| victus subnugalis pro prohibitione inflammationis in luxatione differentia | 73.49 | ancarum materia sive semen | 199.37 |
| vulneratorum victus qualis esse debeat | 183.49 | cur variet in ipsis appareant colores ib. | 1 |
| victus ratio in fracturis | 91.24 | quod habeat vitam & sensum | 146.31 |
| Purgatio victus ibid. | 25 | quod habeant proprios morbos | 147.8 |
| victus ratio in omnibus fracturis cum vulnere | 81.42 | in unguit. & dentib. duplex esse incrementum | 147.41 |
| vincula ad fracturas apta quo ordine inticienda | 93.12 | quare ungues in senibus magis videantur crescere quam in iuuenibus | 147.57 |
| vinum humidum ne sit an vero siccum | 23.56 | quomodo sentiant | 148.18 |
| vinum chalybeatis vinum in curatione canceri | 264.1 | ex qualis excremento fiant ib. | 13. |
| vinum patientis & aqua ardentis vires | 23.50 | convenientia inter substantiâ unguinum & cor. n. m. | 149.20 |
| viperarum præstantia contra lepram | 275.11 | vinum partium quid | 158.28 |
| quæ sit earum præparatio & usus ibid. | 26 | vinum partium quod duplex sit | 165.28 |
| in quibus regionibus vipera sint venenosissima | 36 | vinum partium vulneratarum quæ & quos requirat | 173.26 |
| virga aurea duplex | 264.19 | vocis sonora causa | 107.19 |
| viscidum quod est | 12.47 | volsella pro extractione infixi in oculo qualis esse debeat | 200.6 |
| causa ibidem | 49 | vomitum unde prægnantibus accidat | 113.46 |
| visciditas cur in rebus putrescentibus excutitur | 12.54 | urina suppressio unde fiat | 24.39 |
| visciditas nimia quomodo & quibus emendanda | 22.11 | & quomodo curanda | ibid. |
| viscera ad quem finem habeant membranas | 127.31 | vsuæ velasne | 36.29 |
| viscum omne per putredinem fieri | 170.12 | visionem in vulneratis vasis esse quam maxime vitandam & quare | 211.28 |
| visio fiat ne ex subita transfusione spirituum ad oculos | 119.13 | quæ in visione sint observanda | 171.32 |
| visus nerni sint ne cavi | 119.7 | vulneraria artis nobilitas | 157.31 |
| vitam in humido consistere | 16.20 | quod hæc pars paucissima habeat axiomata ib. | 44 |
| vituentia quadam ex compositione tantum elementorum consistere | 96.40 | quod sit omnium antiquissima ibid. | 43 |
| vulnerantia sine dolore contra strumas puerorum | 290.55 | qui eius primam autores de ea tractarint | ibid. 54 |
| vulnorum vesica succus mirabilis ad conglutinanda vulnera | 180.42 | vulnus quid sit | 158.20 |
| quomodo hic succus præparetur | ibid. | vulnus quæ sunt alicuius momenti nunquam sanari sine medico | 157.35 |
| uncie ponderales quomodo à mensuralibus differant | 274.23 | an in vulnere fiat vera nutritio | 159.4 |
| | | vulnus & vulcus quomodo differant | 161.34 |
| | | vulnorum differentia unde horantur ibid. | 57 |
| | | error modernorum circa ætatem vulnere | 162.15 |
| | | vulnorum vera accidentia ibid. | 24 |
| | | notandum in maximum circa fluxorem sanguinis in vulnere ibid. | 28 |
| | | vulnorum causa ibid. | 38 |
| | | circoscognoenda ibid. | 40 |
| | | signa ibid. | 46 |
| | | prognostica ibid. | 51 |
| | | quos in vulnere prævidenda atque præannuncianda sint | ibid. 59 |
| | | Vulnorum communis indicatio | 165.27 |
| | | instrumenta & cause errantes vulnus | 166.35 |
| | | impedientia naturam in curatione vulnorum quos sint | ibid. 43 |
| | | sex capita in curatione vulnorum observanda | ibid. 55 |
| | | | vulnera |

I N D E X

vulnera cur nonnunquam crudeſcant 190. 48
 quomodo cognoſcantur ibid. 47 quomodo cu-
 randa ibid. 51
 Vulnera omnia, in quibus neceſſaria eſt ſectio, dila-
 tatio & oſus abraſio, requirere neceſſario medi-
 camenta per os 183. 32
 vulnera unde dicantur magna 182. 40
 vulneris labia quibus rebus ſeruentur coniuncta
 173. 41
 vulnerū penetrantium in cavitatē thoris ac ſigna
 213. 54 prognofica ibid. 37 quando laſa
 ſunt contenta quid præſagiendum ibid. 52
 quomodo non penetrantia ſint curanda ib. 41
 quod penetrantia ut plurimum ſint lethalia
 214. 21
 Vulnera ſclopessorum an nova ſint nec ne 233. 6

ſclopessorum vulnus quid ſit ibidem. 20 an in
 his vulneribus adſit exuſtio ibidem 23 an ve-
 nenum 234. 5 quale ergo hac vulnera ſint
 234. 48 quas habeant cauſas, ſpecies & dif-
 ferentias ibidem. 51 que ſigna ibidem. 54
 quam curationem ibid. 58 quomodo ſiſtendus
 ſanguis 235. 30

X

Xyloballamum quid ſit 12 eius nota 53. 20 quod
 non habeamus in officiis ibid. 12

Z

Zibetum quid ſit 59. 27 que eius vires ibid.
 34 unde pronenitas ibid. 27. Quale ſit illud
 animal, ex quo pronenitas ibid. 24 quomodo &
 quibus cibus nutriatur ibid. 32

F I N I S.

BENEVOLVS LECTOR MENDA HAEC
pruſquam autorem noſtrum legat,
emendat.

Pag. 1 lin. 57 [ai] in 16. 53 [teritum] tetrum. 22. 19 [ndi non poſſe] ndi etiam poſſe 23 in titulo cap. [diſas] diſtos & lin.
 49 [ſunt, aſu] ſunt acta. 34. 4 [nos] vos 36. 2 [concedatur] comedatur. 53. 22 [ſopotes] ſopores 77. 22 [conſuſione] conſuſio 83.
 16 [copioſam] que aſquam [copioſa] que aqua 86. 52 [coſeſmo] chalcantio 107. 18 [ideo in ea imprimuntur] ideo imprimuntur 108.
 58 [ab excremento ad excrementum] ab extremo ad extremum 109. 38 [parmus] partibus 115. 4 [ergo] ego & lin. 39 [ſorta] ſora
 tui 117. 3 [locan] locali & ib. in rai. cap. [aitu] oeru 123. 58 [vi] & 133. 2 [qma] qna 143. 33 [poſſumus] vere poſſumus dicere ve-
 re 146. 21 [moſer] mouer 166. 20 [vulnere] vulnere 173. 14 [vox qma] vox, quz quia & ib. lin. 34 [xquylibus] xquilibus 157. 36
 [col. bol. & ib. lin. 46] [oliſa] ſeliſa 176. 29 [paxcipuo] paxcipue 182 in tit. cap. [res naturales] res ad naturales & ib. 1. 45 [erui]
 etiamſi 185. 6 [perfecta] per ſedam. 191. 45. [aiſoli] ſeroli. 197. 30 [damaſcenum] damaſcenam. 206. 21 [ſingularis] ſingularis
 207. 11 [ar] & 213. 1 in margine [om] oſen 218 in tit. cap. [empyemia] empyema 225 in tit. cap. [curandi] curandi 238. 4 [decli-
 nationo] deſillatio 240. 7 [Auicenna] Auicennaz & ib. lin. 49 [propobatur] promittatur. 241. 12 [eo] ego. 235. 41 [8] 3. 248. 5 [vde-
 ra] viera 255. 54 [scus plumbens] iacus plumbes 253. 57 [nimeur] nutritur 257. 58 [phlegmolum] phlegmolum 264. 15
 [guſtui ſua] guſtui non ſunt. 269. 5 [eratur] curatur 268. 36 [iſte malis rubrans] iſti malis rubus 270. 31 [oculo] oculo 272. 41
 [aliquid idem eſt exhibendum] aliquid idem exhibendum 273. 26 [leproſa maſſa ſanguis] leproſo maſſa ſanguis 275. 12 [ſi-
 poſis] ſiponſi 277. 11 [aſſa] eſſa 278. 30 in margine [ſalubris] ſalibus 279. 10 [deſcripio] deſcripio 287. 2 [efficientem eſſe] effi-
 cientem non eſſe & ib. lin. 41 [ſonum] ſonum. 288. 8 [aducentia] educentia. 290. 46. [oſas] alas & ib. lin. 49. [ſaſas] alas 294. 23
 [metacarpo] metacarpo oritur metacarpo oritur. 296. 37 [tangatur facile] facile ſunt tangatur, facile ſunt 297. 13 [er.] et. & ib.
 lin. 15 [Quando] Quandoque. & ib. lin. 16 [poſſumus] poſſumus lin. 19 [ex] ex 299. 41 [ocula] oculos. 300. 42 [diſtinctus] diſtin-
 ctus. 300. 55 [vel coppo] vel del coppo. 303. 33 [Graecis] videtur enim Graecis: videtur enim 281. 28 [quando] quandoque 283.
 34 [melancholia] melancholia 284. 47 [ex] eſt 285. 53 [tenetati] tenetati 286. 40 [ſicco] ſiccio 304. 30 [tendunt] iundunt 307. 37
 [eſt reuſus] eſt ſanguis reuſus 307. 2 [emita] emita 311. 47 [nomen] deinde 321. 10 [exerere] exercere. & ib. 39 [terraneo]
 terramentu 322. 3 [er.] et. ib. 18. [apta] aperta ib. 28 [eſt deſigatione] eſt in deſigatione. ib. 46 [ariculus] ariculus 328. 9 [vaca-
 tur] vocatur 333. 12 [naturum] iacuram 334. 11 [abſoluſ] abſoluſ 339. 55 [puera] pueros. & ib. [conſiſtentibus] conſiſtencia.
 340. 19 [eo] ego 413 [renuit] renuit ib. 16 [oblationem] oblationem 344. 18 [virginali] iugamali 353. 33 [illa] illa 324. 13 [cor-
 poris] corpore. ib. 15 [quibus] quibuſdam 330. 21 [patet] patet. ib. 40 [accationibus] occationibus. 331. 35 [officiis] officiis.
 ib. 51 & feces] et feces 332. 18 [ſcalongia] expa] capz aſcalongia. vel communes.

